

I 15 783 / 1072

©Akademie der Wissenschaften Wien; download unter: www.biologiezentrum.at

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE

Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet
festgestellten Tierarten

Teil XV p:

Coleoptera, Fam. Chrysomelidae von H. Jakob†, Wien



WIEN, 1979

VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Der Catalogus Faunae Austriae

zählt alle bisher innerhalb der Grenzen des heutigen Österreichs festgestellten rezenten Arten und Unterarten von Tieren auf. Es werden nicht nur die in der Fachliteratur erwähnten Arten berücksichtigt, sondern es finden auch solche möglichst Aufnahme in das Verzeichnis, die in den verschiedenen öffentlichen und privaten Sammlungen enthalten sind, über deren Vorkommen in Österreich jedoch bis jetzt noch nicht berichtet wurde. Damit wird zum ersten Male der Gesamtbestand der Tierwelt Österreichs aufgenommen, das sich, wie kaum ein zweites Land des europäischen Kontinents, trotzdem es verhältnismäßig klein ist, durch eine Vielheit der historisch-geographischen Faunenelemente und eine große ökologische Mannigfaltigkeit auszeichnet.

Das Werk gliedert sich in 21 Teile und erscheint in Abteilungen, die für sich paginiert sind; jeder Teil umfaßt eine oder mehrere solche Abteilungen. Diese Art der Einteilung ermöglicht einerseits die sofortige Drucklegung einer Abteilung, sobald diese im Manuskript fertiggestellt ist, andererseits aber doch auch die Gliederung des „Catalogus“ nach dem zoologischen System.

Einteilung des Catalogus Faunae Austriae

- Teil I: **Protozoa**, Einzellige Tiere
- II: **Porifera**, Schwammtiere; **Cnidaria**, Nesseltiere
- III: **Platyhelminthes**, Plattwürmer
- IV: **Aschelminthes**, Schlauchwürmer; **Nemertini**, Schnurwürmer
- V: **Chaetopoda**, Borstenwürmer
- VI: **Tardigrada**, Bärtierchen
- VII: **Mollusca**, Weichtiere; **Ectoprocta**, Moostierchen
- VIII: **Crustacea**, Krebse
- IX: **Arachnoidea**, Spinnentiere
- X: **Linguatulida**, Zungenwürmer
- XI: **Myriapoda**, Tausendfüßler
- XII—XX: **Insecta**, Insekten
- XXI: **Vertebrata**, Wirbeltiere

Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite

CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE

**Ein systematisches Verzeichnis
aller auf österreichischem Gebiet festgestellten Tierarten**

In Einzeldarstellungen herausgegeben
von der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften
unter Mitarbeit von Fachzoologen

Teil XV p:
Coleoptera
Fam. Chrysomelidae

Bearbeitet von H. Jakob†, Wien

Wien 1979



Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

ÖKOLOGIE UND EVOLUTION

ÖKOLOGIE UND EVOLUTION
VON
HANS-JÜRGEN
KREMER
UND
KARL
J. VON
HOLST

INSECTA

Ü.-Ordn.: **Coleopteroidea**Ordn.: **Coleoptera**U.-Ordn.: **Phytophaga**Teil XV p: **Fam. Chrysomelidae**

Bearbeitet von H. JAKOB, Wien

(Nach neuester Systematik werden die Halticidae als eigene Familie geführt.)

U.-Fam.: **Donaciinae**Gatt.: **Haemonia** LATREILLE 1829 = **Macrolea** SAMOUELLE

H. appendiculata (PANZER) 1794, Faun. Ins. Germ., fasc. 24, p. 17 (*Donacia a.*). — (*H. equiseti* FABRICIUS 1798; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., Käf., ed. 3, v. 2, p. 443). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 11. — F.-H.-L. 1966¹, p. 101. — FRANZ 1974², p. 386.

m.-n.-eur., sib. (hygrophil)

N B

Gatt.: **Donacia** FABRICIUS 1775

D. (Donacia s. str.) clavipes FABRICIUS 1793, Syst. Ent., v. 1, p. 117. — (*D. menyanthidis* GYLLENHAL 1827; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., Käf., ed. 3, v. 2, p. 507). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 34. — F.-H.-L. 1966, p. 104. — FRANZ 1974, p. 387.

eur., as. (paludicol)

Ö

D. appendiculata AHRENS 1810, Mon., v. 34, p. 16. — F.-H.-L. 1966, p. 103.

w.-, s.-eur., n.-afr.

St

D. (D.) crassipes FABRICIUS 1775, Syst. Ent., p. 195. — WEISE 1900, Ent. Zeit., v. 19, p. 125. — F.-H.-L. 1966, p. 102. — FRANZ 1974, p. 387.

eur., as. (hygrophil)

Ö

D. (D.) dentata HOPPE 1795, Enum. Ins. Erlang., p. 40. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 18. — F.-H.-L. 1966, p. 103. — FRANZ 1974, p. 387.

eur., as. (paludicol)

N St B K

D. (D.) versicolore BRAHM 1790, Ins. Kalender, v. 1, p. 135. — (*D. cincta* GERMAR 1810; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 439). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 20. — F.-H.-L. 1966, p. 103. — FRANZ 1974, p. 388.

eur., as.

Ö

D. (D.) semicuprea PANZER 1796, Faun. Germ., fasc. 29, p. 14. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 38. — F.-H.-L. 1966, p. 103. — FRANZ 1974, p. 387.

eur. (paludicol)

Ö

D. (D.) malinowskyi AHRENS 1810, N. Schr. Ges. Halle, v. 1, p. 29. — F.-H.-L. 1966, p. 104.

n.-, m.-eur., sib. (hygrophil)

Ö

¹ FREUDE, H. & HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. 1966. Die Käfer Mitteleuropas. v. 9. Krefeld, Goecke & Evers.

² FRANZ, H. 1974. Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck-München.

- D. (D.) sparganii* AHRENS 1810, N. Schr. Ges. Halle, v. 1, p. 20. — F.-H.-L. 1966, p. 105.
n.-, m.-eur., sib. (paludicol) O* (Ettenau)! LEEDER
- D. (D.) aquatica* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 397 (*Leptura a.*). — (*D. dentipes* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr. Käf., ed. 3, v. 2, p. 440). — WEISE 1893, Ins. Deutschl. v. 6, p. 22. — F.-H.-L. 1966, p. 105. — FRANZ 1974, p. 386.
eur., as. (paludicol) Ö
- D. (D.) impressa* PAYKUL 1799, Faun. Suec., v. 2, p. 193. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 31. — F.-H.-L. 1966, p. 105. — FRANZ 1974, p. 387.
pal. (paludicol) Ö
- D. (D.) brevicornis* AHRENS 1810, N. Schr. Ges. Halle, v. 1, p. 26. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 29. — F.-H.-L. 1966, p. 106. — FRANZ 1974, p. 386.
m.-eur. (paludicol) nT St K oT
- D. (D.) marginata* HOPPE 1795, Enum. Ins. Erlang., p. 42. — (*D. lemnae* FABRICIUS 1810; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 440). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 76. — F.-H.-L. 1966, p. 106. — FRANZ 1974, p. 387.
eur., as. (paludicol) Ö
- D. (D.) bicolor* ZSCHACH 1788, Mus. Leskean, p. 27. — (*D. sagittariae* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr. Käf., ed. 3, v. 2, p. 440). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 26. — F.-H.-L. 1966, p. 106. — FRANZ 1974, p. 386.
eur., as. (paludicol) Ö
- D. (D.) obscura* GYLLENHAL 1813, Ins. Suec., v. 3, p. 654. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 27. — F.-H.-L. 1966, p. 107. — FRANZ 1974, p. 387.
eur., as. (paludicol) Ö
- D. (D.) antiqua* KUNZE 1818, N. Schr. Ges. Halle, v. 2, p. 21. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 32. — F.-H.-L. 1966, p. 107. — FRANZ 1974, p. 386.
m.-, n.-eur. (paludicol) K+
- D. (D.) thalassina* GERMAR 1811, N. Schr. Ges. Halle, v. 6, p. 29. — F.-H.-L. 1966, p. 106. — FRANZ 1974, p. 387, 388.
eur., as. (paludicol) Ö
- D. (D.) vulgaris* ZSCHACH 1788, Mus. Laskean., p. 27. — (*D. typhar* AHRENS, 1810, N. Schr. Ges. Halle, v. 1; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr. Käf., ed. 3, v. 2, p. 442). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 39. — F.-H.-L. 1966, p. 103, 104. — FRANZ 1974, p. 388.
eur., as. Ö
- D. (D.) simplex* FABRICIUS 1775, Syst. Ent., p. 195. — (*D. linearis* HOPPE 1795, Ins. Erlan., v. 46, p. 10; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 441). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 40. — F.-H.-L. 1966, p. 104. — FRANZ 1974, p. 387.
pal. (paludicol) Ö
- D. tomentosa* AHRENS 1810, Nov. Act. Hal., v. 1, fasc. 3, p. 42. — F.-H.-L. 1966, p. 107. — FRANZ 1974, p. 388.
m.-eur., sib. O St
- D. (D.) cinerea* HERBST 1784, Fuessly Arch, v. 5, p. 100. — (*D. hydrocharidis* KUNZE 1818, N. Schr. Ges. Halle, v. 2; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr. Käf., ed. 3, v. 2, p. 442). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 41. — F.-H.-L. 1966, p. 107. — FRANZ 1974, p. 386, 387.
m.-, n.-eur., sib. (paludicol) Ö

Gatt.: Plateumaris C. G. THOMSON 1866

P. (Plateumaris s. str.) *discolor* (PANZER) 1795, Ent. Germ., p. 216 (*Donacia*). — (*P. comari* SUFFRIAN 1846; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr. ed. 3, v. 2, p. 443). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 47. — F.-H.-L. 1966, p. 108. — FRANZ 1974, p. 388, 389.

m.-eur. (paludicol)

V nT S O N* St K oT

P. (P.) sericea (LINNÉ) 1761, Faun. Suec., v. 2, p. 196 (*Leptura*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 45. — F.-H.-L. 1966, p. 108. — FRANZ 1974, p. 389.

eur., as.

Ö

P. (Juliusiana REITTER) *braccata* (SCOPOLI) 1772 Ann. Hist. Nat., v. 5, p. 100 (*Leptura*). — (*P. nigra* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 441). — WEISE 1896, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 296. — F.-H.-L. 1966, p. 109. — FRANZ 1974, p. 388.

eur., as. (paludicol)

V O N St K

P. (J.) consimilis (SCHRANK) 1781, Enum. Ins. Austr., p. 155 (*Leptura*). — (*P. discolor* HOPPE 1795, Enum. Ins. Erlang.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 441). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 50. — F.-H.-L. 1966, p. 109. — FRANZ 1974, p. 388.

eur., as. (paludicol)

Ö

P. (J.) affinis (KUNZE) 1818, N. Schr. Ges. Halle, v. 4, p. 27 (*Donacia*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 53. — F.-H.-L. 1966, p. 109. — FRANZ 1974, p. 388.

pal. (paludicol)

N St K

P. (J.) rustica (KUNZE) 1818, N. Schr. Ges. Halle, v. 4, p. 31 (*Donacia*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 51. — F.-H.-L. 1966, p. 109. — FRANZ 1974, p. 389.

m.-eur. (paludicol)

Ö

U.-Fam.: Orsodacninae

Gatt.: Orsodacne LATREILLE 1802

O. cerasi (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — WEISE 1896, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 295. — F.-H.-L. 1966, p. 110. — FRANZ 1974, p. 389.

eur. (subalpin)

Ö

O. lineola (PANZER) 1795, Ent. Germ., p. 170 (*Crioceris*). — (*O. nigriceps* LATREILLE 1807; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 438). — WEISE 1896, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 295. — F.-H.-L. 1966, p. 110. — FRANZ 1974, p. 389.

m.-, s.-eur., med.

N (Leithagebirge) St B*

Gatt.: Zeugophora KUNZE 1818

Z. scutellaris SUFFRIAN 1840, Stett. Ent. Zeit., v. 1, p. 99. — F.-H.-L. 1966, p. 110. — FRANZ 1974, p. 390.

eur., sib.

nT O N

Z. subspinosa (FABRICIUS) 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 55 (*Crioceris*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 57. — F.-H.-L. 1966, p. 111. — FRANZ 1974, p. 390.

eur.

Ö

- Z. flavicollis* (MARSHAM) 1802, Ent. Brit., v. 1, p. 217 (*Auchenia*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 58. — F.-H.-L. 1966, p. 111. — FRANZ 1974, p. 389.
m.-eur. Ö

U.-Fam.: **Criocerinae**Gatt.: **Lema** FABRICIUS 1798

- L. erichsoni* SUFFRIAN 1841, Stett. Ent. Zeit., v. 2, p. 104. — F.-H.-L. 1966, p. 112. — FRANZ 1974, p. 390.
m., s.-eur. Ö
- L. septentrionis* WEISE 1880, Deutsch. Zeit., v. 3, p. 158. — F.-H.-L. 1966, p. 113. — FRANZ 1974, p. 391.
n., m.-eur. oN B St
- L. cyanella* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., p. 376 (*Chrysomela*). — (*L. puncticollis* CURTIS 1830; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 445). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 61. — F.-H.-L. 1966, p. 112. — FRANZ 1974, p. 390.
eur., as. (Sibirien) Ö
- L. lichenis* (VOET) 1806, Cat. Syst. Col., v. 2, p. 42 (*Crioceris*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 63. — (*L. cyanella* PAYKUL 1798). — F.-H.-L. 1966, p. 112. — FRANZ 1974, p. 390.
eur., as. (Sibirien) Ö
- L. tristis* (HERBST) 1786, Fuessly Arch. Ins., v. 7, p. 165 (*Chrysomela*). — (*L. flavipes* SUFFRIAN 1841; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 446). — WEISE 1900, Arch. Nat., v. 66, p. 267. — F.-H.-L. 1966, p. 113. — FRANZ 1974, p. 391.
eur., as. (Sibirien) nT N K
- L. melanopa* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 65. — F.-H.-L. 1966, p. 113. — *pa* FRANZ 1974, p. 391.
pal. (Sibirien) Ö
- L. rufocyanea* SUFFRIAN 1847, Stett. Ent. Zeit., v. 8, p. 99. — (*L. cyanipennis* DUFTSCHMIDT 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 243). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 66. — F.-H.-L. 1966, p. 113. — FRANZ 1974, p. 391.
eur. (Sibirien) nT O N

Gatt.: **Crioceris** GEOFFROY 1762

- C. duodecimpunctata* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 72. — F.-H.-L. 1966, p. 114. — FRANZ 1974, p. 391.
m.-eur., n.-am. (Sibirien) Ö
- C. quatuordecimpunctata* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 37 (*Attelabus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 74. — F.-H.-L. 1966, p. 114. — FRANZ 1974, p. 391.
eur., as. (Sibirien) St N B*
- C. quinquepunctata* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 36 (*Attelabus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 75. — F.-H.-L. 1966, p. 114. — FRANZ 1974, p. 391, 392.
pann. (Sibirien) oSt N B
- C. asparagi* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — (*C. cruciata* SCHUSTER 1905; HEYDENI 1906, Wien. Ent. Zeit., v. 25, p. 124). — SCHUSTER 1907, Wien. Ent. Zeit., p. 111. — F.-H.-L. 1966, p. 113. — (*C. asparagi* FRANZ 1974, p. 391).
eur., as., n.-am. Ö

Gatt.: Lilioceris REITTER 1912

L. lilii (SCOPOLI) 1763, Syst. Carn., p. 63 (*Attelabus*). — (*L. meridigera* FABRICIUS 1775, Syst. Ent.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 446). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 69. — F.-H.-L. 1966, p. 115. — FRANZ 1974, p. 392.

eur.

Ö

L. meridigera (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — (*L. brunnea* FABRICIUS 1795; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 446). — REITTER 1893, Wien. Ent. Zeit., v. 12, p. 302. — F.-H.-L. 1966, p. 115. — FRANZ 1974, p. 392.

eur., as., n.-am.

Ö

L. tibialis (VILLA) 1836, Coll. Eur. Atl. Suppl., p. 63 (*Lema*). — (*L. alpina* REDTENBACHER 1849, Faun. Austr., p. 517). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 79. — F.-H.-L. 1966, p. 115. — FRANZ 1974, p. 392.

alp. (subalpin)

nT S O N St K oT

U.-Fam.: Clytrinae

Gatt.: Labidostomis REDTENBACHER 1845

L. tridentata (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — (*L. leithneri* REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 445). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 89. — F.-H.-L. 1966, p. 117. — FRANZ 1974, p. 393, 394.

eur., as.

Ö

L. humeralis (SCHNEIDER) 1792, Neuest. Magaz., ed. 1, v. 2, p. 192 (*Clytra*). — REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 448. — F.-H.-L. 1966, p. 117. — FRANZ 1974, p. 392, 393.

m.-eur.

N St B* K

L. longimana (LINNÉ) 1761, Faun. Suec., v. 2, p. 170 (*Chrysomela*). — REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 448. — F.-H.-L. 1966, p. 117. — FRANZ 1974, p. 393.

eur., as.

Ö

L. pallidipennis (GEBLER) 1830, Reis., ed. 2, v. 3, p. 199 (*Clytra*). — REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 449. — F.-H.-L. 1966, p. 117. — FRANZ 1974, p. 393.

m.-eur., s.-as.

N St B

L. cyanicornis (GERMAR) 1817, Germ. Faun. Ins. Eur., v. 7, p. 7 (*Clytra*). — (*L. tridentata* REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 488). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 99. — F.-H.-L. 1966, p. 117. — FRANZ 1974, p. 392.

med.

N B sK

L. lucida GERMAR ssp. *axillaris* LACORDAIRE in: FRANZ 1974, p. 393.

m.-s.-eur., kauk.

nN nB

Gatt.: Lachnaea REDTENBACHER 1845

L. sexpunctata (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 67 (*Buprestis*). — (*Cryptocephalus longipes* FABRICIUS 1875, Syst. Ent., p. 105; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 450). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 107. — F.-H.-L. 1966, p. 118. — FRANZ 1974, p. 394.

med.

O N St K B oT

L. italica WEISE 1882, Nat. Deutschl., v. 6, p. 108. — F.-H.-L. 1966, p. 118.

med.

sK?

Gatt.: Antipa DEGEER 1778

- A. macropus* (ILLIGER) 1800, Wiedem. Archiv Zool., ed. 1, v. 2, p. 128 (*Clytra*). — (*Tituboea* m. WEISE 1893, Naturg. Deutschl., v. 6, p. 103). — F.-H.-L. 1966, p. 118. — FRANZ 1974, p. 394.
 pann. N (Steinfeld, Frauenstein KÜHNELT) B (Braunsberg, Leithageb. FRANZ)

Gatt.: Clytra LAICHHARTING 1781

- C. quadripunctata* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 374 (*Chrysomela*). — REDTENBACHER 1874, Fauna Austr., ed. 3, v. 2, p. 451. — F.-H.-L. 1966, p. 119. — FRANZ 1974, p. 394.
 eur., as. Ö

- C. appendicina* LACORDAIRE 1848, Mon. Phyt., v. 2, p. 208. — F.-H.-L. 1966, p. 119. — (*C. appendiculata* LACORDAIRE in: FRANZ 1974, p. 394).

s.-eur., as.

N B* K

- C. laeviuscula* RATZEBURG 1837, Forstinst., v. 1, p. 201, v. 2, p. 247. — F.-H.-L. 1966, p. 119. — FRANZ 1974, p. 394.

eur., as.

Ö

Gatt.: Gynandrophthalma LACORDAIRE = Cyaniris REDTENBACHER 1845

- G. cyanea* (FABRICIUS) 1775, Syst. Ent., p. 109 (*Cryptocephalus*). — REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 451. — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 88. — F.-H.-L. 1966, p. 119. — FRANZ 1974, p. 395, 396.

eur., as.

Ö

- G. flavicollis* (CHARPENTIER) 1825, Horae Entom., p. 236 (*Clytra*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 119. — F.-H.-L. 1966, p. 119. — FRANZ 1974, p. 396.

m., s.-eur., n.-afr.

N B

- G. diversipes* (LETZNER) 1839, Ent. Arb. Schles. Ges., p. 114 (*Clytra*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 120. — F.-H.-L. 1966, p. 119.

m.-eur.

V nT S

- G. aurita* (LINNÉ) 1766, Syst. Nat., ed. 12, p. 595 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 121. — F.-H.-L. 1966, p. 120. — FRANZ 1974, p. 395.

eur.-as.

V O N St B K oT

- G. affinis* (ILLIGER) 1794, Schneid. Neuest. Magaz., ed. 1, v. 5, p. 611 (*Cryptocephalus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 121. — F.-H.-L. 1966, p. 120. — FRANZ 1974, p. 395.

m., s.-eur., n.-afr.

Ö

- G. xanthaspis* (GERMAR) 1824, Ins. spec. nov., p. 547 (*Clytra*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 122. — F.-H.-L. 1966, p. 120. — FRANZ 1974, p. 396.

m., s.-eur., n.-afr.

N St B K

Gatt.: Chilotoma REDTENBACHER 1845

- Ch. musciformis* (GOEZE) 1777, Ent. Beitr., v. 1, p. 319 (*Chrysomela*). — (*Ch. bucephala* SCHALLER 1783; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 452). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 131. — F.-H.-L. 1966, p. 120. — FRANZ 1974, p. 396.

med.

N St B

Gatt.: **Coptocephala** LACORDAIRE 1848

- C. chalybaea* (GERMAR) 1824, Ins. spec. nov., p. 546 (*Clytra*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 119. — F.-H.-L. 1966, p. 121. — FRANZ 1974, p. 396.
pan., med. N B
- C. unifasciata* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 66 (*Buprestis*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 133. — F.-H.-L. 1966, p. 121. — FRANZ 1974, p. 397.
med. V N St K oT
- C. scopolina* (LINNÉ) 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 597 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 133. — F.-H.-L. 1966, p. 122. — FRANZ 1974, p. 397.
s.-, m.-eur., n.-afr. V S N St K oT
- C. rubicunda* (LAICHHARTING) 1781, Verz. Tyrol. Ins., v. 1, p. 169 (*Clytra*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 135. — F.-H.-L. 1966, p. 122. — FRANZ 1974, p. 396, 397.
m.-eur. (subalpin) Ö

U.-Fam.: **Cryptocephalinae**Gatt.: **Pachybrachys** SUFFRIAN 1848

- P. hieroglyphicus* (LAICHHARTING) 1781, Verz. Tyrol. Ins., v. 1, p. 182 (*Cryptocephalus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 248. — F.-H.-L. 1966, p. 123. — FRANZ 1974, p. 397.
eur., sib. Ö
- P. haliciensis* MILLER 1868, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, v. 18, p. 29. — (*P. sinuatus* MULSANT & REY in: F.-H.-L. 1966, p. 124). — FRANZ 1974, p. 397.
m.-eur. V nT S O N St K* oT
- P. hippophaeus* SUFFRIAN 1848, Linn. Ent., v. 3, p. 125. — F.-H.-L. 1966, p. 124. — FRANZ 1974, p. 397, 398.
submed. V nT S O N K oT
- P. tessellatus* (OLIVIER) 1791, Encycl. math., v. 6, p. 618 (*Cryptocephalus*). — (*P. bisignatus* REDTENBACHER 1849, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 563). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 262. — F.-H.-L. 1966, p. 124. — FRANZ 1974, p. 398.
med. N oSt B* sK
- P. picus* WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 264. — F.-H.-L. 1966, p. 125. — FRANZ 1974, p. 398.
submed. V N+ K+
- P. fimbriolatus* SUFFRIAN 1848, Linn. Ent., v. 3, p. 142; 1853, v. 8, p. 149. — F.-H.-L. 1966, p. 125. — FRANZ 1974, p. 397.
med. N St B sK
- P. flexuosus* WEISE var. *viennensis* WEISE in: FRANZ 1974, p. 397.
med. oN (Bisamberg GANGLBAUER)

Gatt.: **Cryptocephalus** GEOFFROY 1762

- C. carinthiacus* SUFFRIAN 1848, Linn. Ent., v. 3, p. 1. — F.-H.-L. 1966, p. 131.
s.-alp., end. sK

- C. coryli* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 147. — F.-H.-L. 1966, p. 131. — FRANZ 1974, p. 401.
eur., as. Ö
- C. cordiger* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 148. — F.-H.-L. 1966, p. 130. — FRANZ 1974, p. 401.
eur., as. Ö
- C. octopunctatus* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 67 (*Buprestis*). — (*C. variabilis* SCHNEIDER 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 458). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 149. — F.-H.-L. 1966, p. 132. — FRANZ 1974, p. 406.
m.-eur. Ö
- C. sexpunctatus* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 151. — F.-H.-L. 1966, p. 132. — FRANZ 1974, p. 409.
eur., as. Ö
- C. quinquepunctatus* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 67 (*BUPRESTIS*). — (*C. interruptus* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 458). — JUNK-SCHENKLING 1913, pars. 53., p. 179. — F.-H.-L. 1966, p. 131. — (*C. signatus* LAICHHARTING in: FRANZ 1974, p. 408).
m.-eur. Ö
- C. variegatus* FABRICIUS 1781, Spec. Ins., v. 2, p. 497. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 155. — F.-H.-L. 1966, p. 132. — FRANZ 1974, p. 409.
m.-eur. (subalpin) V nT S O K oT
- C. distinguendus* SCHNEIDER 1792, Neust. Magaz., ed. 1, v. 2, p. 209. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 156. — F.-H.-L. 1966, p. 131. — FRANZ 1974, p. 401.
n.-, m.-eur., sib. nT S O St K oT
- C. albolineatus* SUFFRIAN 1847a, Linn. Ent., v. 2, p. 55. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 157. — F.-H.-L. 1966, p. 132. — FRANZ 1974, p. 398.
alp., Schneeberg V nT S O* (Totes Gebirge KÜHNELT) N+ (Frauenstein bei Wien, Mödling REDTENBACHER, HICKER) St K oT
- C. laevicollis* GEBLER 1830, Ledeb. Reise, ed. 2, v. 3, p. 205. — F.-H.-L. 1966, p. 135. — FRANZ 1974, p. 404.
pann. N B
- C. bimaculatus* FABRICIUS 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 141. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 161. — F.-H.-L. 1966, p. 134.
sw.-eur. (alpin) St K oT
- C. imperialis* LAICHHARTING 1781, Verz. Tyrol. Ins., v. 1, p. 179. — (*C. bistrispunctatus* GERMAR 1823; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 462). — WEISE 1901, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 204. — F.-H.-L. 1966, p. 137. — FRANZ 1974, p. 403.
med. N B* (Parndorfer Platte FRANZ)
- C. trimaculatus* ROSSI 1790, Faun. Etrusca, p. 96. — (*C. salicis* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 462). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 165.
s.-, m.-eur., sib. B* K
- C. bipunctatus* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 374 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 166. — F.-H.-L. 1966, p. 136. — FRANZ 1974, p. 400.
eur., sib. O N St

- C. bipunctatus* ssp. *sanguinolentus* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 66 (*Chrysomela*). — FRANZ 1974, p. 400.
O sN nSt
- C. biguttatus* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 65 (*Buprestis*). — (*C. bipustulatus* FABRICIUS 1775, Syst. Ent.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 461). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 168. — F.-H.-L. 1966, p. 136. — FRANZ 1974, p. 399.
eur. Ö
- C. quatuordecimmaculatus* SCHNEIDER 1792, Neuest. Magaz., ed. 1, v. 2, p. 195. — (*C. coloratus* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 475). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 169. — F.-H.-L. 1966, p. 135. — FRANZ 1974, p. 408.
pann. N oSt B
- C. bohemiensis* DRAPANT 1819, Ann. génér. sc. phys. Brux., v. 1, p. 296. — (*C. böhmii* GERMAR 1824, Ins. spec. nov.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 463). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 175. — F.-H.-L. 1966, p. 135. — FRANZ 1974, p. 400.
pann. oSt B* (Gois)
- C. apicalis* GEBLER 1830, Ledeb. Reise, ed. 2, v. 3, p. 201. — (*C. flavoguttatus* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 464). — F.-H.-L. 1966, p. 134. — FRANZ 1974, p. 398.
pann. B (Zurndorf KLOSE)
- C. laetus* FABRICIUS 1792, Ent. Syst., ed. 1, v. 2, p. 54. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 178. — F.-H.-L. 1966, p. 125. — FRANZ 1974, p. 404.
m.-eur., as. N St
- C. villosulus* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2, p. 148. — F.-H.-L. 1966, p. 126. — (*C. [Proctophysus]* v. FRANZ 1974, p. 409, 410).
pann. N B
- C. schäfferi* SCHRANK 1789, Naturf., v. 24, p. 69. — (*C. lobatus* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 456). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 179. — F.-H.-L. 1966, p. 126. — (*C. [Proctophysus]* sch. FRANZ 1874, p. 408).
eur., as. N St B K
- C. aureolus* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2, p. 132. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 186. — F.-H.-L. 1966, p. 127. — FRANZ 1974, p. 398.
n., m.-eur. Ö
- C. aureolus* ssp. *illyricus* FRANZ 1949, Portug. Acta Biol., B., p. 174. — F.-H.-L. 1966, p. 127. — FRANZ 1974, p. 398.
s.-eur. sSt sK
- C. aureolus* ssp. *monticola* BREIT 1918, Wien. Ent. Zeit., v. 37, p. 37. — F.-H.-L. 1966, p. 127. — FRANZ 1974, p. 399.
alp. (subalpin) V nT S O N St K oT
- C. sericeus* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 374 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 183. — F.-H.-L. 1966, p. 126. — FRANZ 1974, p. 408, 409.
eur., as. Ö
- C. hypocheridis* (LINNÉ) 1758, Syst. Natg. Deutschl., ed. 10, v. 1, p. 370 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 188. — F.-H.-L. 1966, p. 127. — FRANZ 1974, p. 403.
eur., as. Ö

- C. hypochoeridis* ssp. *transiens* FRANZ 1949, Portug. acta Biol., B., p. 184. — F.-H.-L. 1966, p. 127. — FRANZ 1974, p. 403.
pann. N soSt B
- C. violaceus* LAICHHARTING 1781, Verz. Tyrol. Ins., p. 172. — (*C. virens* REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 459). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 190. — F.-H.-L. 1966, p. 128. — FRANZ 1974, p. 410.
m.-, s.-eur. Ö
- C. virens* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2, p. 125. — F.-H.-L. 1966, p. 144. — FRANZ 1974, p. 410.
pann., sib. O N St B K
- C. elongatus* GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 557. — F.-H.-L. 1966, p. 128. — FRANZ 1974, p. 402.
pann. N oSt B sK
- C. marginellus* OLIVIER 1791, Encycl. meth., v. 6, p. 616. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 192. — F.-H.-L. 1966, p. 128.
med. St? K?
- C. nitidus* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 374 (*Chrysomela*). — (*C. nitens* LINNÉ 1761, Faun. Suec., II.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 460). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 194. — F.-H.-L. 1966, p. 128. — FRANZ 1974, p. 405.
eur., as. Ö
- C. nitidulus* FABRICIUS 1787, Mant. Ins., v. 1, p. 84. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 193. — F.-H.-L. 1966, p. 128. — FRANZ 1974, p. 405.
n.-, m.-eur., as. Ö
- C. punctiger* PAYKUL 1799, Faun. suec., v. 2, p. 146. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 195. — F.-H.-L. 1966, p. 129. — FRANZ 1974, p. 407.
n.-, m.-eur., sib. nT S oSt
- C. pallidifrons* GYLLENHAL 1813, Ins. suec., v. 3, p. 625. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 196. — F.-H.-L. 1966, p. 129. — FRANZ 1974, p. 406.
m.-eur., sib. St
- C. janthinus* GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 555. — F.-H.-L. 1966, p. 129. — FRANZ 1974, p. 403.
s.-, m.-eur., sib. O N B K
- C. parvulus* MÜLLER 1776, Zool. Dan. Prodr., p. 58. — (*C. fulcratus* GERMAR 1824, Ins. spec. nov.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 460). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 198. — F.-H.-L. 1966, p. 129. — FRANZ 1974, p. 406.
eur., as. Ö
- C. coerulescens* SAHLBERG 1839, Diss. Ent. Ins. Fenn., p. 261. — (*C. flavilabris* GYLLENHAL 1813, Ins. suec., III.; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 460). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 200. — F.-H.-L. 1966, p. 129. — FRANZ 1974, p. 400.
eur. N+ 1874
- C. marginatus* FABRICIUS 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 140. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 202. — F.-H.-L. 1966, p. 130. — FRANZ 1974, p. 404.
eur. nT S O N St B K oT
- C. octomaculatus* ROSSI 1790 Faun. Etrusc., v. 1, p. 96. — (*C. quinquepunctatus* HARRER 1784; HORION 1951, Verz. Käf. Mitteleur., v. 2, p. 397). — F.-H.-L. 1966, p. 136. — FRANZ 1974, p. 406.
m.-, s.-eur., as. nT S N B

- C. pini* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 205. — F.-H.-L. 1966, p. 138. — (*C. [Disopus]* p. FRANZ 1974, p. 406, 407).
eur., as. Ö
- C. frenatus* LAICHHARTING 1781, Verz. Tyrol. Ins., v. 1, p. 183. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 209. — F.-H.-L. 1966, p. 138. — FRANZ 1974, p. 402.
m.-eur. Ö
- C. decemmaculatus* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — WEISE 1892, Ins. Deutschl., v. 6, p. 207. — F.-H.-L. 1966, p. 138. — FRANZ 1974, p. 401.
n., m.-eur., sib. V N St B K
- C. moraei* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 374 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 224. — F.-H.-L. 1966, p. 139. — FRANZ 1974, p. 404, 405.
eur., as. Ö
- C. octacosmus* BEDEL 1891, Faun. Col. Bass. Seine, v. 5, p. 131. — F.-H.-L. 1966, p. 141. — FRANZ 1974, p. 406.
eur., as. S N B
- C. quadriguttatus* RICHTER 1820, Suppl. Faun. Ins. Eur., p. 12. — F.-H.-L. 1966, p. 134. — FRANZ 1974, p. 407.
pann. N oSt B
- C. quadripustulatus* GYLLENHAL 1813, Ins. Suec., v. 3, p. 613. — F.-H.-L. 1966, p. 133. — FRANZ 1974, p. 407.
n., m.-eur., kauk. (subalpin) nT S O St K oT
- C. flavipes* FABRICIUS 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 146. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 214. — F.-H.-L. 1966, p. 133. — FRANZ 1974, p. 402.
eur., as. Ö
- C. signatifrons* SUFFRIAN 1847, Linn. Ent., v. 2, p. 172. — G. MÜLLER 1948/49 Atti. Mus. civ. stor. nat. Trieste, v. 17, p. 86. — F.-H.-L. 1966, p. 133. — FRANZ 1974, p. 409.
s., m.-eur., V O N St K
- C. turcicus* SUFFRIAN 1847, Mon., v. 2, p. 173. — F.-H.-L. 1966, p. 133.
med. K?
- C. vittatus* FABRICIUS 1775, Syst. Ent., p. 110. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 228. — F.-H.-L. 1966, p. 137. — FRANZ 1974, p. 410.
eur. Ö
- C. bilineatus* (LINNÉ) 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 597 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 229. — F.-H.-L. 1966, p. 140. — FRANZ 1974, p. 399, 400.
eur., as. Ö
- C. elegantulus* GRAVENHORST 1807, Vergl. Übers. Zool. Syst., p. 152. — (*C. tessellatus* GERMAR 1813; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 460). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 231. — F.-H.-L. 1966, p. 139. — FRANZ 1974, p. 401, 402.
s., m.-eur., as. S N St B K
- C. strigosus* GERMAR 1823, Ins. spec. nov., p. 560. — F.-H.-L. 1966, p. 140. — FRANZ 1974, p. 409.
med. O N St B K
- C. chrysopus* GEMEL 1788, ed. LINNÉ, ed. 1, v. 4, p. 1713. — (*C. hübnéri* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 416). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 216. — F.-H.-L. 1966, p. 142. — FRANZ 1974, p. 400.
m., n.-eur. N B K

- C. frontalis* MARSHAM 1802, Ent. Brit., v. 1, p. 211. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 218. — F.-H.-L. 1966, p. 142. — FRANZ 1974, p. 402.
n., m.-eur., sib. nT S O N St
- C. saliceti* ZEBE 1855, Stett. Ent. Zeit., v. 16, p. 28. — F.-H.-L. 1966, p. 142. — FRANZ 1974, p. 408.
m., n.-eur. V nT S N K oT
- C. ocellatus* DRAPANT 1819, Ann. gener. sc. phys. Brux., v. 1, p. 201. — (*C. geminus* GYLLENHAL 1827; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 461.) — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 219. — F.-H.-L. 1966, p. 141. — FRANZ 1974, p. 405, 406.
m., s.-eur. Ö
- C. querceti* SUFFRIAN 1848, Linn. Ent., v. 2, p. 96. — F.-H.-L. 1966, p. 141.
eur., as. nT B (teste JAKOB)
- C. labiatus* (LINNÉ) 1761, Faun. Suec., p. 169 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl. p. 221. — F.-H.-L. 1966, p. 142. — FRANZ 1974, p. 403, 404.
eur., as. Ö
- C. scapularis* SUFFRIAN 1848, Revis., p. 99. — F.-H.-L. 1966, p. 142. — FRANZ 1974, p. 408.
ital. oN
- C. exiguus* SCHNEIDER 1792, Neuest. Magaz., ed. 1, v. 2, p. 204. — (*C. wasastjernae* GYLLENHAL 1827; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 464.) — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 223. — F.-H.-L. 1966, p. 139. — FRANZ 1974, p. 402.
n., m.-eur., w.-sib. V N K
- C. pygmaeus* FABRICIUS 1792, Ent. Syst., ed. 1, v. 2, p. 70. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 233. — F.-H.-L. 1966, p. 142. — FRANZ 1974, p. 407.
m., s.-eur. Ö
- C. vittula* SUFFRIAN 1848, Linn. Ent., v. 3, p. 63. — F.-H.-L. 1966, p. 139. — FRANZ 1974, p. 410.
m., s.-eur. nT N St B K
- C. connexus* OLIVIER 1807, Ent., v. 6, p. 836. — F.-H.-L. 1966, p. 143. — FRANZ 1974, p. 400.
pann. N B
- C. fulvus* GOEZE 1777, Ent. Beytr., v. 1, p. 221. — (*C. minutus* FABRICIUS 1792; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 464.) — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 236. — F.-H.-L. 1966, p. 143. — FRANZ 1974, p. 403.
eur., as. Ö
- C. macellus* SUFFRIAN 1860, Linn. Ent., v. 14, p. 53. — F.-H.-L. 1966, p. 143. — FRANZ 1974, p. 404.
med. N
- C. planifrons* WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 239. — F.-H.-L. 1966, p. 143. — FRANZ 1974, p. 407.
pann. sSt sK
- C. populi* SUFFRIAN 1848, Linn. Ent., v. 2, p. 76. — F.-H.-L. 1966, p. 143. — FRANZ 1974, p. 407.
m.-eur. nT N St
- C. pusillus* FABRICIUS 1777, Gen. Ins. Mant., p. 221. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 242. — F.-H.-L. 1966, p. 144. — FRANZ 1974, p. 407.
eur. Ö
- C. rufipes* GOEZE 1777, Ent. Beytr., v. 1, p. 321. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 244. — F.-H.-L. 1966, p. 144. — FRANZ 1974, p. 408.
med. N oSt+ K+

U.-Fam.: **Lamprosominae**Gatt.: **Lamprosoma** Kirby 1818

L. concolor (STURM) 1807, Deutschl. Ins., v. 2, p. 109 (*Byrrhus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 282. — F.-H.-L. 1966, p. 145. — FRANZ 1974, p. 410, 411.

eur.

Ö

L. kolbei SCHOLZ 1926, Ent. Blätter, p. 105. — F.-H.-L. 1966, p. 145. — FRANZ 1974, p. 411.

m., s.-eur., kauk.

N St

U.-Fam.: **Eumolpinae**Gatt.: **Adoxus** Kirby 1837 (*Bromius* REDTENBACHER)

A. obscurus (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 375 (*Chrysomela*). — WEISE 1882, Ins. Deutschl., v. 6, p. 295. — F.-H.-L. 1966, p. 146. — FRANZ 1974, p. 411.

eur., as.

(schwarze Form auf Scorzonera, die braune Form auf Vitis) Ö

A. obscurus ssp. *villosulus* SCHRANK (*A. vitis* FABRICIUS) (*Bromius vitis* F.) in: FRANZ 1974, p. 411.

pal.

N nB

Gatt.: **Pachnephorus** REDTENBACHER 1845

P. pilosus (ROSSI) 1970, Faun. Etrusca., v. 1, p. 100 (*Cryptocephalus*). — (*P. arenarius* PANZER 1797; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 454). — REITTER 1901, Wien. Ent. Zeit., v. 20, p. 53. — F.-H.-L. 1966, p. 147. — FRANZ 1974, p. 411.

eur., kauk.

Ö

P. tessellatus (DUFTSCHMID) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 217 (*Eumolpus*). — REITTER 1901, Wien. Ent. Zeit., v. 20, p. 53. — F.-H.-L. 1966, p. 147.

m., s.-eur.

N B*

P. villosus (DUFTSCHMID) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 217 (*Eumolpus*). — REITTER 1901, Wien. Ent. Zeit., v. 20, p. 53. — F.-H.-L. 1966, p. 147. — FRANZ 1974, p. 411, 412.

m., s.-eur.

N B

Gatt.: **Chrysochus** REDTENBACHER 1845

Ch. asclepiadeus (PALLAS) 1776, Reise, v. 2, p. 69 (*Cryptocephalus*). — (*Ch. pretiosus* SCHNEIDER 1791; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., v. 2, p. 894). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 6, p. 107. — F.-H.-L. 1966, p. 148. — (*Ch. pretiosus* FABRICIUS in: FRANZ 1974, p. 412).

s., m.-eur., as.

O N St B K

U.-Fam.: **Chrysomelinae**Gatt.: **Leptinotarsa** STAL 1858

L. decemlineata (SAY) 1824, Journ. Ac. Philad., ed. 3, v. 3, p. 453 (*Chrysomela*). — KNAB 1907, Journ. N. York Ent. Soc., v. 15, p. 190. — HORION 1951, Verz. Käf. Mitteleur., v. 2, p. 400. — F.-H.-L. 1966, p. 151. — FRANZ 1974, p. 412.

n.-am. (Sibirien)

Ö

Gatt.: Chrysomela LINNÉ 1758

(Die Gatt. Chrysomela wird in ihrem ursprünglichen Sinn aufgefaßt — die vorgeschlagene Aufgliederung folgt der von F.-H.-L.)

Ch. fastuosa SCOPOLI 1763, Ent. Carn., p. 74. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 422. — F.-H.-L. 1966, p. 165. — FRANZ 1974, p. 413.

eur., as.

Ö

Ch. fimbrialis KÜSTER 1845, Käf. Eur., v. 2, p. 14. — F.-H.-L. 1966, p. 154. — (*Ch. [Diochrysa]* f. FRANZ 1974, p. 413, 414).

pann.

St N B

Ch. coerulea OLIVIER 1807, Ent., v. 5, p. 515. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 347. — F.-H.-L. 1966, p. 161.

s.-eur., as. (subalpin)

sK (Eisenkappel KÜHNELT 1941)

Ch. coerulans SCRIBA 1791, Journ. Lieb. Ent., v. 3, p. 286. — (*Ch. violacea* PANZER 1797; REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 471). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 118. — F.-H.-L. 1966, p. 164. — (*Ch. [Menthastriella]* c. FRANZ 1974, p. 413).

m.-eur.

Ö

Ch. menthastri SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 90. — (*Ch. herbacea* DUFTSCHMIED 1825, Faun. Austr., v. 3.)

pal.

Ö

Ch. graminis LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 369. — F.-H.-L. 1966, p. 163. — FRANZ 1974, p. 414, 415.

n.-, m.-eur., as. (Sibirien)

N B

Ch. lichenis ssp. *ahena* GERMAR 1824, Ibs. spec. nov., p. 586. — F.-H.-L. 1966, p. 162. — (*Ch. [Heliostola]* l. a. FRANZ 1974, p. 416, 417.)

alp. (alpin)

N St K

Ch. polita LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 370. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 430. — F.-H.-L. 1966, p. 164. — (*Ch. [Erythrochrysa]* p. FRANZ 1974, p. 418).

pal.

Ö

Ch. staphylea LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 370. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 380. — F.-H.-L. 1966, p. 157. — (*Ch. [Chrysolina]* st. FRANZ 1974, p. 419).

pal.

Ö

Ch. cerealis LINNÉ 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 588. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 413. — F.-H.-L. 1966, p. 162. — (*Ch. [Chrysomorpha]* c. FRANZ 1974, p. 412).

eur., as. (subalpin)

V nT S O N St K oT

Ch. cerealis ssp. *alternans* PANZER 1799, Faun. Germ., fasc. 67, p. 16. — (*Ch. c.* ssp. *plorans* BECK) JAKOB 1954, Koleopt. Rundsch., v. 32, p. 104. — FRANZ 1974, p. 413.

pann.

oN B

Ch. cerealis ssp. *mixta* KÜSTER in: FRANZ 1974, p. 413.

alp.

St K

Ch. relucens ROSENHEIM 1847, Beitr. Ins. Eur., v. 1, p. 62. — F.-H.-L. 1966, p. 161.

alp. (subalpin — hochalpin)

V nT

Ch. rufa DUFTSCHMIED 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 186. — FRANZ 1952, Ent. Nachrichtenbl., öst. u. schw. Ent., v. 4, fasc. 1—3, p. 2. — F.-H.-L. 1966, p. 157. — (*Ch. [Colaphopterus]* r. FRANZ 1974, p. 418, 419).

m.-eur. (montan)

O N St

Ch. rufa ssp. *crassicollis* SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 50. — FRANZ 1952, Ent. Nachrichtenblatt öst. u. schw. Ent., v. 4, fasc. 1—3, p. 2. — FRANZ 1974, p. 418.

o.-alp., karp. (montan)

S O N St K

Ch. globosa PANZER 1805, Faun. Germ., fasc. 87, p. 16. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 363. — F.-H.-L. 1966, p. 160. — (*Ch. [Colaphopterus]* g. FRANZ 1974, p. 414).

östl. m.-eur. (montan)

O N St K

Ch. marcasitica GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 585. — F.-H.-L. 1966, p. 158. — (*Ch. [Colaphopterus]* m. FRANZ 1974, p. 417).

o., m.-eur. (montan)

nT S O N St K oT

Ch. hemisphaerica GERMAR 1817, Reise Dalmat., p. 204. — FRANZ 1952, Ent. Nachrichtenbl. Öst. u. Schweiz. Ent., v. 4, fasc. 1—3, p. 2—6.

med. (montan)

sK

Ch. hemisphaerica ssp. *crassimargo* GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 584. — FRANZ 1952, Ent. Nachrichtenbl. Öst. u. Schweiz. Ent., v. 4, fasc. 1—3, p. 2—6. — F.-H.-L. 1966, p. 159. — (*Ch. [Colaphopterus]* h. c. FRANZ 1974, p. 415).

o.-alp. (subalpin — alpin)

S O N St nK oT

Ch. hemisphaerica ssp. *purpurascens* GERMAR 1822, Faun. Ins. Eur., v. 5, p. 6. — FRANZ 1952, Ent. Nachrichtenbl. Öst. u. Schweiz. Ent., v. 4, fasc. 1—3, p. 2—6. — F.-H.-L. 1966, p. 159.

m.-eur., (Schwarzwald, Suchten)

N

Ch. oricalcia MÜLLER 1776, Zool. Dan. Prodr., p. 82. — (*Ch. lomina* MATZEK 1842, Übers. Arb. Schles., p. 156). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 398. — F.-H.-L. 1966, p. 155. — FRANZ 1974, p. 417.

eur., as.

Ö

Ch. chalcites GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 587. — F.-H.-L. 1966, p. 155. — (*Ch. [Minckia]* ch. FRANZ 1974, p. 413).

pann.

oN B

Ch. rufoaenea SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 122. — F.-H.-L. 1966, p. 155.

m.-eur.

V nT

Ch. haemoptera LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 369. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 368. — F.-H.-L. 1966, p. 160. — (*Ch. [Colaphodes]* h. FRANZ 1974, p. 415).

eur., as.

Ö

Ch. violacea MÜLLER 1776, Zool. Danic. Prodr., p. 81. — (*Ch. goettingensis* auct. LINNÉ 1761). — (*Ch. diversipes* BEDEL 1892). — (*Ch. fuscipes* GMELIN 1890). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 374. — (*Ch. diversipes* BEDEL in: F.-H.-L. 1966, p. 160). — (*Ch. [Colaphosoma]* v. FRANZ 1974, p. 420).

eur., as.

Ö

Ch. sanguinolenta LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 371. — (*Ch. marginalis* DUFTSCHMIED 1825, Faun. Austr., v. 3). — FRANZ 1938, Ent. Blätt., v. 34, fasc. 4, p. 202. — F.-H.-L. 1966, p. 154. — (*Ch. [Stichoptera]* s. FRANZ 1974, p. 419).

eur., as.

Ö

- Ch. rossia* ILLIGER 1802, Mag. Ins., v. 1, p. 415. — (*Ch. rossii* SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 38). — FRANZ 1938, Ent. Blätt., v. 34, fasc. 4, p. 197. — F.-H.-L. 1966, p. 153.
med. O (Nußdorf a. Attersee)*
- Ch. grysohilae* KÜSTER 1845, Käf. Eur., v. 2, p. 71. — FRANZ 1938, Ent. Blätt., v. 34, fasc. 4, p. 193. — F.-H.-L. 1966, p. 154. — (*Ch. [Stichoptera] g.* FRANZ 1974, p. 415).
eur., as. O N
- Ch. latecincta* (*crassicornis* HELLIENSEN) ssp. *holdhausi* FRANZ 1949, Zentralbl. Gesamtgeb. Ent., p. 3. — (*Ch. latecincta* DEMAISON in F.-H.-L. 1966, p. 154). — FRANZ 1974, p. 416.
alp. (hochalpin) St (Dachstein)
- Ch. latecincta* (*crassicornis* HELLIENSEN) ssp. *norica* HOLDHAUS 1914, Verh. Zool.-Bot. Ges., p. 126. — FRANZ 1938, Ent. Blätt., v. 34, fasc. 4, p. 258. — FRANZ 1974, p. 416.
alp. (hochalpin) nT S K
- Ch. latecincta* (*crassicornis* HELLIENSEN) ssp. *rheatica* FRANZ 1938, Ent. Bl., v. 34, fasc. 4, p. 252.
alp. (hochalpin) nT (Wettersteingeb.)*
- Ch. küsteri* HELLIENSEN 1911, Aaarsber. Stavang. Mus., v. 22, fasc. 1, p. 7. — FRANZ 1938, Ent. Blätt., v. 34, fasc. 4, p. 202. — (*Ch. sanguinolenta* KÜSTER 1847). — F.-H.-L. 1966, p. 153. — (*Ch. [Stichoptera] k.* FRANZ 1974, p. 416).
s., m.-eur. (Tallagen) Ö
- Ch. perplexa* BREIT 1920, Kol. Rundsch., v. 8, p. 86. — F.-H.-L. 1966, p. 163. — (*Ch. [Anopachys] p.* FRANZ 1974, p. 418).
end., (Donauauen bei Wien, S.-Slowakei) N (Klosterneuburg BREIT 1920)
- Ch. varians* SCHALLER 1783, Abh. Nat. Frnde Ges. Halle, p. 271. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 428. — F.-H.-L. 1966, p. 161. — (*Ch. [Sphaeromela] v.* FRANZ 1974, p. 419, 420).
eur., kl.-as., afr. Ö
- Ch. didymata* SCRIBA 1971, Journ. Liebh. Ent., v. 1, p. 294. — F.-H.-L. 1966, p. 156. — FRANZ 1974, p. 413.
s., sm.-eur., kl.-as. (der Autor bezweifelt das Vorkommen in Ö) sO
- Ch. hyperici* FORSTER 1771, Nov. spec. Ins., v. 1, p. 20. — (*Ch. fucata* FABRICIUS 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 126). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 406. — F.-H.-L. 1966, p. 156. — (*Ch. [Hypericia] h.* FRANZ 1974, p. 416).
eur., as., n.-afr. Ö
- Ch. brunsvicensis* GRAVENHORST 1807, vergl. Übers. Zool. Syst., p. 135. — REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 473. — F.-H.-L. 1966, p. 157. — (*Ch. [Hypericia] b.* FRANZ 1974, p. 412).
m.-eur. V
- Ch. geminata* PAYKUL 1799, Faun. Suec., v. 2, p. 65. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 403. — F.-H.-L. 1966, p. 156. — (*Ch. [Hypericia] g.* FRANZ 1974, p. 414).
n., m.-eur. Ö
- Ch. quadrigemina* SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 125. — (*Ch. cuprina* DUFTSCHMIED 1925 in: F.-H.-L. 1966, p. 157). — (*Ch. [Hypericia] cuprina* FRANZ 1974, p. 413).
m.-eur. nT N St
- Ch. carnifex* FABRICIUS 1792, Ent. Syst., ed. 1, v. 1, p. 325. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 386. — F.-H.-L. 1966, p. 154. — (*Ch. [Chalcoidea] c.* FRANZ 1974, p. 412).
m.-eur., sib. N St K

Ch. analis LINNÉ 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 592. — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 3. — F.-H.-L. 1966, p. 153. 154. — (*Ch. [Chalcoidea]* a. FRANZ 1974, p. 412).
eur. Ö

Ch. marginata LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 371. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 389. — F.-H.-L. 1966 p. 155. — FRANZ 1974, p. 417.
pal. Ö

Ch. limbata FABRICIUS 1775, Syst. Ent., p. 101. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 375. — F.-H.-L. 1966, p. 153. — (*Ch. [Craspeda]* l. FRANZ 1974, p. 417).
eur., as. nT N St B

Ch. limbata ssp. *findeli* SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 70. — REDTENBACHER 1874, Faun. Austr., ed. 3, v. 2, p. 476. — F.-H.-L. 1966, p. 153.
s.-alp. sK

Gatt.: Crosita MOTSCHULSKY

Ch. salviae GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 586. — F.-H.-L. 1966, p. 165.
s., m.-eur., as. N sK

Gatt.: Chrysochloa HOPPE 1840

Ch. (Allorina) WEISE 1902 *rugulosa* SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 181. — F.-H.-L. 1966, p. 167. — FRANZ 1974, p. 423.
eur. (montan) S (Schafberg MADER, BREIT, MOCZARSKI; von FRANZ nicht wiedergefunden)

Ch. (Romalorina) WEISE 1906 *intricata* ssp. *anderschi* (DUFTSCHMIED 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 166 (*Chrysomela*)). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 444. — F.-H.-L. 1966, p. 167. — (*Ch. i. a.* FRANZ 1974, p. 422, 423).
alp. (subalpin) V nT S O N K oT

Ch. (R.) alpestris ssp. *polymorpha* KRAATZ 1880, Ent. Monatsbl., v. 2, p. 35, 99. — WEISE 1884, Ins. Deutschl., v. 6, fasc. 3, p. 447. — F.-H.-L. 1966, p. 168.
w.-eur. (subalpin) V (Rosenegg-Bludenz MÜLLER 1901 ?+)

Ch. (R.) gloriosa (FABRICIUS) 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 497 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, p. Ins. Deutschl., v. 6, p. 450. — F.-H.-L. 1966, p. 169. — FRANZ 1974, p. 422.
m.-eur. (subalpin — hochalpin) V nT S O N St K oT

Ch. (R.) variabilis WEISE 1883, Deutsch. Ent. Zeitschr., v. 27, p. 245. — F.-H.-L. 1966, p. 169. — FRANZ 1974, p. 425.
m.-eur. (montan) V nT S O N St K

Ch. (R.) liturata (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 73 (*Coccinella*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 438. — F.-H.-L. 1966, p. 167.
s., o.-alp (subalpin) sK

Ch. (R.) vittigera SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 166. — WEISE 1884, Ins. Deutschl., v. 6, fasc. 3, p. 439, 458. — F.-H.-L. 1966, p. 169. — FRANZ 1974, p. 423.
m.-eur. (subalpin) V nT S N K oT

Ch. (R.) bifrons (FABRICIUS) 1792, Ent. Syst., ed. 1, v. 1, p. 314 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 461. — F.-H.-L. 1966, p. 168. — FRANZ 1974, p. 420, 412.
alp. (subalpin) V nT S O N St K oT

- Ch. (R.) bifrons* ssp. *decora* RICHTER 1820, Suppl. Faun. Ins. Eur., v. 1, p. 7. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 439, 462. — F.-H.-L. 1966, p. 168, 169.
alp. V nT
- Ch. (R.) viridis* (DUFTSCHMIED) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 167 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 465. — F.-H.-L. 1966, p. 169. — FRANZ 1974, p. 425.
m.-eur. (alpin — hochalpin) V nT S O N St K oT
- Ch. (R.) viridis* ssp. *waldenburgi* MÜLLER 1926, Studien.
s.-alp. (hochalpin) K
- Ch. (R.) virgulata* (GERMAR) 1824, Ins. spec. nov., p. 596 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 439. — F.-H.-L. 1966, p. 170. — FRANZ 1974, p. 425.
m.-eur. (subalpin — alpin) V nT S O N St K oT
- Ch. (R.) cacaliae* (SCHRANK) 1785, Fuessly Neuest, Magaz., ed. 2, v. 4, p. 317 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 475. — F.-H.-L. 1966, p. 170. — FRANZ 1974, p. 421.
m.-eur. (subalpin — alpin) V nT S O N St K oT
- Ch. (R.) speciosissima* (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 74 (*Coccinella*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 440. — F.-H.-L. 1966, p. 172. — FRANZ 1974, p. 423.
m.-eur. (subalpin) V nT S O N St K oT
- Ch. (R.) speciosissima* ssp. *troglydites* KIESWETTER 1861, Berlin. Ent. Zeitschr., v. 5, p. 291. — F.-H.-L. 1966, p. 172.
s.-, o.-alp. (hochalpin) V S K oT
- Ch. (R.) speciosissima* ssp. *flammea* JAKOB 1965, Col. Rundsch. Wien.
subalp. O N (Mühlviertel, Waldviertel)
- Ch. (R.) elongata* ssp. *ruffoi* FRANZ 1949, Zentralbl. Gesamtgeb. Ent., p. 3. — F.-H.-L. 1966, p. 172.
alp. (subalpin — alpin) V
- Ch. (R.) elongata* ssp. *styriaca* FRANZ 1949, Zentralbl. Gesamtgeb. Ent., p. 3. — F.-H.-L. 1966, p. 171. — (*Ch. e. st.* FRANZ 1974, p. 421, 422).
alp. (subalpin) StoK
- Ch. (R.) frigida* WEISE, Deutsch. Ent. Zeitsch., p. 247. — F.-H.-L. 1966, p. 170. — FRANZ 1974, p. 422.
alp. (hochalpin) V nT S St K oT
- Ch. (Protorina* WEISE 1894) *melanocephala* (DUFTSCHMIED) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 170 (*Chrysomela*). — JAKOB 1952, Ent. Arb. Mus. Frey. München, v. 3, fasc. 1, p. 96. — F.-H.-L. 1966, p. 173. — FRANZ 1974, p. 423.
o.-alp. (alp.) V nT S N St K oT
- Ch. (P.) plagiata* ssp. *commutata* SUFFRIAN 1861, Stett. Ent. Zeitsch., v. 22, p. 435. — JAKOB 1952, Ent. Arb. Mus. Frey. München, v. 3, fasc. 1, p. 96. — F.-H.-L. 1966, p. 173. — FRANZ 1974, p. 423.
alp. (subalpin) S O St K
- Ch. (P.) plagiata* ssp. *retenta* WEISE 1894, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 256. — JAKOB 1952, Ent. Arb. Mus. Frey. München, v. 3, fasc. 1, p. 96. — (*Ch. r.* WEISE in: F.-H.-L. 1966, p. 174).
o.-alp. (subalpin) St (Zirbitzkogel)

Gatt.: Colaphellus WEISE 1915

- C. sophiae* (SCHALLER) 1783, Abh. Halle Ges., v. 1, p. 272 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 305. — F.-H.-L. 1966, p. 174. — FRANZ 1974, p. 425.
 pann. N B

Gatt.: Gastroidea HOPPE 1840

- G. polygoni* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 307 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 308. — F.-H.-L. 1966, p. 174. — (*Gastroiophysa* p. FRANZ 1974, p. 426).
 eur., as., n.-am. Ö
- G. viridula* (DEGEER) 1775, Mem., v. 5, p. 311 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 307. — F.-H.-L. 1966, p. 175. — (*Gastroiophysa* v. FRANZ 1974, p. 426).
 eur., as., n.-am. (alpin bis paludicol) Ö

Gatt.: Phaedon LATREILLE 1829

- Ph. laevigatus* (DUFTSCHMIED) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 214 (*Chrysomela*). — (*Chrysomela gramicus* DUFTSCHMIED 1925, Faun. Austr., v. 3, p. 215.) — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 543. — F.-H.-L. 1966, p. 175. — FRANZ 1974, p. 432.
 o., m.-eur. (montan — paludicol) Ö
- Ph. cochleariae* (FABRICIUS) 1792, Ent. Syst., ed. 1, v. 1, p. 330 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 545. — F.-H.-L. 1966, p. 175. — FRANZ 1974, p. 432.
 eur., as. (paludicol) Ö
- Ph. armoraciae* (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 369 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 547. — F.-H.-L. 1966, p. 176. — FRANZ 1974, p. 433.
 eur., as., n.-am. (paludicol) Ö
- Ph. veronicae* (nach FRANZEIGENE Art) BEDEL 1892. — (Synon. von *armoraciae* F.-H.-L. 1966, p. 176). — FRANZ 1974, p. 433.
 eur., sib. O N St nB
- Ph. (Neophaedon) JACOBS pyritus* ROSSI 1792, Mant., v. 1, p. 31 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 541. — F.-H.-L. 1966, p. 176. — FRANZ 1974, p. 432.
 m.-eur., as. (paludicol) S O N St K oT
- Ph. (Sternoplatys) MOTSCH segnis* WEISE 1884, Nat. Ins. Deutschl., v. 6, p. 540. — F.-H.-L. 1966, p. 176. — FRANZ 1974, p. 432, 433.
 o.-alp., karp. (subalpin, alpin, paludicol) S O N St K oT

Gatt.: Sclerophaedon WEISE 1882

- S. carniolicus* (GERMAR) 1824, Ins. spec. nov., p. 588 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 536. — F.-H.-L. 1966, p. 177. — FRANZ 1974, p. 431, 432.
 m.-eur. (alpin-paludicol) S O N St K oT
- S. orbicularis* (SUFFRIAN) 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 243 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1131. — F.-H.-L. 1966, p. 177.
 m.-eur. (montan-paludicol) St K

Gatt.: Hydrothassa C. G. THOMPSON 1866

H. glabra (HERBST) 1783 Fuessly, Arch., v. 4, p. 6 (*Chrysomela*). — REITTER 1912, Faun. Germ. v. 4, p. 132. — F.-H.-L. 1966, p. 178. — FRANZ 1974, p. 430, 431.

eur., as. (paludicol)

Ö

H. marginella (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 371 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 527. — F.-H.-L. 1966, p. 178. — FRANZ 1974, p. 431.

eur., as. (paludicol)

Ö

H. hannoverana (FABRICIUS) 1775, Syst. Ent., p. 102 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 4, p. 528. — F.-H.-L. 1966, p. 178.

n.-, m.-eur.

N?

H. flavocincta BRULLÉ 1832, Exped. Mor., v. 3, p. 271. — F.-H.-L. 1966, p. 178. — FRANZ 1974, p. 430.

so.-eur., sib.

nB

Gatt.: Prasocuris LATREILLE 1802

P. junci (BRAHM) 1790, Ins. Kalend., v. 1, p. 62 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 533. — F.-H.-L. 1966, p. 179. — FRANZ 1974, p. 430.

eur., n.-afr. (paludicol)

Ö

P. phellandrii (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 376 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschland, v. 6, p. 531. — F.-H.-L. 1966, p. 179. — FRANZ 1974, p. 430.

eur., as., n.-am. (paludicol)

Ö

Gatt.: Plagioderia REDTENBACHER 1845

P. versicolora (LAICHHARTING) 1781, Verz. Tyrol. Ins., v. 1, p. 148 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 550. — F.-H.-L. 1966, p. 179. — (*P. versicolor* in: FRANZ 1974, p. 433).

eur., as., n.-afr., n.-am.

Ö

Gatt.: Melasoma STEPHENS 1834

M. (Linacidea) Motsch aenea (LINNÉ) Syst. Nat., ed. 10, p. 369 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 554. — F.-H.-L. 1966, p. 180. — FRANZ 1974, p. 433, 434.

eur., as.

Ö

M. (Microdera) Stephens cuprea (FABRICIUS) 1775, Syst. Ent., p. 96 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 555. — F.-H.-L. 1966, p. 181. — FRANZ 1974, p. 434.

n.-, m.-eur., sib.

nT S O N St K oT

M. (M.) lapponica (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 317 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 556. — F.-H.-L. 1966, p. 181. — FRANZ 1974, p. 434.

n.-, m.-eur., as.

nT (Reutte) mO (Hornbachgraben PRIESNER) N St (Friedberg)

M. (Macrolina) Motsch vigintipunctata (SCOPOLI) 1763, Ent. Cern., p. 78 (*Coccinella*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 558. — F.-H.-L. 1966, p. 180, 181. — FRANZ 1974, p. 435.

eur.

Ö

M. (M.) collaris (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 371 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 560. — F.-H.-L. 1966, p. 181. — FRANZ 1974, p. 434.

n.-, m.-eur., sib. (subalpin — alpin)

V nT S O N B K oT

M. (Melasoma s. str.) populi (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 370. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 563. — JAKOB 1955, Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, v. 60, p. 233, 234. — F.-H.-L. 1966, p. 181. — FRANZ 1974, p. 434.

pal.

Ö

M. (M.) tremulae (FABRICIUS) 1787, Mant. v. 1, p. 69 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 564. — JAKOB 1955, An. Nat. Hist. Mus. Wien, v. 60, p. 233. — F.-H.-L. 1966, p. 182. — FRANZ 1974, p. 434.

eur., as.

Ö

M. (M.) saliceti WEISE 1884, Nat. Ins. Deutschl., v. 6, p. 565. — JAKOB 1955, Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, v. 60, p. 233. — F.-H.-L. 1966, p. 181. — FRANZ 1974, p. 434.

eur., as.

Ö

Gatt.: Phytodecta KIRBY 1837

Ph. (Phytodecta s. str.) flavicornis SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 215. — F.-H.-L. 1966, p. 185.

eur. (montan)

V K

Ph. (Ph.) kaufmanni MILLER 1880, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, v. 30, p. 7. — F.-H.-L. 1966, p. 186.

s., o.-alp., karp.

K?

Ph. (Ph.) holdhausi LEEDER 1950, Zeit. Wien. Ent. Ges., Jg. 35, p. 21. — F.-H.-L. 1966, p. 186. — FRANZ 1974, p. 426.

o.-alp.

nT S St

Ph. (Ph.) viminalis (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 371 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 491. — F.-H.-L. 1966, p. 185. — FRANZ 1974, p. 428.

eur., as., n.-am.

Ö

Ph. (Ph.) rufipes (DEGEER) 1775, Mem. Ins., v. 5, p. 295 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 495. — F.-H.-L. 1966, p. 184. — FRANZ 1974, p. 428.

eur., as., n.-am.

Ö

Ph. (Ph.) affinis (GYLLENHAL) 1808, Schönh. Syn. Ins., ed. 1, v. 3, p. 257 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 500. — F.-H.-L. 1966, p. 185. — (*Ph. moosa* SUFFRIAN in: FRANZ 1974, p. 426).

eur., as.

V nT S O N St K oT

Ph. (Ph.) linnaeana (SCHRANK) 1781, Enum., p. 69 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 498. — F.-H.-L. 1966, p. 184. — FRANZ 1974, p. 427.

eur.

Ö

Ph. (Spartoxena MOTSCH) gobantzi REITTER 1902, Wien. Ent. Zeit., v. 21, p. 141. — F.-H.-L. 1966, p. 183. — F.-H.-L. 1966, p. 183.

med.

K

Ph. (Spartomena REITTER) fornicata BRÜGGEMANN 1873, Abh. Naturfr. Ver. Bremen, v. 3, p. 518. — F.-H.-L. 1966, p. 183. — (*Ph. [Spartophila] fornicata* FRANZ 1974, p. 426).

pann.

N oSt B*

Ph. (Spartophila MOTSCH) olivacea (FORSTER) Nov. spec. Ins., p. 23 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 506. — F.-H.-L. 1966, p. 186. — FRANZ 1974, p. 427.

med.

N

Ph. (Goniomena) Motsch. quinquepunctata (FABRICIUS) 1787, Mant. Ins., v. 1, p. 72 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 508. — F.-H.-L. 1966, p. 187. — FRANZ 1974, p. 428. eur., as. Ö

Ph. (G.) intermedia HELLER 1911, Stavang. Mus. Aarh., v. 23, p. 1. — F.-H.-L. 1966, p. 187. — FRANZ 1974, p. 426.

m., n.-eur.

S O N St

Ph. (G.) pallida (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 370 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 510. — F.-H.-L. 1966, p. 187. — FRANZ 1974, p. 427.

eur.

Ö

Ph. (G.) interposita FRANZ & PALMEN 1950, Ann. Ent. Fenn., v. 16, p. 14. — F.-H.-L. 1966, p. 187. — FRANZ 1974, p. 427.

m.-eur.

S N St K

Gatt.: Phyllodecta KIRBY 1837

Ph. vulgatissima (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 370 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 514. — F.-H.-L. 1966, p. 188. — FRANZ 1974, p. 430.

eur., as., n.-am.

Ö

Ph. tibialis SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 259. — F.-H.-L. 1966, p. 188. — FRANZ 1974, p. 429.

m.-eur.

V nT S O N St K oT

Ph. polaris SCHNEIDER 1886, Aarsh. Tromsø Mus., v. 9, p. 66. — F.-H.-L. 1966, p. 189. — FRANZ 1974, p. 429.

n., m.-eur., sib. (subalpin)

V nT S O N St K oT

Ph. laticollis SUFFRIAN 1851, Linn. Ent., v. 5, p. 262. — F.-H.-L. 1966, p. 188. — FRANZ 1974, p. 429.

eur., as.

Ö

Ph. vitellinae (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 370 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 518. — F.-H.-L. 1966, p. 189. — FRANZ 1974, p. 429.

eur., as., n.-am.

Ö

Ph. atrovirens CORNELIUS 1857, Stett. Ent. Zeit., v. 18, p. 400. — F.-H.-L. 1966, p. 189. — FRANZ 1974, p. 429.

n., m.-eur.

nT S O St K oT

Gatt.: Timarcha LATREILLE 1829

T. (Timarcha) s. str. tenebricosa (FABRICIUS) 1775, Syst. Ent., v. 94 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 321. — F.-H.-L. 1966, p. 190. — FRANZ 1974, p. 436.

m.-eur., jap.

V O N St B

T. (T.) goettingensis (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 368 (*Chrysomela*). — (*T. coriaria* LAICHARTING 1781), REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 108. — F.-H.-L. 1966, p. 192. — FRANZ 1974, p. 435.

m.-eur.

O N St B

T. (T.) pratensis (DUFTSCHMIED) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 162 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 329. — F.-H.-L. 1966, p. 192. — FRANZ 1974, p. 436.

pann.

N B

T. (Metallotimarcha) Motsch. metallica 1781, Verz. Tyrol. Ins., p. 144 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 336. — F.-H.-L. 1966, p. 192. — FRANZ 1974, p. 435.

m.-eur. (subalpin)

V nT S O N St K oT

T. (M.) gibba (HOPPE) 1825, Nov. acta Leop. Carol., v. 12, p. 487 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 338. — F.-H.-L. 1966, p. 192.

med. (subalpin)

sSt sK

Gatt.: Entomoscelis CHEVOLAT 1843

E. adonidis (PALLAS) 1771, Reisen, ed. 1, v. 2, p. 463 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 310. — F.-H.-L. 1966, p. 192. — FRANZ 1974, p. 436.

s.-o., m.-eur., as.

N oSt B

E. sacra (LINNÉ) 1748, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 312 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 312. — F.-H.-L. 1966, p. 192. — FRANZ 1974, p. 436.

pann.

Ö

U.-Fam.: Galerucinae

Gatt.: Galerucella CROTSCH 1873

G. (Hydrogaleruca) Laboiss. nymphaeae (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 622. — F.-H.-L. 1966, p. 195. — FRANZ 1974, p. 437.

eur., sib., n.-am.

Ö

G. (Galerucella s. str.) lineola (FABRICIUS) 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 149 (*Galeruca*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 626. — F.-H.-L. 1966, p. 195. — FRANZ 1974, p. 436.

eur., as., n.-afr.

Ö

G. (G.) sagittariae (GYLLENHAL) 1813, Ins. Suec., v. 3, p. 511 (*Galeruca*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 624.

eur., as.

Ö

G. (G.) pusilla (DUFTSCHMIED) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 230 (*Galeruca*). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 140. — F.-H.-L. 1966, p. 196. — FRANZ 1974, p. 437.

eur.

Ö

G. (G.) tenella (LINNÉ) 1761, Faun. Suec., ed. 2, p. 171 (*Chrysomela*). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 140. — F.-H.-L. 1966, p. 195. — FRANZ 1974, p. 437.

eur., as.

Ö

G. (Xanthogaleruca) Laboiss. luteola (MÜLLER) 1766, Melang. Soc. Roy. Turin, v. 3, p. 187 (*Galeruca*). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 139. — F.-H.-L. 1966, p. 194. — FRANZ 1974, p. 437.

eur., sib.

O N St B K

G. (X.) californiensis (LINNÉ) 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 600 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 629. — F.-H.-L. 1966, p. 146. — FRANZ 1974, p. 436.

eur.

Ö

Gatt.: Pyrrhalta JOANNIS 1866

P. viburni (PAYKUL) 1799, Suec., v. 2, p. 89 (*Galeruca*). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 138. — F.-H.-L. 1966, p. 196. — FRANZ 1974, p. 437.

eur.

Ö

Gatt.: Galeruca GEOFFROY 1762

G. (Galeruca s. str.) tanacetii (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 369 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 641. — F.-H.-L. 1966, p. 197. — FRANZ 1974, p. 438.

eur.

Ö

G. (G.) pomonae (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 83 (*Tenebrio*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 645. — F.-H.-L. 1966, p. 197. — FRANZ 1974, p. 438.

eur., as., n.-am.

Ö

G. (G.) pomonae ssp. anthracina WEISE in: FRANZ 1974, p. 438.

alp.

S St

G. (G.) pomonae ssp. pannonica FRANZ in: FRANZ 1974, p. 438.

pann.

N nB

G. (G.) laticollis STAHLBURG 1837, Ins. Fenn., v. 2, p. 218. — F.-H.-L. 1966, p. 198. — FRANZ 1974, p. 438.

eur., as.

nT

G. (G.) dahli JOANNIS 1966, Abeille, v. 3, p. 14, 36. — F.-H.-L. 1966, p. 198. — FRANZ 1974, p. 437.

m.-eur., as.

S N?

G. (Emarhopa WEISE) rufa GERMAR 1824, Ins. spe. non., p. 603. — F.-H.-L. 1966, p. 197.

pann.

N oSt B* K

G. (Haptoscelis WEISE) melanocephala PONZA 1805, Mem. Acc. Turin, v. 13, p. 57. — F.-H.-L. 1966, p. 197. — FRANZ 1974, p. 438.

pann.

N B

Gatt.: Lochmaea WEISE 1883

L. capreae (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 611. — F.-H.-L. 1966, p. 199. — FRANZ 1974, p. 439.

eur., as.

Ö

L. suturalis (THOMSON) 1866, Skand. Col., v. 8, p. 151 (*Galeruca*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 613. — F.-H.-L. 1966, p. 199. — FRANZ 1974, p. 439.

eur.

V nT S N St K oT

L. crataegi (FORSTER) 1771, Nov. spec. Ins., v. 1, p. 28 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 615. — F.-H.-L. 1966, p. 198. — FRANZ 1974, p. 439.

eur., as., n.-afr.

Ö

Gatt.: Phyllobrotica REDTENBACHER 1845

Ph. quadrimaculata (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 376 (*Chrysomela*). — REDTENBACHER 1849, Faun. Austr., p. 525. — F.-H.-L. 1966, p. 199. — FRANZ 1974, p. 439.

eur., as.

Ö

Ph. adusta (CREUTZER) 1799, Ent. Vers., p. 121 (*Crioceris*). — REDTENBACHER 1849, Faun. Austr., p. 525. — F.-H.-L. 1966, p. 199. — FRANZ 1974, p. 439.

pann.

N B

Gatt.: Exosoma JACOBSON (Malacosoma ROSENHAUER)

E. lusitanica LINNÉ 1767, Syst. Nat. — F.-H.-L. 1966, p. 200. — FRANZ 1974, p. 440.

w.-med.

N(teste MOHR 1966)

Gatt.: Luperus GEOFFROY 1762

L. (Calomicrus) STEPHENS circumfusus (MARSHAM) 1802, Ent. Brit., v. 1, p. 227 (*Crioceris*). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 142. — F.-H.-L. 1966, p. 200. — FRANZ 1974, p. 440.

m.-eur.

O N B St K

L. (C.) pinicola (DUFTSCHMIED) 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 234 (*Crioceris*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 594. — F.-H.-L. 1966, p. 201. — FRANZ 1974, p. 441.

eur.

Ö

L. (C.) gularis GREDLER 1847, Käfer v. Passeier, v. 2, p. 73. — F.-H.-L. 1966, p. 201.

alp. (subalpin)

?K

L. (C.) nigripes KIESWETTER in: F.-H.-L. 1966, p. 201.

w.-alp.

T St K

L. (C.) xanthopoda SCHRANK 1781, Enum. Ins. Austr., p. 93. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 603. — F.-H.-L. 1966, p. 201. — (*L. [Lochmaea]* x. FRANZ 1974, p. 441).

s., o., m.-eur.

O N B St K

L. (C.) saxonicus (GEMEL) 1790, ed. Linn., ed. 1, v. 4, p. 1723 (*Crioceris*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 604. — F.-H.-L. 1966, p. 202. — (*L. [Lochmaea]* s. 1974, p. 441).

pann.

St B

L. (C.) longicornis (FABRICIUS) 1781, Spec. Ins., v. 1, p. 72 (*Pinus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 597, 604. — F.-H.-L. 1966, p. 202. — (*L. [Lochmaea]* l. FRANZ 1974, p. 440).

eur., as.

Ö

L. (C.) lyperus SULZER 1776, Abh. Gesch. Ins., p. 35. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 598. — (*L. dispar* REDTENBACHER in: F.-H.-L. 1966, p. 202). — (*L. [Lochmaea]* niger GOEZE in: FRANZ 1974, p. 440).

m.-eur.

Ö

L. (C.) flavipes (LINNÉ) 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 601 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 598. — F.-H.-L. 1966, p. 203. — (*L. [Lochmaea]* f. FRANZ 1974, p. 440).

eur., as.

Ö

L. (C.) viridipennis GERMAR 1824, Ins. spec. nov., p. 547. — F.-H.-L. 1966, p. 202. — (*L. [Lochmaea]* v. FRANZ 1974, p. 441).

m.-eur., as.

Ö

L. (C.) carnificus KIESWETTER 1861, Berl. Ent. Zeitschr., v. 5, p. 393. — F.-H.-L. 1966, p. 203.

sw.-alp.

K

Gatt.: Agelastica REDTENBACHER 1845

A. alni (LINNÉ) 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 369 (*Chrysomela*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 580. — F.-H.-L. 1966, p. 203. — FRANZ 1974, p. 442.

eur., as.

Ö

Gatt.: Sermylassa REITTER 1912

S. halensis (LINNÉ) 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 589 (*Chrysomela*). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 138. — F.-H.-L. 1966, p. 203. — FRANZ 1974, p. 442.
eur. V nT S O N* B St

Gatt.: Euluperus WEISE 1886

E. xanthopus (DUFTSCHMIED 1825, Faun. Austr., v. 3, p. 324 (*Criocerus*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 663. — F.-H.-L. 1966, p. 204. — FRANZ 1974, p. 442.
pann. N

U.-Fam.: Hispinae

Gatt.: Hispella CHAPIUS 1875

H. atra (LINNÉ) 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 603 (*Hispa*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1065. — F.-H.-L. 1966, p. 271. — FRANZ 1974, p. 480.
pal. (xerothermophil) Ö

U.-Fam.: Cassidinae

Gatt.: Pilemostoma DESBROCKES 1891

P. fastuosa (SCHALLER) 1783, Abh. Hall. Ges., v. 1, p. 259 (*Cassida*). — SPAETH 1914, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 64, p. 136. — F.-H.-L. 1966, p. 272. — FRANZ 1974, p. 480.
pal. N B

Gatt.: Hypocassida WEISE 1903

H. subferruginea (SCHRANK) 1776, Beytr., p. 62 (*Cassida*). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1074. — F.-H.-L. 1966, p. 273. — FRANZ 1974, p. 480.
pal. Ö

Gatt.: Cassida LINNÉ 1758

C. (Odontionycha) WEISE) viridis LINNÉ, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 362. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1086. — F.-H.-L. 1966, p. 274. — (*C. [Odontionella]* v. FRANZ 1974, p. 484).
pal. Ö

C. (O.) hemispaerica HERBST 1799, Nat. Syst. Käf., v. 8, p. 226. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1075, 1087. — F.-H.-L. 1966, p. 274. — FRANZ 1974, p. 481.
eur., n.-afr. Ö

- C. (Lordiconia) REITTER*) *canaliculata* LAICHHARTING 1781, Verz. Tyrol. Ins., p. 109. — (*C. austriaca* FABRICIUS 1792, Ent. Syst., v. 1, p. 293). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1085. — F.-H.-L. 1966, p. 273. — FRANZ 1974, p. 481.
m.-, o.-eur. (xerophil) N B
- C. (Cassida s. str.) murraea* LINNÉ 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 575. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1077. — F.-H.-L. 1966, p. 275. — FRANZ 1974, p. 482.
pal. Ö
- C. (C.) nebulosa* LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 363. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1077, 1109. — F.-H.-L. 1966, p. 276. — FRANZ 1974, p. 482.
eur., as. (S) Ö
- C. (C.) flaveola* THUNBERG 1794, Ins. Suec., p. 103. — (*C. exculpta* CHARPENTIER 1825, Horae Ent., p. 22). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1077, 1110. — (*C. littoralis* WEISE in: F.-H.-L. 1966, p. 276). — FRANZ 1974, p. 481.
m.-, n.-eur. Ö
- C. (C.) berolinensis* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 270. — SPAETH 1914, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 64, p. 142. — F.-H.-L. 1966, p. 276. — FRANZ 1974, p. 481.
o.-eur. N B
- C. (C.) lineola* CREUTZER 1799, Ent. Verz., p. 119. SPAETH 1914, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 64, p. 138. — F.-H.-L. 1966, p. 276. — FRANZ 1974, p. 482.
o.-eur., as. N B
- C. atrata* FABRICIUS 1787, Mant. Ins., v. 1, p. 62. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1077, 1094. — F.-H.-L. 1966, p. 276. — FRANZ 1974, p. 480.
m.-, o.-eur., as. Ö
- C. seladonia* GYLLENHAL 1827, Ins. Suec., v. 4, p. 644. — F.-H.-L. 1966, p. 277. — FRANZ 1974, p. 483.
s.-schw., m.-, w.-, s.-eur. nB(teste FRANZ 1974)
- C. (C.) vibex* LINNÉ 1767, Syst. Nat., ed. 11, v. 1, 2, p. 275. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1078, 1107. — F.-H.-L. 1966, p. 277. — FRANZ 1974, p. 484.
pal. Ö
- C. (C.) pannonica* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., p. 147. — SPAETH 1914, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 64, p. 141. — F.-H.-L. 1966, p. 277. — FRANZ 1974, p. 482.
pann. N B*
- C. (C.) panzeri* WEISE 1907, Wien. Ent. Zeit., v. 66, p. 14. — F.-H.-L. 1966, p. 277. — FRANZ 1974, p. 482.
eur., as. Ö
- C. (C.) ferruginea* GOEZE 1777, Ent. Beytr., v. 1, p. 213. — (*C. tincta* WEISE 1891, Wien. Ent. Zeit., v. 10, p. 205). — REITTER 1912, Faun. Germ., v. 4, p. 217. — F.-H.-L. 1966, p. 277. — FRANZ 1974, p. 481.
m.-eur., as. V nT* S K oT*
- C. (C.) rubiginosa* MÜLLER 1776, Zool. Dan. Prodr., p. 65. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1079, 1104. — F.-H.-L. 1966, p. 277. — FRANZ 1974, p. 483.
pal. Ö

- C. (C.) inquinata* BRULLE 1832, Exped. Scient. Moree, ed. 3, v. 1, p. 266. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1080. — F.-H.-L. 1966, p. 278. — FRANZ 1974, p. 482.
med. nB
- C. (C.) stigmatica* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 206. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1078, 1098. — F.-H.-L. 1966, p. 278. — FRANZ 1974, p. 483.
m.-eur., as. S N St K
- C. (C.) sanguinosa* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 105. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1081, 1102. — F.-H.-L. 1966, p. 278. — FRANZ 1974, p. 483.
pal. Ö
- C. (C.) rufovirens* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 144. — WEISE 1893, p. Ins. Deutschl., v. 6, p. 1081, 1097. — F.-H.-L. 1966, p. 278. — FRANZ 1974, p. 483.
so., m.-eur. N B K
- C. (C.) aurora* WEISE 1907, Wien. Ent. Zeit., v. 26, p. 14. — (*C. rosea* BOH 1854, Mon. Cassid., v. 2, p. 387; REDTENBACHER 1858, Faun. Austr., ed. 2, p. 955). — F.-H.-L. 1966, p. 278. — FRANZ 1974, p. 481.
end. St
- C. (C.) denticollis* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 186. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1077, 1096. — F.-H.-L. 1966, p. 278. — FRANZ 1974, p. 481.
eur. Ö
- C. (C.) sanguinolenta* MÜLLER 1776, Zool. dan. Prodr., p. 65. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1081, 1100. — F.-H.-L. 1966, p. 279. — FRANZ 1974, p. 483.
pal. Ö
- C. (C.) prasina* ILLIGER 1798, Käf. Preuss., v. 1, p. 481. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1101. — F.-H.-L. 1966, p. 279. — FRANZ 1974, p. 482.
pal. Ö
- C. (Mionycha WEISE) azurea* FABRICIUS 1801, Syst. Elen., v. 1, p. 389. — (*C. lucida* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 215). — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1088. — (*C. ornata* CREUTZER in: F.-H.-L. 1966, p. 274.) — FRANZ 1974, p. 481.
m.-eur., as. (alpin) V nT* S* N St* K oT*
- C. (M.) subreticulata* SUFFRIAN 1844, Stett. Ent. Zeit., v. 5, p. 244. — SPAETH 1914, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 64, p. 137. — (*C. splendidula* SUFFRIAN in: F.-H.-L. 1966, p. 275). — FRANZ 1974, p. 483.
n., s.-eur., as. Ö
- C. margaritacea* SCHALLER 1783, Abh. Hall. Ges., p. 259. — F.-H.-L. 1966, p. 275. — FRANZ 1974, p. 482.
eur., kl.-as., kauk. N St B
- C. (Cassidula WAISE) nobilis* LINNÉ 1758, Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 363. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1082, 1113. — F.-H.-L. 1966, p. 280. — (*C. [Cassidulella]* n. FRANZ 1974, p. 482).
pal. Ö
- C. (C.) vittata* VILLERS 1789, Linn. Ent., v. 1, p. 93. — WEISE 1893, Ins. Deutschl., v. 6, p. 1115. — F.-H.-L. 1966, p. 280. — (*C. [Cassidulella]* v. FRANZ 1974, p. 484).
pal. N B K

Register

- (adonidis, Chrysomela)* 23
adonidis, Entomoscelis 23
Adoxus 13
(adusta, Crioceris) 25
adusta, Phyllobrotica 25
(aenea, Chrysomela) 20
aenea, Melosoma 20
(affinis, Cryptocephalus) 6
(affinis, Chrysomela) 21
(affinis, Donacia) 3
affinis, Gynandrophthalma 6
affinis, Phytodecta 21
affinis, Plateumaris 3
Agelastica 25
(ahena, Chrysomela lichenis) 14
ahena, Chrysomela lichenis ssp. 14
albolineatus, Cryptocephalus 8
Allorina 17
alni, Agelastica 25
(alni, Chrysomela) 25
alpestris ssp. *polymorpha, Chrysoschloa* 17
(alpina, Lilioceris) 5
alternans, Chrysomela cerealis ssp. 14
(amoraciae, Chrysomela) 19
amoraciae, Phaeton 19
analis, Chrysomela 17
(analis, Chrysomela) 17
(anderschi, Chrysoschloa intricata) 17
anderschi, Chrysoschloa intricata ssp. 17
(anderschi, Chrysomela intricata ssp.) 17
(Anopachys [U.-Gatt.]) 16
anthracina, Galeruca panonae ssp. 24
Antipa 6
antiqua, Donacia 2
apicalis, Cryptocephalus 9
appendicina, Clytra 6
(appendiculata, Clytra) 6
appendiculata, Donacia 1
(appendiculata, Donacia) 1
appendiculata, Haemonia 1
aquatica, Donacia 2
(aquatica, Leptura) 2
arenarius, Pachnephorus 13
asclepiadeus, Chrysoschloa 13
(asclepiadeus, Cryptocephalus) 13
(asparagi, Chrysomela) 4
asparagi, Crioceris 4
(asparagi, Crioceris) 4
(atra, Hispa) 26
atra, Hispella 26
atrata, Cassida 27
atrovirens, Phyllodecta 22
(Attelabus) 5
(Auchenia) 4
aureolus, Cryptocephalus 9
aureolus ssp. *illyricus, Cryptocephalus* 9
aureolus ssp. *monticola, Cryptocephalus* 9
(aurita, Chrysomela) 6
aurita, Gynandrophthalma 6
aurora, Cassida 28
(austriaca, Cassida) 27
axillaris, Lapidostomis lucida ssp. 5
azurea, Cassida 28

berolinensis, Cassida 27
bicolor, Donacia 2
bifrons, Chrysoschloa 17
(bifrons, Chrysomela) 17
bifrons ssp. *decora, Chrysoschloa* 18
(biguttatus, Buprestis) 9
biguttatus, Cryptocephalus 9
(bilineata, Chrysomela) 11
bilineatus, Cryptocephalus 11
bimaculatus, Cryptocephalus 8
(bipunctata, Chrysomela) 8
(bipunctata ssp. *sanguinolenta, Chrysomela)* 9
bipunctatus, Cryptocephalus 8
(bipunctatus ssp. *sanguinolentus, Cryptocephalus*) 9
(bipustulatus, Cryptocephalus) 9
(bisignatus, Pachybrachys) 7
(bistripunctatus, Cryptocephalus) 8
(böhm, Cryptocephalus) 9
bohemi, Cryptocephalus 9
(braccata, Leptura) 3
braccata, Plateumaris 3
brevicornis, Donacia 2
(Bromius) 13
(brunnea, Lilioceris) 5
brunsvicensis, Chrysomela 16
(brunsvicensis, Chrysomela) 16
(bucephala, Chilotoma) 6
(Buprestis) 5, 7, 8, 9
(Byrrhus) 13

cacaliae, Chrysoschloa 18
(cacaliae, Chrysomela) 18
(calmariensis, Chrysomela) 23
calmariensis, Galerucella 23
Calomicrus (U.-Gatt.) 25
canaliculata, Cassida 27
(caprae, Chrysomela) 24
caprae, Lochmaea 24
carinthiacus, Cryptocephalus 7
carnifex, Chrysomela 16
(carnifex, Chrysomela) 16
carnilicus, Luperus 25
(carniolica, Chrysomela) 19

- carniolicus*, *Sclerophaedon* 19
Cassida 27, 28
(*Cassida*) 26, 27, 28
Cassida (U.-Gatt.) 27, 28
Cassidinae 26
Cassidula (U.-Gatt.) 28
(*Cassidulella* [U.-Gatt.]) 28
(*cerasi*, *Chrysomela*) 3
cerasi, *Orsodacne* 3
cerealis, *Chrysomela* 14
(*cerealis*, *Chrysomela*) 14
cerealis ssp. *alternans*, *Chrysomela* 14
cerealis ssp. *mixta*, *Chrysomela* 14
(*cerealis* ssp. *plorans*, *Chrysomela*) 14
chalcites, *Chrysomela* 15
(*chalcites*, *Chrysomela*) 15
(*Chalcoides* [U.-Gatt.]) 16, 17
(*chalybaea*, *Clytra*) 7
chalybaea, *Coptocephala* 7
Chilotoma 6
Chrysochloa 17, 18
(*Chrysochloa*) 17, 18
Chrysochus 13
(*Chrysolina* [U.-Gatt.]) 14
Chrysomela 14, 15, 16, 17
(*Chrysomela*) 3 usw.
Chrysomelinae 13
(*Chrysomorpha* [U.-Gatt.]) 14
chrysopus, *Cryptocephalus* 11
(*cincta*, *Donacia*) 1
cinerea, *Donacia* 2
(*circumfusus*, *Crioceris*) 25
circumfusus, *Luperus* 25
clavipes, *Donacia* 1
Clytra 6
(*Clytra*) 5, 6, 7
Clytrinae 5
(*Coccinella*) 17, 18, 19
(*cochleariae*, *Chrysomela*) 19
cochleariae, *Phaedon* 19
coerulans, *Chrysomela* 14
(*coerulans*, *Chrysomela*) 14
coerulea, *Chrysomela* 14
coerulescens, *Cryptocephalus* 10
Colaphellus 19
(*Colaphodes* [U.-Gatt.]) 15
(*Colaphopterus* [U.-Gatt.]) 15
(*Colaphosoma* [U.-Gatt.]) 15
(*collaris*, *Chrysomela*) 20
collaris, *Melasoma* 20
(*coloratus*, *Cryptocephalus*) 9
(*comari*, *Plateumaris*) 3
commutata, *Chrysochloa plagiata* ssp. 18
(*consimilis*, *Leptura*) 3
consimilis, *Plateumaris* 3
(*concolor*, *Byrrhus*) 13
concolor, *Lamprosoma* 13
connexus, *Cryptocephalus* 12
Coptocephala 7
(*cordiger*, *Chrysomela*) 8
cordiger, *Cryptocephalus* 8
coriaria, *Timarcha* 22
(*coryli*, *Chrysomela*) 8
coryli, *Cryptocephalus* 8
(*Craspeda* [U.-Gatt.]) 17
crassicornis, *Chrysomela rufa* ssp. 15
(*crassicornis*) *latecincta* ssp. *holdhausi*, *Chrysomela* 16
(*crassicornis*) *latecincta* ssp. *norica*, *Chrysomela* 16
(*crassicornis*) *latecincta* ssp. *rhaetica*, *Chrysomela* 16
crassimargo, *Chrysomela hemisphaerica* ssp. 15
(*crassimargo*, *Chrysomela hemisphaerica* ssp.) 15
crassipes, *Donacia* 1
(*crataegi*, *Chrysomela*) 24
crataegi, *Lochmaea* 24
Criocerinae 4
Crioceris 4
(*Crioceris*) 3, 4, 24, 25, 26
Crosita 17
(*cruciata*, *Crioceris*) 4
Cryptocephalinae 7
Cryptocephalus 7, 8, 9, 10, 11, 12
(*Cryptocephalus*) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
(*cuprea*, *Chrysomela*) 20
cuprea, *Melasoma* 20
(*cuprina*, *Chrysomela*) 16
(*cyanea*, *Cryptocephalus*) 6
cyanea, *Gynandrophthalma* 6
(*cyarella*, *Chrysomela*) 4
cyarella, *Lema* 4
(*cyarella*, *Lema*) 4
(*cyanicornis*, *Clytra*) 5
cyanicornis, *Lapidostomis* 5
(*cyanipennis*, *Lema*) 4
Cyaniris = *Gynandrophthalma* 6
dahli, *Galeruca* 24
(*decemlineata*, *Chrysomela*) 13
decemlineata, *Leptinotarsa* 13
(*decemmaculatus*, *Chrysomela*) 11
decemmaculatus, *Cryptocephalus* 11
decora, *Chrysochloa bifrons* ssp. 18
dentata, *Donacia* 1
denticollis, *Cassida* 28
(*dentipes*, *Donacia*) 2
didymata, *Chrysomela* 16
(*discolor*, *Donacia*) 3
discolor, *Plateumaris* 3
(*discolor*, *Plateumaris*) 3

- (Disopus [U.-Gatt.])* 11
(dispar, Luperus) 25
distinguendus, Cryptocephalus 8
(diversipes, Chrysomela) 15
(diversipes, Clytra) 6
diversipes, Gynandrophthalma 6
(Dlochrysa [U.-Gatt.]) 14
Donacia 1, 2
(Donacia) 1, 2, 3
Donacia (U.-Gatt.) 1, 2
Donaciinae 1
(duodecimpunctata, Chrysomela) 4
duodecimpunctata, Crioceris 4
- elegantulus, Cryptocephalus* 11
elongata ssp. ruffoi, Chrysomela 18
elongata ssp. styriaca, Chrysomela 18
(elongata styriaca, Chrysomela) 18
elongatus, Cryptocephalus 10
Emarhopa (U.-Gatt.) 24
Entomoscelis 23
(equiseti, Haemonia) 1
erichsoni, Lema 4
(Erythrochrysa [U.-Gatt.]) 14
Euluperus 25
Eumolpinae 13
(Eumolpus) 13
(exculcata, Cassida) 27
exiguus, Cryptocephalus 12
Exosoma=Malacosoma 24
- (fastuosa, Cassida)* 26
fastuosa, Chrysomela 14
fastuosa, Pileostoma 26
ferruginea, Cassida 27
fimbrialis, Chrysomela 14
(fimbrialis, Chrysomela) 14
fimbriolatus, Pachybrachys 7
findeli, Chrysomela lumbata ssp. 17
flammea, Chrysomela speciosissima ssp. 18
flaveola, Cassida 27
(flavicollis, Auchenia) 4
(flavicollis, Clytra) 6
flavicollis, Gynandrophthalma 6
flavicollis, Zeugophora 4
flavicornis, Phytodecta 21
(flavilabris, Cryptocephalus) 10
(flavipes, Chrysomela) 25
(flavipes, Cryptocephalus) 11
(flavipes, Lema) 4
flavipes, Luperus 25
(flavipes, Luperus) 25
flavocincta, Hydrothassa 20
(flavoguttatus, Cryptocephalus) 9
- flexuosus, Pachybrachys* 7
fornicata, Phytodecta 21
(fornicata, Phytodecta) 21
frenatus, Cryptocephalus 11
frigida, Chrysomela 18
frontalis, Cryptocephalus 12
(fucata, Chrysomela) 16
(fulcratus, Cryptocephalus) 10
fulvus, Cryptocephalus 12
(fuscipes, Chrysomela) 15
- Galeruca* 24
(Galeruca) 24
Galeruca (U.-Gatt.) 23, 24
Galerucella 23
Galerucella (U.-Gatt.) 23
Galerucinae 23
Gastroidea 19
(Gastroiphysa) 19
geminata, Chrysomela 16
(geminata, Chrysomela) 16
(geminus, Cryptocephalus) 12
(gibba, Chrysomela) 23
gibba, Timarcha 23
(glabra, Chrysomela) 20
glabra, Hydrothassa 20
globosa, Chrysomela 15
(globosa, Chrysomela) 15
gloriosa, Chrysomela 17
(gloriosa, Chrysomela) 17
gobantzi, Phytodecta 21
(goettingensis, Chrysomela) 15, 22
goettingensis, Timarcha 22
Goniomena (U.-Gatt.) 22
(gramica, Chrysomela) 19
graminis, Chrysomela 14
gryophilae, Chrysomela 16
(gryophilae, Chrysomela) 16
gularis, Luperus 25
Gynandrophthalma=Cyaniris 6
- Haemonia=Macroplea* 1
haemoptera, Chrysomela 15
(haemoptera, Chrysomela) 15
(halensis, Chrysomela) 26
halensis, Sermylassa 26
haliciensis, Pachybrachys 7
(hannoverana, Chrysomela) 20
hannoverana, Hydrothassa 20
Haptoscelis U.-Gatt. 24
(Helostola [U.-Gatt.]) 14
hemisphaerica, Cassida 26
hemisphaerica, Chrysomela 15
hemisphaerica ssp. crassimargo, Chrysomela 15
(hemisphaerica ssp. crassimargo, Chrysomela) 15

- hemisphaerica* ssp. *purpurascens*, *Chrysomela* 15
(herbacea, Chrysomela) 14
(hieroglyphicus, Cryptocephalus) 7
hieroglyphicus, Pachybrachys 7
hippophæus, Pachybrachys 7
(Hispa) 26
Hispella 26
Hispinæ 26
holdhausi, Chrysomela crassicornis ssp. 16
holdhausi, Phytodecta 21
(hübneri, Cryptocephalus) 11
(humeralis, Clytra) 5
humeralis, Labidostomis 5
(hydrocharidis, Donacia) 2
Hydrogaleruca (U.-Gatt.) 23
Hydrothassa 20
hyperici, Chrysomela 16
(hyperici, Chrysomela) 16
(Hypericia [U.-Gatt.]) 16
Hypocassida 26
(hypochœridis, Chrysomela) 9
hypochœridis, Cryptocephalus 9
hypochœridis ssp. *transiens, Cryptocephalus* 10

illyricus, Cryptocephalus aureolus ssp. 9
imperialis, Cryptocephalus 8
impressa, Donacia 2
inquinata, Cassida 28
intermedia, Phytodecta 22
interposita, Phytodecta 22
(interruptus, Cryptocephalus) 8
(intricata anderschi, Chrysomela) 17
intricata ssp. *anderschi, Chrysomela* 17
(intricata anderschi, Chrysomela) 17
italica, Lachnaea 5

janthinus, Cryptocephalus 10
Juliusiana (U.-Gatt.) 3
(junci, Chrysomela) 20
junci, Prasocuris 20

kaufmanni, Phytodecta 21
kolbei, Lamprosoma 13
küsteri, Chrysomela 16
(küsteri, Chrysomela) 16

(labiata, Chrysomela) 12
labiatus, Cryptocephalus 12
Labidostomis 5
(Labidostomis) 5
Lachnaea 5

laetus, Cryptocephalus 9
laevicollis, Cryptocephalus 8
(laevigatus, Chrysomela) 19
laevigatus, Phaedon 19
laeviuscula, Clytra 6
Lamprosoma 13
Lamprosominae 13
(lapponica, Chrysomela) 20
lapponica, Melasoma 20
(latecincta, Chrysomela) 16
latecincta (crassicornis) ssp. *holdhausi, Chrysomela* 16
latecincta (crassicornis) ssp. *norica, Chrysomela* 16
latecincta (crassicornis) ssp. *rhaetica, Chrysomela* 16
laticollis, Galeruca 24
laticollis, Phyllodecta 22
(leithneri, Labidostomis) 5
Lema 4
(Lema) 4, 5
(lemnæ, Donacia) 2
Leptinotarsa 13
(Leptura) 2, 3
(lichenis athena, Chrysomela) 14
(lichenis, Crioceris) 4
lichenis, Lema 4
lichenis ssp. *athena, Chrysomela* 14
(lilii, Attelabus) 5
lilii, Lilioceris 5
Lilioceris 5
(Lilioceris) 5
limbata, Chrysomela 17
(limbata, Chrysomela) 17
limbata ssp. *findeli, Chrysomela* 17
Linæidea (U.-Gatt.) 20
(linearis, Donacia) 2
lineola, Cassida 27
(lineola, Crioceris) 3
(lineola, Galeruca) 23
lineola, Galerucella 23
lineola, Orsodacne 3
(linnaeana, Chrysomela) 21
linnaeana, Phytodecta 21
(littoralis, Cassida) 27
liturata, Chrysomela 17
(liturata, Coccinella) 17
(lobatus, Cryptocephalus) 9
Lochmaea 24
(Lochmaea [U.-Gatt.]) 25
(lomina, Chrysomela) 15
longicornis, Luperus 25
(longicornis, Luperus) 25
(longicornis, Ptinus) 25
(longimana, Chrysomela) 5
longimana, Labidostomis 5

- (longipes, Cryptocephalus)* 5
Lordiconia (U.-Gatt.) 27
(lucida, Cassida) 28
lucida ssp. *axillaris, Labidostomis* 5
Luperus 25
luperus, Luperus 25
lusitanica, Exosoma 24
(luteola, Galeruca) 23
luteola, Galerucella 23
- macellus, Cryptocephalus* 12
Macrolina (U.-Gatt.) 20
Macroplea = *Haemonia* 1
macropus, Antipa 6
(macropus, Clytra) 6
(macropus, Tituboea) 6
Malacosoma = *Exosoma* 25
malinowskyi, Donacia 1
marcasitica, Chrysomela 15
(marcasitica, Chrysomela) 15
margaritacea, Cassida 28
(marginalis, Chrysomela) 15
marginata, Chrysomela 17
marginata, Donacia 2
marginatus, Cryptocephalus 10
(marginella, Chrysomela) 20
marginella, Hydrothassa 20
marginellus, Cryptocephalus 10
melanocephala, Chrysochloa 18
(melanocephala, Chrysochloa) 18
melanocephala, Galeruca 24
(melanopa, Chrysomela) 4
melanopa, Lema 4
Melasoma 20, 21
Melasoma (U.-Gatt.) 21
menthastri, Chrysomela 14
(Menthastriella [U.-Gatt.]) 14
(menyanthidis, Donacia) 1
(merdigera, Chrysomela) 5
merdigera, Lilioceris 5
(merdigera, Lilioceris) 5
(metallica, Chrysomela) 23
metallica, Timarcha 23
Metallochimarcha (U.-Gatt.) 23
Microdera (U.-Gatt.) 20
(Minckia [U.-Gatt.]) 15
(minutus, Cryptocephalus) 12
Mionycha (U.-Gatt.) 28
mixta, Chrysomela cerealis ssp. 14
(moasa, Phytodecta) 21
monticola, Cryptocephalus aureolus ssp. 9
(moraei, Chrysomela) 11
moraei, Cryptocephalus 11
murraea, Cassida 27
musciiformis, Chilotoma 6
(musciiformis, Chrysomela) 6
- nebulosa, Cassida* 26
Neophaedon (U.-Gatt.) 19
(niger, Luperus) 25
(nigra, Plateumaris) 3
(nigriceps, Orsodacne) 3
nigripes, Luperus 25
(nitens, Cryptocephala) 10
(nitida, Chrysomela) 10
nitidulus, Cryptocephalus 10
nitidus, Cryptocephalus 10
nobilis, Cassida 28
norica, Chrysomela crassicornis ssp. 16
(nymphaeae, Chrysomela) 23
nymphaeae, Galerucella 23
- (obscura, Chrysomela)* 13
obscura, Donacia 2
obscurus, Adoxus 13
obscurus ssp. *villosulus, Adoxus* 13
ocellatus, Cryptocephalus 12
octacosmus, Cryptocephalus 11
octomaculatus, Cryptocephalus 10
(octopunctatus, Buprestis) 8
octopunctatus, Cryptocephalus 8
(Odontionella [U.-Gatt.]) 26
Odontionycha (U.-Gatt.) 26
(olivacea, Chrysomela) 21
olivacea, Phytodecta 21
(orbicularis, Chrysomela) 19
orbicularis, Sclerophaedon 19
oricalcia, Chrysomela 15
(ornata, Cassida) 28
Orsodacne 3
Orsodacninae 3
- Pachnephorus* 13
Pachybrachys 7
(Pachybrachys) 7
(pallida, Chrysomela) 22
pallida, Phytodecta 22
pallidifrons, Cryptocephalus 10
(pallidipennis, Clytra) 5
pallidipennis, Lapidostomis 5
pannonica, Cassida 27
pannonica, Galeruca pomonae ssp. 24
panzeri, Cassida 27
parvulus, Cryptocephalus 10
perplexa, Chrysomela 16
(perplexa, Chrysomela) 16
Phaedon 19
(phellandrii, Chrysomela) 20
phellandrii, Prasocuris 20
Phyllobrotica 24, 25
Phyllodecta 22

- Phytodecta* 21, 22
Phytodecta (U.-Gatt.) 21
picus, *Pachybrachys* 7
Pilemostoma 26
(pilosus, Cryptocephalus) 13
pilosus, *Pachnephorus* 13
(pini, Chrysomela) 11
pini, *Cryptocephalus* 11
(pini, Cryptocephalus) 11
(pinicola, Crioceris) 25
pinicola, *Luperus* 25
plagiata ssp. *commutata*, *Chrysochloa* 18
plagiata ssp. *retenta*, *Chrysochloa* 18
Plagiodera 20
planifrons, *Cryptocephalus* 12
Plateumaris 3
Plateumaris (U.-Gatt.) 3
(plorans, Chrysomela cerealis ssp.) 14
polaris, *Phyllodecta* 22
polita, *Chrysomela* 14
(polita, Chrysomela) 14
(polygona, Chrysomela) 19
polygona, *Gastroidea* 19
(polygona, Gastrophyta) 19
polymorpha, *Chrysochloa alpestris* ssp. 17
pomona, *Galeruca* 24
pomona ssp. *anthracina*, *Galeruca* 24
pomona ssp. *annonica*, *Galeruca* 24
(pomona, Tenebrio) 24
populi, *Cryptocephalus* 12
populi, *Melasoma* 21
prasina, *Cassida* 28
Prasocuris 20
(pratensis, Chrysomela) 22
pratensis, *Timarcha* 22
(pretiosus, Chrysochus) 13
(Proctophylus [U.-Gatt.]) 9
Protorina (U.-Gatt.) 18
(Ptinus) 25
(puncticollis, Lema) 4
punctiger, *Cryptocephalus* 10
purpurascens, *Chrysomela hemisphaerica*
 ssp. 15
(pusilla, Galeruca) 23
pusilla, *Galerucella* 23
pusillus, *Cryptocephalus* 12
pygmaeus, *Cryptocephalus* 12
(pyritosa, Chrysomela) 19
pyritosus, *Phaedon* 19
Pyrrhalta 24

quadrigemina, *Chrysomela* 16
quadriguttatus, *Cryptocephalus* 11
(quadrimaculata, Chrysomela) 24
quadrimaculata, *Phyllotroica* 24

(quadripunctata, Chrysomela) 6
quadripunctata, *Clytra* 6
quadripustulatus, *Cryptocephalus* 11
quatuordecimmaculatus, *Cryptocephalus* 9
(quatuordecimpunctata, Attelabus) 4
(quatuordecimpunctata, Crioceris) 4
querceti, *Cryptocephalus* 12
(quinquepunctata, Attelabus) 4
(quinquepunctata, Chrysomela) 22
quinquepunctata, *Crioceris* 4
quinquepunctata, *Phytodecta* 22
(quinquepunctatus, Buprestis) 8
quinquepunctatus, *Cryptocephalus* 8
(quinquepunctatus, Cryptocephalus) 10

relucens, *Chrysomela* 14
(retenta, Chrysochloa) 18
retenta, *Chrysochloa plagiata* ssp. 18
rhaetica, *Chrysomela crassicornis* ssp. 16
rosea, *Cassida* 28
Romalorina (U.-Gatt.) 17, 18
rossia, *Chrysomela* 16
(rossii, Chrysomela) 16
(rubicunda, Clytra) 7
rubicunda, *Coptocephala* 7
rubiginosa, *Cassida* 27
rufa, *Chrysomela* 15
(rufa, Chrysomela) 15
rufa, *Galeruca* 24
rufa ssp. *crassicollis*, *Chrysomela* 15
ruffoi, *Chrysochloa elongata* ssp. 18
(rufipes, Chrysomela) 21
rufipes, *Cryptocephalus* 12
rufipes, *Phytodecta* 21
rufocylindrica, *Chrysomela* 15
rufocylindrica, *Lema* 4
rufocylindrica, *Cassida* 28
rugulosa, *Chrysochloa* 17
(rustica, Donacia) 3
rustica, *Plateumaris* 3

(sacra, Chrysomela) 23
sacra, *Entomoscelis* 23
(sagittariae, Donacia) 2
sagittariae, *Galeruca* 23
sagittariae, *Galerucella* 23
saliceti, *Cryptocephalus* 12
saliceti, *Melasoma* 21
(salicis, Cryptocephalus) 8
salviae, *Crosita* 17
sanguinolenta, *Cassida* 28
sanguinolenta, *Chrysomela* 15
(sanguinolenta, Chrysomela) 15, 16
(sanguinolenta, Chrysomela bipunctata ssp.) 8

sanguinolentus, *Cryptocephalus bipunctatus* ssp. 8
sanguinosa, *Cassida* 28
(saxonicus, Crioceris) 25
saxonicus, Luperus 25
(saxonicus, Luperus) 25
scapularis, Cryptocephalus 12
schäfferi, Cryptocephalus 9
(schäfferi, Cryptocephalus) 9
Sclerophaedon 19
(scopolina, Chrysomela) 7
scopolina, Coptocephala 7
scutellaris, Zeugophora 3
segnis, Phaeton 19
seladonia, Cassida 27
semicuprea, Donacia 1
septentrionis, Lema 4
(sericea, Chrysomela) 9
(sericea, Leptura) 3
sericea, Plateumaris 3
sericeus, Cryptocephalus 9
Sermylassa 26
(sexpunctata, Buprestis) 5
sexpunctata, Lachnaea 5
sexpunctatus, Cryptocephalus 8
(sexpunctatus, Cryptocephalus) 8
signatifrons, Cryptocephalus 11
(signatus, Cryptocephalus) 8
(signatus, Pachybrachys) 7
simplex, Donacia 2
(sophiae, Chrysomela) 19
sophiae, Colaphellus 19
sparganii, Donacia 2
Spartomena (U.-Gatt.) 21
Spartophila (U.-Gatt.) 21
(Spartophila [U.-Gatt.] 21
Spartoxena (U.-Gatt.) 21
speciosissima, Chrysochloa 18
(speciosissima, Coccinella) 18
speciosissima ssp. flammaea, Chrysochloa 18
speciosissima ssp. troglodytes, Chrysochloa 18
(Sphaeromela [U.-Gatt.] 16
(spendidula, Cassida) 28
staphylea, Chrysomela 14
(staphylea, Chrysomela) 14
Sternoplatus (U.-Gatt.) 19
(Stichoptera [U.-Gatt.] 15
stigmatica, Cassida 28
strigosus, Cryptocephalus 11
(styriaca, Chrysochloa elongata) 18
styriaca, Chrysochloa elongata ssp. 18
(subferruginea, Cassida) 26
subferruginea, Hypocassida 26
subreticulata, Cassida 28
(subspinosa, Crioceris) 3
subspinosa, Zeugophora 3

(suturalis, Galeruca) 24
suturalis, Lochmaea 24
(tanaceti, Chrysomela) 24
tanaceti, Galeruca 24
(tenebricosa, Chrysomela) 22
tenebricosa, Timarcha 22
(Tenebrio) 24
(tenella, Chrysomela) 23
tenella, Galerucella 23
(tesselatus, Cryptocephalus) 7, 11
(tessalatus, Eumolpus) 13
tesselatus, Pachnephorus 13
tesselatus, Pachybrachys 7
thalassina, Donacia 2
(tibialis, Lema) 5
tibialis, Lilioceris 5
tibialis, Phyllodecta 22
Timarcha 22, 23
Timarcha (U.-Gatt.) 22
(tinca, Cassida) 27
(Tituboea) 6
tomentosa, Donacia 2
transiens, Cryptocephalus hypochaeridis ssp. 10
(tremulae, Chrysomela) 21
tremulae, Melasoma 21
(tridentata, Chrysomela) 5
tridentata, Labidostomis 5
(tridentata, Labidostomis) 5
trimaculatus, Cryptocephalus 8
(tristis, Chrysomela) 4
tristis, Lema 4
troglydites, Chrysochloa speciosissima ssp. 18
turcicus, Cryptocephalus 11
(typhar, Donacia) 2

(unifasciata, Buprestis) 7
unifasciata, Coptocephala 7

variabilis, Chrysochloa 17
(variabilis, Cryptocephalus) 8
varians, Chrysomela 16
variegatus, Cryptocephalus 8
veronicae, Phaeton 19
(versicolora, Chrysomela) 20
versicolora, Plagioderia 20
versicoloreae, Donacia 1
(versicolor, Plagioderia) 20
vibex, Cassida 27
(viburni, Galeruca) 24
viburni, Phyllorhalla 24
(vigintipunctata, Coccinella) 20
vigintipunctata, Melasoma 20

- villosulus, Adoxus obscurus* ssp. 13
villosulus, Cryptocephalus 9
(villosulus, Cryptocephalus) 9
(villosus, Eumolpus) 13
villosus, Pachnephorus 13
(viminalis, Chrysomela) 21
viminalis, Phytodecta 21
violacea, Chrysomela 15
(violacea, Chrysomela) 14, 15
violaceus, Cryptocephalus 10
virens, Cryptocephalus 10
(virens, Cryptocephalus) 10
virgulata, Chrysochloa 18
(virgulata, Chrysomela) 18
viridipennis, Luperus 25
(viridipennis, Luperus) 25
viridis, Cassida 26
viridis, Chrysochloa 18
(viridis, Chrysomela) 18
viridis ssp. *waldenburgi, Chrysochloa* 18
(viridula, Chrysomela) 19
viridula, Gastroides 19
(viridula, Gastroiphysa) 19
(vitellinae, Chrysomela) 22
vitellinae, Phyllodecta 22
- (vitis, Adoxus)* 13
(vitis, Bromius) 13
vittata, Cassida 28
vittatus, Cryptocephalus 11
vittigera, Chrysochloa 17
vittula, Cryptocephalus 12
vulgaris, Donacia 2
(vulgatissima, Chrysomela) 22
vulgatissima, Phyllodecta 22
- waldenburgi, Chrysochloa viridis* ssp. 18
(wasastjerna, Cryptocephalus) 12
- (xanthaspis, Clytra)* 6
xanthaspis, Gynandrophthalma 6
Xanthogaleruca (U.-Gatt.) 23
xanthopoda, Luperus 25
(xanthopoda, Luperus) 25
(xanthopus, Crioceris) 26
xanthopus, Euluperus 26
- Zeugophora* 3

Es sind bisher folgende Teile erschienen, die derzeit zu den angegebenen Preisen beim Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien I, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, bezogen werden können:

		Preis (ö.S)
Teil VI:	Tardigrada. Von F. Mihelčič	39,—
Teil VIIa:	Mollusca. Von W. Klemm	59,—
Teil VIIIaa:	Anostraca. Von J. Vornatscher	39,—
Teil VIIIc:	Harpacticoida. Von H. Löffler und F. Neuhuber	59,—
Teil VIIIe:	Isopoda (Assele). Von K. Schmölzer	36,—
Teil VIIIf:	Amphipoda. Von J. Vornatscher	39,—
Teil IX:	Arachnoidea (Register). Von H. Strouhal	39,—
Teil IXa:	Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea. Von M. Beier	39,—
Teil IXb:	Araneae. Von E. Kritscher	86,—
	(Nachtrag zu IXa und IXb. Von M. Beier, E. Kritscher und H. Strouhal)	39,—
Teil IXc:	Opiliones. Von E. Kritscher	39,—
Teil IXh:	Porohalacaridae, Hydrachnellae (Wassermilben). Von K. O. Viets	39,—
Teil XIa:	Myriapoda: Chilopoda, Symphyla, Pauropoda. Von C. Attems†, M. Würmli und G. Imhof	59,—
Teil XIb:	Myriapoda: Diplopoda. Von C. Attems† und U. Schmölzer- Falkenberg	49,—
Teil XIIb:	Plecoptera. Von E. Pomeisl	39,—
Teil XIIc:	Odonta (Libellen). Von D. St. Quentin	39,—
Teil XIIIa:	Saltatoria, Dermaptera, Blattodea, Mantodea (Geradflügler). Von R. Ebner	39,—
Teil XIIIc:	Thysanoptera (Fransenflügler). Von U. Schmölzer-Falken- berg	59,—
Teil XVa:	Coleoptera, Cicindelidae und Carabidae-Carabinae. Von K. Mandl	59,—
Teil XVb:	Coleoptera, Carabidae-Carabinae. Von K. Mandl und R. Schönmann	70,—
Teil XVf, a:	Coleoptera, Staphylinidae. Von O. Scheerpeltz	410,—
Teil XVp:	Coleoptera, Chrysomelidae. Von H. Jakob†	60,—
Teil XVz:	Strepsiptera (Fächerflügler). Von V. Székessy	39,—
Teil XVI:	Hymenoptera, Cleptidae, Chrysididae. Von St. Zimmermann	39,—
Teil XVIp:	Hymenoptera, Formicidae (Ameisen). Von E. Hözl	39,—
Teil XIXz:	Siphonaptera (Flöhe). Von F. G. Smit	39,—
Teil XXI:	Vertebrata (Register). Von H. Strouhal	39,—
Teil XXIaa:	Vertebrata, Pisces. Von P. Kähsbauer	82,—
Teil XXIab:	Vertebrata, Amphibia, Reptilia. Von J. Eiselt	39,—
Teil XXIb:	Vertebrata, Aves (Vögel). Von G. Rokitsky	91,—
Teil XXIc:	Vertebrata, Mammalia (Säugetiere). Von O. Wettstein	39,—
	(Nachtrag zu XXIc. Von K. Bauer und O. Wettstein)	39,—

Der Katalog zählt alle wesentlichen Kategorien des Systems bis einschließlich Gattung bzw. Untergattung auf; lediglich bei der Gattung werden der Autor und das Jahr ihrer Aufstellung angeführt. Die Kategorien bis einschließlich Gattung (Untergattung) sind natürlich gruppiert. Innerhalb der Gattung (Untergattung) sind die Arten systematisch geordnet.

Von jeder Art (Unterart) sind angegeben: der jetzt gültige Name, zwischen Klammern der Name der zugehörigen Untergattung, der Autorennamen und das Jahr und Literaturzitat der Erstbeschreibung. Wurde die Art zuerst einer anderen Gattung zugeteilt, ist der Name dieser, zwischen Klammern, dem Literaturzitat der Erstbeschreibung angefügt, und der Autorennamen steht in einem solchen Fall in Klammern. Auf das Zitat der Erstbeschreibung folgen weitere Angaben über beschreibende Literatur, möglichst aus letzter Zeit. Synonyme finden unter Anführung des Art- und Autorennamens, ferner des Jahres ihrer Beschreibung, des Literaturzitates und des Gattungsnamens nur dann Berücksichtigung, wenn Arten unter solchen Namen aus Österreich in wissenschaftlichen Schriften erwähnt sind.

Es folgen dann eine kurze tiergeographische Charakteristik der Art, in besonderen Fällen, in Klammern stehend, auch noch eine Kennzeichnung in ökologischer oder biologischer Hinsicht, und schließlich Angaben über das Vorkommen in Österreich unter gekürzter Anführung der einzelnen Bundesländer, in denen die Art festgestellt wurde: V = Vorarlberg, nT = Tirol, S = Salzburg, O = Oberösterreich, N = Niederösterreich (einschließlich Wien), St = Steiermark, B = Burgenland, K = Kärnten, oT = Osttirol. Eine allgemeine Verbreitung über ganz Österreich ist durch „Ö“ zum Ausdruck gebracht. Liegt eine beschränkte Verbreitung vor, ist der in Frage kommende Teil des Bundeslandes näher bezeichnet, z. B. nB = nördliches Burgenland, oN = östliches Niederösterreich, soK = Südostkärnten. Ist das Vorkommen lokalisiert, findet sich hinter der Abkürzung für das Bundesland, eingeklammert, die nähere Ortsangabe. Bei Arten, deren Erstbeschreibung aus Österreich erfolgte, ist der „klassische Fundort“ (l. cl.) angegeben. Eingeschleppte (und eingeführte) Arten sind hinter der Angabe ihres Vorkommens mit einem „x“ bezeichnet. In historischer Zeit ausgestorbene Arten haben hinter der Angabe ihres letzten Vorkommens ein „+“. Bisher unveröffentlichte Fundortsangaben sind durch ein „*“ gekennzeichnet.

Diese Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern:

Prof. Dr. Wilhelm Kühnelt (Obmann)
Prof. Dr. Herbert Franz (Obmann-Stellvertreter)
Prof. Dr. Karl v. Frisch
Prof. Dr. Friedrich Ehrendorfer
Prof. Dr. Helmuth Zapfe
Prof. Dr. Ernst Reichl

Redaktion:

Dr. Ursula Falkenberg
(Anfragen: 1170 Wien, Heigerleinstraße 49/34, Tel. 46 94 965)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Catalogus Faunae Austriae, Wien](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [XVp](#)

Autor(en)/Author(s): Jakob Hermann

Artikel/Article: [Teil XV p: Coleoptera, Fam. Chrysomelidae. 1-36](#)