

Bemerkungen zur Braunkohlenformation in Mecklenburg.

Von E. Geinitz, Rostock.

Der kurze Artikel „Die Braunkohlenformation in Mecklenburg“ in dem Handbuch für den deutschen Braunkohlenbergbau von G. KLEIN ist leider unvollständig und z. T. unrichtig. Dem Bearbeiter ist die neuere Literatur unbekannt geblieben; ich bedaure, daß er sich nicht der in Rostock bestehenden Meckl. Geologischen Landesanstalt erinnert hat, die ihm gern das diesseitige, für eine spätere Veröffentlichung vorbereitete Beobachtungsmaterial zur Verfügung gestellt hätte.

So ist u. a. noch die bereits (9. Beitr. z. Geol. Meckl. p. 22) als unrichtig erkannte Angabe betr. Pritz aufgenommen; so findet sich die völlig aus der Luft gegriffene Angabe, daß bei Schwansee ein Braunkohlenlager entdeckt worden sein soll, und wird gesagt, daß im östlichen Mecklenburg ausschließlich mariner Septarienton das Tertiär verträte. Daß Parchim nordöstlich von Schwansee liegen soll, ist wohl nur ein Satzfehler (Schwansee liegt an der Ostsee!). Auf p. 475 ist Herzfeld, Parchim und Pritz zu Brandenburg gestellt.

Ueber die Verbreitung der Basaltgänge in der Umgebung von Freiburg im Breisgau.

Von Otto Wilckens in Bonn.

Mit 3 Textfiguren.

Die Umgegend von Freiburg im Breisgau ist reich an vulkanischen Schloten und Gängen, die teils östlich der Rheintal-Hauptverwerfung im Schwarzwald, teils westlich von ihr in der „Vorbergzone“ aufsetzen. Manche von ihnen sind in der Literatur oft erwähnt, vor allem hat der Schlot von Alpersbach (in der Gegend des Höllentales) wegen seiner großen Bedeutung für die geologische Geschichte des Schwarzwaldes lebhaftes Interesse gefunden¹. Gut bekannt ist auch der Schlot von der Berghausener Kapelle am Schönberg², weniger der von Maleck bei Emmendingen, der

¹ STEINMANN, G., Die Nagelfluh von Alpersbach im Schwarzwalde. Ein Beitrag zur Geschichte der alemannischen Gebirgstafel. Ber. Nat. Ges. Freiburg i. B. 4. (1888). — STEINMANN, G. u. GRAEFF, F., Geolog. Führer d. Umg. v. Freiburg. p. 73–75 (1890). — STEINMANN, G., Die Neuaufschließung des Alpersbacher Stollens. Ber. üb. d. Vers. d. ober-rheinischen geol. Ver. 35. Vers. (Freiburg i. B.). p. 8–12. (1902). — WILCKENS, O., Über die Bedeutung von Eruptiv-Breccien als erdgeschichtliche Urkunden. Naturw. Wochenschr. N. F. III. p. 26–29.

² FROMHERZ, K., Die Jura-Formationen des Breisgaus. p. 46. (1838). — SCHILL, J., Geolog. Beschr. d. Umgeb. der Bäder Glottertal u. Suggen-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Geinitz Franz Eugen

Artikel/Article: [Bemerkungen zur Braunkohlenformation in Mecklenburg. 261](#)