Checkliste der Fellkäfer Thüringens (Coleoptera: Leptinidae)

Stand: 01.10.2002

WOLFGANG APFEL, Eisenach

Von der artenarmen Familie der Fellkäfer (Coleoptera: Leptinidae) kommen zwei Arten in Deutschland vor. Eine sehr auffällige Art, bei der es schwer fällt an einen Käfer zu denken, ist der Biberkäfer *Platypsyllus castoris*. Im Mittelbegebiet wurde durch FRIEDRICH (1894) das erste Exemplar dieser Käferart gefunden. Durch Wiederansiedlung des Bibers in Bayern konnte die Art aktuell auch in Westdeutschland gefunden werden (GEISER 1980, 1981). In Schleswig-Holstein wird die Art durch importierte Tiere nachgewiesen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Sachsen-Anhalt werden von denselben Autoren nur Nachweise vor 1950 gemeldet. Die Art wird aber aktuell von NEUMANN & PIECHOCKI (1984) gemeldet. In Thüringen verschwand der Biber schon im 19. Jahrhundert. Ob der Käfer auch hier vorkam, ist nicht mehr zu ermitteln.

Die zweite und morphologisch sehr verschiedene Art dieser Familie ist der Mäusekäfer *Leptinus testaceus*. Die durch geringe Pigmentierung gelbe Färbung und die Reduktion der Augen weisen auf eine unterirdische Lebensweise wie bei den Höhlenkäfern hin. Die Larven leben bei Mäusen (Waldmaus, Gelbhalsmaus u.a.). Man kann die Art auch beim Maulwurf finden. Die Nahrung besteht aus Stoffen, die vom Wirt stammen bzw. anfallen (einschließlich Kot). Im Gegensatz zum Biberkäfer leben die Larven nicht unmittelbar am Wirt. Beide Arten sind aber keine Parasiten.

In Thüringen kommt nur der Mäusekäfer vor. Der Käfer ist weit verbreitet und wird vereinzelt in Bodenfallen gefangen. Da die Art sehr verborgen lebt, wird sie relativ selten gefunden (alte Funde s. RAPP 1933)

Taxon	vor 1950	nach 1950
<i>Leptinus testaceus</i> Müller, 1817	x	x

Literatur

- FRIEDRICH, H. (1894): Die Biber an der mittleren Elbe. Anhang: *Platypsyllus castoris* Ritsema. - Dessau: Paul Baumann.
- GEISER, R. (1980): 8. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. *Platypsyllus castoris* Ritsema. - Nachrichtenbl. der Bayer. Entomologen **29**: 39.
- (1981): 9. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - Nachrichtenbl. der Bayer. Entomologen **30**: 33-50.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. u. Ber., Beiheft **4**, 185 S.

- NEUMANN, V. (1998): Rote Liste der Fellkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Heft 30, Halle.
- & R. PIECHOCKI (1984): Die Entwicklungsstadien der Familie Leptinidae (Coleoptera). - Ent. Nachr. Ber. **28**, 6: 237-252.
- RAPP, O. (1933): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, Band I. - Selbstverlag, Erfurt, 766 S.

Anschrift des Autors: Wolfgang Apfel
Hellwigstraße 6
D-99817 Eisenach
eMail: Wolfgang.Apfel@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang

Artikel/Article: [Checkliste der Fellkäfer Thüringens \(Coleoptera: Leptinidae\) 13-14](#)