

Aktualisierte Checkliste der Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae) Thüringens

Stand: 01.10.2002

WOLFGANG APFEL, Eisenach

Seit dem Erscheinen der 1. Fassung der Checkliste Thüringer Insekten (APFEL 1995) und der Ergänzung (APFEL 1998) hat sich in der Taxonomie, Systematik und Faunistik so viel geändert, daß es sinnvoll erschien, eine neue aktuelle Gesamtartenliste zu erstellen. Da sich international durchgesetzt hat, die Scaphidiidae, Dasycteridae und Pselaphidae als Unterfamilien der Staphylinidae anzusehen, werden diese mit aufgeführt. Die taxonomischen Änderungen wurden durch Revisionen bzw. Kataloge von LÖBL (1997), HERMAN (2001b) und NEWTON & CHANDLER (1989) erforderlich. Änderungen bei den Schreibweisen der Autoren oder Jahreszahlen geben ASSING & SCHÜLKE (2001) im aktualisierten Verzeichnis mitteleuropäischer Staphylinidae an und werden hier ebenfalls mit übernommen. Um bei der neuen Liste noch den Überblick zu behalten, werden die letzten gebräuchlichen Artnamen der beiden Listen (APFEL 1995, 1998) mit aufgeführt. Neufunde und Wiederfunde werden im Anschluß nur dann kommentiert, wenn dies noch nicht in der Ergänzung (APFEL 1998) erfolgte. Bei den Neufunden für Thüringen wurde die Bestimmung durch die Spezialisten J. Vogel (Görlitz), V. Assing (Hannover) und V. Brachat (Geretsried) abgesichert.

Bei einer Reihe von Arten mußte der Eintrag „nach 1960“ gelöscht werden, da es sich in den meisten Fällen um Fehldeterminationen oder Fundortverwechslungen handelte. Gelegentliche Revisionen in den Sammlungen Rapp, Wolfrum und Kellner (Museum der Natur Gotha) brachten bei einigen fraglichen Meldungen für Thüringen Klarheit. Allerdings steht noch bei einer Reihe von Arten die Überprüfung aus. Besonders bei alten, sehr zerbrechlichen Exemplaren ist eine Kontrolle oft sehr zeitaufwendig. Da in der vergangenen Zeit bei einigen Meldungen keine Belege in den Sammlungen der Museen Erfurt und Gotha gefunden werden konnten und ein Vorkommen angezweifelt werden muß, wurden 12 Arten aus den 1. Fassung der Checklisten (Staphylinidae / Pselaphidae) gestrichen.

Zu streichende Arten

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Brachygluta haemoptera</i> (Aubé, 1844) | keine Belege vorhanden |
| 2. <i>Bledius spectabilis</i> Kraatz, 1857 | bezieht sich auf <i>Bledius limicola</i> |
| 3. <i>Bledius filipes</i> Sharp, 1911 | überprüfte Tiere sind <i>B. pallipes</i> |
| 4. <i>Tasgius globulifer</i> (Geoffroy, 1785) | alte Meldungen sind <i>T. melanarius</i> |
| 5. <i>Quedius persimilis</i> Mulsant & Rey, 1875 | kein sicherer Beleg vorhanden |
| 6. <i>Mycetoporus despectus</i> Strand, 1969 | keine Belege vorhanden |
| 7. <i>Mycetoporus nigricollis</i> Stephens, 1835 | wahrscheinlich nur südliche Art |
| 8. <i>Mycetoporus angularis</i> Mulsant & Rey, 1853 | keine Belege vorhanden |
| 9. <i>Cypha seminulum</i> Erichson, 1839 | keine Belege vorhanden |
| 10. <i>Myllaena gracilicornis</i> Fairmaire & Brisout, 1859 | keine Belege vorhanden |
| 11. <i>Atheta contristata</i> (Kraatz, 1856) | keine Belege vorhanden |
| 12. <i>Aleochara heeri</i> Likovsky, 1982 | keine Belege vorhanden |

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
	Unterfamilie: Micropeplinae			
1	Micropeplus tesserula Curtis, 1828		x	
2	Micropeplus fulvus Erichson, 1840	x	x	
3	Micropeplus marietti Jaquelin Du Val, 1857	x	x	
4	Micropeplus longipennis Kraatz, 1859	x	x	
5	Micropeplus porcatus (Fabricius, 1789)	x	x	
	Unterfamilie: Scaphidiinae			
6	Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790	x	x	
7	Scaphisoma agaricinum (Linné, 1758)	x	x	
8	Scaphisoma boleti (Panzer, 1793)	x	x	
9	Scaphisoma assimile Erichson, 1845	x	x	
10	Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954		x	1
	Unterfamilie: Piestinae			
11	Siagonium quadricorne Kirby & Spence, 1815	x	x	
	Unterfamilie: Pseudopsinae			
12	Pseudopsis sulcata Newman, 1834	x		
	Unterfamilie: Phloeocharinae			
13	Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830	x	x	
	Unterfamilie: Dasycerinae			
14	Dasycerus sulcatus Broingnart, 1800	x	x	
	Unterfamilie: Pselaphinae			
15	Bibloporus bicolor (Denny, 1825)	x	x	
16	Bibloporus minutus Raffray, 1914		x	
17	Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888		x	
18	Meliceria spec.		x	2
19	Biblopectus ambiguus (Reichenbach, 1816)	x		
20	Euplectus nanus (Reichenbach, 1816)	x	x	
21	Euplectus piceus Motschulsky, 1835		x	
22	Euplectus sparsus Besuchet, 1964		x	
23	Euplectus bescidicus Reitter, 1881		x	
24	Euplectus sanguineus Denny, 1825	x	x	
25	Euplectus signatus (Reichenbach, 1816)	x	x	
26	Euplectus bonvouloiri narentinus Reitter, 1881		x	3
27	Euplectus punctatus Mulsant, 1861	x	x	
28	Euplectus karsteni (Reichenbach, 1816)	x	x	
29	Euplectus fauveli Guillebeau, 1888		x	
30	Euplectus brunneus Grimmer, 1841	x	x	
31	Plectophloeus fleischeri Machulka, 1929	x		
32	Plectophloeus erichsoni erichsoni (Aubé, 1844)		x	
33	Plectophloeus nubigena (Reitter, 1876)		x	
34	Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
35	Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816)	x	x	
36	Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816)	x	x	
37	Amauronyx maerkelii (Aubé, 1844)		x	
38	Batrisus formicarius (Aubé, 1833)	x	x	
39	Batrisodes delaporteii (Aubé, 1833)	x	x	
40	Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816)	x		
41	Batrisodes adnexus (Hampe, 1863)	x		
42	Batrisodes buqueti (Aubé, 1833)		x	
43	Batrisodes unisexualis Besuchet, 1988		x	
44	Batrisodes oculatus (Aubé, 1833)	x		
45	Tychobythinus glabratus (Rye, 1870)		x	
46	Bythinus macropalpus Aubé, 1833	x	x	
47	Bythinus burrellii Denny, 1825	x	x	
48	Bythinus securiger (Reichenbach, 1816)	x		
49	Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833)	x	x	
50	Bryaxis carinula (Rey, 1888)		x	
51	Bryaxis puncticollis (Denny, 1825)	x	x	
52	Bryaxis nigripennis (Aubé, 1844)	x		
53	Bryaxis curtisi curtisi (Leach, 1817)		x	
54	Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816)		x	
55	Bryaxis clavicornis (Panzer, 1806)	x	x	4
56	Tychus niger (Paykull, 1800)	x	x	
57	Rybaxis longicornis (Leach, 1817)	x	x	
58	Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816)	x	x	
59	Brachygluta lefebvrei (Aubé, 1833)	x		
60	Brachygluta xanthoptera (Reichenbach, 1816)	x		
61	Brachygluta haematica (Reichenbach, 1816)	x	x	
62	Brachygluta simplicior Raffray, 1904		x	5
63	Brachygluta sinuata (Aubé, 1833)		x	
64	Brachygluta helferi helferi (Schmidt-Göbel, 1836)	x	x	
65	Reichenbachia jurorum Leach, 1817	x	x	
66	Trissemus impressus (Panzer, 1803)	x	x	
67	Pselaphaulax dresdensis (Herbst, 1792)	x	x	
68	Pselaphus heisei Herbst, 1792	x	x	
69	Chennium bituberculatum Latreille, 1807	x		
70	Centrotoma lucifuga Heyden, 1849	x		
71	Ctenistes palpalis Reichenbach, 1816	x		
72	Tyrus mucronatus (Panzer, 1803)		x	
73	Claviger testaceus Preyßler, 1790		x	
74	Claviger longicornis Müller, 1818	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
	Unterfamilie: Proteininae			
75	Metopsia similis Zerche, 1998 Syn. <i>Metopsia clypeata</i> sensu FHL	x	x	
76	Megarthus prosseni Schatzmayr, 1904 Syn. <i>Megarthus depressus</i> sensu FHL	x	x	
77	Megarthus depressus (Paykull, 1835) Syn. <i>Megarthus sinuatocollis</i> sensu FHL	x	x	
78	Megarthus bellevoeyi Saulcy, 1862 Syn. <i>Megarthus affinis</i> Miller, 1853	x	x	
79	Megarthus denticollis (Beck, 1817)	x	x	
80	Megarthus nitidulus Kraatz, 1857	x	x	
81	Megarthus hemipterus (Illiger, 1794)	x		6
82	Proteinus ovalis Stephens, 1834	x	x	
83	Proteinus crenulatus Pandellé, 1867		x	
84	Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)	x	x	
85	Proteinus atomarius Erichson, 1840	x	x	
86	Proteinus laevigatus Hochhuth, 1872 Syn. <i>Proteinus macropterus</i> sensu FHL	x	x	
	Unterfamilie: Omaliinae			
87	Eusphalerum alpinum (Heer, 1839)	x	x	
88	Eusphalerum anale (Erichson, 1840)	x		
89	Eusphalerum longipenne (Erichson, 1839)	x	x	
90	Eusphalerum stramineum (Kraatz, 1857)	x	x	
91	Eusphalerum primulae (Stephens, 1834)	x	x	
92	Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792)	x	x	
93	Eusphalerum semicoleoptratum (Panzer, 1895) Syn. <i>Eusphalerum abdominale</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
94	Eusphalerum luteum (Marsham, 1802)	x	x	
95	Eusphalerum marshami (Fauvel, 1869)	x	x	
96	Eusphalerum signatum (Märkel, 1857)	x	x	
97	Eusphalerum limbatum (Erichson, 1840)	x	x	
98	Eusphalerum pseudaucupariae (Strand, 1917)	x	x	
99	Eusphalerum rectangulum (Fauvel, 1870)	x	x	
100	Eusphalerum sorbi (Gyllenhal, 1810)	x	x	
101	Eusphalerum torquatum (Marsham, 1802)	x		
102	Eusphalerum atrum (Heer, 1839)	x	x	
103	Eusphalerum tenenbaumi (Bernhauer, 1932) Syn. <i>Eusphalerum florale</i> (Panzer, 1793)	x	x	
104	Acrolocha inflata (Gyllenhal, 1813)	x	x	
105	Acrolocha minuta (Olivier, 1795)	x	x	
106	Acrolocha amabilis (Heer, 1841)	x	x	
107	Acrolocha pliginskii Bernhauer, 1912		x	7

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
108	Phyllodrepa melanocephala (Fabricius, 1787)	x	x	
109	Phyllodrepa salicis (Gyllenhal, 1810)	x	x	8
110	Phyllodrepa nigra (Gravenhorst, 1806)	x	x	
111	Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789)	x	x	
112	Phyllodrepa melis Hansen, 1940	x	x	
113	Phyllodrepa ioptera (Stephens, 1834)	x	x	
114	Phyllodrepa vilis (Erichson, 1840)	x		
115	Hapalaraea pygmaea (Paykull, 1800)	x	x	
116	Hypopycna rufula (Erichson, 1840)		x	
117	Omalium validum Kraatz, 1857	x	x	
118	Omalium rivulare (Paykull, 1789)	x	x	
119	Omalium septentrionis Thomson, 1857	x	x	
120	Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806	x	x	
121	Omalium laticolle Kraatz, 1857	x		
122	Omalium exiguum Gyllenhal, 1810	x		
123	Omalium caesum Gravenhorst, 1806	x	x	
124	Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880	x	x	
125	Omalium excavatum Stephens, 1834	x	x	
126	Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
127	Phloeonomus punctipennis Thomson, 1867	x	x	
128	Phloeonomus minimus (Erichson, 1839)	x	x	
129	Phloeostiba plana (Paykull, 1792)	x	x	
130	Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838)	x	x	9
131	Xylostiba monilicornis (Gyllenhal, 1810)	x	x	
132	Xylodromus depressus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
133	Xylodromus affinis Gerhardt, 1877	x	x	
134	Xylodromus concinnus (Marsham, 1802) Syn. <i>Xylodromus brunnipennis</i> (Stephens, 1834)	x	x	
135	Xylodromus testaceus (Erichson, 1840)	x	x	
136	Philorinum sordidum (Stephens, 1834)	x	x	
137	Orochares angustatus (Erichson, 1840)	x	x	10
138	Phyllodrepoidea crenata Ganglbauer, 1895	x	x	
139	Deliphrum tectum (Paykull, 1789)	x	x	
140	Deliphrum algidum Erichson, 1840	x		
141	Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794) Syn. <i>Lathrimaeum melanocephalum</i> (Illiger, 1794)	x	x	
142	Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) Syn. <i>Lathrimaeum atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
143	Anthobium unicolor (Marsham, 1802) Syn. <i>Lathrimaeum unicolor</i> (Marsham, 1802)	x	x	
144	Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810)	x	x	
145	Olophrum fuscum (Gravenhorst, 1806)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
146	Olophrum assimile (Paykull, 1800)	x	x	
147	Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810)		x	
148	Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806)	x	x	
149	Acidota crenata (Fabricius, 1792)	x	x	
150	Acidota cruentata (Mannerheim, 1831)	x	x	
151	Amphichroum canaliculatum (Erichson, 1840)	x	x	
152	Lesteva punctata Erichson, 1839	x	x	
153	Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777)	x	x	
154	Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847 Syn. <i>Lesteva nivicola</i> Fauvel, 1871	x	x	
155	Lesteva hansenii Lohse, 1953	x	x	
156	Lesteva pubescens Mannerheim, 1831	x	x	
157	Geodromicus nigrita (Müller, 1821)	x	x	
158	Anthophagus praeustus Müller, 1821	x	x	
159	Anthophagus caraboides (Linné, 1758)	x	x	
160	Anthophagus bicornis (Block, 1799)	x	x	
161	Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1830)	x	x	
162	Eudectus giraudi Redtenbacher, 1857	x		
163	Coryphium angusticollae Stephens, 1834	x	x	
	Unterfamilie: Oxytelinae			
164	Syntomium aeneum (Müller, 1821)	x	x	
165	Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802)	x	x	
166	Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793)	x	x	
167	Coprophilus piceus (Solsky, 1867)	x		
168	Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827)	x		
169	Planeustomus palpalis (Erichson, 1839)	x	x	
170	Ochtheophilus rosenhaueri (Kiesenwetter, 1850) Syn. <i>Ochtheophilus longipennis</i> (Fairmaire & Laboulb., 1856)	x	x	
171	Ochtheophilus omalinus (Erichson, 1840)	x	x	
172	Ochtheophilus aureus (Fauvel, 1871)		x	
173	Thinodromus dilatatus (Erichson, 1839)	x		
174	Thinodromus hirticollis Mulsant & Rey, 1878	x		11
175	Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834)	x	x	
176	Carpelimus bilineatus (Stephens, 1834)	x	x	
177	Carpelimus similis (Smetana, 1967)		x	12
178	Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860)	x	x	
179	Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
180	Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802)	x	x	13
181	Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848)	x	x	14
182	Carpelimus lindrothi (Palm, 1943)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
183	Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835)	x	x	
184	Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
185	Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946)	x	x	
186	Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840)	x	x	
187	Carpelimus gangelbaueri (Bernhauer, 1901)		x	15
188	Carpelimus foveolatus (Sahlberg, 1832)	x	x	
189	Carpelimus halophilus (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
190	Carpelimus despectus (Baudi di Selve, 1870)		x	
191	Carpelimus exiguus (Erichson, 1839)	x		
192	Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
193	Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830)	x	x	
194	Carpelimus subtilis (Erichson, 1839)	x	x	
195	Carpelimus elongatulus (Erichson, 1839)	x	x	
196	Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
197	Aploderus caesus (Erichson, 1839)	x	x	
198	Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806	x	x	
199	Oxytelus migrator Fauvel, 1904		x	
200	Oxytelus fulvipes Erichson, 1839	x	x	
201	Oxytelus piceus (Linné, 1767)	x	x	
202	Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802)	x	x	
203	Anotylus insecatus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
204	Anotylus rugifrons Hochhuth, 1849)	x	x	
205	Anotylus rugosus (Fabricius, 1775)	x	x	
206	Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
207	Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
208	Anotylus mutator (Lohse, 1963)		x	
209	Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
210	Anotylus complanatus (Erichson, 1839)	x	x	
211	Anotylus clypeonitens (Pandellé, 1867)	x	x	16
212	Anotylus affinis (Czwalina, 1870)		x	
213	Anotylus hamatus (Fairmaire & Laboulbène, 1856)	x?		17
214	Anotylus bernhaueri (Ganglbauer, 1898)		x	
215	Anotylus saulcyi (Pandellé, 1867)	x	x	18
216	Anotylus tetracarınatus (Block, 1799)	x	x	
217	Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785)	x	x	
218	Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
219	Platystethus alutaceus Thomson, 1861	x	x	
220	Platystethus capito Heer, 1839	x	x	
221	Platystethus nodifrons (Mannerheim, 1830)	x		
222	Platystethus nitens (Sahlberg, 1832)	x	x	
223	Bledius furcatus (Olivier, 1811)	x		

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
224	<i>Bledius bicornis bicornis</i> (Germar, 1823) Syn. <i>Bledius dama</i> Motschulsky, 1857	x		
225	<i>Bledius limicola</i> Tottenham, 1940	x	x	
226	<i>Bledius tricornis</i> (Herbst, 1784)	x	x	
227	<i>Bledius unicoloris</i> (Germar, 1825)	x	x	
228	<i>Bledius pallipes</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
229	<i>Bledius longulus</i> Erichson, 1839	x	x	
230	<i>Bledius denticollis</i> Fauvel, 1870	?		
231	<i>Bledius opacus</i> (Block, 1799)	x	x	
232	<i>Bledius gallicus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
233	<i>Bledius procerulus</i> Erichson, 1840	x	x	
234	<i>Bledius dissimilis</i> Erichson, 1840	x		19
235	<i>Bledius crassicolis</i> Lacordaire, 1835	?		
236	<i>Bledius occidentalis</i> Bondroit, 1907	x	x	
237	<i>Bledius cribricollis</i> Heer, 1839	x	x	
238	<i>Bledius femoralis</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	20
239	<i>Bledius atricapillus</i> (Germar, 1825)	x		
240	<i>Bledius nanus</i> Erichson, 1840	x	x	
241	<i>Bledius agriculator</i> Heer, 1841	x	x	
242	<i>Bledius erraticus</i> Erichson, 1839	x	x	
243	<i>Bledius talpa</i> (Gyllenhal, 1810)	x		
244	<i>Bledius subterraneus</i> Erichson, 1839	x	x	
245	<i>Thinobius brunneipennis</i> Kraatz, 1857	?		21
246	<i>Thinobius longipennis</i> (Heer, 1841)	x		
247	<i>Thinobius ciliatus</i> Kiesenwetter, 1844	x		22
248	<i>Thinobius brevipennis</i> Kiesenwetter, 1850	x		
	Unterfamilie: Oxyporinae			
249	<i>Oxyporus rufus</i> (Linné, 1758)	x	x	
250	<i>Oxyporus maxillosus</i> Fabricius, 1793	x	x	
	Unterfamilie: Steninae			
251	<i>Stenus biguttatus</i> (Linné, 1758)	x	x	
252	<i>Stenus comma</i> Leconte, 1863	x	x	
253	<i>Stenus guttula</i> Müller, 1821	x	x	
254	<i>Stenus fossulatus</i> Erichson, 1840	x	x	
255	<i>Stenus aterrimus</i> Erichson, 1839	x	x	
256	<i>Stenus juno</i> (Paykull, 1789)	x	x	
257	<i>Stenus ater</i> Mannerheim, 1830	x	x	
258	<i>Stenus longitarsis</i> Thomson, 1851	x	x	
259	<i>Stenus gallicus</i> Fauvel, 1873	x		
260	<i>Stenus lustrator</i> Erichson, 1839	x	x	
261	<i>Stenus proditor</i> Erichson, 1839	x		

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
262	<i>Stenus sylvester</i> Erichson, 1839	x		
263	<i>Stenus stigmula</i> Erichson, 1840	x		
264	<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	
265	<i>Stenus providus</i> Erichson, 1839	x	x	
266	<i>Stenus scrutator</i> Erichson, 1839	x	x	
267	<i>Stenus bimaculatus</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
268	<i>Stenus palposus</i> Zetterstedt, 1838	x		
269	<i>Stenus ruralis</i> Erichson, 1840	x		
270	<i>Stenus boops</i> Ljungh, 1810	x	x	
271	<i>Stenus incrassatus</i> Erichson, 1839	x	x	
272	<i>Stenus melanarius</i> Stephens, 1833	x	x	
273	<i>Stenus subdepressus</i> Mulsant & Rey, 1861		x	
274	<i>Stenus morio</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
275	<i>Stenus atratulus</i> Erichson, 1839	x	x	
276	<i>Stenus melanopus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
277	<i>Stenus canaliculatus</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
278	<i>Stenus nitens</i> Stephens, 1833	x	x	
279	<i>Stenus fuscipes</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
280	<i>Stenus argus</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
281	<i>Stenus europaeus</i> Puthz, 1966 Syn. <i>Stenus cautus</i> sensu FHL	x	x	23
282	<i>Stenus cautus</i> Erichson, 1839 Syn. <i>Stenus vafellus</i> Erichson, 1839	x	x	24
283	<i>Stenus incanus</i> Erichson, 1839	x		
284	<i>Stenus pusillus</i> Stephens, 1833	x	x	
285	<i>Stenus nanus</i> Stephens, 1833	x	x	
286	<i>Stenus circularis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
287	<i>Stenus pumilio</i> Erichson, 1839	x		
288	<i>Stenus humilis</i> Erichson, 1839	x	x	
289	<i>Stenus carbonarius</i> Gyllenhal, 1827	x	x	25
290	<i>Stenus opticus</i> Gravenhorst, 1806	x		
291	<i>Stenus formicetorum</i> Mannerheim, 1843	x	x	
292	<i>Stenus crassus</i> Stephens, 1833	x	x	
293	<i>Stenus brunnipes</i> Stephens, 1833	x	x	
294	<i>Stenus nigritulus</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
295	<i>Stenus latifrons</i> Erichson, 1839	x	x	
296	<i>Stenus fulvicornis</i> Stephens, 1833	x	x	
297	<i>Stenus tarsalis</i> Ljungh, 1810	x	x	
298	<i>Stenus oscillator</i> Rye, 1870	x	x	
299	<i>Stenus bohemicus</i> Machulka, 1947		x	
300	<i>Stenus similis</i> (Herbst, 1784)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
301	<i>Stenus solutus</i> Erichson, 1840	x	x	
302	<i>Stenus cicindeloides</i> (Schaller, 1783)	x	x	
303	<i>Stenus kiesenwetteri</i> Rosenhauer, 1856		x	26
304	<i>Stenus fornicatus</i> Stephens, 1833	x	x	
305	<i>Stenus pallitarsis</i> Stephens, 1833	x	x	
306	<i>Stenus niveus</i> Fauvel, 1865	x		
307	<i>Stenus binotatus</i> Ljungh, 1804	x	x	
308	<i>Stenus pubescens</i> Stephens, 1833	x	x	
309	<i>Stenus flavipes</i> Stephens, 1833	x	x	
310	<i>Stenus nitidiusculus nitidiusculus</i> Stephens, 1833	x	x	
311	<i>Stenus picipennis</i> Erichson, 1840	x	x	
312	<i>Stenus bifoveolatus</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
313	<i>Stenus picipes picipes</i> Stephens, 1833	x	x	
314	<i>Stenus picipes brevipennis</i> Thomson, 1851 Syn. <i>Stenus brevipennis</i> Thomson, 1851	x	x	
315	<i>Stenus impressus</i> Germar, 1824	x	x	
316	<i>Stenus ludyi</i> Fauvel, 1886	x	x	
317	<i>Stenus ochropus</i> Kiesenwetter, 1858	x	x	
318	<i>Stenus fuscicornis</i> Erichson, 1840	x	x	
319	<i>Stenus subaeneus</i> Erichson, 1840	x		27
320	<i>Stenus glacialis</i> Heer, 1839		x	
321	<i>Stenus palustris</i> Erichson, 1839	x		
322	<i>Stenus flavipalpis</i> Thomson, 1860	x	x	
323	<i>Stenus geniculatus</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
324	<i>Stenus montivagus</i> Heer, 1841	x	x	
325	<i>Stenus pallipes</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
326	<i>Dianous coerulescens</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
	Unterfamilie: Euaesthetinae			
327	<i>Euaesthetus bipunctatus</i> (Ljungh, 1804)	x	x	
328	<i>Euaesthetus superlatus</i> Peyerimhoff, 1937		x	
329	<i>Euaesthetus ruficapillus</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
330	<i>Euaesthetus laeviusculus</i> Mannerheim, 1844	x	x	
	Unterfamilie: Paederinae			
331	<i>Paederidus ruficollis</i> (Fabricius, 1781)	x		
332	<i>Paederidus rubrothoracicus rubrothoracicus</i> (Goeze, 1777)	x		28
333	<i>Paederus caligatus</i> Erichson, 1840	x		
334	<i>Paederus limophilus</i> Heer, 1839 Syn. <i>Paederus limnophilus</i> Erichson, 1840	x	x	
335	<i>Paederus brevipennis</i> Lacordaire, 1835	x	x	
336	<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
337	<i>Paederus riparius</i> (Linné, 1758)	x	x	
338	<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
339	<i>Astenus procerus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
340	<i>Astenus pulchellus</i> (Heer, 1839)	x	x	
341	<i>Astenus immaculatus</i> Stephens, 1833	x		
342	<i>Astenus gracilis</i> (Paykull, 1789)	x	x	
343	<i>Rugilus fragilis</i> (Gravenhorst, 1806) Syn. <i>Rugilus angustatus</i> (Geoffroy, 1785), <i>Rugilus scutellatus</i> (Motschulsky, 1858)	x	x	
344	<i>Rugilus subtilis</i> Erichson, 1840	x	x	
345	<i>Rugilus rufipes</i> (Germar, 1836)	x	x	
346	<i>Rugilus similis</i> Erichson, 1839	x	x	
347	<i>Rugilus geniculatus</i> Erichson, 1839	x		
348	<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)	x	x	
349	<i>Rugilus erichsoni</i> (Fauvel, 1867)	x	x	
350	<i>Medon castaneus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	29
351	<i>Medon piceus</i> (Kraatz, 1858)	x	x	30
352	<i>Medon brunneus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
353	<i>Medon fuscus</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
354	<i>Medon ripicola</i> (Kraatz, 1854)	x		
355	<i>Medon apicalis</i> (Kraatz, 1857)	x	x	31
356	<i>Hypomedon debilicornis</i> (Wollaston, 1857) Syn. <i>Chloecharis debilicornis</i> (Wollaston, 1857)		x	
357	<i>Sunius bicolor</i> (Olivier, 1795)	x	x	
358	<i>Sunius melanocephalus</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
359	<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Erichson, 1840)	x	x	
360	<i>Pseudomedon obsoletus</i> (Nordmann, 1837)	x		
361	<i>Lithocharis ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	32
362	<i>Lithocharis nigriceps</i> Kraatz, 1859	x	x	
363	<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
364	<i>Scopaeus sulcicollis</i> (Stephens, 1833)	x	x	
365	<i>Scopaeus minutus</i> Erichson, 1840	x	x	
366	<i>Scopaeus pusillus</i> Kiesenwetter, 1843		x	
367	<i>Scopaeus ryei</i> Wollaston, 1872 Syn. <i>Scopaeus minimus</i> sensu FHL	x	x	
368	<i>Scopaeus gracilis</i> (Sperk, 1835)	x		
369	<i>Domene scabricollis</i> (Erichson, 1840)	x	x	
370	<i>Lobrathium multipunctum</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Lathrobium multipunctum</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
371	<i>Platydomene picipes</i> (Erichson, 1840) Syn. <i>Lathrobium picipes</i> Erichson, 1840	x		33

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
372	Platydomene angusticollis (Lacordaire, 1835) Syn. <i>Lathrobium angusticolle</i> Boisd. & Lac., 1835	x		34
373	Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Lathrobium terminatum</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
374	Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909) Syn. <i>Lathrobium fennicus</i> (Renkonen, 1938)	x	x	
375	Tetartopeus quadratus (Paykull, 1789) Syn. <i>Lathrobium quadratum</i> (Paykull, 1789)	x	x	
376	<i>Lathrobium rufipenne</i> Gyllenhal, 1813	x	x	34a
377	<i>Lathrobium elongatum</i> (Linné, 1767)	x	x	
378	<i>Lathrobium volgense</i> Hochhuth, 1851	x	x	
379	<i>Lathrobium pallidipenne</i> Hochhuth, 1851	x	x	
380	<i>Lathrobium laevipenne</i> Heer, 1839	x	x	
381	<i>Lathrobium castaneipenne</i> Kolenati, 1846	x	x	
382	<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
383	<i>Lathrobium brunnipes</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
384	<i>Lathrobium fovulum</i> Stephens, 1833	x	x	
385	<i>Lathrobium spadiceum</i> Erichson, 1840		x	35
386	<i>Lathrobium impressum</i> Heer, 1841	x	x	
387	<i>Lathrobium longulum</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
388	<i>Lathrobium pallidum</i> Nordmann, 1837	x	x	
389	<i>Lathrobium dilutum</i> Erichson, 1839	x	x	
390	<i>Achenium humile</i> (Nicolai, 1822)	x	x	
391	<i>Leptobium gracile</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Dolicaon biguttulus</i> (Lacordaire, 1835)	x		36
392	<i>Cryptobium fracticorne</i> (Paykull, 1800)	x	x	
	Unterfamilie: Staphylininae			
393	<i>Leptacinus formicetorum</i> Märkel, 1841	x	x	
394	<i>Leptacinus intermedius</i> Donisthorpe, 1936		x	
395	<i>Leptacinus sulcifrons</i> (Stephens, 1833) Syn. <i>Leptacinus othioides</i> sensu FHL		x	
396	<i>Leptacinus batychrus</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
397	<i>Leptacinus pusillus</i> (Stephens, 1833)	x	x	
398	<i>Phacophallus parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
399	<i>Gyropterus fulgidus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
400	<i>Nudobius lentus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
401	<i>Gyrophypnus liebei</i> Scheerpeltz, 1926	x	x	
402	<i>Gyrophypnus fracticornis</i> (Müller, 1776)	x	x	
403	<i>Gyrophypnus atratus</i> (Heer, 1839)	x	x	
404	<i>Gyrophypnus angustatus</i> Stephens, 1833 Syn. <i>Gyrophypnus scoticus</i> (Joy, 1913)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
405	Megalinus glabratus (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Xantholinus glabratus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
406	Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895) Syn. <i>Hypnogyra glabra</i> (Nordmann, 1837)	x	x	
407	Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)	x	x	
408	Xantholinus elegans (Olivier, 1795) Syn. <i>Xantholinus jarrigei</i> Coiffait, 1956; <i>Xantholinus meridionalis</i> sensu FHL	x	x	
409	Xantholinus laevigatus Jacobsen, 1849	x	x	
410	Xantholinus linearis (Olivier, 1795)	x	x	
411	Xantholinus gallicus Coiffait, 1956 Syn. <i>Xantholinus rhenanus</i> Coiffait, 1962	x	x	37
412	Xantholinus longiventris Heer, 1839	x	x	
413	Xantholinus dvoraki Coiffait, 1956 Syn. <i>Xantholinus roubali</i> Coiffait, 1956		x	
414	Atrecus affinis (Paykull, 1789)	x	x	
415	Othius punctulatus (Goeze, 1777)	x	x	
416	Othius lapidicola Märkel & Kiesenwetter, 1848	x		
417	Othius angustus Stephens, 1833 Syn. <i>Othius melanocephalus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
418	Othius volans Sahlberg, 1876		x	
419	Othius subuliformis Stephens, 1833 Syn. <i>Othius myrmecophilus</i> Kiesenwetter, 1843	x	x	
420	Neobisnius villosulus (Stephens, 1833)	x	x	
421	Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
422	Neobisnius lathrobioides (Baudi di Selve, 1848)		x	
423	Neobisnius prolixus (Erichson, 1840)	x		
424	Erichsonius signaticornis (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
425	Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)	x	x	
426	Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851)	x	x	
427	Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
428	Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835)	x	x	
429	Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806)	x	x	
430	Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806)	x	x	
431	Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
432	Philonthus rufipes (Stephens, 1832) Syn. <i>Philonthus immundus</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
433	Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
434	Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
435	Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802)	x	x	
436	Philonthus alpinus Eppelsheim, 1875		x	
437	Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
438	<i>Philonthus corruscus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
439	<i>Philonthus caucasicus</i> Nordmann, 1837	x		38
440	<i>Philonthus ebeninus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
441	<i>Philonthus intermedius</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
442	<i>Philonthus laminatus</i> (Creutzer, 1799)	x	x	
443	<i>Philonthus tenuicornis</i> Mulsant & Rey, 1853	x	x	
444	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832	x	x	
445	<i>Philonthus mannerheimi</i> Fauvel, 1869	x	x	
446	<i>Philonthus politus</i> (Linné, 1758)	x	x	
447	<i>Philonthus succicola</i> Thomson, 1860	x	x	
448	<i>Philonthus addendus</i> Sharp, 1867	x	x	
449	<i>Philonthus temporalis</i> Mulsant & Rey, 1853	x	?	39
450	<i>Philonthus decorus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
451	<i>Philonthus nitidus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
452	<i>Philonthus spinipes</i> Sharp, 1874		x	
453	<i>Philonthus cyanipennis</i> (Fabricius, 1793)	x		
454	<i>Philonthus caerulescens</i> (Lacordaire, 1835)	x		
455	<i>Philonthus rotundicollis</i> (Ménétries, 1832)	x	x	
456	<i>Philonthus carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
457	<i>Philonthus nitidicollis</i> (Lacordaire, 1835)	x		
458	<i>Philonthus cruentatus</i> (Gmelin, 1790)	x	x	
459	<i>Philonthus pseudovarians</i> Strand, 1941		x	
460	<i>Philonthus jurgans</i> Tottenham, 1937		x	
461	<i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789)	x	x	
462	<i>Philonthus splendens</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
463	<i>Philonthus punctus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
464	<i>Philonthus ventralis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
465	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
466	<i>Philonthus rufimanus</i> Heer, 1839	x		
467	<i>Philonthus corvinus</i> Erichson, 1839	x	x	
468	<i>Philonthus sanguinolentus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
469	<i>Philonthus salinus</i> Kiesenwetter, 1844	x	x	
470	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	x	x	
471	<i>Philonthus discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
472	<i>Philonthus lepidus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
473	<i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832	x	x	
474	<i>Philonthus parvicornis</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Philonthus agilis</i> (Gravenhorst, 1806)	x		
475	<i>Philonthus micans</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
476	<i>Philonthus rubripennis</i> Stephens, 1832	x	x	
477	<i>Philonthus marginatus</i> (Müller, 1764)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
478	<i>Rabigus tenuis</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
479	<i>Gabronthus thermarum</i> (Aubé, 1850)		x	
480	<i>Bisnius subuliformis</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Philonthus subuliformis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
481	<i>Bisnius sparsus</i> (Lucas, 1846) Syn. <i>Philonthus sparsus</i> (Lucas, 1846)		x	40
482	<i>Bisnius cephalotes</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Philonthus cephalotes</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
483	<i>Bisnius nigriventris</i> (Thomson, 1867) Syn. <i>Philonthus nigriventris</i> (Thomson, 1867)		x	
484	<i>Bisnius sordidus</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Philonthus sordidus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
485	<i>Bisnius parvus</i> (Sharp, 1874) Syn. <i>Philonthus parvus</i> (Sharp, 1874)		x	
486	<i>Bisnius pseudoparcus</i> (Brunner, 1976) Syn. <i>Philonthus pseudoparcus</i> (Brunner, 1976)		x	41
487	<i>Bisnius spermophili</i> (Ganglbauer, 1897) Syn. <i>Philonthus spermophili</i> (Ganglbauer, 1897)	x	x	
488	<i>Bisnius fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Philonthus fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
489	<i>Bisnius scribae</i> (Fauvel, 1867) Syn. <i>Philonthus scribae</i> (Fauvel, 1867)	x	x	
490	<i>Bisnius puella</i> (Nordmann, 1837) Syn. <i>Philonthus puella</i> (Nordmann, 1837)	x	x	
491	<i>Bisnius nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Philonthus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
492	<i>Gabrius osseticus</i> (Kolenati, 1846)	x	x	
493	<i>Gabrius femoralis</i> (Hochhuth, 1851)	x	x	
494	<i>Gabrius exiguus</i> (Nordmann, 1837)	x		
495	<i>Gabrius astutoides</i> (Strand, 1946)		x	42
496	<i>Gabrius lividipes</i> (Baudi di Selve, 1848)	x	x	
497	<i>Gabrius splendidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
498	<i>Gabrius trossulus</i> (Nordmann, 1837)	x	x	
499	<i>Gabrius dieckmanni</i> Smetana, 1957	x	x	
500	<i>Gabrius nigrutilus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
501	<i>Gabrius bishopi</i> Sharp, 1910		x	
502	<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk, 1835) Syn. <i>Gabrius pennatus</i> Sharp, 1910	x	x	
503	<i>Gabrius appendiculatus</i> Sharp, 1910 Syn. <i>Gabrius subnigrutilus</i> Reitter, 1909	x	x	
504	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linné, 1758)	x	x	
505	<i>Ontholestes tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
506	<i>Ontholestes murinus</i> (Linné, 1758)	x	x	
507	<i>Emus hirtus</i> (Linné, 1758)	x	x	
508	<i>Platydracus fulvipes</i> (Scopoli, 1763)	x	x	
509	<i>Platydracus latebricola</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
510	<i>Platydracus stercorarius</i> (Olivier, 1795)	x	x	
511	<i>Platydracus chalcocephalus</i> (Fabricius, 1801)	x	x	
512	<i>Dinothenarus pubescens</i> (Degeer, 1774)	x	x	
513	<i>Dinothenarus fossor</i> (Scopoli, 1771) Syn. <i>Staphylinus fossor</i> (Scopoli, 1771)	x	x	
514	<i>Staphylinus erythropterus</i> Linné, 1758	x	x	
515	<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798	x	x	
516	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851	x	x	
517	<i>Ocypus olens</i> (Müller, 1764)	x	x	
518	<i>Ocypus tenebricosus</i> (Gravenhorst, 1846)	x	x	
519	<i>Ocypus ophthalmicus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)	x	x	
520	<i>Ocypus macrocephalus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
521	<i>Ocypus nitens</i> (Schrank, 1781) Syn. <i>Ocypus nero</i> Faldermann, 1835	x	x	
522	<i>Ocypus brunnipes</i> (Fabricius, 1781)	x	x	
523	<i>Ocypus fuscatus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
524	<i>Ocypus picipennis picipennis</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
525	<i>Ocypus fulvipennis</i> Erichson, 1840	x	x	
526	<i>Ocypus aeneocephalus</i> (Degeer, 1774)	x	x	
527	<i>Tasgius pedator</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Ocypus pedator</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
528	<i>Tasgius ater</i> (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Ocypus ater</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
529	<i>Tasgius morsitans</i> (Rossi, 1790) Syn. <i>Ocypus compressus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
530	<i>Tasgius melanarius</i> (Heer, 1839) Syn. <i>Ocypus melanarius</i> (Heer, 1839)	x	x	
531	<i>Heterothops praeivus</i> Erichson, 1839	x	x	
532	<i>Heterothops niger</i> Kraatz, 1868	x	x	
533	<i>Heterothops stiglundbergi</i> Israelson, 1979		x	
534	<i>Heterothops quadripunctulus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
535	<i>Heterothops dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
536	<i>Heterothops minutus</i> Wollaston, 1860		x	
537	<i>Euryporus picipes</i> (Paykull, 1800)	x	x	
538	<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
539	<i>Quedius brevis</i> Erichson, 1840	x	x	
540	<i>Quedius truncicola</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856	x	x	
541	<i>Quedius infuscatus</i> Erichson, 1840	x		43

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
542	<i>Quedius microps</i> Gravenhorst, 1847	x	x	
543	<i>Quedius lateralis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
544	<i>Quedius longicornis</i> Kraatz, 1857	x	x	
545	<i>Quedius ochripennis</i> (Ménétries, 1832)	x	x	
546	<i>Quedius nigrocaeruleus</i> Fauvel, 1876	x	x	
547	<i>Quedius puncticollis</i> (Thomson, 1867)	x	x	
548	<i>Quedius invreae</i> Gridelli, 1924		x	
549	<i>Quedius fulgidus</i> (Fabricius, 1793) Syn. <i>Quedius assimilis</i> (Nordmann, 1837)	x	x	
550	<i>Quedius cruentus</i> (Olivier, 1795)	x	x	
551	<i>Quedius brevicornis</i> (Thomson, 1860)	x	x	
552	<i>Quedius vexans</i> Eppelsheim, 1881	x	x	
553a	<i>Quedius mesomelinus mesomelinus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
553b	<i>Quedius mesomelinus skoraszewskyi</i> Korge, 1961		x	
554	<i>Quedius maurus</i> (Sahlberg, 1830)	x	x	
555	<i>Quedius xanthopus</i> Erichson, 1839	x	x	
556	<i>Quedius scitus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
557	<i>Quedius cinctus</i> (Paykull, 1790)	x	x	
558	<i>Quedius plagiatus</i> Mannerheim, 1843	x	x	
559	<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
560	<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908	x	x	
561	<i>Quedius levicollis</i> (Brullé, 1832) Syn. <i>Quedius tristis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
562	<i>Quedius unicolor</i> Kiesenwetter, 1847 Syn. <i>Quedius subunicolor</i> sensu FHL	x		
563	<i>Quedius balticus</i> Korge, 1960		x	
564	<i>Quedius molochinus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
565	<i>Quedius picipes</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
566	<i>Quedius umbrinus</i> Erichson, 1839	x	x	
567	<i>Quedius nigriceps</i> Kraatz, 1857	x	x	44
568	<i>Quedius suturalis</i> Kiesenwetter, 1845	x	x	
569	<i>Quedius limbatus</i> (Heer, 1839)	x	x	
570	<i>Quedius maurorufus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
571	<i>Quedius nemoralis</i> Baudi di Selve, 1848	x	x	
572	<i>Quedius fumatus</i> (Stephens, 1833)	x	x	
573	<i>Quedius scintillans</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
574	<i>Quedius lucidulus</i> Erichson, 1839	x	x	
575	<i>Quedius riparius</i> Kellner, 1843	x	x	
576	<i>Quedius paradisianus</i> (Heer, 1839)	x	x	
577	<i>Quedius nitipennis</i> (Stephens, 1833)	x	x	
578	<i>Quedius fulvicollis</i> (Stephens, 1833)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
579	Quedius boopoides Munster, 1923		x	
580	Quedius boops (Gravenhorst, 1802)	x	x	
581	Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850		x	45
582	Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784)	x		
583	Atanygnathus terminalis (Erichson, 1839)	x		
	Unterfamilie: Habrocerinae			
584	Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)	x	x	
	Unterfamilie: Trichophyinae			
585	Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810)	x	x	
	Unterfamilie: Tachyporinae			
586	Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895	x	x	
587	Mycetoporus erichsonianus Fagel, 1965	x	x	
588	Mycetoporus baudueri Mulsant & Rey, 1875	x	x	
589	Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
590	Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830	x	x	
591	Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835	x	x	
592	Mycetoporus glaber (Sperk, 1835)	x	x	46
593	Mycetoporus dispersus Schülke & Kocian, 2000	x	x	47
594	Mycetoporus forticornis Fauvel, 1875	x	x	
595	Mycetoporus ambiguus Luze, 1901	x	x	
596	Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832)	x	x	
597a	Mycetoporus solidicornis reichei (Pandellé, 1869)	x		
597b	Mycetoporus solidicornis subpronus Reitter, 1909	x		
598	Mycetoporus niger Fairmaire & Laboulbène, 1856	x	x	
599	Mycetoporus corpulentus Luze, 1901	x	x	
600	Mycetoporus maerkelii Kraatz, 1857	x	x	48
601	Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832)	x	x	
602	Mycetoporus eppelsheimianus Fagel, 1968	x	x	
603	Mycetoporus brucki (Pandellé, 1869)	x		49
604	Mycetoporus punctus Gravenhorst, 1806	x	x	
605	Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847)	x	x	
606	Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806)	x	x	
607	Bryoporus cernuus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
608	Bryophacis crassicornis (Mäklin, 1847) Syn. <i>Bryoporus crassicornis</i> (Mäklin, 1847)		x	
609	Bryophacis rufus (Erichson, 1839) Syn. <i>Bryoporus rufus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
610	Carphacis striatus (Olivier, 1795)	x	x	50
611	Lordithon bicolor (Gravenhorst, 1806)	x		
612	Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777)	x	x	
613	Lordithon exoletus (Erichson, 1839)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
614	Lordithon trinotatus (Erichson, 1839)	x	x	
615	Lordithon bimaculatus (Schränk, 1798)		x	51
616	Lordithon lunulatus (Linné, 1760)	x	x	
617	Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830)	x		
618	Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1830	x	x	
619	Bolitobius castaneus (Stephens, 1832)	x	x	
620	Parabolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806) Syn. <i>Bolitobius inclinans</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
621	Parabolitobius formosus (Gravenhorst, 1806) Syn. <i>Bolitobius formosus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
622	Sepedophilus littoreus (Linné, 1758)	x	x	
623	Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793)	x	x	
624	Sepedophilus constans (Fowler, 1888)		x	
625	Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)		x	
626	Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832)	x	x	
627	Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802)	x	x	
628	Sepedophilus obtusus (Luzé, 1902)		x	
629	Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802)	x	x	
630	Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)	x	x	
631	Tachyporus obtusus (Linné, 1767)	x	x	
632	Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781)	x		52
633	Tachyporus formosus Matthews, 1838	x	x	
634	Tachyporus solutus Erichson, 1839	x	x	
635	Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)	x	x	
636	Tachyporus chrysomelinus (Linné, 1758)	x	x	
637	Tachyporus dispar (Paykull, 1789)		x	
638	Tachyporus tersus Erichson, 1839	x		53
639	Tachyporus atriceps Stephens, 1832	x	x	
640	Tachyporus quadriscopulatus Pandellé, 1869		x	
641	Tachyporus ruficollis Gravenhorst, 1802	x	x	
642	Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806	x	x	
643	Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806	x	x	
644	Tachyporus scitulus Erichson, 1839	x	x	
645	Tachyporus corpulentus Sahlberg, 1876	x	x	
646	Lamprinodes saginatus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
647	Lamprinodes haematopterus (Kraatz, 1857)	x	x	54
648	Lamprinus erythropterus (Panzer, 1796)	x		
649	Tachinus lignorum (Linné, 1758)	x	x	
650	Tachinus humeralis Gravenhorst, 1802	x	x	
651	Tachinus proximus Kraatz, 1855	x	x	
652	Tachinus subterraneus (Linné, 1758)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
653	<i>Tachinus bipustulatus</i> (Fabricius, 1793)	x	x	55
654	<i>Tachinus scapularis</i> Stephens, 1832	x	x	
655	<i>Tachinus pallipes</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
656	<i>Tachinus fimetarius</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
657	<i>Tachinus signatus</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
658	<i>Tachinus laticollis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
659	<i>Tachinus marginellus</i> (Fabricius, 1781)	x	x	
660	<i>Tachinus corticinus</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
661	<i>Tachinus rufipennis</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
662	<i>Tachinus elongatus</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
663	<i>Cilea silphoides</i> (Linné, 1767)	x	x	
	Unterfamilie: Aleocharinae			
664	<i>Deinopsis erosa</i> (Stephens, 1832)	x	x	
665	<i>Gymnusa brevicollis</i> (Paykull, 1800)	x	x	
666	<i>Gymnusa variegata</i> Kiesenwetter, 1845	x	x	
667	<i>Myllaena dubia</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
668	<i>Myllaena intermedia</i> Erichson, 1837	x	x	
669	<i>Myllaena kraatzii</i> Sharp, 1871	x	x	
670	<i>Myllaena elongata</i> (Matthews, 1838)		x	
671	<i>Myllaena brevicornis</i> (Matthews, 1838)	x	x	
672	<i>Myllaena gracilis</i> (Matthews, 1838)	x	x	
673	<i>Myllaena minuta</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
674	<i>Myllaena infusata</i> Kraatz, 1853	x	x	56
675	<i>Pronomaea rostrata</i> Erichson, 1837	x		
676	<i>Oligota granaria</i> Erichson, 1837	x	x	
677	<i>Oligota parva</i> Kraatz, 1862	x	x	57
678	<i>Oligota inflata</i> Mannerheim, 1830	x	x	
679	<i>Oligota pusillima</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
680	<i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858		x	
681	<i>Holobus flavicornis</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
682	<i>Holobus apicatus</i> (Erichson, 1837)	x	x	
683	<i>Cypha longicornis</i> (Paykull, 1800)	x	x	
684	<i>Cypha laeviuscula</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
685	<i>Cypha ovulum</i> (Heer, 1839)	x?		
686	<i>Cypha discoidea</i> (Erichson, 1839)	x	x	
687	<i>Cypha pulicaria</i> (Erichson, 1839)	x	x	
688	<i>Cypha hansenii</i> (Palm, 1949)	x	x	
689	<i>Hygronoma dimidiata</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
690	<i>Brachida exigua</i> (Heer, 1839)	x	x	
691	<i>Encephalus complicans</i> Stephens, 1832	x	x	
692	<i>Gyrophaena pulchella</i> Heer, 1839	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
693	Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830	x	x	
694	Gyrophaena rousi Dvorak, 1966		x	58
695	Gyrophaena nana (Paykull, 1800)	x	x	
696	Gyrophaena pseudonana Strand, 1939		x	59
697	Gyrophaena gentilis Erichson, 1839	x	x	
698	Gyrophaena minima Erichson, 1837	x	x	
699	Gyrophaena congrua Erichson, 1837	?		
700	Gyrophaena williamsi Strand, 1935		x	
701	Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802)	x	x	
702	Gyrophaena bihamata Thomson, 1867	x	x	
703	Gyrophaena lucidula Erichson, 1837	x	x	
704	Gyrophaena transversalis Strand, 1939		x	
705	Gyrophaena joyi Wendeler, 1924		x	
706	Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937		x	
707	Gyrophaena manca Erichson, 1839 Syn. <i>Gyrophaena angustata</i> (Stephens, 1832)	x	x	
708	Gyrophaena strictula Erichson, 1839	x	x	
709	Gyrophaena boleti (Linné, 1758)	x	x	
710	Gyrophaena polita (Gravenhorst, 1802)	x	x	
711	Agaricochara latissima (Stephens, 1832)	x	x	
712	Cyphea curtula (Erichson, 1837)	x	x	
713	Placusa complanata Erichson, 1839	x	x	60
714	Placusa depressa Mäklin, 1845	x	x	
715	Placusa tachyporoides (Waltl, 1838)	x	x	
716	Placusa atrata (Mannerheim, 1830)	x	x	
717	Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802)	x	x	
718	Placusa aescita Erichson, 1839	x		
719	Silusa rubiginosa Erichson, 1837	x	x	
720	Silusa rubra Erichson, 1839	x	x	61
721	Rhopalocerina clavigera (Scriba, 1859)	x	x	62
722	Homalota plana (Gyllenhal, 1810)	x	x	
723	Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839)	x	x	
724	Thecturota marchii (Doderö, 1922)		x	63
725	Megaloscapa punctipennis (Kraatz, 1856)	x	x	
726	Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830)	x	x	
727	Leptusa fumida (Erichson, 1839)	x	x	
728	Leptusa ruficollis (Erichson, 1839)	x	x	
729	Leptusa simoni wolfrumi Lohse, 1971	x	x	
730	Euryusa castanoptera Kraatz, 1856	x	x	
731	Euryusa optabilis Heer, 1839	x	x	
732	Euryusa sinuata Erichson, 1837	x	x	64

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
733	Euryusa coarctata Märkel, 1844	x		
734	Tachyusida gracilis (Erichson, 1837)	x		
735	Bolitochara obliqua Erichson, 1837	x	x	
736	Bolitochara bella Märkel, 1844	x	x	
737	Bolitochara mulsanti Sharp, 1875	x	x	
738	Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806)	x	x	
739	Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802)	x	x	
740	Autalia impressa (Olivier, 1795)	x	x	
741	Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947		x	
742	Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
743	Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802)	x	x	
744	Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806)	x	x	
745	Falagria caesa Erichson, 1837	x	x	
746	Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1839) Syn. <i>Falagria concinnus</i> (Erichson, 1839)		x	
747	Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) Syn. <i>Falagria thoracica</i> (Stephens, 1832)	x	x	
748	Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802) Syn. <i>Falagria nigra</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
749	Tachyusa constricta Erichson, 1837 Syn. <i>Ischnopoda constricta</i> Erichson, 1837	x	x	
750	Tachyusa coarctata Erichson, 1837 Syn. <i>Ischnopoda coarctata</i> Erichson, 1837	x	x	
751	Tachyusa balteata Erichson, 1839 Syn. <i>Ischnopoda balteata</i> Erichson, 1839	x	x	
752	Tachyusa scitula Erichson, 1837 Syn. <i>Ischnopoda scitula</i> Erichson, 1837	x		
753	Thinonoma atra (Gravenhorst, 1806) Syn. <i>Ischnopoda atra</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
754	Ischnopoda leucopus (Marshall, 1802)	x	x	
755	Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837)	x	x	
756	Dasygnypeta velata (Erichson, 1837)	x	x	
757	Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
758	Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830)	x	x	
759	Gnypeta rubrior Tottenham, 1939	x	x	
760	Brachyusa concolor (Erichson, 1839)	x	x	
761	Dacrila fallax (Kraatz, 1856)	x	x	65
762	Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802	x	x	
763	Callicerus rigidicornis (Erichson, 1839)		x	66
764	Schistoglossa viduata (Erichson, 1837)	x	x	67
765	Schistoglossa gemina (Erichson, 1837)	x	x	
766	Schistoglossa curtipennis (Sharp, 1869)		x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
767	Schistoglossa aubei (Brisout de Barneville, 1860)	x	x	68
768	Boreophilia hercynica (Renkonen, 1936)	x	x	
769	Hydrosmeeta fluviatilis (Kraatz, 1854)	x		
770	Hydrosmeeta fragilicornis (Kraatz, 1856)	x		
771	Hydrosmeeta fragilis (Kraatz, 1854)	x		
772	Hydrosmeeta longula (Heer, 1839)	x	x	
773	Hydrosmeeta delicatula (Sharp, 1869)	x		
774	Hydrosmeeta subtilissima (Kraatz, 1854)	x	x	
775	Aloconota eichhoffi (Scriba, 1867)	x		
776	Aloconota planifrons (Waterhouse, 1864)	x	x	
777	Aloconota appulsa (Scriba, 1867)	x		
778	Aloconota cambrica (Wollaston, 1855)	x	x	
779	Aloconota currax (Kraatz, 1856)	x	x	
780	Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913)		x	
781	Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832)	x	x	
782	Aloconota insecta (Thomson, 1856)	x	x	
783	Aloconota subgrandis (Brundin, 1954)		x	
784	Aloconota gregaria (Erichson, 1839)	x	x	
785	Aloconota languida (Erichson, 1837)	x	x	
786	Aloconota longicollis (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
787	Aloconota coulsoni (Last, 1952)		x	69
788	Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861)	x	x	
789	Enalodroma hepatica (Erichson, 1839)	x	x	
790	Amischa analis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
791	Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830) Syn. <i>Amischa cavifrons</i> (Sharp, 1869)	x	x	
792	Amischa nigrofusca (Stephens, 1832) Syn. <i>Amischa soror</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
793	Amischa decipiens (Sharp, 1869)		x	
794	Amischa forcipata Mulsant & Rey, 1873		x	
795	Amidobia talpa (Heer, 1841)	x	x	
796	Lypoglossa lateralis (Mannerheim, 1830)	x	x	
797	Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830)	x	x	
798	Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806)	x	x	
799	Notothecta confusa (Märkel, 1844)	x	x	
800	Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837)	x	x	
801	Neohilara subterranea (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
802	Alaobia scapularis (Sahlberg, 1831)	x	x	
803	Brundinia meridionalis (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
804	Brundinia marina (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
805	Dochmonota clancula (Erichson, 1837)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
806	<i>Tomoglossa luteicornis</i> (Erichson, 1837)	x	x	
807	<i>Ousipalia caesula</i> (Erichson, 1839)	x	x	70
808	<i>Geostiba circellaris</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
809	<i>Taxicera sericophila</i> (Baudi di Selve, 1869)	x	x	71
810	<i>Taxicera renneri</i> Benick, 1982		x	
811	<i>Taxicera deplanata</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
812	<i>Dinaraea angustula</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
813	<i>Dinaraea aequata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
814	<i>Dinaraea linearis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
815	<i>Dinaraea arcana</i> (Erichson, 1839)	x	x	
816	<i>Dadobia immersa</i> (Erichson, 1837)	x	x	
817	<i>Plataraea nigrifrons</i> (Erichson, 1839)	x		
818	<i>Plataraea brunnea</i> (Fabricius, 1798)	x	x	
819	<i>Liogluta pagana</i> (Erichson, 1839)	x	x	
820	<i>Liogluta granigera</i> (Kiesenwetter, 1850)	x	x	
821	<i>Liogluta micans</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
822	<i>Liogluta longiuscula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
823	<i>Liogluta wuesthoffi</i> (Benick, 1938)	x	x	
824	<i>Liogluta microptera</i> Thomson, 1867	x	x	
825	<i>Liogluta alpestris</i> (Heer, 1839) Syn. <i>Liogluta alpestris nitidula</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
826	<i>Atheta arctica</i> (Thomson, 1856)	x	x	
827	<i>Atheta elongatula elongatula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
828	<i>Atheta hygrobia hygrobia</i> (Thomson, 1856)		x	72
829	<i>Atheta hygrotopora</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
830	<i>Atheta luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
831	<i>Atheta terminalis</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
832	<i>Atheta gyllenhalii</i> (Thomson, 1856)	x	x	73
833	<i>Atheta melanocera</i> (Thomson, 1856)	x	x	
834	<i>Atheta malleus</i> Joy, 1913		x	
835	<i>Atheta volans</i> (Scriba, 1859)		x	
836	<i>Atheta obtusangula</i> Joy, 1913		x	
837	<i>Atheta sequanica</i> (Brisout de Barneville, 1859)	x		
838	<i>Atheta palustris</i> (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
839	<i>Atheta debilis</i> (Erichson, 1837)	x		
840	<i>Atheta parca</i> (Mulsant & Rey, 1873)		x	
841	<i>Atheta deformis</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
842	<i>Atheta ripicola</i> Hanssen, 1932	x	x	
843	<i>Atheta rhenana</i> Benick, 1965	x	x	
844	<i>Atheta luteipes</i> (Erichson, 1837)	x	x	
845	<i>Atheta vilis</i> (Erichson, 1837)		x	74

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
846	<i>Atheta laticeps</i> (Thomson, 1856)	x	x	
847	<i>Atheta occulta</i> (Erichson, 1837)	x	x	
848	<i>Atheta fungivora</i> (Thomson, 1867)	x	x	
849	<i>Atheta monticola</i> (Thomson, 1852)	x	x	
850	<i>Atheta excellens</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
851	<i>Atheta spatula</i> (Fauvel, 1872)		x	
852	<i>Atheta euryptera</i> (Stephens, 1832)	x	x	
853	<i>Atheta divisa</i> (Märkel, 1844)	x	x	
854	<i>Atheta nigricornis</i> (Thomson, 1852)		x	
855	<i>Atheta harwoodi</i> Williams, 1930	x	x	
856	<i>Atheta nigrifula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
857	<i>Atheta corvina</i> (Thomson, 1856)	x	x	
858	<i>Atheta ammanni</i> Benick, 1970		x	75
859	<i>Atheta puberula</i> (Sharp, 1869)	x	x	
860	<i>Atheta kochi</i> Roubal, 1937		x	
861	<i>Atheta speluncicollis</i> Bernhauer, 1909		x	76
862	<i>Atheta foveicollis</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
863	<i>Atheta paleola</i> (Erichson, 1837)	x		
864	<i>Atheta benickiella</i> Brundin, 1948	x	x	77
865	<i>Atheta amacula</i> (Stephens, 1832)		x	
866	<i>Atheta pittionii</i> Scheerpeltz, 1950	x	x	
867	<i>Atheta inquinula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
868	<i>Atheta ganglbaueri</i> Brundin, 1948		x	
869	<i>Atheta subtilis</i> (Scriba, 1866)	x	x	
870	<i>Atheta aegra</i> (Heer, 1841)	x	x	
871	<i>Atheta atomaria</i> (Kraatz, 1856)	x		
872	<i>Atheta minuscula</i> (Brisout de Barneville, 1859)		x	
873	<i>Atheta glabricula</i> Thomson, 1867		x	78
874	<i>Atheta indubia</i> (Sharp, 1869)	x	x	
875	<i>Atheta liliputana</i> (Brisout de Barneville, 1860)	x	x	
876	<i>Atheta boreella</i> Brundin, 1948		x	
877	<i>Atheta cribrata</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
878	<i>Atheta mortuorum</i> Thomson, 1867	x	x	
879	<i>Atheta testaceipes</i> (Heer, 1841)	x	x	
880	<i>Atheta pervagata</i> Benick, 1975		x	
881	<i>Atheta dilaticornis</i> (Kraatz, 1856)	x		
882	<i>Atheta sodalis</i> (Erichson, 1837)	x	x	
883	<i>Atheta gagatina</i> (Baudi di Selve, 1848)	x	x	
884	<i>Atheta pallidicornis</i> (Thomson, 1856)	x	x	
885	<i>Atheta hybrida</i> (Sharp, 1869)	x	x	
886	<i>Atheta trinotata</i> (Kraatz, 1856)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
887	<i>Atheta cadaverina</i> (Brisout de Barneville, 1860)		x	
888	<i>Atheta hansseni</i> Strand, 1943		x	79
889	<i>Atheta subglabra</i> (Sharp, 1869)		x	
890	<i>Atheta serrata</i> Benick, 1938		x	80
891	<i>Atheta picipes</i> (Thomson, 1856)	x	x	
892	<i>Atheta melanaria</i> (Mannerheim, 1830)	x		
893	<i>Atheta clientula</i> (Erichson, 1839)	x	x	81
894	<i>Atheta orphana</i> (Erichson, 1837)	x	x	82
895	<i>Atheta orbata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
896	<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
897	<i>Atheta negligens</i> (Mulsant & Rey, 1873)		x	
898	<i>Atheta amplicollis</i> (Mulsant & Rey, 1873)		x	
899	<i>Atheta subsinuata</i> (Erichson, 1839)	x		
900	<i>Atheta zosteræ</i> (Thomson, 1856)	x		
901	<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
902	<i>Atheta dadopora</i> Thomson, 1867	x	x	
903	<i>Atheta sordidula</i> (Erichson, 1837)	x	x	
904	<i>Atheta celata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
905	<i>Atheta hypnorum</i> (Kiesenwetter, 1850)	x	x	
906	<i>Atheta castanoptera</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
907	<i>Atheta ermischii</i> Benick, 1934		x	
908	<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
909	<i>Atheta xanthopus</i> (Thomson, 1856)	x	x	
910	<i>Atheta graminicola</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
911	<i>Atheta ebenina</i> (Mulsant & Rey, 1873)	x	x	
912	<i>Atheta heymesi</i> Hubenthal, 1913	x	x	
913	<i>Atheta aquatilis</i> (Thomson, 1867)	x	x	
914	<i>Atheta incognita</i> (Sharp, 1869)	x	x	
915	<i>Atheta aquatica</i> (Thomson, 1852)	x	x	
916	<i>Atheta aeneicollis</i> (Sharp, 1869)	x	x	
917	<i>Atheta laticollis</i> (Stephens, 1832)	x	x	
918	<i>Atheta fimorum</i> (Brisout de Barneville, 1860)	x		
919	<i>Atheta coriaria</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
920	<i>Atheta intermedia</i> (Thomson, 1852)	x	x	83
921	<i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839)	x	x	
922	<i>Atheta procera</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
923	<i>Atheta basicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
924	<i>Atheta myrmecobia</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
925	<i>Atheta nidicola</i> (Johansen, 1914)	x	x	
926	<i>Atheta oblita</i> (Erichson, 1839)	x	x	
927	<i>Atheta boletophila</i> (Thomson, 1856)	x		

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
928	<i>Atheta autumnalis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
929	<i>Atheta diversa diversa</i> (Sharp, 1869)		x	
930	<i>Atheta pilicornis</i> (Thomson, 1852)	x	x	
931	<i>Atheta fungicola</i> (Thomson, 1852)	x	x	
932	<i>Atheta britanniae</i> Bernhauer & Scheerpeltz, 1926		x	
933	<i>Atheta crassicornis</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
934	<i>Atheta paracrassicornis</i> Brundin, 1954		x	
935	<i>Atheta macrocera</i> (Thomson, 1856)	x	x	84
936	<i>Atheta cauta</i> (Erichson, 1837)	x	x	
937	<i>Atheta puncticollis</i> Benick, 1938		x	85
938	<i>Atheta ischnocera</i> Thomson, 1870		x	
939	<i>Atheta setigera</i> (Sharp, 1869)		x	86
940	<i>Atheta laevana</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
941	<i>Atheta nigripes</i> (Thomson, 1856)	x	x	
942	<i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
943	<i>Atheta marcida</i> (Erichson, 1837)	x	x	
944	<i>Atheta putrida</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
945	<i>Atheta europaea</i> Likovský, 1984	x	x	
946	<i>Atheta cinnamoptera</i> (Thomson, 1856)	x	x	
947	<i>Atheta episcopalis</i> Bernhauer, 1910	x	x	
948	<i>Atheta aeneipennis</i> (Thomson, 1856)	x	x	
949	<i>Atheta longicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
950	<i>Acrotona exigua</i> (Erichson, 1837)	x		
951	<i>Acrotona sylvicola</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
952	<i>Acrotona pygmaea</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
953	<i>Acrotona obfuscata</i> (Gravenhorst, 1802)		x	
954	<i>Acrotona troglodytes</i> (Motschulsky, 1858) Syn. <i>Acrotona consanguinea</i> (Eppelsheim, 1875)		x	
955	<i>Acrotona parens</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
956	<i>Acrotona muscorum</i> (Brisout de Barneville, 1860)	x	x	
957	<i>Acrotona aterrima</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
958	<i>Acrotona benicki</i> (Allen, 1940) Syn. <i>Acrotona pusilla</i> (Brundin, 1952)		x	
959	<i>Acrotona parvula</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
960	<i>Alevonota rufotestacea</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
961	<i>Alevonota gracilenta</i> (Erichson, 1839)	x	x	
962	<i>Alevonota egregia</i> (Rye, 1875)	x	x	
963	<i>Alianta incana</i> (Erichson, 1837)	x	x	
964	<i>Pachnida nigella</i> (Erichson, 1837)	x	x	
965	<i>Trichiusa immigrata</i> Lohse, 1984		x	
966	<i>Thamiaraea cinnamomea</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
967	Thamiaraea hospita (Märkel, 1844)	x	x	
968	Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)	x	x	
969	Zyras collaris (Paykull, 1800)	x		87
970	Zyras fulgidus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
971	Zyras haworthi (Stephens, 1832)	x	x	
972	Zyras erraticus (Hagens, 1863)		x	88
973	Zyras limbatus (Paykull, 1789)	x	x	
974	Zyras funestus (Gravenhorst, 1806)	x	x	
975	Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
976	Zyras similis (Märkel, 1844)	x	x	89
977	Zyras cognatus (Märkel, 1842)	x	x	
978	Zyras lugens (Gravenhorst, 1802)	x	x	
979	Zyras laticollis (Märkel, 1842)	x	x	
980	Myrmoecia plicata (Erichson, 1837)	x	x	
981	Myrmoecia confragrosa (Hochhuth, 1849)		x	
982	Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1792)	x	x	90
983	Lomechusa emarginata (Paykull, 1789)	x	x	
984	Lomechusa paradoxa Gravenhorst, 1806	x	x	
985	Lomechusa pubicollis Brisout de Barneville, 1860	x	x	
986	Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806)	x	x	
987	Dinarda hagensii Wasmann, 1889	x	x	
988	Dinarda maerkelii Kiesenwetter, 1843	x	x	
989	Dinarda pygmaea Wasmann, 1894	x		
990	Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802)	x	x	
991	Phloeopora opaca Bernhauer, 1902		x	
992	Phloeopora concolor (Kraatz, 1856)	x		91
993	Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830)	x	x	
994	Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802)	x	x	
995	Phloeopora scribae (Eppelsheim, 1884)	x	x	
996	Phloeopora bernhaueri Lohse, 1984		x	
997	Rhopalotella validiuscula (Kraatz, 1856)	x	x	92
998	Ilyobates bennetti Donisthorpe, 1914 Syn. <i>Ilyobates subopacus</i> Palm, 1935		x	
999	Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800)	x	x	93
1000	Ilyobates propinquus (Aubé, 1850)	x	x	
1001	Calodera nigrita Mannerheim, 1830	x	x	
1002	Calodera riparia Erichson, 1837	x	x	
1003	Calodera uliginosa Erichson, 1837	x	x	94
1004	Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1005	Calodera protensa Mannerheim, 1830	x	x	
1006	Chilomorpha longitarsis (Thomson, 1867)		x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
1007	<i>Parocyusa rubicunda</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1008	<i>Parocyusa longitarsis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
1009	<i>Ityocara rubens</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1010	<i>Amarochara umbrosa</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1011	<i>Amarochara bonnairei</i> (Fauvel, 1865)		x	
1012	<i>Amarochara forticornis</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
1013	<i>Ocalea badia</i> Erichson, 1837	x	x	
1014	<i>Ocalea picata</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1015	<i>Ocalea concolor</i> Kiesenwetter, 1847	x	x	
1016	<i>Ocalea rivularis</i> Miller, 1851	x	x	
1017	<i>Apimela mulsanti</i> (Ganglbauer, 1895)	x	x	95
1018	<i>Apimela macella</i> (Erichson, 1839)	x		96
1019	<i>Meotica pallens</i> (Redtenbacher, 1849)	x	x	
1020	<i>Meotica marchica</i> Benick, 1954		x	
1021	<i>Meotica exilis</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	97
1022	<i>Meotica filiformis</i> (Motschulsky, 1860) <i>Syn. Meotica capitalis</i> Mulsant & Rey, 1873	x	x	
1023	<i>Ocyusa maura</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1024	<i>Ocyusa picina</i> (Aubé, 1850) <i>Syn. Deubelia picina</i> (Aubé, 1850)	x	x	
1025	<i>Cousya nitidiventris</i> (Fagel, 1958)		x	98
1026	<i>Zoosetha inconspicua</i> (Erichson, 1839)		x	
1027	<i>Poromniusa procidua</i> (Erichson, 1837) <i>Syn. Zoosetha procidua</i> (Erichson, 1837)	x		99
1028	<i>Mniusa incrassata</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
1029	<i>Hygropora cunctans</i> (Erichson, 1837)	x		
1030	<i>Oxypoda lugubris</i> Kraatz, 1856		x	
1031	<i>Oxypoda elongatula</i> Aubé, 1850	x	x	
1032	<i>Oxypoda procerula</i> Mannerheim, 1830	x	x	
1033	<i>Oxypoda opaca</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1034	<i>Oxypoda longipes</i> Mulsant & Rey, 1861	x	x	
1035	<i>Oxypoda vittata</i> Märkel, 1842	x	x	
1036	<i>Oxypoda acuminata</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1037	<i>Oxypoda spectabilis</i> Märkel, 1844	x	x	
1038	<i>Oxypoda funebris</i> Kraatz, 1856	x	x	
1039	<i>Oxypoda lentula</i> Erichson, 1837		x	100
1040	<i>Oxypoda induta</i> Mulsant & Rey, 1861	x	x	
1041	<i>Oxypoda skalitzkyi</i> Bernhauer, 1902	x	x	
1042	<i>Oxypoda brevicornis</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1043	<i>Oxypoda doderoi</i> Bernhauer, 1902	x	x	
1044	<i>Oxypoda carbonaria</i> (Heer, 1841)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
1045	Oxypoda vicina Kraatz, 1856	x	x	
1046	Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830)	x	x	
1047	Oxypoda rufa Kraatz, 1856	x	x	
1048	Oxypoda togata Erichson, 1837	x	x	
1049	Oxypoda exoleta Erichson, 1839	x	x	
1050	Oxypoda formosa Kraatz, 1856	x	x	
1051	Oxypoda arborea Zerche, 1994	x		
1052	Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1053	Oxypoda caucasica Bernhauer, 1902	x		
1054	Oxypoda praecox Erichson, 1839	x	x	
1055	Oxypoda mutata Sharp, 1871		x	
1056	Oxypoda testacea Erichson, 1837		x	
1057	Oxypoda miranda Roubal, 1929		x	
1058	Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832)	x	x	
1059	Oxypoda tarda Sharp, 1871	x	x	
1060	Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830)	x	x	
1061	Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856	x	x	
1062	Oxypoda filiformis Redtenbacher, 1849	x	x	
1063	Oxypoda ferruginea Erichson, 1839	x		
1064	Oxypoda soror Thomson, 1855	x	x	
1065	Oxypoda formiceticola Märkel, 1841	x	x	
1066	Oxypoda pratensisicola Lohse, 1970		x	
1067	Oxypoda recondita Kraatz, 1856	x		
1068	Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853	x	x	
1069	Oxypoda haemorrhoea (Mannerheim, 1830)	x	x	
1070	Devia prospera (Erichson, 1839)	x		
1071	Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839)	x	x	
1072	Ischnoglossa proluxa (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1073	Ischnoglossa obscura Wunderle, 1990		x	
1074	Dexiogyia corticina (Erichson, 1837)	x	x	
1075	Homoeusa acuminata (Märkel, 1842)	x	x	
1076	Thiasophila angulata (Erichson, 1837)	x	x	
1077	Thiasophila lohsei Zerche, 1987	x		101
1078	Thiasophila canaliculata Mulsant & Rey, 1874	x		
1079	Thiasophila wockii (Schneider, 1862)		x	
1080	Thiasophila inquilina (Märkel, 1842)	x		
1081	Cratarea suturalis (Mannerheim, 1830)	x	x	
1082	Haploglossa gentilis (Märkel, 1844)	x	x	102
1083	Haploglossa villosula (Stephens, 1832)	x	x	
1084	Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852)	x	x	
1085	Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
1086	Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827)	x	x	
1087	Haploglossa bernhaueri (Sainte-Claire-Deville, 1907) Syn. <i>Haploglossa fulvohirta</i> Lohse, 1979		x	
1088	Tinotus morion (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1089	Aleochara curtula (Goeze, 1777)	x	x	
1090	Aleochara lata Gravenhorst, 1802	x	x	
1091	Aleochara laticornis Kraatz, 1856	x		
1092	Aleochara haematoptera Kraatz, 1858 Syn. <i>Aleochara haematodes</i> Schaum, 1862, <i>Aleochara ripicola</i> Mulsant & Rey, 1874	x	x	
1093	Aleochara spissicornis Erichson, 1839	x	x	
1094	Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806	x	x	
1095	Aleochara puberula Klug, 1833	x	x	
1096	Aleochara intricata Mannerheim, 1830	x	x	
1097	Aleochara tristis Gravenhorst, 1806	x	x	
1098	Aleochara moesta Gravenhorst, 1802	x		
1099	Aleochara inconspicua Aubé, 1850	x	x	
1100	Aleochara sparsa Heer, 1839	x	x	
1101	Aleochara stichai Likovský, 1965		x	103
1102	Aleochara kamila Likovský, 1984	x		
1103	Aleochara funebris Wollaston, 1864 Syn. <i>Aleochara albovillosa</i> Bernhauer, 1901	x	x	
1104	Aleochara lanuginosa Gravenhorst, 1802	x	x	
1105	Aleochara lygaea Kraatz, 1862	x	x	
1106	Aleochara villosa Mannerheim, 1830	x	x	
1107	Aleochara sanguinea (Linné, 1758)	x	x	
1108	Aleochara fumata Gravenhorst, 1802	x	x	104
1109	Aleochara moerens Gyllenhal, 1827	x		
1110	Aleochara maculata Brisout de Barneville, 1863	x	x	105
1111	Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810	x	x	
1112	Aleochara haemoptera Kraatz, 1856	x		
1113	Aleochara cuniculorum Kraatz, 1858	x		106
1114	Aleochara peusi Wagner, 1949	x	x	
1115	Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802	x	x	
1116	Aleochara major Fairmaire, 1857		x	
1117	Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806	x	x	
1118	Aleochara bilineata Gyllenhal, 1810	x	x	
1119	Aleochara binotata Kraatz, 1856 Syn. <i>Aleochara pauxilla</i> sensu FHL, <i>Aleochara verna</i> sensu FHL	x	x	
1120	Aleochara bipustulata (Linné, 1761)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anm.
1121	Aleochara verna SAY, 1836 Syn. <i>Aleochara pauxilla</i> (Mulsant & Rey, 1874)		x	107
1122	Aleochara spadicea (Erichson, 1837)	x	x	

Anmerkungen:

1. *Scaphisoma balcanicum*: Erstnachweis, 15.IX.1995 Nöda, Auwald, leg. Kopetz
2. *Meliceria* spec. (*sulciventris*-Gruppe): Erstnachweis der Gattung für Mitteleuropa, 2001, Krölp, Pinsenberg, leg. Weigel, det. Brachet
3. *Euplectus bonvouloiri narentinus*: Erstnachweis, 14.VIII.2000 Altenburg, Fasanerieholz, leg. Weigel, coll. Apfel
4. *Bryaxis clavicornis*: die Art wurde beim Drucken der Checkliste (1999) vergessen
5. *Brachygluta simplicior*: Erstnachweis, 20.IX.1994 Apfelstädt, leg. Weipert, coll. NME
6. *Megarthus hemipterus*: der aktuelle Fund war Fehlbestimmung
7. *Acrolocha pliginskii*: Erstnachweis, 06.X.1998 Badra, Solberg, leg. Weipert, coll. NME
8. *Phyllodrepa salicis*: Wiederfund, 01.V.1996 Gräfenroda, Lütschegrund, leg./coll. Müller
9. *Phloeostiba lapponica*: Wiederfund, 01.VII.1998 Nationalpark Hainich, leg./coll. Möller
10. *Orochares angustatus*: Wiederfund, 25.XII.1995 Sonneberg, Eichberg, leg./coll. Frenzel
11. *Thinodromus hirticollis*: Erstnachweis 1930 Thüringen, leg.?, det. Gildenkov, coll. DEI
12. *Carpelimus similis*: Erstnachweis, 11.V.1975 Esperstedt, Salzstelle, leg./coll. Zerche
13. *Carpelimus fuliginosus*: Wiederfund, 26.VII.2001 Nationalpark Hainich, leg./coll. Apfel
14. *Carpelimus nitidus*: Wiederfund, 30.VII.2002 Vieselbach, leg. Kopetz, coll. Apfel
15. *Carpelimus gangelbaueri*: Erstnachweis, 15.V.1997 Herbsleben, leg./coll. Cuppen
16. *Anotylus clypeonitens*: Wiederfund, 02.VII.2000 Thörey, Gewerbegebiet, leg./coll. Apfel
17. *Anotylus hamatus*: In den alten Sammlungen stecken unter *hamatus* (bei Stichproben) nur *affinis*. Es müssten alle „*hamatus*“ in den alten Sammlungen kontrolliert werden!
18. *Anotylus saulcyi*: Wiederfund, 14.V.2001 Erfurt, Nordpark, leg. Kopetz, coll. Apfel
19. *Bledius dissimilis*: aktueller Fund war Fehlbestimmung!
20. *Bledius femoralis*: Wiederfund, 04.VII.1999 Unterweißbach, leg. Bellstedt, coll. Apfel
21. *Thinobius brunneipennis*: historischer Beleg verschollen (Mitteilung Schülke)
22. *Thinobius ciliatus*: historische Belege in Sammlung Kellner vor 1873, det. Schülke
23. *Stenus europaeus*: Wiederfund, 01.IV.2002 Barchfeld, Werra, leg. Bellstedt, coll. Apfel
24. *Stenus cautus*: die Art wurde in der 1. Fassung der Checkliste (APFEL 1995) übersehen
25. *Stenus carbonarius*: Wiederfund, 13.VIII.1996 Gotha, leg. Bellstedt, coll. Vogel
26. *Stenus kiesewetteri*: Erstnachweis, 02.V.2002 Bettelhecken, Froschteich, leg./coll. Skale
27. *Stenus subaeneus*: keine aktuelle Meldung (APFEL 1995) , Falscheintrag!
28. *Paederidus rubrothoracicus rubrothoracicus*: aktueller Fund war Falschmeldung
29. *Medon castaneus*: Wiederfund, 01.VI.1995 Bürgel, Judegrund, leg. Weigel, coll. Apfel
30. *Medon piceus*: Wiederfund, 14.V.1998 Bad Frankenhausen, leg. Hartmann, coll. Apfel
31. *Medon apicalis*: Wiederfund, 26.V.2001 Esperdtedter Ried, leg./coll. Renner
32. *Lithocharis ochracea*: Wiederfund, 04.VII.1992 Neusiß, leg. Bellstedt, coll. Vogel
33. *Platydomene picipes*: Belege in Sammlung Kellner vor 1873, Georgenthal, Apfelstädt
34. *Platydomene angusticollis*: Belege in Sammlung Kellner < 1873, Georgenthal, Apfelstädt
- 34a. *Lathrobium rufipenne*: Wiederfund, 07.IX.2002, Marksuhl, leg. Bellstedt, coll. Apfel
35. *Lathrobium spadiceum*: Erstnachweis, 01.I.1985 Breitenbach, leg. Hartmann, coll. Klima

36. *Leptobium gracile*: Belege in Sammlung Kellner < 1873, Sömmerda, leg. Martini
37. *Xantholinus gallicus*: die Art wurde für Thüringen bisher übersehen
38. *Philonthus caucasicus*: keine aktuellen Nachweise nach 1960
39. *Philonthus temporalis*: die aktuellen Nachweise waren Fehlbestimmungen
40. *Bisnius sparsus*: Lohse meldet die Art für Thüringen (LOHSE 1989) ohne genaue Angaben zu machen
41. *Bisnius pseudoparcus*: Lohse meldet die Art für Thüringen (LOHSE 1989) ohne genaue Angaben zu machen
42. *Gabrius astutooides*: alle als *G. astutus* gemeldeten Funde beziehen sich auf *G. astutooides*
43. *Quedius infuscatus*: der aktuelle Fund war eine Fehlbestimmung
44. *Quedius nigriceps*: Wiederfund, 01.I.1984 Erfurt, Steiger, leg. Hartmann, coll. Klima
45. *Acylophorus wagenschieberi*: Erstnachweis, 07.IX.2002, Marsuhl, Albertsee, leg. Bellstedt, coll. Apfel
46. *Mycetoporus glaber*: von *Mycetoporus nigricollis* Stephens abgetrennte Art
47. *Mycetoporus dispersus*: von *Mycetoporus nigricollis* Stephens abgetrennte Art
48. *Mycetoporus maerkelii*: Wiederfund, 13.VI.2000 Tabarz, Lauchgrund, leg./coll. Apfel
49. *Mycetoporus brucki*: Beleg im MNG mit unleserlichem Fundortetikett
50. *Carphaxis striatus*: Wiederfund, 07.IX.1999 Ronneburg, leg. Weigel, coll. Apfel
51. *Lordithon bimaculatus*: Erstnachweis, 12.VII.1987 Arlesberg, leg. Sparmberg, coll. Apfel
52. *Tachyporus abdominalis*: der aktuelle Fund war eine Falschmeldung
53. *Tachyporus tersus*: der aktuelle Fund war eine Fehldetermination
54. *Lamprinodes haematopterus*: Wiederfund, 13.V.1999 Udersleben, leg. Weipert, coll. Apfel
55. *Tachinus bipustulatus*: Wiederfund, 10.VI.1998 Paska, Saaleufer, leg. Weigel, coll. Apfel
56. *Myllaena infuscata*: Wiederfund, 05.VIII.1989 Apfelstädt, leg. Hartmann, coll. Apfel
57. *Oligota parva*: Wiederfund, 20.IV.1996 Seehausen, leg. Grimm, coll. Apfel
58. *Gyrophæna rousi*: Erstnachweis, 10.VI.1992 Schwarzburg, leg. Burger, coll. Apfel
59. *Gyrophæna pseudonana*: Erstnachweis, 02.X.2000 NP Hainich, Craula, leg./coll. Apfel
60. *Placusa complanata*: Wiederfund, 01.VII.1998 Hainich, Mülverst. Holz, leg./det. Möller
61. *Silusa rubra*: Wiederfund, 27.IX.1999 Niederböhmersdorf, leg. Weigel, coll. Apfel
62. *Rhopalocera clavifera*: Wiederfund, 17.VI.2002 Walsburg, Saale, leg./coll. Apfel
63. *Thecturota marchii*: Erstnachweis, 26.V.2001 Esperstedter Ried, leg. Renner, coll. Apfel
64. *Euryssa sinuata*: Wiederfund, 22.VII.1999 Pöhlitz, Elsteraue, leg. Weigel, coll. Apfel
65. *Dacrila fallax*: Wiederfund, 26.V.2001 Esperstedter Ried, leg. Renner, coll. Apfel
66. *Callicerus rigidicornis*: Erstnachweis, 22.V.1998 Woffleben, leg. Sparmberg, coll. Apfel
67. *Schistoglossa viduata*: Wiederfund, 12.II.1999 Sparmberg, leg. Skale, coll. Apfel
68. *Schistoglossa aubei*: Wiederfund, 26.VI.2002 Ohrdruf, Feldweiher, leg./coll. Apfel
69. *Aloconota coulsoni*: Erstnachweis, 26.VI.2001 NP Hainich, Birkensee, leg./coll. Apfel
70. *Ousipalia caesula*: Wiederfund, 30.V.1999 Erfurt, Stedten, leg. Sparmberg, coll. Apfel
71. *Taxicera sericophila*: Wiederfund, 12.VIII.1998 Berka v.d.H., leg. Weigel, coll. Apfel
72. *Atheta hygrobia*: Erstnachweis, 03.VII.1999 NP Craula, leg. Bellstedt, coll. Apfel
73. *Atheta gyllenhalii*: Wiederfund, 26.VI.2002 Ohrdruf, Feldweiher, leg./coll. Apfel
74. *Atheta vilis*: Erstnachweis, 19.V.2001 NP Hainich, Birkensee, leg./coll. Apfel
75. *Atheta ammanni*: Erstnachweis, 17.VIII.1998 Schnellbach, leg. Bellstedt, coll. Apfel
76. *Atheta speluncicollis*: Erstnachweis, 17.VII.1998 Schnellbach, leg. Bellstedt, coll. Apfel
77. *Atheta benickiella*: Wiederfund, 17.V.2000 NP Hainich, leg. Weigel, coll. Apfel
78. *Atheta glabricula*: Erstnachweis, 17.VIII.1998 Schnellbach, leg. Bellstedt, coll. Apfel
79. *Atheta hansseni*: Erstnachweis, 29.VI.1996 Titschendorf, leg. Weigel, coll. Apfel
80. *Atheta serrata*: Erstnachweis, 24.V.2001 Bad Frankenhausen, leg./coll. Renner

81. *Atheta clientula*: Wiederfund, 25.VII.2001 NP Hainich, Hütscheroda, leg./coll. Apfel
82. *Atheta orphana*: Wiederfund, 12.II.1989 Eisenach, Hörsel, leg./col. Apfel
83. *Atheta intermedia*: Wiederfund, 24.VIII.2000 NP Hainich, leg./coll. Apfel
84. *Atheta macrocera*: Wiederfund, 13.VII.1987 Eisenach, Karolinenbrücke, leg./coll. Apfel
85. *Atheta puncticollis*: Erstnachweis, 11.VI.1999 Völkershäuser, leg. Bellstedt, coll. Apfel
86. *Atheta setigera*: Erstnachweis, 22.X.2000 NP Hainich, Craula, leg./coll. Apfel
87. *Zyras collaris*: letzter Nachweis, 10.VI.1962 Bad Frankenhausen, leg./coll. Ermisch
88. *Zyras erraticus*: Erstnachweis, 08.VII.1998 Bad Frankenhausen, leg. Weipert, coll. Apfel
89. *Zyras similis*: Wiederfund, 13.VIII.1999 Woffleben, Knochental, leg. Hentze, coll. Apfel
90. *Lomechusoides strumosus*: Wiederfund, 01.V.1995 Emstedt/Schalkau, leg./coll. Frenzel
91. *Phloeopora concolor*: die aktuelle Meldung war eine Fehlbestimmung
92. *Rhopalotella validiuscula*: Wiederfund, 29.IV.1999 NP Hainich, leg. Weigel, coll. Apfel
93. *Ilyobates nigricollis*: Wiederfund, 03.V.1994 Eisenach, Hörselufer, leg./coll. Apfel
94. *Calodera uliginosa*: Wiederfund, 01.IV.2002 Barchfeld, Werra, leg. Bellstedt, coll. Apfel
95. *Apimela mulsanti*: Wiederfund, 09.V.2002 Wechmar, leg. Weigel, coll. Apfel
96. *Apimela macella*: Erstnachweis, 1930 Treffurt, leg. Janssen, coll. MNG
97. *Meotica exilis*: Erstnachweis, 11.VI.1999 Haselbach, leg. Sparmberg, coll. Apfel
98. *Cousya nitidiventris*: Erstnachweis, 06.VIII.1998 Hämlich, leg. Sparmberg, coll. Apfel
99. *Poromniusa procidua*: keine Funde nach 1960, nur historische Belege vorhanden
100. *Oxyopoda lentula*: Erstnachweis, 30.V.2001 NP Hainich, Birkensee, leg./coll. Apfel
101. *Thiasophila lohsei*: Erstnachweis, 24.III.1993 Bad Frankenhausen, leg./coll. Zerche
102. *Haploglossa gentilis*: Wiederfund, 19.V.2000 Troistedt, leg. Weipert, coll. Apfel
103. *Aleochara stichai*: Erstnachweis, 01.VII.1998 NP Hainich, Flarchheim, leg./coll. Möller
104. *Aleochara fumata*: Wiederfund, 17.VIII.1996 Bad Frankenhausen, leg./coll. Willers
105. *Aleochara maculata*: Wiederfund, 25.IV.1998 Schlechtsart, leg. Skale, coll. Apfel
106. *Aleochara cuniculorum*: keine Funde nach 1960
107. *Aleochara verna*: Erstnachweis, 01.V.1950 Meuselbach, Schwarzmühle, coll. ZMB
Wiederfund, 29.VI.1988 Eisenach, Petersberg, leg./coll. Apfel

Abkürzungen

- NME = Naturkundemuseum Erfurt
 MNG = Museum der Natur Gotha
 DEI = Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde
 ZMB = Zoologisches Museum Berlin

Literatur

- APFEL, W. (1995): Checklist der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten 3: 14-39.
- (1998): Ergänzung zur Checklist der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens. – Check-Listen Thüringer Insekten 6: 41-43.
 - (1999): Checklist der Palpenkäfer (Coleoptera, Pselaphidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten 7: 55-57.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). - Ent. Bl. 95: 1-31.
- (2001): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). II. - Ent. Bl. 97: 121-176.
- HERMAN, L. H. (2001b): Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). - 1758 to the end of the second millennium. Volumes I-VII. – Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 265: 1-419.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. - Band IX Staphylinidae 1.Teil: Micropeplinae bis Euaesthetinae. - Überlingen, 412 S.
- (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. - Band X Staphylinidae 2.Teil: Paederinae bis Staphylininae. - Überlingen, 334 S.
 - (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. - Band XI Staphylinidae 3.Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae). - Überlingen, 417 S.
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. u. Ber., Beiheft 4: 185 S.
- LOHSE, G. A. & W. LUCHT: (1989): Die Käfer Mitteleuropas, 1. Supplementband. - Goecke & Evers, Krefeld, 346 S.
- LÖBL, I. (1997): Catalogue of the Saphidiinae (Coleoptera: Staphylinidae). - Instrumenta biodiversitatis I, Genève: I-XII, 190 S.
- NEWTON, A. F. & CHANDLER, D. S. (1989): World catalogue of the genera of Pselaphidae (Coleoptera). - Fieldiana Zool. (N.S) 53: 1-93.
- RAPP, O. (1933) : Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Die Natur der Mitteldeutschen Landschaft, Selbstverlag, Erfurt, 766 S.

Anschrift des Autors: Wolfgang Apfel
Hellwigstraße 6
D-99817 Eisenach
eMail: Wolfgang.Apfel@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang

Artikel/Article: [Aktualisierte Checkliste der Kurzflügelkäfer \(Coleoptera: Staphylinidae\) Thüringens 19-53](#)