

Checkliste der Wanzen (Heteroptera) Thüringens

Stand 01.12.2010

JÜRGEN KÜBNER, Arnstadt

In der vorliegenden zweiten Fassung der Checkliste Thüringer Wanzen werden die Wasserwanzen (Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha) und Landwanzen (Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha) gemeinsam betrachtet. Nach dem Erscheinen der Checklisten der Wasser- und Uferwanzen Thüringens (BELLSTEDT 1995), der Landwanzen Thüringens LICHTER & SANDER (1998) und der Ergänzungen und Korrekturen zur Checkliste der Landwanzen Thüringens LICHTER, SANDER & VOIGT (1999), wurden 33 Arten neu für Thüringen nachgewiesen. Einige dieser Nachweise wurden bereits publiziert NIGMANN et. al. (2008), ACHTZIGER, NIGMANN (2008), ACHTZIGER (2004), ARNOLD (2002, 2004), LICHTER, SANDER (2000), BRETTFELD, BELLSTEDT & NIXDORF (2003, 2007), GRUSCHWITZ (2003), KLEINSTEUBER (2010), KÜBNER, FRENZEL & BELLSTEDT (2009), KÜBNER (2009), für andere sind Veröffentlichungen in Vorbereitung.

In den letzten Jahren wurde begonnen, die Daten aus Thüringer Museumssammlungen, aus aktuellen wie auch historischen Publikationen und aktuelle Nachweise in einer MultiBase-Datenbank zu erfassen. Zum 01.12.2010 enthielt diese Datenbank ca. 21000 Funddaten Thüringer Wanzen, die als Grundlage für die Erstellung dieser Liste dienen. Von den 865 in Deutschland vorkommenden Wanzenarten konnten 590 aktuell (nach 1960) für Thüringen bestätigt werden, weitere 74 Arten wurden nur aus der Zeit vor 1960 beschrieben diese sind nur zum Teil belegt, sie werden in der Checkliste als verschollen geführt. Eine Überprüfung dieser Nachweise in noch nicht gesichteten Sammlungen und eine gezielte Nachsuche verschollener Arten im Feld wird in den nächsten Jahren in den Vordergrund rücken.

Für ihre Zuarbeit und Ermöglichung der Sammlungseinsicht möchte ich mich besonders bedanken bei: Dirk Frenzel (Sonneberg), Ronald Bellstedt (Museum der Natur Gotha), Matthias Hartmann (Naturkundemuseum Erfurt), Kathrin Worschech (Mauritianum Altenburg), Andreas Kopetz (Kerspleben), Frank Burger (Weimar), und Prof. Dr. Rolf Beutel (Phyletisches Museum Jena).

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
	Ceratocombidae		
1	<i>Ceratocombus coleoptratus</i> (Zetterstedt, 1819)	s	
	Dipsocoridae		
2	<i>Cryptostemma pusillum</i> (J. Sahlberg, 1870)	es	
3	<i>Cryptostemma waltli</i> (Fieber, 1860)	ss	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
	Nepidae		
4	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	h	
5	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	s	
	Corixidae		
6	<i>Arctocoris germari</i> (Fieber, 1848)	ss	
7	<i>Callicorixa praeusta</i> (Fieber, 1848)	mh	
8	<i>Corixa affinis</i> Leach, 1817	ex	Anf. 20. Jh.
9	<i>Corixa dentipes</i> Thomson, 1869	mh	
10	<i>Corixa panzeri</i> Fieber, 1848	es	
11	<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	sh	
12	<i>Cymatia bonzdorffii</i> (C.R. Sahlberg, 1819)	ex	Anf. 20. Jh.
13	<i>Cymatia coleoptrata</i> (Fabricius, 1777)	s	
14	<i>Cymatia rogenhoferi</i> (Fieber, 1864)	ss	
15	<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber, 1848)	s	
16	<i>Hesperocorixa moesta</i> (Fieber, 1848)	ex	Anf. 20. Jh.
17	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)	s	
18	<i>Micronecta griseola</i> Horvath, 1899	s	
19	<i>Micronecta minutissima</i> (Linnaeus, 1758)	ss	
20	<i>Micronecta scholtzi</i> (Fieber, 1860)	s	
21	<i>Paracorixa concinna</i> (Fieber, 1848)	mh	
22	<i>Sigara distincta</i> (Fieber, 1848)	s	
23	<i>Sigara falleni</i> (Fieber, 1848)	s	
24	<i>Sigara fossarum</i> (Leach, 1817)	ss	
25	<i>Sigara iactans</i> Jansson, 1983	s	
26	<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)	h	
27	<i>Sigara limitata</i> (Fieber, 1848)	es	
28	<i>Sigara longipalis</i> (J.Sahlberg, 1878)	es	1
29	<i>Sigara nigrolineata</i> (Fieber, 1848)	sh	
30	<i>Sigara semistriata</i> (Fieber, 1848)	ss	
31	<i>Sigara striata</i> (Linnaeus, 1758)	h	
	Nautocoridae		
32	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	h	
	Aphelocheiridae		
33	<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius, 1794)	ss	
	Notonectidae		
34	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	sh	
35	<i>Notonecta lutea</i> Müller, 1776	ss	
36	<i>Notonecta maculata</i> Fabricius, 1794	s	
37	<i>Notonecta viridis</i> Delcourt, 1909	s	
	Pleidae		
38	<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817	s	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
	Mesoveliidae		
39	Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852	s	
	Hebridae		
40	Hebrus pusillus (Fallén, 1807)	s	
41	Hebrus ruficeps Thomson, 1871	h	
	Hydrometridae		
42	Hydrometra gracilenta Horváth, 1899	ss	
43	Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)	h	
	Veliidae		
44	Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)	mh	
45	Velia caprai Tamanini, 1947	h	
46	Velia saulii Tamanini, 1947	h	
	Gerridae		
47	Aquarius najas (De Geer, 1773)	ss	
48	Aquarius paludum (Fabricius, 1794)	s	
49	Gerris argentatus Schummel, 1832	s	
50	Gerris gibbifer Schummel, 1832	h	
51	Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)	sh	
52	Gerris lateralis Schummel, 1832	ex	Anf. 20. Jh.
53	Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828)	h	
54	Gerris thoracicus Schummel, 1832	sh	
55	Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)	es	
	Saldidae		
56	Chartoscirta cincta (Herrich-Schaeffer, 1841)	s	
57	Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835)	ss	
58	Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807)	ss	
59	Halosalda lateralis (Fallén, 1807)	es	
60	Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)	ex	1902
	Macrosaldula variabilis (Herrich-Schaeffer, 1835)		2
61	Micracanthia marginalis (Fallén, 1807)	ex	Anf. 20. Jh.
62	Salda littoralis (Linnaeus, 1758)	ss	
63	Salda muelleri (Gmelin, 1790)	ss	
64	Saldula arenicola (Scholtz, 1847)	s	
65	Saldula c-album (Fieber, 1859)	s	
66	Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)	ss	
67	Saldula orthochila (Fieber, 1859)	s	
68	Saldula pallipes (Fabricius, 1794)	sh	
69	Saldula pilosella (Thomson, 1871)	s	
70	Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)	sh	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
	Leptopodidae		
71	Leptopus marmoratus (Goeze, 1778)	ss	
	Tingidae		
72	Acalypta carinata (Panzer, 1806)	s	
73	Acalypta gracilis (Fieber, 1844)	ss	
74	Acalypta marginata (Wolff, 1804)	h	
75	Acalypta musci (Schränk, 1781)	s	
76	Acalypta nigrina (Fallén, 1807)	ss	
77	Acalypta parvula (Fallén, 1807)	h	
78	Acalypta platycheila (Fieber, 1844)	es	
79	Agramma confusum (Puton, 1879)	ex	1931
80	Agramma femorale Thomson, 1871	ss	
81	Agramma laetum (Fallén, 1807)	ss	
82	Campylosteira verna (Fallén, 1826)	ss	
83	Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778)	s	
84	Catoplatus fabricii (Stål, 1868)	ss	
85	Catoplatus horvathi (Puton, 1878)	es	
86	Copium clavicorne (Linné, 1758)	s	
87	Derephysia cristata (Panzer, 1806)	ex	Anf. 20. Jh.
88	Derephysia foliacea (Fallén, 1807)	s	
89	Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1835)	s	
90	Dictyla echii (Schränk, 1782)	sh	
91	Dictyla humuli (Fabricius, 1794)	mh	
92	Dictyla lupuli (Herrich-Schaeffer, 1837)	ex	Anf. 20. Jh.
93	Dictyla rotundata (Herrich-Schaeffer, 1835)	ex	19. Jh.
94	Dictyonota fuliginosa A. Costa, 1853	s	
95	Dictyonota strichnocera Fieber, 1844	ss	
96	Elasmotropis testacea (Herrich-Schaeffer, 1830)	ss	
97	Galeatus maculatus (Herrich-Schaeffer, 1838)	ss	
	Galeatus sinuatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)		3
98	Galeatus spinifrons (Fallén, 1807)	es	
99	Kalama tricornis (Schränk, 1801)	s	
100	Lasiacantha capucina (Germar, 1837)	s	
101	Oncochila scapularis (Fieber, 1844)	ex	19. Jh.
102	Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830)	s	
103	Physatocheila costata (Fabricius, 1794)	ss	
104	Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)	mh	
105	Physatocheila harwoodi China, 1936	ss	
106	Physatocheila smreczynskii China, 1952	ss	
107	Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)	es	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
108	Stephanitis rhododendri Horvath, 1905	es	
109	Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)	ex	Anf. 20. Jh.
110	Tingis cardui (Linné, 1758)	sh	
111	Tingis maculata (Herrich-Schaeffer, 1838)	ex	Anf. 20. Jh.
112	Tingis marrubii Vallot, 1829	ex	1916
113	Tingis pilosa Hummel, 1825	es	
114	Tingis reticulata Herrich-Schaeffer, 1835	s	
	Microphysidae		
115	Loricula coleoptrata (Fallén, 1807)	s	
116	Loricula distinguenda Reuter, 1884	es	
117	Loricula elegantula (Baerensprung, 1858)	mh	
118	Loricula exilis (Fallén, 1807)	ss	
119	Loricula pselaphiformis Curtis, 1833	s	
	Miridae		
120	Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)	s	
121	Acetropis gimmerthalii (Flor, 1860)	ex	4
122	Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835)	ex	19. Jh.
123	Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)	sh	
124	Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)	mh	
125	Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836)	es	
126	Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)	mh	
127	Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)	ex	1938
128	Agnocoris reclairei (E. Wagner, 1949)	s	
129	Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)	s	
130	Alloeonotus fulvipes (Scopoli, 1763)	ex	19. Jh.
131	Alloeotomus germanicus E. Wagner, 1939	mh	
132	Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)	h	
133	Amblytylus albidus (Hahn, 1834)	ex	Anf. 20. Jh.
134	Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)	mh	
135	Apolygus limbatus (Fallén, 1807)	s	
136	Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)	sh	
137	Apolygus rhamnicola (Reuter, 1885)	ss	
138	Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)	s	
139	Asciodema obsoleta (Fieber, 1864)	ss	
140	Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)	es	
141	Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)	mh	
142	Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)	h	
143	Atractotomus parvulus Reuter, 1878	s	
144	Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)	h	
145	Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856)	ss	
146	Bothynotus pilosus (Boheman, 1852)	es	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
147	<i>Brachyarthrum limitatum</i> Fieber, 1858	ss	
148	<i>Brachycoleus decolor</i> Reuter, 1887	es	
149	<i>Brachynotocoris puncticornis</i> Reuter, 1880	ss	
150	<i>Bryocoris pteridis</i> (Fallén, 1807)	mh	
151	<i>Calocoris affinis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	h	
152	<i>Calocoris alpestris</i> (Meyer-Dür, 1843)	s	
153	<i>Calocoris roseomaculatus</i> (De Geer, 1773)	mh	
154	<i>Camptozygum aequale</i> (Villers, 1789)	s	
155	<i>Campylomma annulicorne</i> (Signoret, 1865)	ss	
156	<i>Campylomma verbasci</i> (Meyer-Dür, 1843)	s	
157	<i>Campyloneura virgula</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	mh	
158	<i>Capsodes gothicus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
159	<i>Capsus ater</i> (Linnaeus, 1758)	sh	
160	<i>Capsus pilifer</i> (Remane, 1950)	es	5
161	<i>Capsus wagneri</i> (Remane, 1950)	ss	
162	<i>Charagochilus gyllenhalii</i> (Fallén, 1807)	h	
163	<i>Chlamydatus pulicarius</i> (Fallén, 1807)	h	
164	<i>Chlamydatus pullus</i> (Reuter, 1870)	h	
165	<i>Chlamydatus saltitans</i> (Fallén, 1807)	s	
166	<i>Closterotomus biclavatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	h	
167	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (De Geer, 1773)	mh	
168	<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790)	mh	
169	<i>Compsidolon salicellum</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	mh	
170	<i>Conostethus roseus</i> (Fallén, 1807)	ex	Anf. 20. Jh.
171	<i>Cremnocephalus albolineatus</i> Reuter, 1875	s	
172	<i>Cremnocephalus alpestris</i> E. Wagner, 1941	s	
173	<i>Criocoris crassicornis</i> (Hahn, 1834)	h	
174	<i>Criocoris nigricornis</i> Reuter, 1894	es	
175	<i>Criocoris nigripes</i> Fieber, 1861	ex	Anf. 20. Jh.
176	<i>Criocoris sulcicornis</i> (Kirschbaum, 1856)	ex	Anf. 20. Jh.
177	<i>Cyllecoris histrionius</i> (Linnaeus, 1767)	s	
178	<i>Cyrtorhinus caricis</i> (Fallén, 1807)	ex	Anf. 20. Jh.
179	<i>Deraeocoris annulipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1842)	s	
180	<i>Deraeocoris cordiger</i> (Hahn, 1834)	es	
181	<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. Costa, 1862)	mh	
182	<i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling, 1837)	sh	
183	<i>Deraeocoris olivaceus</i> (Fabricius, 1777)	s	
184	<i>Deraeocoris punctulatus</i> (Fallén, 1807)	ex	Anf. 20. Jh.
185	<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)	h	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
186	<i>Deraeocoris scutellaris</i> (Fabricius, 1794)	ex	19. Jh.
187	<i>Deraeocoris serenus</i> (Douglas & Scott, 1868)	?	6
188	<i>Deraeocoris trifasciatus</i> (Linnaeus, 1767)	s	
189	<i>Dichrooscytus gustavi</i> Josifov, 1981	ss	
190	<i>Dichrooscytus intermedius</i> Reuter, 1885	s	
191	<i>Dichrooscytus rufipennis</i> (Fallén, 1807)	ss	
192	<i>Dicyphus annulatus</i> (Wolff, 1804)	mh	
193	<i>Dicyphus epilobii</i> Reuter, 1883	mh	
194	<i>Dicyphus errans</i> (Wolff, 1804)	mh	
195	<i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén, 1829)	mh	
196	<i>Dicyphus hyalinipennis</i> (Burmeister, 1835)	s	
197	<i>Dicyphus pallicornis</i> (Fieber, 1861)	mh	
198	<i>Dicyphus pallidus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	h	
199	<i>Dicyphus stachydis</i> J. Sahlberg, 1878	ss	
200	<i>Dryophilocoris flavoquadrinotatus</i> (De Geer, 1773)	s	
201	<i>Europiella alpina</i> (Reuter, 1875)	s	
202	<i>Europiella artemisiae</i> (Becker, 1864)	h	
203	<i>Europiella decolor</i> (Uhler, 1893)	ss	
204	<i>Eurycolpus flaveolus</i> (Stål, 1858)	mh	
205	<i>Euryopicoris nitidus</i> (Meyer-Dür, 1843)	?	
206	<i>Fieberocapsus flaveolus</i> (Reuter, 1870)	es	
207	<i>Globiceps flavomaculatus</i> (Fabricius, 1794)	s	
208	<i>Globiceps fulvicollis</i> Jakovlev, 1877	mh	
209	<i>Globiceps sphegiformis</i> (Rossi, 1790)	ss	
210	<i>Grypocoris sexguttatus</i> (Fabricius, 1777)	s	
211	<i>Hadrodemus m-flavum</i> (Goeze, 1778)	mh	
212	<i>Hallodapus montandoni</i> Reuter, 1895	ex	Anf. 20. Jh.
213	<i>Hallodapus rufescens</i> (Burmeister, 1835)	es	
214	<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus, 1758)	sh	
215	<i>Halticus luteicollis</i> (Panzer, 1804)	ss	
216	<i>Halticus pusillus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ex	Anf. 20. Jh.
217	<i>Halticus saltator</i> (Geoffroy, 1785)	ex	Anf. 20. Jh.
218	<i>Harpocera thoracica</i> (Fallén, 1807)	h	
219	<i>Heterocordylus erythrophthalmus</i> (Hahn, 1833)	es	
220	<i>Heterocordylus genistae</i> (Scopoli, 1763)	mh	
221	<i>Heterocordylus leptocerus</i> (Kirschbaum, 1856)	ex	Anf. 20. Jh.
222	<i>Heterocordylus tibialis</i> (Hahn, 1833)	s	
223	<i>Heterocordylus tumidicornis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	s	
224	<i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas, 1772)	h	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
225	<i>Hoplomachus thunbergi</i> (Fallén, 1807)	s	
226	<i>Horistus orientalis</i> (Gmelin, 1790)	ex	Anf. 20. Jh.
227	<i>Hypseloecus visci</i> (Puton, 1888)	s	
228	<i>Isometopus intrusus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ss	
229	<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)	h	
230	<i>Leptopterna ferrugata</i> (Fallén, 1807)	h	
231	<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius, 1781)	sh	
232	<i>Lopus decolor</i> (Fallén, 1807)	s	
233	<i>Lygocoris contaminatus</i> (Fallén, 1807)	sh	
234	<i>Lygocoris pabulinus</i> (Linnaeus, 1761)	mh	
235	<i>Lygocoris rugicollis</i> (Fallén, 1807)	s	
236	<i>Lygocoris viridis</i> (Fallén, 1807)	sh	
237	<i>Lygus gemellatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	h	
238	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	sh	
239	<i>Lygus punctatus</i> (Zetterstedt, 1818)	ex	Anf. 20. Jh.
240	<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911	sh	
241	<i>Lygus wagneri</i> Remane, 1955	s	
242	<i>Macrolophus pygmaeus</i> (Rambur, 1839)	mh	
243	<i>Macrotylus herrichi</i> (Reuter, 1873)	mh	
244	<i>Macrotylus horvathi</i> (Reuter, 1876)	s	
245	<i>Macrotylus paykullii</i> (Fallén, 1807)	mh	
246	<i>Macrotylus solitarius</i> (Meyer-Dür, 1843)	ss	
247	<i>Malacocoris chlorizans</i> (Panzer, 1794)	s	
248	<i>Mecomma ambulans</i> (Fallén, 1807)	h	
249	<i>Mecomma dispar</i> (Boheman, 1852)	es	
250	<i>Megacoelum beckeri</i> (Fieber, 1870)	ss	
251	<i>Megacoelum infusum</i> (Herrich-Schaeffer, 1837)	mh	
252	<i>Megaloceroea recticornis</i> (Geoffroy, 1785)	h	
253	<i>Megalocoleus exsanguis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	es	
254	<i>Megalocoleus molliculus</i> (Fallén, 1807)	h	
255	<i>Megalocoleus tanaceti</i> (Fallén, 1807)	h	
256	<i>Mermitelocerus schmidtii</i> (Fieber, 1836)	es	
257	<i>Miris striatus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
258	<i>Monalocoris filicis</i> (Linnaeus, 1758)	mh	
259	<i>Monosynamma bohemani</i> (Fallén, 1829)	s	
260	<i>Myrmecoris gracilis</i> (R.F. Sahlberg, 1848)	ss	
261	<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)	h	
262	<i>Notostira erratica</i> (Linnaeus, 1758)	h	
263	<i>Omphalonotus quadriguttatus</i> (Kirschbaum, 1856)	es	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
264	<i>Oncotylus punctipes</i> Reuter, 1875	mh	
265	<i>Orthocephalus brevis</i> (Panzer, 1798)	ss	
266	<i>Orthocephalus coriaceus</i> (Fabricius, 1777)	h	
267	<i>Orthocephalus saltator</i> (Hahn, 1835)	mh	
268	<i>Orthocephalus vittipennis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ex	Anf. 20. Jh.
269	<i>Orthonotus rufifrons</i> (Fallén, 1807)	mh	
270	<i>Orthops basalis</i> (A. Costa., 1857)	h	
271	<i>Orthops campestris</i> (Linnaeus, 1758)	h	
272	<i>Orthops kalmii</i> (Linnaeus, 1758)	h	
273	<i>Orthotylus adenocarpi</i> (Perris, 1857)	s	
274	<i>Orthotylus bilineatus</i> (Fallén, 1807)	ss	
275	<i>Orthotylus concolor</i> (Kirschbaum, 1856)	h	
276	<i>Orthotylus ericetorum</i> (Fallén, 1807)	s	
277	<i>Orthotylus flavinervis</i> (Kirschbaum, 1856)	ss	
278	<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C.R. Sahlberg C., 1841)	h	
279	<i>Orthotylus fuscescens</i> (Kirschbaum, 1856)	ss	
280	<i>Orthotylus interpositus</i> K. Schmidt, 1938	s	
281	<i>Orthotylus marginalis</i> Reuter, 1883	sh	
282	<i>Orthotylus nassatus</i> (Fabricius, 1787)	s	
283	<i>Orthotylus prasinus</i> (Fallén, 1826)	h	
284	<i>Orthotylus rubidus</i> (Puton, 1874)	es	
285	<i>Orthotylus tenellus</i> (Fallén, 1807)	mh	
286	<i>Orthotylus virens</i> (Fallén, 1807)	ss	
287	<i>Orthotylus virescens</i> (Douglas & Scott, 1865)	s	
288	<i>Orthotylus viridinervis</i> (Kirschbaum, 1856)	s	
289	<i>Pachytomella parallela</i> (Meyer & Dür, 1843)	ex	7
290	<i>Pantilius tunicatus</i> (Fabricius, 1781)	h	
291	<i>Parapsallus vitellinus</i> (Scholz, 1847)	s	
292	<i>Phoenicocoris modestus</i> (Meyer-Dür, 1843)	mh	
293	<i>Phoenicocoris obscurellus</i> (Fallén, 1829)	s	
294	<i>Phylus coryli</i> (Linnaeus, 1758)	mh	
295	<i>Phylus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1767)	mh	
296	<i>Phytocoris austriacus</i> Wagner, 1954	es	
297	<i>Phytocoris confusus</i> Reuter, 1896	ex	Anf. 20. Jh.
298	<i>Phytocoris dimidiatus</i> Kirschbaum, 1856	s	
299	<i>Phytocoris hirsutulus</i> Flor, 1861	ss	
300	<i>Phytocoris intricatus</i> Flor, 1861	mh	
301	<i>Phytocoris juniperi</i> Frey-Gessner, 1865	ex	1920
302	<i>Phytocoris longipennis</i> Flor, 1861	h	
303	<i>Phytocoris pini</i> Kirschbaum, 1856	mh	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
304	Phytocoris populi (Linné, 1758)	ss	
305	Phytocoris reuteri Saunders, 1876	ex	Anf. 20. Jh.
306	Phytocoris tiliae (Fabricius, 1777)	mh	
307	Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758)	mh	
308	Phytocoris varipes Boheman, 1852	sh	
309	Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)	mh	
310	Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)	mh	
311	Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856)	ss	
312	Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875	mh	
313	Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)	h	
314	Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)	s	
315	Pinalitus viscidola (Puton, 1888)	s	
316	Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)	mh	
317	Placochilus seladonicus (Fallén, 1807)	s	
318	Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)	sh	
319	Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)	sh	
320	Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum, 1856)	es	
321	Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)	mh	
322	Polymerus asperulae (Fieber, 1861)	es	
323	Polymerus brevicornis (Reuter, 1879)	es	
324	Polymerus holosericeus Hahn, 1831	ex	1939
325	Polymerus nigrata (Fallén, 1807)	mh	
326	Polymerus palustris (Reuter, 1907)	es	
327	Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)	h	
328	Polymerus vulneratus (Panzer, 1806)	ex	1955
329	Psallus aethiops (Zetterstedt, 1838)	es	8
330	Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856)	s	
331	Psallus ambiguus (Fallén, 1807)	mh	
332	Psallus assimilis Stichel, 1956	s	
333	Psallus betuleti (Fallén, 1807)	s	8
334	Psallus confusus Rieger, 1981	s	
335	Psallus cruentatus (Mulsant & Rey, 1852)	es	8
336	Psallus falleni Reuter, 1883	s	
337	Psallus flavellus Stichel, 1933	h	
338	Psallus haematodes (Gmelin, 1790)	mh	
339	Psallus lepidus Fieber, 1858	sh	
340	Psallus luridus Reuter, 1878	s	
341	Psallus mollis (Mulsant, 1852)	s	8
342	Psallus montanus JOSIFOV, 1973	mh	
343	Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852)	h	
344	Psallus piceae Reuter, 1878	s	

Nr.	Taxa	Bemerkung /	
		Häufigkeit	letzter Nachweis
345	Psallus pseudoplatani Reichling, 1984	ss	8
346	Psallus quercus (Kirschbaum, 1856)	ss	
347	Psallus salicis (Kirschbaum, 1856)	s	
348	Psallus variabilis (Fallén, 1807)	h	
349	Psallus varians (Herrich-Schaeffer, 1841)	h	
350	Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953	mh	8
351	Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843)	s	
352	Reuteria marqueti Puton, 1875	es	
353	Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794)	mh	
354	Salicarus roseri (Herrich-Schaeffer, 1838)	mh	
355	Stenodema calcarata (Fallén, 1807)	h	
356	Stenodema holsata (Fabricius, 1787)	h	
357	Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758)	sh	
358	Stenodema virens (Linnaeus, 1767)	s	
359	Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)	h	
360	Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1846)	es	
361	Strongylocoris atrocoeruleus (Fieber, 1864)	es	
362	Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)	s	9
363	Strongylocoris niger (Herrich-Schaeffer, 1835)	ss	
364	Strongylocoris steganoides (J. Sahlberg, 1875)	s	9
365	Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767)	ss	
366	Teratocoris antennatus (Boheman, 1852)	ss	
367	Teratocoris paludum J. Sahlberg, 1870	es	
368	Tinicephalus hortulanus (Meyer-Dür, 1843)	ss	
369	Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)	h	
370	Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834)	ex	Anf. 20. Jh.
371	Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785)	s	
372	Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1838)	ss	
	Nabidae		
373	Himacerus apterus (Fabricius, 1798)	h	
374	Himacerus boops (Schjødte, 1870)	s	
375	Himacerus major (A. Costa., 1842)	s	
376	Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)	sh	
377	Nabis brevis Scholtz, 1847	sh	
378	Nabis ericetorum Scholtz, 1847	s	
379	Nabis ferus (Linnaeus, 1758)	s	
380	Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847	h	
381	Nabis limbatus Dahlbom, 1851	h	
382	Nabis lineatus Dahlbom, 1851	es	
383	Nabis pseudoferus Remane, 1949	sh	
384	Nabis punctatus A. Costa., 1847	?	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
385	<i>Nabis rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	sh	
386	<i>Prostemma guttula</i> (Fabricius, 1787)	ss	
	Anthocoridae		
387	<i>Acomporis alpinus</i> Reuter, 1875	ss	
388	<i>Acomporis pygmaeus</i> (Fallén, 1807)	s	
389	<i>Amphiraeus obscuriceps</i> Poppius, 1909	?	10
390	<i>Anthocoris amplicollis</i> Horváth, 1893	s	
391	<i>Anthocoris confusus</i> Reuter, 1884	h	
392	<i>Anthocoris gallarumulmi</i> (De Geer, 1773)	s	
393	<i>Anthocoris limbatus</i> Fieber, 1836	ss	
394	<i>Anthocoris minki</i> Dohrn, 1860	ex	Anf. 20. Jh.
395	<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)	sh	
396	<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)	sh	
397	<i>Anthocoris pilosus</i> (Jakovlev, 1877)	ex	1939
398	<i>Anthocoris sarothamni</i> Douglas & Scott, 1865	ss	
399	<i>Anthocoris simulans</i> Reuter, 1884	es	
400	<i>Anthocoris visci</i> Douglas, 1889	ss	
401	<i>Brachysteles parvicornis</i> (A. Costa., 1847)	?	
402	<i>Cardiastethus fasciiventris</i> (Garbiglietti, 1869)	es	
403	<i>Dufouriellus ater</i> (Dufour, 1833)	s	
404	<i>Dysepicritus rufescens</i> (A. Costa., 1847)	ex	19. Jh.
405	<i>Elatophilus nigricornis</i> (Zetterstedt, 1838)	ss	
406	<i>Elatophilus pini</i> (Bärensprung, 1858)	ex	1943
407	<i>Elatophilus stigmatellus</i> (Zetterstedt, 1838)	es	
408	<i>Lycocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)	mh	
409	<i>Orius agilis</i> (Flor, 1860)	es	
410	<i>Orius horvathi</i> (Reuter, 1884)	ss	
411	<i>Orius laticollis</i> (Reuter, 1884)	s	
412	<i>Orius majusculus</i> (Reuter, 1879)	h	
413	<i>Orius minutus</i> (Linnaeus, 1758)	sh	
414	<i>Orius niger</i> (Wolff, 1811)	sh	
415	<i>Orius vicinus</i> (Ribaut, 1923)	ss	
416	<i>Scoloposcelis pulchella</i> (Zetterstedt, 1838)	es	
417	<i>Temnostethus dacicus</i> (Puton, 1888)	es	
418	<i>Temnostethus gracilis</i> Horváth, 1907	mh	
419	<i>Temnostethus pusillus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	mh	
420	<i>Tetraphleps bicuspis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ex	1941
421	<i>Xylocoris cursitans</i> (Fallén, 1807)	mh	
422	<i>Xylocoris formicetorum</i> (Boheman, 1844)	es	
423	<i>Xylocoris galactinus</i> (Fieber, 1836)	s	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
	Cimicidae		
424	<i>Cimex columbarius</i> Jenyns, 1839	ex	Anf. 20. Jh.
425	<i>Cimex dissimilis</i> (Horváth, 1910)	ex	Anf. 20. Jh.
426	<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758	?	
427	<i>Cimex pipistrelli</i> Jenyns, 1839	s	
428	<i>Oeciacus hirundinis</i> (Lamarck, 1816)	ex	Anf. 20. Jh.
	Reduviidae		
429	<i>Coranus subapterus</i> (De Geer, 1773)	ss	
430	<i>Coranus woodroffei</i> P.V. Puthshkov, 1982	ss	
431	<i>Empicoris baerensprungi</i> (Dohrn, 1863)	es	
432	<i>Empicoris culiciformis</i> (De Geer, 1773)	ss	
433	<i>Empicoris vagabundus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
434	<i>Phymata crassipes</i> (Fabricius, 1775)	s	
435	<i>Pygolampis bidentata</i> (Goeze, 1778)	ex	1944
436	<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758)	ss	
437	<i>Rhynocoris annulatus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
438	<i>Rhynocoris erythropus</i> (Linnaeus, 1767)	ex	Anf. 20. Jh.
439	<i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761)	ss	
	Aradidae		
440	<i>Aneurus avenius</i> (Dufour, 1833)	ss	
441	<i>Aneurus laevis</i> (Fabricius, 1775)	s	
442	<i>Aradus betulinus</i> Fallén, 1807	es	
443	<i>Aradus cinnamomeus</i> (Panzer, 1806)	s	
444	<i>Aradus conspicuus</i> Herrich-Schaeffer, 1835	s	
445	<i>Aradus corticalis</i> (Linnaeus, 1758)	ex	1919
446	<i>Aradus depressus</i> (Fabricius, 1794)	mh	
447	<i>Aradus erosus</i> Fallén, 1807	ss	
448	<i>Aradus signaticornis</i> R.F.Sahlberg, 1848	es	
449	<i>Aradus versicolor</i> Herrich-Schaeffer, 1835	es	
	Lygaeidae		
450	<i>Acompus pallipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1834)	ex	11
451	<i>Acompus rufipes</i> (Wolff, 1804)	s	
452	<i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1778)	es	
453	<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)	s	
454	<i>Arocatus longiceps</i> Stål, 1872	mh	
	<i>Arocatus melanocephalus</i> (Fabricius, 1798)		12
455	<i>Arocatus roeselii</i> (Schilling, 1829)	es	
456	<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)	es	
457	<i>Camptotelus lineolatus</i> (Schilling, 1829)	ex	Anf. 20. Jh.
458	<i>Chilacis typhae</i> (Perris, 1857)	mh	
459	<i>Cymus aurescens</i> Distant, 1883	mh	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
460	<i>Cymus claviculus</i> (Fallén, 1807)	mh	
461	<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1832	sh	
462	<i>Cymus melanocephalus</i> Fieber, 1861	sh	
463	<i>Drymus brunneus</i> (R.F. SAHLBERG, 1848)	h	
464	<i>Drymus latus</i> Douglas & Scott, 1871	es	
465	<i>Drymus pilicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	ss	
466	<i>Drymus pilipes</i> Fieber, 1861	es	
467	<i>Drymus ryeii</i> Douglas & Scott, 1865	h	
468	<i>Drymus sylvaticus</i> (Fabricius, 1775)	sh	
469	<i>Emblethis denticollis</i> Horváth, 1878	ss	
470	<i>Emblethis griseus</i> (Wolff, 1802)	es	
471	<i>Emblethis verbasci</i> (Fabricius, 1803)	mh	
472	<i>Eremocoris abietis</i> (Linnaeus, 1758)	ss	
473	<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schaeffer, 1839)	ss	
474	<i>Eremocoris plebejus</i> (Fallén, 1807)	sh	
475	<i>Eremocoris podagricus</i> (Fabricius, 1775)	mh	
476	<i>Gastrodes abietum</i> Bergroth, 1914	h	
477	<i>Gastrodes grossipes</i> (De Geer, 1773)	sh	
478	<i>Geocoris ater</i> (Fabricius, 1787)	ex	Anf. 20. Jh.
479	<i>Geocoris dispar</i> (Waga, 1839)	es	
480	<i>Geocoris grylloides</i> (Linnaeus, 1761)	s	
481	<i>Gonianotus marginepunctatus</i> (Wolff, 1804)	ex	Anf. 20. Jh.
482	<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius, 1775)	s	
483	<i>Henestaris halophilus</i> (Burmeister, 1835)	ss	
484	<i>Heterogaster affinis</i> Herrich-Schaeffer, 1835	es	
485	<i>Heterogaster artemisiae</i> Schilling, 1829	mh	
486	<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius, 1775)	mh	
487	<i>Horvathiolus superbus</i> (Pollich, 1781)	es	
488	<i>Ischnocoris angustulus</i> (Boheman, 1852)	ss	
489	<i>Ischnocoris hemipterus</i> (Schilling, 1829)	s	
490	<i>Ischnocoris punctulatus</i> Fieber, 1861	ex	19. Jh.
492	<i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén, 1826)	mh	
492	<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797)	sh	
493	<i>Lamproplax picea</i> (Flor, 1860)	es	
494	<i>Lasiosomus enervis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	s	
495	<i>Ligyrocoris sylvestris</i> (Linnaeus, 1758)	es	
496	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	s	
497	<i>Lygaeus simulans</i> Deckert, 1985	es	
498	<i>Macrodema microptera</i> (Curtis, 1836)	s	
499	<i>Macroplax preyssleri</i> (Fieber, 1837)	ss	
500	<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling, 1829)	h	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
50	<i>Megalonotus chiragra</i> (Fabricius, 1794)	sh	
502	<i>Megalonotus dilatatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	es	
503	<i>Megalonotus emarginatus</i> (Rey, 1888)	es	
504	<i>Megalonotus hirsutus</i> Fieber, 1861	s	
505	<i>Megalonotus praetextatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ss	
506	<i>Megalonotus sabulicola</i> (Thomson, 1870)	ss	
507	<i>Metopoplax origani</i> (Kolenati, 1845)	es	
508	<i>Nithecus jacobaeae</i> (Schilling, 1829)	s	
509	<i>Nysius ericae</i> (Schilling, 1829)	s	
510	<i>Nysius helveticus</i> (Herrich-Schaeffer, 1850)	s	
511	<i>Nysius senecionis</i> (Schilling, 1829)	mh	
512	<i>Nysius thymi</i> (Wolff, 1804)	s	
513	<i>Orsillus depressus</i> (Mulsant & Rey, 1852)	s	
514	<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	mh	
515	<i>Oxycarenus modestus</i> (Fallén, 1829)	s	
516	<i>Pachybrachius fracticollis</i> (Schilling, 1829)	s	
517	<i>Pachybrachius luridus</i> Hahn, 1826	es	
518	<i>Panaorus adpersus</i> (Mulsant & Rey, 1852)	ex	1918
519	<i>Peritrechus angusticollis</i> (R.F. Sahlberg, 1848)	es	
520	<i>Peritrechus geniculatus</i> (Hahn, 1832)	sh	
521	<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877	ex	Anf. 20. Jh.
522	<i>Peritrechus lundii</i> (Gmelin, 1790)	es	
523	<i>Peritrechus nubilus</i> (Fallén, 1807)	ss	
524	<i>Pionosomus varius</i> (Wolff, 1804)	ss	
525	<i>Platyplax salviae</i> (Schilling, 1829)	s	
526	<i>Plinthisus brevipennis</i> (Latreille, 1807)	mh	
527	<i>Plinthisus pusillus</i> (Scholtz, 1847)	ss	
528	<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (Schilling, 1829)	s	
529	<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)	mh	
530	<i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (Rossi, 1794)	h	
531	<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)	h	
532	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)	h	
533	<i>Scolopostethus affinis</i> (Schilling, 1829)	h	
534	<i>Scolopostethus decoratus</i> (Hahn, 1833)	s	
535	<i>Scolopostethus pictus</i> (Schilling, 1829)	mh	
536	<i>Scolopostethus pilosus</i> Reuter, 1874	ex	Anf. 20. Jh.
537	<i>Scolopostethus puberulus</i> Horváth, 1887	ss	
538	<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1875	sh	
539	<i>Sphragisticus nebulosus</i> (Fallén, 1807)	ss	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
	<i>Spilostethus saxatilis</i> (Scopoli, 1763)		13
540	<i>Stygnocoris fuliginus</i> (Geoffroy, 1785)	mh	
541	<i>Stygnocoris pygmaeus</i> (R.F. Sahlberg, 1848)	es	
542	<i>Stygnocoris rusticus</i> (Fallén, 1807)	h	
543	<i>Stygnocoris sabulosus</i> (Schilling, 1829)	sh	
544	<i>Taphropeltus contractus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ss	
545	<i>Taphropeltus hamulatus</i> (Thomson, 1870)	ss	
546	<i>Trapezonotus anorus</i> (Flor, 1860)	ex	Anf. 20. Jh.
547	<i>Trapezonotus arenarius</i> (Linnaeus, 1758)	mh	
548	<i>Trapezonotus dispar</i> Stål, 1872	s	
549	<i>Trapezonotus ullrichi</i> (Fieber, 1837)	ex	Anf. 20. Jh.
550	<i>Tropidophlebia costalis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	es	
551	<i>Tropistethus holosericus</i> (Scholtz, 1846)	mh	
552	<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798)	es	
	Piesmatidae		
553	<i>Parapiesma quadratum</i> (Fieber, 1844)	s	
554	<i>Parapiesma variabile</i> (Fieber, 1844)	ex	Anf. 20. Jh.
555	<i>Piesma capitatum</i> (Wolff, 1804)	s	
556	<i>Piesma maculatum</i> (Laporte, 1833)	sh	
	Berytidae		
557	<i>Berytinus clavipes</i> (Fabricius, 1775)	h	
558	<i>Berytinus crassipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	ss	
559	<i>Berytinus geniculatus</i> (Horváth, 1885)	ex	19. Jh.
560	<i>Berytinus minor</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	h	
561	<i>Berytinus montivagus</i> (Meyer-Dür, 1841)	s	
562	<i>Berytinus signoreti</i> (Fieber, 1859)	s	
563	<i>Gampsocoris punctipes</i> (Germar, 1822)	mh	
564	<i>Metatropis rufescens</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	s	
565	<i>Neides tipularius</i> (Linnaeus, 1758)	es	
	Pyrrhocoridae		
566	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	h	
567	<i>Pyrrhocoris marginatus</i> (Kolenati, 1845)	ex	1916
	Alydidae		
568	<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
	Coreidae		
569	<i>Arenocoris falleni</i> (Schilling, 1829)	ex	Anf. 20. Jh.
570	<i>Bathysolen nubilus</i> (Fallén, 1807)	s	
571	<i>Ceraleptus lividus</i> Stein, 1858	s	
572	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	sh	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
573	<i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli, 1763)	h	
574	<i>Coriomeris scabricornis</i> (Panzer, 1809)	ex	Anf. 20. Jh.
575	<i>Enoplops scapha</i> (Fabricius, 1794)	s	
576	<i>Gonocerus acuteangulatus</i> (Goeze, 1778)	s	
577	<i>Gonocerus juniperi</i> Herrich-Schaeffer, 1839	s	
578	<i>Nemocoris falleni</i> R.F. SAHLBERG, 1848	ex	19. Jh.
579	<i>Spathocera dalmanii</i> (Schilling, 1829)	es	
580	<i>Spathocera laticornis</i> (Schilling, 1829)	ex	Anf. 20. Jh.
581	<i>Syromastes rhombeus</i> (Linnaeus, 1767)	s	
	Rhopalidae		
582	<i>Brachycarenum tigrinus</i> (Schilling, 1829)	ss	
583	<i>Chorosoma schillingii</i> (Schummel, 1829)	ss	
584	<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	h	
585	<i>Liorhyssus hyalinus</i> (Fabricius, 1794)	es	
586	<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)	h	
587	<i>Rhopalus conspersus</i> (Fieber, 1837)	ss	
588	<i>Rhopalus distinctus</i> (Signoret, 1859)	es	
589	<i>Rhopalus maculatus</i> (Fieber, 1837)	s	
590	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829	sh	
591	<i>Rhopalus rufus</i> Schilling, 1829	ex	Anf. 20. Jh.
592	<i>Rhopalus subrufus</i> (Gmelin, 1790)	sh	
593	<i>Stictopleurus abutilon</i> (Rossi, 1790)	h	
594	<i>Stictopleurus crassicornis</i> (Linnaeus, 1758)	s	
595	<i>Stictopleurus pictus</i> (Fieber, 1861)	ss	
596	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)	h	
	Stenocephalidae		
597	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)	mh	
598	<i>Dicranocephalus albipes</i> (Fabricius, 1781)	ss	
599	<i>Dicranocephalus medius</i> (Mulsant & Rey, 1870)	s	
	Plataspidae		
600	<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)	mh	
	Cydnidae		
601	<i>Adomerus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
602	<i>Aethus nigrinus</i> (Fabricius, 1794)	ex	Anf. 20. Jh.
603	<i>Canthophorus dubius</i> (Scopoli, 1763)	s	
604	<i>Canthophorus impressus</i> (Horváth, 1880)	ss	
605	<i>Cydnus aterrimus</i> (Forster, 1771)	s	
606	<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)	mh	
607	<i>Legnotus picipes</i> (Fallén, 1807)	s	
608	<i>Ochetostethus opacus</i> (Scholz, 1847)	es	
609	<i>Sehirus luctuosus</i> Mulsant & Rey, 1866	s	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
610	Sehirus morio (Linnaeus, 1761)	es	
611	Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)	s	
612	Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)	mh	
613	Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)	mh	
	Scutelleridae		
614	Eurygaster austriaca (Schränk, 1776)	ss	
615	Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)	sh	
616	Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)	mh	
617	Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)	ss	
618	Odontoscelis lineola Rambur, 1839	es	
	Pentatomidae		
619	Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)	sh	
620	Aelia klugii Hahn, 1833	s	
621	Aelia rostrata Boheman, 1852	ex	19. Jh.
	Antheminia lunulata (Goeze, 1778)		14
622	Arma custos (Fabricius, 1794)	s	
623	Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)	h	
624	Carpocoris pudicus (Poda, 1761)	es	
625	Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)	sh	
626	Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758)	ss	
627	Chlorochroa pinicola (Mulsant & Rey, 1852)	s	
628	Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)	sh	
629	Eurydema dominulum (Scopoli, 1763)	s	
630	Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)	sh	
631	Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)	s	
632	Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)	ex	1932
	Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)		15
633	Eysarcoris venustissimus (Schränk, 1776)	s	
634	Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)	mh	
635	Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794)	ss	
636	Holcostethus strictus (Wolff, 1804)	sh	
637	Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)	ss	
638	Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830)	ex	19. Jh.
639	Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)	mh	
640	Palomena prasina (Linnaeus, 1761)	sh	
641	Palomena viridissima (Poda, 1761)	h	
642	Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)	h	
643	Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)	h	
644	Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)	mh	
645	Podops inunctus (Fabricius, 1775)	mh	
646	Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)	mh	

Nr.	Taxa	Häufigkeit	Bemerkung / letzter Nachweis
647	<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)	s	
648	<i>Rubiconia intermedia</i> (Wolff, 1811)	ss	
649	<i>Sciocoris cursitans</i> (Fabricius, 1794)	h	
650	<i>Sciocoris homalonotus</i> Fieber, 1851	ss	
651	<i>Sciocoris macrocephalus</i> Fieber, 1851	es	
652	<i>Sciocoris microphthalmus</i> Flor, 1860	ss	
653	<i>Sciocoris umbrinus</i> (Wolff, 1804)	s	
654	<i>Stagonomus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	s	
655	<i>Staria lunata</i> (Hahn, 1835)	ex	19. Jh.
656	<i>Troilus luridus</i> (Fabricius, 1775)	mh	
657	<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	s	
	Acanthosomatidae		
658	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758)	h	
659	<i>Cyphostethus tristriatus</i> (Fabricius, 1787)	mh	
660	<i>Elasmotethus interstinctus</i> (Linnaeus, 1758)	sh	
661	<i>Elasmotethus minor</i> Horváth, 1899	mh	
662	<i>Elasmucha ferrugata</i> (Fabricius, 1787)	s	
663	<i>Elasmucha fieberi</i> Jakovlev, 1865	ss	
664	<i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus, 1758)	sh	

Bemerkungen

- 1 *Sigara longipalis* wurde am 03.04.2010 bei Pennewitz erstmals für Thüringen nachgewiesen.
- 2 *Macrosaldula scotica* und *Macrosaldula variabilis* werden bei RAPP (1944) für Wandersleben und die Geraaue bei Erfurt erwähnt. Beide Arten wurden von den selben Sammlern an den selben Fundorten nachgewiesen. Belegt in der Rappsammlung ist jedoch nur *Macrosaldula scotica*. Bei dem einzigen bekannten Beleg von *Macrosaldula variabilis* handelt es sich um eine Fehlbestimmung.
- 3 Bei der Aufnahme von *Galeatus sinuatus* in die Checkliste beziehen sich Lichter & Sander auf die Angaben von Rapp (1944). Rapp nennt die Art jedoch nur für den Raum Halle (Sachsen Anhalt).
- 4 LICHTER & SANDER (1998) erwähnen einen Nachweis von *Acetropis gimmerthalii* durch Schmidt in der Umgebung von Ebenshausen bei Creuzburg (07.07.1956), nehmen die Art jedoch nicht in die Checkliste mit auf. Der Beleg befindet sich in der Sammlung des Phyletischen Museums in Jena.
- 5 *Capsus pilifer* wurde von A. Kopetz am 20.06.2010 bei Sachsenburg erstmals für Thüringen nachgewiesen.
- 6 *Deraeocoris serenus* wird in der Entomofauna Germanica als Aktueller Fund aufgeführt HOFFMANN & MELBER (2006), Datenmaterial liegt nicht vor.

- 7 *Pachytomella parallela* ist in der Sammlung des Phyletischen Museum in Jena belegt (05.06.1948 bei Arnstadt (Hausen) leg. det. Schmidt)
- 8 Aufgrund verstärkter Nachsuche konnten bis zur Erstellung der Liste 6 *Psallus*-Arten neu für Thüringen nachgewiesen werden.
- 9 *Strongylocoris steganoides* wurde lange Zeit als Variante oder Unterart von *Strongylocoris leucocephalus* betrachtet. In Thüringen wurde die Art mehrfach nachgewiesen.
- 10 *Amphiraeus obscuriceps* wurde am 30.09. und 01.10.2010 bei Zimmernsupra festgestellt.
- 11 Von *Acompus pallipes* finden sich in der Sammlung des Phyletisches Museum Jena 4 Tiere aus der Umgebung von Teichweiden (Rudolstadt) 05.08.1939 (leg. Schmidt)
- 12 Der einzige Nachweis von *Arocatus melanocephalus* bei Rapp (1944) beruht auf einer Verwechslung mit *Horvathiolus superbus*. Somit ist die Art für Thüringen zu streichen.
- 13 Alle belegten Nachweise von *Spilostethus saxatilis* bei Rapp (1944) sind Fehlbestimmungen. Ein Vorkommen der Art in Thüringen wird somit stark bezweifelt.
- 14 *Antheminia lunata* wurde von Frank für die Ilmaue zwischen Bad Berka und München (Thür.) erwähnt RAPP (1944) ein Beleg ist nicht bekannt. Das vorkommen der Art hier ist unwahrscheinlich, da die Art trockene steppenartige Biotope besiedelt.
- 15 *Eysarcoris ventralis* ist eine die tropischen und subtropischen Regionen besiedelnde Art. Die aus dem Mittelmeerraum bis Österreich vordringt. Aus Deutschland liegen keine Nachweise der Art vor, auch der von Frank 1913 erwähnte Fund ist nicht belegt und beruht sehr wahrscheinlich auf einer Verwechslung.

Literatur

- ACHTZIGER, R. (2004) Vorkommen von *Strongylocoris niger* (Herrich-Schäffer, 1835) im Frankenwald und in angrenzenden Teilen Thüringens. - *Heteropteron* 19: 19-20.
- ACHTZIGER, R. & U. NIGMANN (2008) Neue Nachweise von *Arocatus longiceps* Stal, 1872, in den Bundesländern Sachsen, Sachsen Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen (Heteroptera: Lygaeidae). - *Heteropteron* 26: 22-23.
- ARNOLD, K. (2002) Zur Verbreitung von *Galeatus maculatus* (Herrich-Schäffer, 1835) in Thüringen (Heteroptera: Tingidae). - *Heteropteron* 14: 3-4.
- (2004) Zur Verbreitung von *Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787) (Fam Acanthosomatidae) und *Tingis pilosa* Hummel, 1825 (Familia, Tingidae) in Thüringen. - *Heteropteron* 19: 13-14.
- BELLSTEDT, R. (1995): Checkliste der Wasser- und Uferwanzen Thüringens (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha). - Checklisten Thüringer Insekten Teil 3: 8-11.
- BRETTFELD, R.; R. BELLSTEDT & F. NIXDORF (2003): Erstnachweis der Grundwanze (*Aphelocheirus aestivalis* Fabricius, 1803) in Thüringen. - *Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes* 10 (1): 22-23.
- BRETTFELD, R.; R. BELLSTEDT & F. NIXDORF (2007): Zur Gewässerfauna der Rodach in Südthüringen. - *Veröffentlichungen Naturhistorisches Museum Bertholdsburg Schleusingen* 22: 93-106.

- GRUSCHWITZ, W. (2003): Erstnachweis von *Strongylocoris atrocoeruleus* in Sachsen Anhalt und Thüringen (Heteroptera, Miridae). - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes **10** (2): 12-14.
- HOFFMANN, H. J. & MELBER, A. (2003): Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) Deutschlands. – In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.): Fauna Germanica Bd. **6**: 209-272.
- KLEINSTEBER, W. (2010): *Micronecta griseola* (Horvath, 1899) eine in Thüringen neue Zwerggrüderwanze (Heteroptera, Corixidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte **54**: 137-138.
- KÜBNER, J. (2009): Zur Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) des Truppenübungsplatzes Ohrdruf (Landkreis Gotha und Ilmkreis/Thüringen). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XIV**: 125-142.
- KÜBNER, J.; D. FRENZEL & R. BELLSTEDT (2009): Neue Wanzen-Arten für die Thüringer Fauna (Insecta: Heteroptera). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XIV**: 143-150.
- LICHTER, D. & SANDER, F. W. (1998): Checkliste der Landwanzen Thüringens (Heteroptera: Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha). - Checklisten Thüringer Insekten **6**: 5-30.
- LICHTER, D.; SANDER, F. W. & VOIGT, K. (1999): Ergänzungen und Korrekturen zur Checkliste der Landwanzen Thüringens (Heteroptera: Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha) sowie der Checkliste der Wasser- und Uferwanzen Thüringens (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha), in Checklisten Thüringer Insekten **7**: 5-19.
- LICHTER, D. & F.W. SANDER (2000): Erstnachweis der Rhododendron-Gitterwanze *Stephanitis rhododendri* Horvát, 1905 (Heteroptera, Tingidae) in Thüringen. - Heteropteron **8**: 25-26.
- LICHTER, D. & F.W. SANDER (2001): Rote Liste der Landwanzen (Heteroptera: Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha) Thüringens. - Naturschutzreport **18**: 95-105.
- NIGMANN U.; D. MÜNCH, M. MÜNCH & R. ACHTZIGER (2008): Verbreitung und Ausbreitung der Platanenwanze *Arocatus longiceps* Stal, 1872 in Ostdeutschland (Heteroptera: Lygaeidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift **3**: 76-88.

Anschrift des Verfassers:

Jürgen Kießner
 Marktstrasse 11
 99310 Arnstadt
 h.j.kuessner@googlemail.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Küßner [Küssner] Jürgen

Artikel/Article: [Checkliste der Wanzen \(Heteroptera\) Thüringens 11-31](#)