

Aktualisierte Checkliste der Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae) Thüringens

Stand: 05.10.2012

WOLFGANG APFEL, Eisenach

Zahlreiche nomenklatorische Änderungen, taxonomische Neugruppierungen und ebenso zahlreiche Neu- und Wiederfunde Thüringer Kurzflügelkäfer machten die Überarbeitung der Checklisten der Thüringer Staphylinidae (APFEL 1995, 2002) und deren Ergänzung (APFEL 1998) erforderlich. Die aktuelle Checkliste umfasst 1149 Arten für Thüringen. Zwei Arten aus der letzten Liste mussten getrichen werden. Diese werden unten separat aufgeführt.

Nicht mit eingearbeitet wurden die Scydmaenidae, die inzwischen auch zu den Staphyliniden zählen. Zwischenzeitlich haben sich nomenklatorische Änderungen durch LÖBL & SMETANA (2004) sowie durch ASSING & SCHÜLKE (2011) ergeben, die in der Liste berücksichtigt wurden.

Die Thüringer "Rapp-Sammlung", die sich bisher als Leihgabe im Museum der Natur Gotha befand, wurde wieder ins Naturkundemuseum Erfurt zurückgeführt. Beim Einsortieren der Käfer in die Hauptsammlung, wurden einige Belege entdeckt, die RAPP (1933-1935, 1953) bereits gemeldet, aber der Autor bisher übersehen hatte. Die Bestimmung der Neufunde für Thüringen wurde durch die Spezialisten Jürgen Vogel (Görlitz), Volker Assing (Hannover), Adriano Zanetti (Verona), Michael Schülke (Berlin) und Volker Brachat (Geretsried) abgesichert.

Zu streichende Arten:

Mycetoporus solidicornis Wollaston, 1864: südliche Art, kommt in Thüringen nicht vor!
Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810): es konnte kein Beleg gefunden bzw. überprüft werden.

Abkürzungen

LF	-	Lichtfang
BF	-	Bodenfalle
EKL	-	Luftklektor
NME	-	Naturkundemuseum Erfurt
SDEI	-	Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg

Tab. 1: Checkliste der Staphylinidae Thüringens

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
1	<i>Siagonium quadricorne</i> Kirby & Spence, 1815	x	x	
2	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	x	x	
3	<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
4	<i>Scaphisoma assimile</i> Erichson, 1845	x	x	
5	<i>Scaphisoma balcanicum</i> Tamanini, 1954		x	
6	<i>Scaphisoma boleti</i> (Panzer, 1793)	x	x	
7	<i>Scaphisoma subalpinum</i> Reitter, 1881	x	x	1
8	<i>Phloeocharis subtilissima</i> Mannerheim, 1830	x	x	
9	<i>Pseudopsis sulcata</i> Newman, 1834	x		
10	<i>Dasycerus sulcatus</i> Brongniart, 1800	x	x	
11	<i>Bibloporus bicolor</i> (Denny, 1825)	x	x	
12	<i>Bibloporus mayeti</i> Guillebeau, 1888		x	
13	<i>Bibloporus minutus</i> Raffray, 1914		x	
14	<i>Meliceria sulciventris</i> Guillebeau, 1888		x	
15	<i>Biblopectus ambiguus</i> (Reichenbach, 1816)	x		
16	<i>Euplectus bescidicus</i> Reitter, 1882		x	
17	<i>Euplectus bonvouloiri narentinus</i> Reitter, 1882		x	
18	<i>Euplectus brunneus</i> Grimmer, 1841	x	x	
19	<i>Euplectus karstenii</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
20	<i>Euplectus mutator</i> Fauvel, 1895 (= <i>Euplectus fauveli</i> Guillebeau, 1888)		x	
21	<i>Euplectus nanus</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
22	<i>Euplectus piceus</i> Motschulsky, 1835		x	
23	<i>Euplectus punctatus</i> Mulsant & Rey, 1861	x	x	
24	<i>Euplectus sanguineus</i> Denny, 1825	x	x	
25	<i>Euplectus signatus</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
26	<i>Euplectus sparsus</i> Besuchet, 1964		x	
27	<i>Leptoplectus spinolae</i> (Aubé, 1844)		x	2
28	<i>Plectophloeus erichsoni</i> (Aubé, 1844)		x	
29	<i>Plectophloeus fischeri</i> (Aubé, 1833)	x	x	
30	<i>Plectophloeus fleischeri</i> Machulka, 1929	x		
31	<i>Plectophloeus nubigena</i> (Reitter, 1877)		x	
32	<i>Plectophloeus rhenanus</i> (Reitter, 1882)		x	3
33	<i>Trimium brevicorne</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
34	<i>Trichonyx sulcicollis</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
35	<i>Amauronyx maerkelii</i> (Aubé, 1844)		x	
36	<i>Batrisis formicarius</i> Aubé, 1833	x	x	
37	<i>Batrisodes adnexus</i> (C. Hampe, 1863)	x	x	4
38	<i>Batrisodes buqueti</i> (Aubé, 1833)		x	
39	<i>Batrisodes delaporti</i> (Aubé, 1833)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
40	<i>Batrisodes oculatus</i> (Aubé, 1833)	x		
41	<i>Batrisodes unisexualis</i> Besuchet, 1988		x	
42	<i>Batrisodes venustus</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	5
43	<i>Tychobythinus glabratus</i> (Rye, 1870)		x	
44	<i>Bythinus burrellii</i> Denny, 1825	x	x	
45	<i>Bythinus macropalpus</i> Aubé, 1833	x	x	
46	<i>Bythinus securiger</i> (Reichenbach, 1816)	x		
47	<i>Bryaxis bulbifer</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
48	<i>Bryaxis carinula</i> (Rey, 1888)	x	x	
49	<i>Bryaxis clavicornis</i> (Panzer, 1809)	x	x	
50	<i>Bryaxis curtisii</i> (Leach, 1817)	x	x	
51	<i>Bryaxis nigripennis</i> (Aubé, 1844)	x		
52	<i>Bryaxis nodicornis</i> (Aubé, 1833)	x	x	
53	<i>Bryaxis puncticollis</i> (Denny, 1825)	x	x	
54	<i>Tychus niger</i> (Paykull, 1800)	x	x	
55	<i>Rybaxis longicornis</i> (Leach, 1817)	x	x	
56	<i>Brachygluta fossulata</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
57	<i>Brachygluta haematica</i> (Reichenbach, 1816)	x	x	
58	<i>Brachygluta helferi helferi</i> (Schmidt-Goebel, 1836)	x	x	
59	<i>Brachygluta helferi longispina</i> Reitter, 1884		x	
60	<i>Brachygluta lefebvrei</i> (Aubé, 1833)	x		
61	<i>Brachygluta simplicior</i> Raffray, 1904		x	
62	<i>Brachygluta sinuata</i> (Aubé, 1833)		x	
63	<i>Brachygluta xanthoptera</i> (Reichenbach, 1816)	x		
64	<i>Reichenbachia juncorum</i> (Leach, 1817)	x	x	
65	<i>Fagniezia impressus</i> (Panzer, 1803) [= <i>Trissemus impressus</i> (Panzer, 1803)]	x	x	
66	<i>Pselaphaulax dresdensis</i> (Herbst, 1792)	x	x	
67	<i>Pselaphus heisei</i> Herbst, 1792	x	x	
68	<i>Chennium bituberculatum</i> Latreille, 1807	x		
69	<i>Centrotoma lucifuga</i> C. Heyden, 1849	x		
70	<i>Ctenistes palpalis</i> Reichenbach, 1816	x		
71	<i>Tyrus mucronatus</i> (Panzer, 1805)	x	x	
72	<i>Claviger longicornis</i> P. W. J. Müller, 1818	x	x	
73	<i>Claviger testaceus</i> Preyßler, 1790	x	x	
74	<i>Metopsia similis</i> Zerche, 1998	x	x	
75	<i>Megarathrus bellevoeyi</i> Saulcy, 1862	x	x	
76	<i>Megarathrus denticollis</i> (Beck, 1817)	x	x	
77	<i>Megarathrus depressus</i> (Paykull, 1789)	x	x	
78	<i>Megarathrus hemipterus</i> (Illiger, 1794)	x		

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
79	<i>Megarathrus nitidulus</i> Kraatz, 1857	x	x	
80	<i>Megarathrus prosseni</i> Schatzmayr, 1904	x	x	
81	<i>Proteinus abditus</i> Assing, 2007		x	6
82	<i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840	x	x	
83	<i>Proteinus brachypterus</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
84	<i>Proteinus crenulatus</i> Pandellé, 1867		x	
85	<i>Proteinus laevigatus</i> Hochhuth, 1872	x	x	
86	<i>Proteinus ovalis</i> Stephens, 1834	x	x	
87	<i>Arrhenopeplus tesserula</i> (Curtis, 1828)		x	
88	<i>Micropeplus fulvus</i> Erichson, 1840	x	x	
89	<i>Micropeplus longipennis</i> Kraatz, 1859	x	x	
90	<i>Micropeplus marietti</i> Jacquelin du Val, 1857	x	x	
91	<i>Micropeplus porcatus</i> (Paykull, 1789)	x	x	
92	<i>Micropeplus ripicola</i> Kerstens, 1964	x	x	7
93	<i>Eusphalerum alpinum</i> (Heer, 1839)	x	x	
94	<i>Eusphalerum anale</i> (Erichson, 1840)	x		
95	<i>Eusphalerum atrum</i> (Heer, 1839)	x	x	
96	<i>Eusphalerum brandmayri</i> Zanetti, 1981	x	x	8
97	<i>Eusphalerum limbatum</i> (Erichson, 1840)	x	x	
98	<i>Eusphalerum longipenne</i> (Erichson, 1839)	x	x	
99	<i>Eusphalerum luteum</i> (Marsham, 1802)	x	x	
100	<i>Eusphalerum marshami</i> (Fauvel, 1869)	x	x	
101	<i>Eusphalerum minutum</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
102	<i>Eusphalerum primulae</i> (Stephens, 1834)	x	x	
103	<i>Eusphalerum pseudaucupariae</i> (Strand, 1917)	x	x	
104	<i>Eusphalerum rectangulum</i> (Baudi di Selve, 1870)	x	x	
105	<i>Eusphalerum semicoleopratum</i> (Panzer, 1895)	x	x	
106	<i>Eusphalerum signatum</i> (Märkel, 1857)	x	x	
107	<i>Eusphalerum sorbi</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
108	<i>Eusphalerum stramineum</i> (Kraatz, 1857)	x	x	
109	<i>Eusphalerum tenenbaumi</i> (Bernhauer, 1932)	x	x	
110	<i>Eusphalerum torquatum</i> (Marsham, 1802)	x		
111	<i>Acrolocha inflata</i> (Gyllenhal, 1813)	x	x	
112	<i>Acrolocha amabilis</i> (Heer, 1841)	x	x	
113	<i>Acrolocha minuta</i> (Olivier, 1795)	x	x	
114	<i>Acrolocha pliginskii</i> Bernhauer, 1912		x	
115	<i>Acrolocha sulcula</i> (Stephens, 1834)		x	9
116	<i>Phyllodrepa floralis</i> (Paykull, 1789)	x	x	
117	<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
118	<i>Phyllodrepa melis</i> Hansen, 1940	x	x	
119	<i>Phyllodrepa nigra</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
120	<i>Phyllodrepa puberula</i> Bernhauer, 1903		x	10
121	<i>Phyllodrepa salicis</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
122	<i>Dropephylla ioptera</i> (Stephens, 1834)	x	x	
123	<i>Dropephylla linearis</i> (Zetterstedt, 1828)		x	11
124	<i>Dropephylla vilis</i> (Erichson, 1840)	x		
125	<i>Hapalaraea pygmaea</i> (Paykull, 1800)	x	x	
126	<i>Hypopycna rufula</i> (Erichson, 1849)		x	
127	<i>Omalium caesum</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
128	<i>Omalium excavatum</i> Stephens, 1834	x	x	
129	<i>Omalium exiguum</i> Gyllenhal, 1810	x		
130	<i>Omalium laticolle</i> Kraatz, 1857	x		
131	<i>Omalium oxyacanthae</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
132	<i>Omalium rivulare</i> (Paykull, 1789)	x	x	
133	<i>Omalium rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880	x	x	
134	<i>Omalium septentrionis</i> C. G. Thomson, 1857	x	x	
135	<i>Omalium validum</i> Kraatz, 1858	x	x	
136	<i>Phloeonomus minimus</i> (Erichson, 1839)	x	x?	12
137	<i>Phloeonomus punctipennis</i> (C. G. Thomson, 1867)	x	x	
138	<i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
139	<i>Xylostiba bosnica</i> (Bernhauer, 1902)		x	13
140	<i>Xylostiba monilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
141	<i>Phloeostiba lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)	x	x	
142	<i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792)	x	x	
143	<i>Xylostromus affinis</i> (Gerhardt, 1877)	x	x	
144	<i>Xylostromus concinnus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
145	<i>Xylostromus depressus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
146	<i>Xylostromus testaceus</i> (Erichson, 1840)	x	x	
147	<i>Philorinum sordidum</i> (Stephens, 1832)	x	x	
148	<i>Orochares angustatus</i> (Erichson, 1840)	x	x	
149	<i>Phyllodrepoidea crenata</i> Ganglbauer, 1895	x	x	
150	<i>Deliphrum algidum</i> Erichson, 1840	x		
151	<i>Deliphrum tectum</i> (Paykull, 1789)	x	x	
152	<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
153	<i>Anthobium melanocephalum</i> (Illiger, 1794)	x	x	
154	<i>Anthobium unicolor</i> (Marsham, 1802)	x	x	
155	<i>Olophrum assimile</i> (Paykull, 1800)	x	x	
156	<i>Olophrum fuscum</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
157	<i>Olophrum piceum</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
158	<i>Arpedium quadrum</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
159	<i>Acidota crenata</i> (Fabricius, 1793)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
160	<i>Acidota cruentata</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
161	<i>Amphichroum canaliculatum</i> (Erichson, 1840)	x	x	
162	<i>Lesteva hanseni</i> Lohse, 1953	x	x	
163	<i>Lesteva longoelytrata</i> (Goeze, 1777)	x	x	
164	<i>Lesteva monticola</i> Kiesenwetter, 1847	x	x	
165	<i>Lesteva pubescens</i> Mannerheim, 1830	x	x	
166	<i>Lesteva punctata</i> Erichson, 1839	x	x	
167	<i>Geodromicus nigrita</i> (Müller, 1821)	x	x	
168	<i>Anthophagus angusticollis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
169	<i>Anthophagus bicornis</i> (Block, 1799)	x	x	
170	<i>Anthophagus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
171	<i>Anthophagus praeustus</i> Müller, 1821	x	x	
172	<i>Eudectus giraudi</i> L. Redtenbacher, 1858	x		
173	<i>Coryphium angusticolle</i> Stephens, 1834	x	x	
174	<i>Syntomium aeneum</i> (Müller, 1821)	x	x	
175	<i>Deleaster dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
176	<i>Coprophilus piceus</i> (Solsky, 1866)	x	x	14
177	<i>Coprophilus striatulus</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
178	<i>Manda mandibularis</i> (Gyllenhal, 1827)	x		
179	<i>Planeustomus palpalis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
180	<i>Ochtheophilus angustior</i> (Bernhauer, 1943)		x	15
181	<i>Ochtheophilus aureus</i> (Fauvel, 1871)	x	x	
182	<i>Ochtheophilus omalinus</i> (Erichson, 1840)	x	x	
183	<i>Ochtheophilus praepositus</i> Mulsant & Rey, 1878 [= <i>O. longipennis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1856) sensu FHL]	x	x	16
184	<i>Carpelimus bilineatus</i> (Stephens, 1834)	x	x	
185	<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
186	<i>Carpelimus despectus</i> (Baudi di Selve, 1869)		x	
187	<i>Carpelimus elongatulus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
188	<i>Carpelimus exiguus</i> (Erichson, 1839)	x		
189	<i>Carpelimus foveolatus</i> (C. R. Sahlberg, 1823)	x	x	
190	<i>Carpelimus fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
191	<i>Carpelimus ganglbaueri</i> (Bernhauer, 1901)		x	
192	<i>Carpelimus gracilis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
193	<i>Carpelimus halophilus</i> (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
194	<i>Carpelimus impressus</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
195	<i>Carpelimus lindrothi</i> (Palm, 1943)	x	x	
196	<i>Carpelimus manchuricus subtilicornis</i> (Roubal, 1946)	x	x	
197	<i>Carpelimus nitidus</i> (Baudi di Selve, 1848)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
198	<i>Carpelimus obesus</i> (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
199	<i>Carpelimus punctatellus</i> (Erichson, 1840)	x	x	
200	<i>Carpelimus pusillus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
201	<i>Carpelimus rivularis</i> (Motschulsky, 1860)	x	x	
202	<i>Carpelimus similis</i> (Smetana, 1967)		x	
203	<i>Carpelimus subtilis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
204	<i>Thinodromus arcuatus</i> (Stephens, 1834)	x	x	
205	<i>Thinodromus dilatatus</i> (Erichson, 1839)	x		
206	<i>Thinodromus hirticollis</i> (Mulsant & Rey, 1879)	x		
207	<i>Aploderus caelatus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
208	<i>Aploderus caesus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
209	<i>Oxytelus fulvipes</i> Erichson, 1839	x	x	
210	<i>Oxytelus laqueatus</i> (Marshall, 1802)	x	x	
211	<i>Oxytelus migrator</i> Fauvel, 1904		x	
212	<i>Oxytelus piceus</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	
213	<i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
214	<i>Anotylus bernhaueri</i> (Ganglbauer, 1898)		x	
215	<i>Anotylus clypeonitens</i> (Pandellé, 1867)	x	x	
216	<i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
217	<i>Anotylus hamatus</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1856) [= <i>Anotylus affinis</i> (Czwalina, 1870)]			17
218	<i>Anotylus insecatus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
219	<i>Anotylus inustus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
220	<i>Anotylus mutator</i> (Lohse, 1963)		x	
221	<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
222	<i>Anotylus rugifrons</i> (Hochhuth, 1849)	x	x	
223	<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)	x	x	
224	<i>Anotylus saulcyi</i> (Pandellé, 1867)	x	x	
225	<i>Anotylus sculpturatus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
226	<i>Anotylus tetracarيناتus</i> (Block, 1799)	x	x	
227	<i>Platystethus alutaceus</i> C. G. Thomson, 1861	x	x	
228	<i>Platystethus arenarius</i> (Geoffroy, 1785)	x	x	
229	<i>Platystethus capito</i> Heer, 1839	x	x	
230	<i>Platystethus cornutus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
231	<i>Platystethus nitens</i> (C. R. Sahlberg, 1832)	x	x	
232	<i>Platystethus nodifrons</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	18
233	<i>Bledius agriculator</i> Heer, 1839)	x	x	
234	<i>Bledius atricapillus</i> (Germar, 1825)	x	x	
235	<i>Bledius bicornis</i> (Germar, 1823)	x		
236	<i>Bledius crassicollis</i> Boisduval & Lacordaire, 1835	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
237	<i>Bledius cribricollis</i> Lacordaire, 1835	x	x	
238	<i>Bledius denticollis</i> Fauvel, 1872	?		
239	<i>Bledius dissimilis</i> Erichson, 1840	x	x	19
240	<i>Bledius erraticus</i> Erichson, 1839	x	x	
241	<i>Bledius femoralis</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
242	<i>Bledius furcatus</i> (Olivier, 1811)	x		
243	<i>Bledius gallicus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
244	<i>Bledius longulus</i> Erichson, 1839	x	x	
245	<i>Bledius nanus</i> Erichson, 1840	x	x	
246	<i>Bledius occidentalis</i> Bondroit, 1907	x	x	
247	<i>Bledius opacus</i> (Block, 1870)	x	x	
248	<i>Bledius pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
249	<i>Bledius procerulus</i> Erichson, 1840	x	x	
250	<i>Bledius spectabilis</i> Kraatz, 1857 (= <i>Bledius limicola</i> Tottenham, 1940)	x	x	20
251	<i>Bledius subterraneus</i> Erichson, 1839	x	x	
252	<i>Bledius talpa</i> (Gyllenhal, 1810)	x		
253	<i>Bledius tricornis</i> (Herbst, 1784)	x	x	
254	<i>Bledius unicornis</i> (Germar, 1825)	x	x	
255	<i>Thinobius brevipennis</i> Kiesenwetter, 1850	x		
256	<i>Thinobius brunneipennis</i> Kraatz, 1857	x		
257	<i>Thinobius ciliatus</i> Kiesenwetter, 1844	x		
258	<i>Thinobius flagellatus</i> Lohse, 1984	x		21
259	<i>Thinobius longipennis</i> (Heer, 1841)	x		
260	<i>Oxyporus maxilloso</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
261	<i>Oxyporus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
262	<i>Stenus argus</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
263	<i>Stenus ater</i> Mannerheim, 1830	x	x	
264	<i>Stenus aterrimus</i> Erichson, 1839	x	x	22
265	<i>Stenus atratulus</i> Erichson, 1839	x	x	
266	<i>Stenus bifoveolatus</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
267	<i>Stenus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
268	<i>Stenus bimaculatus</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
269	<i>Stenus binotatus</i> Ljungh, 1804	x	x	
270	<i>Stenus bohemicus</i> Machulka, 1947		x	
271	<i>Stenus boops</i> Ljungh, 1810	x	x	
272	<i>Stenus brunripes</i> Stephens, 1833	x	x	
273	<i>Stenus canaliculatus</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
274	<i>Stenus carbonarius</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
275	<i>Stenus cautus</i> Erichson, 1839	x	x	
276	<i>Stenus cicindeloides</i> (Schaller, 1783)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
277	<i>Stenus circularis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
278	<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	
279	<i>Stenus comma</i> J. L. LeConte, 1863	x	x	
280	<i>Stenus crassus</i> Stephens, 1833	x	x	
281	<i>Stenus europaeus</i> Puthz, 1966	x	x	
282	<i>Stenus flavipalpis</i> C. G. Thomson, 1860	x	x	
283	<i>Stenus flavipes</i> Stephens, 1833	x	x	
284	<i>Stenus formicetorum</i> Mannerheim, 1843	x	x	
285	<i>Stenus fornicatus</i> Stephens, 1833	x	x	
286	<i>Stenus fossulatus</i> Erichson, 1840	x	x	
287	<i>Stenus fulvicornis</i> Stephens, 1833	x	x	
288	<i>Stenus fuscicornis</i> Erichson, 1840	x	x	
289	<i>Stenus fuscipes</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
290	<i>Stenus gallicus</i> Fauvel, 1873	x	x	
291	<i>Stenus geniculatus</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
292	<i>Stenus glacialis</i> Heer, 1839		x	
293	<i>Stenus guttula</i> Müller, 1821	x	x	
294	<i>Stenus humilis</i> Erichson, 1839	x	x	
295	<i>Stenus impressus</i> Germar, 1824	x	x	
296	<i>Stenus incanus</i> Erichson, 1839	x		
297	<i>Stenus incrassatus</i> Erichson, 1839	x	x	
298	<i>Stenus junco</i> (Paykull, 1789)	x	x	
299	<i>Stenus kiesenwetteri</i> Rosenhauer, 1856		x	
300	<i>Stenus latifrons</i> Erichson, 1839	x	x	
301	<i>Stenus longitarsis</i> C. G. Thomson, 1851	x	x	
302	<i>Stenus ludyi</i> Fauvel, 1885	x	x	
303	<i>Stenus lustrator</i> Erichson, 1839	x	x	
304	<i>Stenus melanarius</i> Stephens, 1833	x	x	
305	<i>Stenus melanopus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
306	<i>Stenus montivagus</i> Heer, 1841	x	x	
307	<i>Stenus morio</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
308	<i>Stenus nanus</i> Stephens, 1833	x	x	
309	<i>Stenus nigrifulus</i> Gyllenhal, 1827	x	x	
310	<i>Stenus nitens</i> Stephens, 1833	x	x	
311	<i>Stenus nitidiusculus</i> Stephens, 1833	x	x	
312	<i>Stenus niveus</i> Fauvel, 1865	x		
313	<i>Stenus ochropus</i> Kiesenwetter, 1858	x	x	
314	<i>Stenus opticus</i> Gravenhorst, 1806	x		
315	<i>Stenus oscillator</i> Rye, 1870	x	x	
316	<i>Stenus pallipes</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
317	<i>Stenus pallitarsis</i> Stephens, 1833	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
318	<i>Stenus palposus</i> Zetterstedt, 1838	x		
319	<i>Stenus palustris</i> Erichson, 1839	x		
320	<i>Stenus picipennis</i> Erichson, 1840	x	x	
321	<i>Stenus picipes brevipennis</i> C. G. Thomson, 1851	x	x	
322	<i>Stenus picipes picipes</i> Stephens, 1833	x	x	
323	<i>Stenus proditor</i> Erichson, 1839	x	x	
324	<i>Stenus providus</i> Erichson, 1839	x	x	
325	<i>Stenus pubescens</i> Stephens, 1833	x	x	
326	<i>Stenus pumilio</i> Erichson, 1839	x		
327	<i>Stenus pusillus</i> Stephens, 1833	x	x	
328	<i>Stenus ruralis</i> Erichson, 1840	x		
329	<i>Stenus scrutator</i> Erichson, 1839	x	x	
330	<i>Stenus similis</i> (Herbst, 1784)	x	x	
331	<i>Stenus solutus</i> Erichson, 1840	x	x	
332	<i>Stenus stigmula</i> Erichson, 1840	x		
333	<i>Stenus subaeneus</i> Erichson, 1840	x		
334	<i>Stenus subdepressus</i> Mulsant & Rey, 1861		x	
335	<i>Stenus sylvester</i> Erichson, 1839	x		
336	<i>Stenus tarsalis</i> Ljungh, 1810	x	x	
337	<i>Dianous coerulescens</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
338	<i>Euaethetus bipunctatus</i> (Ljungh, 1804)	x	x	
339	<i>Euaethetus laeviusculus</i> Mannerheim, 1844	x	x	
340	<i>Euaethetus ruficapillus</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
341	<i>Euaethetus superlatus</i> Peyerimhoff, 1937		x	
342	<i>Paederidus rubrothoracicus</i> (Goeze, 1777)	x		
343	<i>Paederidus ruficollis</i> (Fabricius, 1781)	x		
344	<i>Paederus brevipennis</i> Lacordaire, 1835	x	x	
345	<i>Paederus caligatus</i> Erichson, 1840	x		
346	<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826	x	x	
347	<i>Paederus limnophilus</i> Erichson, 1840	x	x	
348	<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
349	<i>Paederus riparius</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
350	<i>Astenus gracilis</i> (Paykull, 1789)	x	x	
351	<i>Astenus immaculatus</i> Stephens, 1833	x		
352	<i>Astenus procerus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
353	<i>Astenus pulchellus</i> (Heer, 1839)	x	x	
354	<i>Rugilus angustatus</i> (Geoffroy, 1785)	x	x	
355	<i>Rugilus erichsonii</i> (Fauvel, 1867)	x	x	
356	<i>Rugilus geniculatus</i> (Erichson, 1839)	x		
357	<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)	x	x	
358	<i>Rugilus rufipes</i> (Germar, 1836)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
359	<i>Rugilus similis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
360	<i>Rugilus subtilis</i> (Erichson, 1840)	x	x	
361	<i>Medon apicalis</i> (Kraatz, 1857)	x	x	
362	<i>Medon brunneus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
363	<i>Medon castaneus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
364	<i>Medon fuscus</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
365	<i>Medon piceus</i> (Kraatz, 1858)	x	x	
366	<i>Medon ripicola</i> (Kraatz, 1854)	x	x	23
367	<i>Sunius bicolor</i> (Olivier, 1795)	x	x	
368	<i>Sunius melanocephalus</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
369	<i>Hypomedon debilicornis</i> (Wollaston, 1857)	x	x	
370	<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Erichson, 1840)	x	x	
371	<i>Pseudomedon obsoletus</i> (Nordmann, 1837)	x		
372	<i>Lithocharis nigriceps</i> Kraatz, 1859	x	x	
373	<i>Lithocharis ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
374	<i>Scopaeus gracilis</i> (Sperk, 1835)	x		
375	<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
376	<i>Scopaeus minimus</i> (Erichson, 1837) (= <i>Scopaeus furcatus</i> Binaghi, 1935 sensu FHL IV)	x	x	24
377	<i>Scopaeus minutus</i> Erichson, 1840	x	x	
378	<i>Scopaeus pusillus</i> Kiesenwetter, 1843		x	
379	<i>Scopaeus ryei</i> Wollaston, 1872	x	x	
380	<i>Scopaeus sulcicollis</i> (Stephens, 1833)	x	x	
381	<i>Domene scabricollis</i> (Erichson, 1840)	x	x	
382	<i>Lobrathium multipunctum</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
383	<i>Platydomene angusticollis</i> (Lacordaire, 1835)	x		
384	<i>Platydomene picipes</i> (Erichson, 1840)	x		
385	<i>Tetartopeus quadratus</i> (Paykull, 1789)	x	x	
386	<i>Tetartopeus rufonitidus</i> (Reitter, 1909)	x	x	
387	<i>Tetartopeus terminatus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
388	<i>Lathrobium brunnipes</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
389	<i>Lathrobium castaneipenne</i> Kolenati, 1846	x	x	
390	<i>Lathrobium dilutum</i> Erichson, 1839	x	x	
391	<i>Lathrobium elongatum</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	
392	<i>Lathrobium fovulum</i> Stephens, 1833	x	x	
393	<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
394	<i>Lathrobium geminum</i> Kraatz, 1857	x	x	
395	<i>Lathrobium impressum</i> Heer, 1841	x	x	
396	<i>Lathrobium laevipenne</i> Heer, 1839	x	x	
397	<i>Lathrobium longulum</i> Gravenhorst, 1802	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
398	<i>Lathrobium pallidipenne</i> Hochhuth, 1851	x	x	
399	<i>Lathrobium pallidum</i> Nordmann, 1837	x	x	
400	<i>Lathrobium rufipenne</i> Gyllenhal, 1813	x	x	
401	<i>Lathrobium spadiceum</i> Erichson, 1840	x	x	
402	<i>Achenium humile</i> (Nicolai, 1822)	x	x	
403	<i>Leptobium gracile</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
404	<i>Ochtheophilum fracticorne</i> (Paykull, 1800)	x	x	
405	<i>Leptacinus batychrus</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
406	<i>Leptacinus formicetorum</i> Märkel, 1841	x	x	
407	<i>Leptacinus intermedius</i> Donisthorpe, 1936	x	x	
408	<i>Leptacinus pusillus</i> (Stephens, 1833)	x	x	
409	<i>Leptacinus sulcifrons</i> (Stephens, 1833)	x	x	
410	<i>Phacophallus pallidipennis</i> (Motschulsky, 1858)			25
411	<i>Phacophallus parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
412	<i>Gauropterus fulgidus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
413	<i>Nudobius lentus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
414	<i>Gyrohypnus angustatus</i> Stephens, 1833	x	x	
415	<i>Gyrohypnus atratus</i> (Heer, 1839)	x	x	
416	<i>Gyrohypnus fracticornis</i> (Müller, 1776)	x	x	
417	<i>Gyrohypnus punctulatus</i> (Paykull, 1789)	x	x	
418	<i>Megalinus glabratus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
419	<i>Xantholinus dvoraki</i> Coiffait, 1956		x	
420	<i>Xantholinus elegans</i> (Olivier, 1795)	x	x	
421	<i>Xantholinus gallicus</i> Coiffait, 1956	x	x	
422	<i>Xantholinus laevigatus</i> Jacobson, 1849	x	x	
423	<i>Xantholinus linearis</i> (Olivier, 1795)	x	x	
424	<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839	x	x	
425	<i>Xantholinus tricolor</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
426	<i>Hypnogyra angularis</i> (Ganglbauer, 1895)	x	x	
427	<i>Atrecus affinis</i> (Paykull, 1789)	x	x	
428	<i>Othius angustus</i> Stephens, 1833	x	x	
429	<i>Othius lapidicola</i> Märkel & Kiesenwetter, 1848	x		
430	<i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777)	x	x	
431	<i>Othius subuliformis</i> Stephens, 1833	x	x	
432	<i>Othius volans</i> J. Sahlberg, 1876		x	
433	<i>Neobisnius lathrobioides</i> (Baudi di Selve, 1848)		x	
434	<i>Neobisnius procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
435	<i>Neobisnius prolixus</i> (Erichson, 1840)	x		
436	<i>Neobisnius villosulus</i> (Stephens, 1832)	x	x	
437	<i>Erichsonius cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
438	<i>Erichsonius signaticornis</i> (Mulsant & Rey, 1863)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
439	<i>Erichsonius subopacus</i> (Hochhuth, 1851)	x	x	
440	<i>Hesperus rufipennis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
441	<i>Philonthus addendus</i> Sharp, 1867	x	x	
442	<i>Philonthus albipes</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
443	<i>Philonthus alpinus</i> Eppelsheim, 1875		x	
444	<i>Philonthus atratus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
445	<i>Philonthus caerulescens</i> (Lacordaire, 1835)	x		
446	<i>Philonthus carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
447	<i>Philonthus caucasicus</i> Nordmann, 1837	x		
448	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832	x	x	
449	<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
450	<i>Philonthus coruscus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
451	<i>Philonthus corvinus</i> Erichson, 1839	x	x	
452	<i>Philonthus cruentatus</i> (Gmelin, 1790)	x	x	
453	<i>Philonthus cyanipennis</i> (Fabricius, 1793)	x		
454	<i>Philonthus debilis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
455	<i>Philonthus decorus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
456	<i>Philonthus discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
457	<i>Philonthus ebeninus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
458	<i>Philonthus fumarius</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
459	<i>Philonthus intermedius</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
460	<i>Philonthus jurgans</i> Tottenham, 1937		x	
461	<i>Philonthus laevicollis</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
462	<i>Philonthus laminatus</i> (Creutzer, 1799)	x	x	
463	<i>Philonthus lepidus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
464	<i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832	x	x	
465	<i>Philonthus mannerheimii</i> Fauvel, 1869	x	x	
466	<i>Philonthus marginatus</i> (Müller, 1764)	x	x	
467	<i>Philonthus micans</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
468	<i>Philonthus nigrita</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
469	<i>Philonthus nitidicollis</i> (Lacordaire, 1835)	x		
470	<i>Philonthus nitidus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
471	<i>Philonthus pavicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	x		
472	<i>Philonthus politus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
473	<i>Philonthus pseudovarians</i> Strand, 1941		x	
474	<i>Philonthus punctus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
475	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
476	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	x	x	
477	<i>Philonthus rotundicollis</i> (Ménétriés, 1832)	x	x	
478	<i>Philonthus rubripennis</i> Stephens, 1832	x	x	
479	<i>Philonthus rufimanus</i> Erichson, 1840	x		

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
480	<i>Philonthus rufipes</i> (Stephens, 1832)	x	x	
481	<i>Philonthus salinus</i> Kiesenwetter, 1844	x	x	
482	<i>Philonthus sanguinolentus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
483	<i>Philonthus spinipes</i> Sharp, 1874		x	
484	<i>Philonthus splendens</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
485	<i>Philonthus succicola</i> C. G. Thomson, 1860	x	x	
486	<i>Philonthus temporalis</i> Mulsant & Rey, 1853	x	?	
487	<i>Philonthus tenuicornis</i> Mulsant & Rey, 1853	x	x	
488	<i>Philonthus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
489	<i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789)	x	x	
490	<i>Philonthus ventralis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
491	<i>Bisnius cephalotes</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
492	<i>Bisnius fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
493	<i>Bisnius nigriventris</i> (C. G. Thomson, 1867)		x	
494	<i>Bisnius nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
495	<i>Bisnius parvus</i> (Sharp, 1874)		x	
496	<i>Bisnius pseudoparvus</i> (Brunner, 1976)		x	
497	<i>Bisnius puella</i> Nordmann, 1837	x	x	
498	<i>Bisnius scribae</i> (Fauvel, 1867)	x	x	
499	<i>Bisnius sordidus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
500	<i>Bisnius sparsus</i> (Lucas, 1846)		x	
501	<i>Bisnius spermophili</i> (Ganglbauer, 1897)	x	x	
502	<i>Bisnius subuliformis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
503	<i>Rabigus pullus</i> (Nordmann, 1837)	x		26
504	<i>Rabigus tenuis</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
505	<i>Gabronthus thermarum</i> (Aubé, 1850)	x	x	
506	<i>Gabrius appendiculatus</i> Sharp, 1910	x	x	
507	<i>Gabrius astutooides</i> (Strand, 1946)		x	
508	<i>Gabrius bishopi</i> Sharp, 1910		x	
509	<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk, 1835)	x	x	
510	<i>Gabrius dieckmanni</i> Smetana, 1957	x	x	
511	<i>Gabrius exiguus</i> (Nordmann, 1837)	x	x	
512	<i>Gabrius femoralis</i> (Hochhuth, 1851)	x	x	
513	<i>Gabrius lividipes</i> (Baudi di Selve, 1848)	x	x	
514	<i>Gabrius nigrifulus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
515	<i>Gabrius osseticus</i> (Kolenati, 1846)	x	x	
516	<i>Gabrius piliger</i> Mulsant & Rey, 1876		x	27
517	<i>Gabrius splendidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
518	<i>Gabrius trossulus</i> (Nordmann, 1837)	x	x	
519	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
520	<i>Ontholestes haroldi</i> (Eppelsheim, 1884)		x	28

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
521	<i>Ontholestes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
522	<i>Ontholestes tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)	x	x	
523	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
524	<i>Platydracus chalcocephalus</i> (Fabricius, 1801)	x	x	
525	<i>Platydracus fulvipes</i> (Scopoli, 1763)	x	x	
526	<i>Platydracus latebricola</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
527	<i>Platydracus stercorarius</i> (Olivier, 1795)	x	x	
528	<i>Dinothenarus fossor</i> (Scopoli, 1771)	x	x	
529	<i>Dinothenarus pubescens</i> (DeGeer, 1774)	x	x	
530	<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798	x	x	
531	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851	x	x	
532	<i>Staphylinus erythropterus</i> Linnaeus, 1758	x	x	
533	<i>Ocypus aeneocephalus</i> (DeGeer, 1774)	x	x	
534	<i>Ocypus brunripes</i> (Fabricius, 1781)	x	x	
535	<i>Ocypus fulvipennis</i> Erichson, 1840	x	x	
536	<i>Ocypus fuscatus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
537	<i>Ocypus macrocephalus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
538	<i>Ocypus nitens</i> (Schrank, 1781)	x	x	
539	<i>Ocypus olens</i> (Müller, 1764)	x	x	
540	<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)	x	x	
541	<i>Ocypus picipennis</i> (Fabricius, 1792)	x	x	
542	<i>Ocypus tenebricosus</i> (Gravenhorst, 1846)	x	x	
543	<i>Tasgius ater</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
544	<i>Tasgius melanarius</i> (Heer, 1893)	x	x	
545	<i>Tasgius morsitans</i> (P. Rossi, 1790)	x	x	
546	<i>Tasgius pedator</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
547	<i>Tasgius winkleri</i> (Bernhauer, 1906)	x	x	
548	<i>Heterothops dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
549	<i>Heterothops minutus</i> Wollaston, 1860		x	
550	<i>Heterothops niger</i> Kraatz, 1868	x	x	
551	<i>Heterothops praeivus</i> Erichson, 1839	x	x	
552	<i>Heterothops quadripunctulus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
553	<i>Heterothops stiglundbergi</i> Israelson, 1979		x	
554	<i>Euryporus picipes</i> (Paykull, 1800)	x	x	
555	<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
556	<i>Quedius balticus</i> Korge, 1960	x	x	
557	<i>Quedius boopoides</i> Munster, 1923		x	
558	<i>Quedius boops</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
559	<i>Quedius brevicornis</i> (C. G. Thomson, 1860)	x	x	
560	<i>Quedius brevis</i> Erichson, 1840	x	x	
561	<i>Quedius cinctus</i> (Paykull, 1790)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
562	<i>Quedius cruentus</i> (Olivier, 1795)	x	x	
563	<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908	x	x	
564	<i>Quedius fulgidus</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
565	<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
566	<i>Quedius fulvicollis</i> (Stephens, 1833)	x	x	
567	<i>Quedius fumatus</i> (Stephens, 1833)	x	x	
568	<i>Quedius infuscatus</i> Erichson, 1840	x		
569	<i>Quedius invreae</i> Gridelli, 1924		x	
570	<i>Quedius lateralis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
571	<i>Quedius levicollis</i> (Brullé, 1832)	x	x	
572	<i>Quedius limbatus</i> (Heer, 1839)	x	x	
573	<i>Quedius longicornis</i> Kraatz, 1857	x	x	
574	<i>Quedius lucidulus</i> Erichson, 1839	x	x	
575	<i>Quedius maurorufus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
576	<i>Quedius maurus</i> (C. R. Sahlberg, 1830)	x	x	
577	<i>Quedius mesomelinus mesomelinus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
578	<i>Quedius mesomelinus skoraszewskyi</i> Korge, 1961		x	
579	<i>Quedius microps</i> Gravenhorst, 1847	x	x	
580	<i>Quedius molochinus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
581	<i>Quedius nemoralis</i> Baudi di Selve, 1848	x	x	
582	<i>Quedius nigriceps</i> Kraatz, 1857	x	x	
583	<i>Quedius nigrocaeruleus</i> Fauvel, 1874	x	x	
584	<i>Quedius nitipennis</i> (Stephens, 1833)	x	x	
585	<i>Quedius ochripennis</i> (Ménétriés, 1832)	x	x	
586	<i>Quedius paradisianus</i> (Heer, 1839)	x	x	
587	<i>Quedius picipes</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
588	<i>Quedius plagiatus</i> Mannerheim, 1843	x	x	
589	<i>Quedius puncticollis</i> C. G. Thomson, 1867	x	x	
590	<i>Quedius riparius</i> Kellner, 1843	x	x	
591	<i>Quedius scintillans</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
592	<i>Quedius scitus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
593	<i>Quedius suturalis</i> Kiesenwetter, 1845	x	x	
594	<i>Quedius truncicola</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856	x	x	
595	<i>Quedius umbrinus</i> Erichson, 1839	x	x	
596	<i>Quedius unicolor</i> Kiesenwetter, 1847	x		
597	<i>Quedius vexans</i> Eppelsheim, 1881	x	x	
598	<i>Quedius xanthopus</i> Erichson, 1839	x	x	
599	<i>Acylophorus glaberrimus</i> (Herbst, 1784)	x		
600	<i>Acylophorus wagenschieberi</i> Kiesenwetter, 1850		x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
601	<i>Atanygnathus terminalis</i> (Erichson, 1839)	x		
602	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
603	<i>Trichophya pilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
604	<i>Mycetoporus ambiguus</i> Luze, 1901	x	x	
605	<i>Mycetoporus baudueri</i> Mulsant & Rey, 1875	x	x	
606	<i>Mycetoporus bimaculatus</i> Lacordaire, 1835	x	x	
607	<i>Mycetoporus bosnicus</i> Luze, 1901		x	29
608	<i>Mycetoporus brucki</i> (Pandellé, 1869)	x		
609	<i>Mycetoporus clavicornis</i> (Stephens, 1832)	x	x	
610	<i>Mycetoporus corpulentus</i> Luze, 1901	x	x	
611	<i>Mycetoporus dispersus</i> Schülke & Kočian, 2000	x	x	
612	<i>Mycetoporus eppelsheimianus</i> Fagel, 1968	x	x	
613	<i>Mycetoporus erichsonanus</i> Fagel, 1965	x	x	
614	<i>Mycetoporus forticornis</i> Fauvel, 1875	x	x	
615	<i>Mycetoporus glaber</i> (Sperk, 1835)	x	x	
616	<i>Mycetoporus lepidus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
617	<i>Mycetoporus longulus</i> Mannerheim, 1830	x	x	
618	<i>Mycetoporus maerkelii</i> Kraatz, 1857	x	x	
619	<i>Mycetoporus mulsanti</i> Ganglbauer, 1895	x	x	
620	<i>Mycetoporus niger</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856	x	x	
621	<i>Mycetoporus punctus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
622	<i>Mycetoporus reichei</i> (Pandellé, 1869)	x	x	30
623	<i>Mycetoporus rufescens</i> (Stephens, 1832)	x	x	
624	<i>Ischnosoma longicorne</i> (Mäklin, 1847)	x	x	
625	<i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
626	<i>Bryoporus cernuus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
627	<i>Bryopodacis crassicornis</i> (Mäklin, 1847)		x	
628	<i>Bryopodacis rufus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
629	<i>Lordithon bicolor</i> (Gravenhorst, 1806)	x		
630	<i>Lordithon bimaculatus</i> (Schrank, 1798)		x	
631	<i>Lordithon exoletus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
632	<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1760)	x	x	
633	<i>Lordithon pulchellus</i> (Mannerheim, 1830)	x		
634	<i>Lordithon thoracicus</i> (Fabricius, 1777)	x	x	
635	<i>Lordithon trimaculatus</i> (Fabricius, 1793)	x		31
636	<i>Lordithon trinotatus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
637	<i>Carphacis striatus</i> (Olivier, 1795)	x	x	
638	<i>Bolitobius castaneus</i> (Stephens, 1832)	x	x	
639	<i>Bolitobius cingulatus</i> Mannerheim, 1830	x	x	
640	<i>Parabolitobius inclinans</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
641	<i>Parabolitobius formosus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
642	<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	32
643	<i>Sepedophilus constans</i> (Fowler, 1888)		x	
644	<i>Sepedophilus immaculatus</i> (Stephens, 1832)	x	x	
645	<i>Sepedophilus littoreus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
646	<i>Sepedophilus marshami</i> (Stephens, 1832)	x	x	
647	<i>Sepedophilus obtusus</i> (Luze, 1902)		x	
648	<i>Sepedophilus pedicularius</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
649	<i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
650	<i>Tachyporus abdominalis</i> (Fabricius, 1781)	x		
651	<i>Tachyporus atriceps</i> Stephens, 1832	x	x	
652	<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
653	<i>Tachyporus corpulentus</i> J. Sahlberg, 1876	x	x	
654	<i>Tachyporus dispar</i> (Paykull, 1789)		x	
655	<i>Tachyporus formosus</i> Matthews, 1838	x	x	
656	<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)	x	x	
657	<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	x	x	
658	<i>Tachyporus obtusus</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	
659	<i>Tachyporus pusillus</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
660	<i>Tachyporus quadriscopulatus</i> Pandellé, 1869	x	x	
661	<i>Tachyporus ruficollis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
662	<i>Tachyporus scitulus</i> Erichson, 1839	x	x	
663	<i>Tachyporus solutus</i> Erichson, 1839	x	x	
664	<i>Tachyporus tersus</i> Erichson, 1839	x	x	33
665	<i>Tachyporus transversalis</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
666	<i>Lamprinodes haematopterus</i> (Kraatz, 1857)	x	x	
667	<i>Lamprinodes saginatus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
668	<i>Lamprinodes erythropterus</i> (Panzer, 1796)	x		
669	<i>Tachinus bipustulatus</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
670	<i>Tachinus corticinus</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
671	<i>Tachinus elongatus</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
672	<i>Tachinus fimetarius</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
673	<i>Tachinus humeralis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
674	<i>Tachinus laticollis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
675	<i>Tachinus lignorum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
676	<i>Tachinus marginellus</i> (Fabricius, 1781)	x	x	
677	<i>Tachinus pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
678	<i>Tachinus proximus</i> Kraatz, 1855	x	x	
679	<i>Tachinus rufipennis</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
680	<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Tachinus signatus</i> Gravenhorst)	x	x	
681	<i>Tachinus scapularis</i> Stephens, 1832	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
682	<i>Tachinus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
683	<i>Coproporus immigrans</i> Schülke, 2006		x	34
684	<i>Cilea exilis</i> (Boheman, 1858)		x	35
685	<i>Cilea silphoides</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	
686	<i>Deinopsis erosa</i> (Stephens, 1832)	x	x	
687	<i>Gymnusa brevicollis</i> (Paykull, 1800)	x	x	
688	<i>Gymnusa variegata</i> Kiesenwetter, 1845	x	x	
689	<i>Myllaena brevicornis</i> (Matthews, 1838)	x	x	
690	<i>Myllaena dubia</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
691	<i>Myllaena elongata</i> (Matthews, 1838)		x	
692	<i>Myllaena gracilis</i> (Matthews, 1838)	x	x	
693	<i>Myllaena infuscata</i> Kraatz, 1853	x	x	
694	<i>Myllaena intermedia</i> Erichson, 1837	x	x	
695	<i>Myllaena kraatzi</i> Sharp, 1871	x	x	
696	<i>Myllaena minuta</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
697	<i>Pronomaea rostrata</i> Erichson, 1837	x		
698	<i>Oligota granaria</i> Erichson, 1837	x	x	
699	<i>Oligota inflata</i> Mannerheim, 1830	x	x	
700	<i>Oligota parva</i> Kraatz, 1862	x	x	
701	<i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858		x	
702	<i>Oligota pusillima</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
703	<i>Holobus apicatus</i> (Erichson, 1837)	x	x	
704	<i>Holobus flavicornis</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
705	<i>Cypha apicalis</i> (H. Brisout de Barneville, 1863) [= <i>Cypha nitida</i> (Palm, 1936)]	x	x	36
706	<i>Cypha discoidea</i> (Erichson, 1839)	x	x	
707	<i>Cypha laeviuscula</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
708	<i>Cypha longicornis</i> (Paykull, 1800)	x	x	
709	<i>Cypha pulicaria</i> (Erichson, 1839)	x	x	
710	<i>Cypha seminulum</i> (Erichson, 1839) [= <i>Cypha hanseni</i> (Palm, 1949)]	x	x	
711	<i>Hygronoma dimidiata</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
712	<i>Brachida exigua</i> (Heer, 1839)	x	x	
713	<i>Encephalus complicans</i> Stephens, 1832	x	x	
714	<i>Gyrophaena affinis</i> Mannerheim, 1830	x	x	
715	<i>Gyrophaena bihamata</i> C. G. Thomson, 1867	x	x	
716	<i>Gyrophaena boleti</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
717	<i>Gyrophaena congrua</i> Erichson, 1837	?		
718	<i>Gyrophaena fasciata</i> (Marsham, 1802)	x	x	
719	<i>Gyrophaena gentilis</i> Erichson, 1839	x	x	
720	<i>Gyrophaena jovi</i> Wendeler, 1924		x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
721	<i>Gyrophaena joyioides</i> Wüsthoff, 1937		x	
722	<i>Gyrophaena lucidula</i> Erichson, 1837	x	x	
723	<i>Gyrophaena manca</i> Erichson, 1839	x	x	
724	<i>Gyrophaena minima</i> Erichson, 1837	x	x	
725	<i>Gyrophaena nana</i> (Paykull, 1800)	x	x	
726	<i>Gyrophaena polita</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
727	<i>Gyrophaena pseudonana</i> Strand, 1939		x	
728	<i>Gyrophaena pulchella</i> Heer, 1839	x	x	
729	<i>Gyrophaena rousi</i> Dvůrák, 1966		x	
730	<i>Gyrophaena strictula</i> Erichson, 1839	x	x	
731	<i>Gyrophaena transversalis</i> Strand, 1939		x	
732	<i>Gyrophaena williamsi</i> Strand, 1935		x	
733	<i>Agaricochara latissima</i> (Stephens, 1832)	x	x	
734	<i>Cyphea curtula</i> (Erichson, 1837)	x	x	
735	<i>Placusa adscita</i> Erichson, 1839	x		
736	<i>Placusa atrata</i> (Mannerheim, 1831)	x	x	
737	<i>Placusa complanata</i> Erichson, 1839	x	x	
738	<i>Placusa depressa</i> Mäklin, 1845	x	x	
739	<i>Placusa pumilio</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
740	<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)	x	x	
741	<i>Homalota plana</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
742	<i>Anomognathus cuspidatus</i> (Erichson, 1839)	x	x	
743	<i>Silusa rubiginosa</i> Erichson, 1837	x	x	
744	<i>Silusa rubra</i> Erichson, 1839	x	x	
745	<i>Rhopalocerina clavigera</i> (Scriba, 1859)	x	x	
746	<i>Thecturota marchii</i> (Doderò, 1922)		x	
747	<i>Megaloscapa punctipennis</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
748	<i>Leptusa fumida</i> (Erichson, 1839)	x	x	
749	<i>Leptusa pulchella</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
750	<i>Leptusa ruficollis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
751	<i>Leptusa simoni wolfrumi</i> Lohse, 1971	x	x	
752	<i>Euryusa castanoptera</i> Kraatz, 1856	x	x	
753	<i>Euryusa coarctata</i> Märkel, 1844	x	x	37
754	<i>Euryusa optabilis</i> Heer, 1839	x	x	
755	<i>Euryusa sinuata</i> Erichson, 1837	x	x	
756	<i>Tachyusida gracilis</i> (Erichson, 1837)	x		
757	<i>Bolitochara bella</i> Märkel, 1844	x	x	
758	<i>Bolitochara lucida</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
759	<i>Bolitochara mulsanti</i> Sharp, 1875	x	x	
760	<i>Bolitochara obliqua</i> Erichson, 1837	x	x	
761	<i>Bolitochara pulchra</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
762	<i>Autalia impressa</i> (Olivier, 1795)	x	x	
763	<i>Autalia longicornis</i> Scheerpeltz, 1947		x	
764	<i>Autalia rivularis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
765	<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
766	<i>Falagria caesa</i> Erichson, 1837	x	x	
767	<i>Falagria sulcatula</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
768	<i>Myrmecocephalus concinna</i> (Erichson, 1839)		x	
769	<i>Falagrioma thoracica</i> (Curtis, 1833)	x	x	
770	<i>Anaulacaspis nigra</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
771	<i>Tachyusa balteata</i> (Erichson, 1839)	x	x	
772	<i>Tachyusa coarctata</i> (Erichson, 1937)	x	x	
773	<i>Tachyusa constricta</i> (Erichson, 1837)	x	x	
774	<i>Tachyusa scitula</i> (Erichson, 1837)	x		
775	<i>Thinonoma atra</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
776	<i>Ischnopoda leucopus</i> (Marsham, 1802)	x	x	
777	<i>Ischnopoda umbratica</i> (Erichson, 1837)	x	x	
778	<i>Dasygnypeta velata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
779	<i>Gnypeta carbonaria</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
780	<i>Gnypeta ripicola</i> (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
781	<i>Gnypeta rubrior</i> Tottenham, 1939	x	x	
782	<i>Brachyusa concolor</i> (Erichson, 1839)	x	x	
783	<i>Dacrila fallax</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
784	<i>Callicerus obscurus</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
785	<i>Callicerus rigidicornis</i> (Erichson, 1839)		x	
786	<i>Schistoglossa aubei</i> (C. N. F. Brisout de Barneville, 1860)	x	x	
787	<i>Schistoglossa curtipennis</i> (Sharp, 1869)		x	
788	<i>Schistoglossa gemina</i> (Erichson, 1837)	x	x	
789	<i>Schistoglossa viduata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
790	<i>Boreophilia hercynica</i> (Renkonen, 1936)	x	x	
791	<i>Hydrosmecta delicatula</i> (Sharp, 1869)	x		
792	<i>Hydrosmecta fluviatilis</i> (Kraatz, 1854)	x		
793	<i>Hydrosmecta fragilicornis</i> (Kraatz, 1856)	x		
794	<i>Hydrosmecta fragilis</i> (Kraatz, 1854)	x		
795	<i>Hydrosmecta longula</i> (Heer, 1839)	x	x	
796	<i>Hydrosmecta subtilissima</i> (Kraatz, 1854)	x	x	
797	<i>Aloconota appulsa</i> (Scriba, 1867)	x		
798	<i>Aloconota cambrica</i> (Wollaston, 1855)	x	x	
799	<i>Aloconota coulsoni</i> (Last, 1952)		x	
800	<i>Aloconota currax</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
801	<i>Aloconota eichhoffi</i> (Scriba, 1868)	x		

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
802	<i>Aloconota gregaria</i> (Erichson, 1839)	x	x	
803	<i>Aloconota insecta</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
804	<i>Aloconota languida</i> (Erichson, 1837)	x	x	
805	<i>Aloconota longicollis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
806	<i>Aloconota mihoki</i> (Bernhauer, 1913)		x	
807	<i>Aloconota planifrons</i> (Waterhouse, 1864)	x	x	
808	<i>Aloconota subgrandis</i> (Brundin, 1954)		x	
809	<i>Aloconota sulcifrons</i> (Stephens, 1832)	x	x	
810	<i>Enalodroma hepatica</i> (Erichson, 1839)	x	x	
811	<i>Pycnota paradoxa</i> (Mulsant & Rey, 1861)	x	x	
812	<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
813	<i>Amischa bifoveolata</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
814	<i>Amischa decipiens</i> (Sharp, 1869)		x	
815	<i>Amischa forcipata</i> Mulsant & Rey, 1873		x	
816	<i>Amischa nigrofusca</i> (Stephens, 1832)	x	x	
817	<i>Amidobia talpa</i> (Heer, 1841)	x	x	
818	<i>Lypoglossa lateralis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
819	<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
820	<i>Notothecta confusa</i> (Märkel, 1845)	x	x	
821	<i>Notothecta flavipes</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
822	<i>Lypocorrhe anceps</i> (Erichson, 1837)	x	x	
823	<i>Neohilara subterranea</i> (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
824	<i>Alaobia scapularis</i> (C. R. Sahlberg, 1831)	x	x	
825	<i>Brundinia marina</i> (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
826	<i>Brundinia meridionalis</i> (Mulsant & Rey, 1853)	x	x	
827	<i>Dochmonota clancula</i> (Erichson, 1837)	x	x	
828	<i>Ousipalia caesula</i> (Erichson, 1839)	x	x	
829	<i>Tomoglossa luteicornis</i> (Erichson, 1837)	x	x	
830	<i>Geostiba circellaris</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
831	<i>Taxicera deplanata</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
832	<i>Taxicera sericophila</i> (Baudi, 1869) (= <i>Taxicera renneri</i> Benick, 1982)	x	x	
833	<i>Dinaraea aequata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
834	<i>Dinaraea angustula</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
835	<i>Dinaraea arcana</i> (Erichson, 1839)	x	x	
836	<i>Dinaraea linearis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
837	<i>Dadobia immersa</i> (Erichson, 1837)	x	x	
838	<i>Plataraea brunnea</i> (Benick, 1935)	x	x	
839	<i>Plataraea dubiosa</i> (Benick, 1935)		x	38
840	<i>Plataraea nigrifrons</i> (Erichson, 1839)	x		
841	<i>Liogluta alpestris</i> (Heer, 1839)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
842	<i>Liogluta granigera</i> (Kiesenwetter, 1850)	x	x	
843	<i>Liogluta longiuscula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
844	<i>Liogluta micans</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
845	<i>Liogluta microptera</i> C. G. Thomson, 1867	x	x	
846	<i>Liogluta pagana</i> (Erichson, 1839)	x	x	
847	<i>Liogluta wuesthoffi</i> (Benick, 1938)	x	x	
848	<i>Atheta aegra</i> (Heer, 1841)	x	x	
849	<i>Atheta aeneicollis</i> (Sharp, 1869)	x	x	
850	<i>Atheta aeneipennis</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
851	<i>Atheta amicula</i> (Stephens, 1832)		x	
852	<i>Atheta ammanni</i> Benick, 1970		x	
853	<i>Atheta amplicollis</i> (Mulsant & Rey, 1874)		x	
854	<i>Atheta aquatica</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
855	<i>Atheta aquatilis</i> (C. G. Thomson, 1867)	x	x	
856	<i>Atheta arctica</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
857	<i>Atheta atomaria</i> (Kraatz, 1856)	x		
858	<i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	
859	<i>Atheta autumnalis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
860	<i>Atheta basicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
861	<i>Atheta benickiella</i> Brundin, 1948	x	x	
862	<i>Atheta boletophila</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	39
863	<i>Atheta boreella</i> Brundin, 1948		x	
864	<i>Atheta britanniae</i> Bernhauer & Scheerpeltz, 1926		x	
865	<i>Atheta cadaverina</i> (C. N. F. Brisout de Barneville, 1860)	x	x	
866	<i>Atheta canescens</i> (Sharp, 1869)	x	x	40
867	<i>Atheta castanoptera</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
868	<i>Atheta cauta</i> (Erichson, 1837)	x	x	
869	<i>Atheta celata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
870	<i>Atheta cinnemoptera</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
871	<i>Atheta clientula</i> (Erichson, 1839)	x	x	
872	<i>Atheta coriaria</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
873	<i>Atheta corvina</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
874	<i>Atheta crassicornis</i> (Fabricius, 1793)	x	x	
875	<i>Atheta cribrata</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
876	<i>Atheta dadopora</i> C. G. Thomson, 1867	x	x	
877	<i>Atheta debilis</i> (Erichson, 1837)	x		
878	<i>Atheta deformis</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
879	<i>Atheta dilaticornis</i> (Kraatz, 1856)	x	x	41
880	<i>Atheta diversa</i> (Sharp, 1869)		x	
881	<i>Atheta divisa</i> (Märkel, 1845)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
882	<i>Atheta ebenina</i> (Mulsant & Rey, 1873)	x	x	
883	<i>Atheta elongatula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
884	<i>Atheta episcopalis</i> Bernhauer, 1910	x	x	
885	<i>Atheta ermischii</i> Benick, 1934		x	
886	<i>Atheta europaea</i> Likovský, 1984	x	x	
887	<i>Atheta euryptera</i> (Stephens, 1832)	x	x	
888	<i>Atheta excellens</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
889	<i>Atheta fimorum</i> (C. N. F. Brisout de Berneville, 1860)	x		
890	<i>Atheta foveicollis</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
891	<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
892	<i>Atheta fungicola</i> (C. G. Thomson, 1852)	x	x	
893	<i>Atheta fungivora</i> (C. G. Thomson, 1867)	x	x	
894	<i>Atheta gagatina</i> (Baudi di Selve, 1848)	x	x	
895	<i>Atheta ganglbaueri</i> Brundin, 1948		x	
896	<i>Atheta glabricula</i> C. G. Thomson, 1867		x	
897	<i>Atheta graminicola</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
898	<i>Atheta gyllenhali</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
899	<i>Atheta hansseni</i> Strand, 1946		x	
900	<i>Atheta harwoodi</i> Williams, 1930	x	x	
901	<i>Atheta heymesii</i> Hubenthal, 1913	x	x	
902	<i>Atheta hybrida</i> (Sharp, 1869)	x	x	
903	<i>Atheta hygrobia</i> (C. G. Thomson, 1856)		x	
904	<i>Atheta hygrotopora</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
905	<i>Atheta hypnorum</i> (Kiesenwetter, 1850)	x	x	
906	<i>Atheta incognita</i> (Sharp, 1869)	x	x	
907	<i>Atheta indubia</i> (Sharp, 1869)	x	x	
908	<i>Atheta inquinula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
909	<i>Atheta intermedia</i> (C. G. Thomson, 1852)	x	x	
910	<i>Atheta ischnocera</i> C. G. Thomson, 1870		x	
911	<i>Atheta knabli</i> Benick, 1938	x		42
912	<i>Atheta kochi</i> Roubal, 1937		x	
913	<i>Atheta laevana</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
914	<i>Atheta laticeps</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
915	<i>Atheta laticollis</i> (Stephens, 1832)	x	x	
916	<i>Atheta liliputana</i> (C. N. F. Brisout de Barneville, 1860)	x	x	
917	<i>Atheta longicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
918	<i>Atheta luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
919	<i>Atheta luteipes</i> (Erichson, 1837)	x	x	
920	<i>Atheta macrocera</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
921	<i>Atheta malleus</i> Joy, 1913		x	
922	<i>Atheta marcida</i> (Erichson, 1837)	x	x	
923	<i>Atheta melanaria</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
924	<i>Atheta melanocera</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
925	<i>Atheta minuscula</i> (Brisout, 1859)		x	
926	<i>Atheta monticola</i> (C. G. Thomson, 1852)	x	x	
927	<i>Atheta mortuorum</i> C. G. Thomson, 1867	x	x	
928	<i>Atheta myrmecobia</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
929	<i>Atheta negligens</i> (Mulsant & Rey, 1873)	x	x	
930	<i>Atheta nidicola</i> (Johansen, 1914)	x	x	
931	<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
932	<i>Atheta nigripes</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
933	<i>Atheta nigrifula</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
934	<i>Atheta obliata</i> (Erichson, 1839)	x	x	
935	<i>Atheta obtusangula</i> Joy, 1913	x	x	
936	<i>Atheta occulta</i> (Erichson, 1839)	x	x	
937	<i>Atheta orbata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
938	<i>Atheta orphana</i> (Erichson, 1837)	x	x	
939	<i>Atheta palleola</i> (Erichson, 1837)	x	x	
940	<i>Atheta pallidicornis</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
941	<i>Atheta palustris</i> (Kiesenwetter, 1844)	x	x	
942	<i>Atheta paracrassicornis</i> Brundin, 1954		x	
943	<i>Atheta parapicipennis</i> Brundin, 1954		x	43
944	<i>Atheta parca</i> (Mulsant & Rey, 1873)		x	
945	<i>Atheta pervagata</i> Benick, 1975		x	
946	<i>Atheta picipes</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
947	<i>Atheta pilicornis</i> (C. G. Thomson, 1852)	x	x	
948	<i>Atheta pittionii</i> Scheerpeltz, 1950	x	x	
949	<i>Atheta procera</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
950	<i>Atheta pruinosa</i> (Kraatz, 1856) (= <i>Atheta fleischeri</i> Eppelsheim, 1892)		x	44
951	<i>Atheta puberula</i> (Sharp, 1869)	x	x	
952	<i>Atheta puncticollis</i> Benick, 1938		x	
953	<i>Atheta putrida</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
954	<i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839)	x	x	
955	<i>Atheta rhenana</i> Benick, 1965	x	x	
956	<i>Atheta ripicola</i> Hanssen, 1932	x	x	
957	<i>Atheta sequanica</i> (C. N. F. Brisout de Barneville, 1860)	x		
958	<i>Atheta serrata</i> Benick, 1938		x	
959	<i>Atheta setigera</i> (Sharp, 1869)		x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
960	<i>Atheta sodalis</i> (Erichson, 1837)	x	x	
961	<i>Atheta sordidula</i> (Erichson, 1837)	x	x	
962	<i>Atheta spatula</i> (Fauvel, 1875)		x	
963	<i>Atheta speluncicollis</i> Bernhauer, 1909		x	
964	<i>Atheta strandiella</i> Brundin, 1954	x		45
965	<i>Atheta subglabra</i> (Sharp, 1869)		x	
966	<i>Atheta subsinuata</i> (Erichson, 1839)	x		
967	<i>Atheta subtilis</i> (Scriba, 1866)	x	x	
968	<i>Atheta terminalis</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
969	<i>Atheta testaceipes</i> (Heer, 1839)	x	x	
970	<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
971	<i>Atheta trinotata</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
972	<i>Atheta vaga</i> (Heer, 1839)	x	x	
973	<i>Atheta vilis</i> (Erichson, 1837)		x	
974	<i>Atheta volans</i> (Scriba, 1859)		x	
975	<i>Atheta xanthopus</i> (C. G. Thomson, 1856)	x	x	
976	<i>Atheta zosteræ</i> (C. G. Thomson, 1856)	x		
977	<i>Acrotona aterrima</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
978	<i>Acrotona benicki</i> (Allen, 1940)		x	
979	<i>Acrotona exigua</i> (Erichson, 1837)	x		
980	<i>Acrotona muscorum</i> (C. N. F. Brisout de Barneville, 1860)	x	x	
981	<i>Acrotona obfuscata</i> (Gravenhorst, 1802)		x	
982	<i>Acrotona parens</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
983	<i>Acrotona parvula</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
984	<i>Acrotona pseudotenera</i> (Cameron, 1933)		x	46
985	<i>Acrotona pygmaea</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
986	<i>Acrotona sylvicola</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
987	<i>Acrotona troglodytes</i> (Motschulsky, 1858)		x	
988	<i>Alevonota egregia</i> (Rye, 1876)	x	x	
989	<i>Alevonota gracilentia</i> (Erichson, 1839)	x	x	
990	<i>Alevonota rufotestacea</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
991	<i>Alianta incana</i> (Erichson, 1837)	x	x	
992	<i>Pachnida nigella</i> (Erichson, 1837)	x	x	
993	<i>Trichiusa immigrata</i> Lohse, 1984		x	
994	<i>Thamiaræa cinnamomea</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
995	<i>Thamiaræa hospita</i> (Märkel, 1845)	x	x	
996	<i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787)	x	x	
997	<i>Zyras collaris</i> (Paykull, 1800)	x	x	47
998	<i>Zyras fulgidus</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
999	<i>Zyras haworthi</i> (Stephens, 1832)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
1000	<i>Pella cognata</i> (Märkel, 1842)	x	x	
1001	<i>Pella erratica</i> (Hagens, 1863)		x	
1002	<i>Pella funesta</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
1003	<i>Pella humeralis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1004	<i>Pella laticollis</i> (Märkel, 1845)	x	x	
1005	<i>Pella limbata</i> (Paykull, 1789)	x	x	
1006	<i>Pella lugens</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1007	<i>Pella similis</i> (Märkel, 1845)	x	x	
1008	<i>Myrmoezia confragosa</i> (Hochhuth, 1849)		x	
1009	<i>Myrmoezia plicata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1010	<i>Lomechusoides strumosus</i> (Fabricius, 1775)	x	x	
1011	<i>Lomechusa emarginata</i> (Paykull, 1789)	x	x	
1012	<i>Lomechusa paradoxa</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
1013	<i>Lomechusa pubicollis</i> C. N. F. Brisout de Barneville, 1860	x	x	
1014	<i>Dinarda dentata</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
1015	<i>Dinarda hagensii</i> Wasmann, 1889	x	x	
1016	<i>Dinarda maerkelii</i> Kiesenwetter, 1843	x	x	
1017	<i>Dinarda pygmaea</i> Wasmann, 1894	x		
1018	<i>Phloeopora concolor</i> (Kraatz, 1856)	x		
1019	<i>Phloeopora corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1020	<i>Phloeopora nitidiventris</i> Fauvel, 1900		x	48
1021	<i>Phloeopora scribae</i> Eppelsheim, 1884 (= <i>Phloeopora bernhaueri</i> Lohse, 1984)	x	x	
1022	<i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802) (= <i>Phloeopora opaca</i> Bernhauer, 1902)	x	x	
1023	<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
1024	<i>Rhopalotella validiuscula</i> (Kraatz, 1856)	x	x	
1025	<i>Ilyobates bennetti</i> Donisthorpe, 1914		x	
1026	<i>Ilyobates nigricollis</i> (Paykull, 1800)	x	x	
1027	<i>Ilyobates propinquus</i> (Aubé, 1850)	x	x	
1028	<i>Calodera aethiops</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1029	<i>Calodera nigrita</i> Mannerheim, 1830	x	x	
1030	<i>Calodera protensa</i> Mannerheim, 1830	x	x	
1031	<i>Calodera riparia</i> Erichson, 1837	x	x	
1032	<i>Calodera rubens</i> Erichson, 1837 [= <i>Ityocara rubens</i> (Erichson, 1837)]	x	x	
1033	<i>Calodera uliginosa</i> Erichson, 1837	x	x	
1034	<i>Tetralaucopora longitarsis</i> (Erichson, 1839)	x	x	
1035	<i>Tetralaucopora rubicunda</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1036	<i>Amarochara bonnairei</i> (Fauvel, 1865)		x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
1037	<i>Amarochara forticornis</i> (Lacordaire, 1835)	x	x	
1038	<i>Amarochara umbrosa</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1039	<i>Ocalea badia</i> Erichson, 1837	x	x	
1040	<i>Ocalea concolor</i> Kiesenwetter, 1847	x	x	
1041	<i>Ocalea picata</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1042	<i>Ocalea rivularis</i> Miller, 1852	x	x	
1043	<i>Apimela macella</i> (Erichson, 1839)	x		
1044	<i>Apimela mulsanti</i> (Ganglbauer, 1895)	x	x	
1045	<i>Meotica exilis</i> (Gravenhorst, 1906)	x	x	
1046	<i>Meotica filiformis</i> (Motschulsky, 1860)	x	x	
1047	<i>Meotica marchica</i> Benick, 1954		x	
1048	<i>Meotica pallens</i> (Redtenbacher, 1849)	x	x	
1049	<i>Cousya longitarsis</i> (C. G. Thomson, 1867) [= <i>Chilomorpha longitarsis</i> (Thomson, 1867)]	x	x	
1050	<i>Cousya nitidiventris</i> Fagel, 1958		x	
1051	<i>Ocyusa maura</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1052	<i>Ocyusa picina</i> (Aubé, 1850)	x	x	
1053	<i>Zoosetha inconspicua</i> (Erichson, 1839)		x	
1054	<i>Zoosetha rufescens</i> (Kraatz, 1856)		x	49
1055	<i>Poromniusa prociua</i> (Erichson, 1837)	x		
1056	<i>Mniusa incrassata</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	
1057	<i>Hygropora cunctans</i> (Erichson, 1837)	x		
1058	<i>Oxypoda abdominalis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
1059	<i>Oxypoda acuminata</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1060	<i>Oxypoda alternans</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1061	<i>Oxypoda annularis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
1062	<i>Oxypoda arborea</i> Zerche, 1994	x		
1063	<i>Oxypoda bicolor</i> Mulsant & Rey, 1853	x	x	
1064	<i>Oxypoda brachyptera</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1065	<i>Oxypoda brevicornis</i> (Stephens, 1832)	x	x	
1066	<i>Oxypoda carbonaria</i> (Heer, 1841)	x	x	
1067	<i>Oxypoda caucasica</i> Bernhauer, 1902	x		
1068	<i>Oxypoda doderoi</i> Bernhauer, 1902	x	x	
1069	<i>Oxypoda elongatula</i> Aubé, 1850	x	x	
1070	<i>Oxypoda exoleta</i> Erichson, 1839	x	x	
1071	<i>Oxypoda ferruginea</i> Erichson, 1839	x		
1072	<i>Oxypoda filiformis</i> Redtenbacher, 1849	x	x	
1073	<i>Oxypoda flavicornis</i> Kraatz, 1856	x	x	
1074	<i>Oxypoda formiceticola</i> Märkel, 1841	x	x	
1075	<i>Oxypoda formosa</i> Kraatz, 1856	x	x	
1076	<i>Oxypoda funebris</i> Kraatz, 1856	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
1077	<i>Oxypoda haemorrhoea</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
1078	<i>Oxypoda induta</i> Mulsant & Rey, 1861	x	x	
1079	<i>Oxypoda lentula</i> Erichson, 1837		x	
1080	<i>Oxypoda longipes</i> Mulsant & Rey, 1861	x	x	
1081	<i>Oxypoda lugubris</i> Kraatz, 1856		x	
1082	<i>Oxypoda miranda</i> Roubal, 1929		x	
1083	<i>Oxypoda mutata</i> Sharp, 1871		x	
1084	<i>Oxypoda opaca</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1085	<i>Oxypoda praecox</i> Erichson, 1839	x	x	
1086	<i>Oxypoda pratensicola</i> Lohse, 1970		x	
1087	<i>Oxypoda procerula</i> Mannerheim, 1830	x	x	
1088	<i>Oxypoda recondita</i> Kraatz, 1856	x		
1089	<i>Oxypoda rufa</i> Kraatz, 1856	x	x	
1090	<i>Oxypoda skalitzkyi</i> Bernhauer, 1902	x	x	
1091	<i>Oxypoda soror</i> C. G. Thomson, 1855	x	x	
1092	<i>Oxypoda spectabilis</i> Märkel, 1845	x	x	
1093	<i>Oxypoda tarda</i> Sharp, 1871	x	x	
1094	<i>Oxypoda testacea</i> Erichson, 1837		x	
1095	<i>Oxypoda togata</i> Erichson, 1837	x	x	
1096	<i>Oxypoda vicina</i> Kraatz, 1856	x	x	
1097	<i>Oxypoda vittata</i> Märkel, 1842	x	x	
1098	<i>Devia prospera</i> (Erichson, 1839)	x	x	
1099	<i>Stichoglossa semirufa</i> (Erichson, 1839)	x	x	
1100	<i>Ischnoglossa obscura</i> Wunderle, 1990		x	
1101	<i>Ischnoglossa proluxa</i> (Gravenhorst, 1802)	x	?	50
1102	<i>Dexiogygia corticina</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1103	<i>Homoeusa acuminata</i> (Märkel, 1842)	x	x	
1104	<i>Thiasophila angulata</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1105	<i>Thiasophila canaliculata</i> Mulsant & Rey, 1875	x	x	51
1106	<i>Thiasophila inquilina</i> (Märkel, 1845)	x		
1107	<i>Thiasophila lohsei</i> Zerche, 1987		x	
1108	<i>Thiasophila wockii</i> (Schneider, 1862)		x	
1109	<i>Crataraea suturalis</i> (Mannerheim, 1830)	x	x	
1110	<i>Haploglossa gentilis</i> (Märkel, 1845)	x	x	
1111	<i>Haploglossa marginalis</i> (Gravenhorst, 1806)	x	x	
1112	<i>Haploglossa nidicola</i> (Fairmaire, 1853)	x	x	
1113	<i>Haploglossa picipennis</i> (Gyllenhal, 1827)	x	x	
1114	<i>Haploglossa villosula</i> (Stephens, 1832)	x	x	

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Anmerkung
1115	<i>Rhomphocallus bernhaueri</i> (Saint-Claire Deville, 1907) [= <i>Haploglossa bernhaueri</i> (Saint-Claire Deville, 1907)]		x	
1116	<i>Tinotus morion</i> (Gravenhorst, 1802)	x	x	
1117	<i>Aleochara bilineata</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
1118	<i>Aleochara binotata</i> Kraatz, 1856	x	x	
1119	<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1760)	x	x	
1120	<i>Aleochara brevipennis</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
1121	<i>Aleochara cuniculorum</i> Kraatz, 1858	x		
1122	<i>Aleochara curtula</i> (Goeze, 1777)	x	x	
1123	<i>Aleochara erythroptera</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
1124	<i>Aleochara fumata</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
1125	<i>Aleochara funebris</i> Wollaston, 1864	x	x	
1126	<i>Aleochara haematoptera</i> Kraatz, 1858	x	x	
1127	<i>Aleochara haemoptera</i> Kraatz, 1856	x		
1128	<i>Aleochara inconspicua</i> Aubé, 1850	x	x	
1129	<i>Aleochara intricata</i> Mannerheim, 1830	x	x	
1130	<i>Aleochara irmgardis</i> Vogt, 1954		x	52
1131	<i>Aleochara kamila</i> Likovský, 1984	x		
1132	<i>Aleochara laevigata</i> Gyllenhal, 1810	x	x	
1133	<i>Aleochara lanuginosa</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
1134	<i>Aleochara lata</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
1135	<i>Aleochara laticornis</i> Kraatz, 1856	x		53
1134	<i>Aleochara lygaea</i> Kraatz, 1862	x	x	
1136	<i>Aleochara maculata</i> C. N. F. Brisout de Barneville, 1863	x	x	
1137	<i>Aleochara major</i> Fairmaire, 1857		x	
1138	<i>Aleochara moerens</i> Gyllenhal, 1827	x		
1139	<i>Aleochara moesta</i> Gravenhorst, 1802	x		
1140	<i>Aleochara puberula</i> Klug, 1832	x	x	
1141	<i>Aleochara ruficornis</i> Gravenhorst, 1802	x	x	
1142	<i>Aleochara sanguinea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	
1143	<i>Aleochara spadicea</i> (Erichson, 1837)	x	x	
1144	<i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839	x	x	
1145	<i>Aleochara spissicornis</i> Erichson, 1839	x	x	
1146	<i>Aleochara stichai</i> Likovský, 1965		x	
1147	<i>Aleochara tristis</i> Gravenhorst, 1806	x	x	
1148	<i>Aleochara verna</i> Say, 1836		x	
1149	<i>Aleochara villosa</i> Mannerheim, 1830	x	x	

Anmerkungen:

- 1 *Scaphisoma subalpinum*: Erstnachweis, 1 Ex. 1930, Altenburg, leg./coll. Heymes.
- 2 *Leptoplectus spinolae*: Erstnachweis, 1 Ex. 17.06.2002, Walsburg, Saale, 5436/1, Autokescherfang, leg. Weigel, coll. Apfel.
- 3 *Plectophloeus rhenanus*: Erstnachweis, 1 Ex. 11.08.2004, Rottleben, Großer Schweinskopf, 4632/1, EKL, leg. Weipert, coll. Apfel.
- 4 *Batrisodes adnexus*: Wiederfund, 1 Ex. 24.04.2010, Sachsenburg/Hainleite, Kammweg, 4632/4, Laubholzrinde, leg. Kopetz, coll. Apfel, Männchen von *Batrisodes adnexus* wurden noch nicht nördlich der Alpen gefunden. Alle Weibchen sind der Art *unisexualis*, die Besuchet beschrieben hat, zuzuordnen. Das Weibchen von Sachsenburg weicht aber von den üblichen *B. sexualis* ab, so dass es der Pselaphinenspezialist Volker Brachat auch als *B. adnexus* ansieht.
- 5 *Batrisodes venustus*: Wiederfund, 5 Ex. 10.06.2004 - 09.08.2004, Burgk/Saale, Bleiberg, 5436/3, Autokescherfang und Mulmgesiebe, leg. Apfel/Weigel, coll. Apfel // 1 Ex. 02.04.2001, NPL Hainich, Craula, Steinberg, N, 4929/1, Mulmgesiebe, leg./coll. Apfel.
- 6 *Proteimus abditus*: Erstnachweis, 1 Ex. 30.10.1988, Jena, Leutra, 5135/3, BF, leg. Malt, det. Assing.
- 7 *Micropeplus ripicola*: Erstnachweis, 16 Ex. April - Mai 1989, Eisenach, Hörselufer 5028/1, leg./coll. Apfel // 1 Ex. 08.07.2002 Flarchheim, Gottensches Holz, 4828/4, Autokescherfang, leg./coll. Apfel // 1 Ex. 25.05.1991 Neustädt/Eisenach, 5026/2, leg. Weipert, coll. NME.
- 8 *Eusphalerum brandmayri*: Erstnachweis, 6 Ex. 07.07.1901, Friedrichroda, Mordfleck, 5128/2, an *Carduus*, leg. Maaß, det. Apfel, coll. NME. Die Bestimmung wurde durch Zanetti bestätigt. 1 Ex. 15.07.1997, Theuern, NE, Bachtal, 5532/3, Gelbschale, leg. Weipert, coll. NME.
- 9 *Acrolocha sulcula*: Erstnachweis, 16 Ex. 21.09.2009, Stressenhausen, Rodach, Teichwiesen, 5630/3, in Rinderdung, leg./coll. Apfel // 2 Ex. 20.09.2012 Wenigenlupnitz, Eichenwäldchen, Pferdekot, leg. /coll. Apfel.
- 10 *Phyllocrepa puberula*: Erstnachweis, 1 Ex. 06.05.1999, Rottleben, Opferspalthöhle, 4632/1, Bodenfalle, leg. Weipert, coll. Apfel.
- 11 *Dropephylla linearis*: Erstnachweis, 1 Ex. 17.08.2011, Cossengrün, NSG Steinicht, EKL, leg. Weigel, coll. Apfel.
- 12 *Phloeonomus minimus*: Belege der Art, die Klaus Graser gemeldet hat, konnten in seiner Sammlung, die jetzt im Besitz des Museum der Natur Gotha ist, nicht gefunden werden. In Hessen wird die Art aktuelle nachgewiesen sodass ein Vorkommen in Thüringen möglich ist.
- 13 *Xylostiba bosnica*: Erstnachweis, 1 Ex. 08.06.2006, Erfurt, Walters Weiden, Sulze, 4934/4, Bodenfalle, leg. Sparmberg, coll. Apfel // 1 Ex. 12.04.1998, Dermbach, Baier, N, 5226/2, Blockhalde, Bodenfalle, leg./coll. Apfel.
- 14 *Coprophilus piceus*: Wiederfund, 1 Ex. 30.04.1992, Arnstadt, Kalkberg, 5131/3, BF, leg. Weipert, coll. Apfel // 1 Ex. 05.05.2005 Udersleben, Hämling, 4632/2, BF, leg. Weipert, coll. Apfel.
- 15 *Ochtheophilus angustior*: Erstnachweis, 2 Ex. 25.07.1999, Laucha, Lauchaufener, 5029/3, HF // 1 Ex. 22.07.2006 Eisenach, E, Rothenhof, Hörselufer, HF, alle leg. Bellstedt, det./coll. Apfel.

- 16 *Ochtheophilus praepositus*: Wegen Falschdeutung der Art: *Ochtheophilus longipennis* muss für Thüringen der Name *O. praepositus* eintreten. Der Name *O. rosenhaueri* für *O. longipennis* wurde in der Checkliste Teil 10 falsch verwendet.
- 17 *Anotylus affinis* und *Anotylus hamatus* sind identisch. Für die Art tritt der alte Name *Anotylus hamatus* ein.
- 18 *Platystethus nodifrons*: Wiederfund, 1 Ex. 27.07.2005, Nöda, Auwald, 4932/3, Gesiebe Bodenstreu, leg./coll. Apfel.
- 19 *Bledius dissimilis*: Wiederfund, 1 Ex. 07.07.2004, Schwaara/Gera, Lützetel, 5038/4, BF, leg. Weigel, coll. Apfel.
- 20 *Bledius spectabilis*: Leider muss für die Art *Bledius limicola* bzw. *Bledius germanicus* der Name *B. spectabilis* eintreten. Die Küstenart *B. spectabilis* sensu FHL 4 wird in *B. frisius* umbenannt.
- 21 *Thinobius flagellatus*: Erstfund: 1 Ex. 15.05.1953, Mühlberg/Gotha, 5130/2, leg. W. Liebmann, det. Schülke, coll. SDEI Müncheberg.
- 22 *Stenus aterrimus* Erichson, 1839 wurde von ZERCHE (2009) in einen Komplex aus 6 Arten aufgespalten. Alle neuen einschließlich der für Thüringen relevanten Arten: *Stenus pratensicola* und *Stenus polyctenicola* wurden aber zwischenzeitlich wieder eingezogen. Bei *Stenus aterrimus*, die bei Ameisen lebt, sollte weiterhin die Wirtsameise mit eingesammelt werden.
- 23 *Medon ripicola*: Wiederfund, 1 Ex. 27.09.2011 Hörschel, Hörselufer, 4927/3, BF, leg. Bellstedt, coll. Apfel.
- 24 *Scopaeus minimus*: 1 Ex. 13.05.1877 Altenburg, 5040/2, leg. Krause, coll. NME // 1 Ex. 19.09.1882 Eisenberg, NW, Beuche, 5037/1, leg. Krause, coll. NME // 1 Ex. 23.10.1910 Stotternheim, 4932/1, Maulwurfneest, leg. Bickhardt // 1 Ex. 27.05.2001 Esperstedt, Esperstedter Ried, 4633/3, leg./coll. Assing // 1 Ex. 15.05.1976 Kelbra, Numburg, Salzbach, 4531/4, leg./coll. Zerche.
- 25 *Phacophallus pallidipennis*: Erstnachweis, 1 Ex. 18.08.2003 Oberheldrungen, Hohe Schrecke, 4633/4, LF, leg. Weigel, coll. Apfel // 1 Ex. 22.08. und 1 Ex. 14.09.2012 Schönau/Hörsel, Gewerbegebiet, 5028/4, Kompostgesiebe, leg./coll. Apfel. Der erste Fund (2003) wurde vom Autor für ein immatures Exemplar von *parumpunctatus* gehalten. Erst 2012 wurde dieses Belegtier richtig erkannt.
- 26 *Rabigus pullus*: 1 Ex. 1900 Thüringen, leg. F. Strübing, coll. NME. Der Beleg wurde bei der Durchsicht der Sammlung Rapp im Naturkundemuseum Erfurt gefunden.
- 27 *Gabrius piliger*: Erstnachweis, 1 Ex. 04.05.2007 Wutha-Farnroda, Eichrodt, 5028/1, Pferdeweide an Kot, leg. / coll. Apfel // 2 Ex. 03.09.2012 Eisenach, Mariental 5027/2, an Pilzen, leg./coll. Apfel.
- 28 *Ontholestes haroldi*: Erstnachweis, 1 Ex. 15.08.2012 Schönau/Hörsel, Gewerbegebiet, Kompostgesiebe, leg./coll. Apfel
- 29 *Mycetoporus bosnicus*: Erstnachweis, 3 Ex. 13.05.- 10.06.2000 Stadtlengsfeld, Baier, 5226/2, Gesiebe, leg./coll. Apfel
- 30 *Mycetoporus reichei*: Wiederfund, 1 Ex. 14.07.2007 Wandersleben, Burg Gleichen, 5131/3, BF, leg. Kopetz, coll. Apfel. *Mycetoporus subpronus* Reitter, 1909 ist wahrscheinlich nur eine Form und keine Subspezies. Die Art wird deshalb nicht mehr aufgeführt.

- 31 *Lordithon trimaculatus*: 1 Ex. 23.08.1896 Sachsenburg/Hainleite, 4732/2, leg. Maaß, coll. NME.
- 32 *Sepedophilus bipunctatus*: *Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst, 1802) kommt in Thüringen nicht vor. Der Name wurde in der Checkliste Teil 10 verwechselt.
- 33 *Tachyporus tersus*: Wiederfund, 1 Ex. 03.06.1994 Suhl, Dreisbachtal, 5429/2, BF // 1 Ex. 21.06.1994 - 14.07.1994 Roßdorf, Nebel, 5327/1, BF, leg. Wepert, coll. Apfel.
- 34 *Coproporus immigrans*: Erstnachweis, 1 Ex. 03.08.2004 Burgk/Saale, Bleiberg, 5436/1, Mulmgesiebe, leg./coll. Apfel // 14 Ex. 30.09.2012 Schönau/Hörsel, Gewerbegebiet, Kompostgesiebe, leg./coll. Apfel.
- 35 *Cilea exilis*: Erstnachweis, 1 Ex. 06.08.2008 Gera, Heeresberg, Südhang, 5138/1, Lufttektor, leg. Weigel, coll. Apfel // 7 Ex. 20.08. - 17.09.2012 Schönau/Hörsel, Gewerbegebiet, Kompostgesiebe, leg./coll. Apfel.
- 36 *Cypha apicalis*: Erstnachweis, je 1 Ex. 20.06.2001, 06.09.2001, 25.09.2001 Weberstedt, Birkensee, 4928/2, Malaise-Falle // 1 Ex. 04.07.2001 Flarchheim, Gottersches Holz, 4828/4, Autokescherfang // 1 Ex. 04.07.2001 Weberstedt, Weberstedter Trift, 4928/2, Autokescherfang, alle leg. Apfel // 1 Ex. 17.06.2002 Pöbneck, W, Zechsteinriffe, 5335/1, Autokescherfang, leg. Weigel, alle det. Vogel, coll. Apfel.
- 37 *Euryusa coarctata*: Wiederfund, 1 Ex. 10.07.2001 Erfurt, Steiger, Lingelquartier, 5032/1, EKL, leg. Kopetz, coll. Apfel.
- 38 *Plataraea dubiosa*: Erstnachweis, je 1 Ex. 02.06.2005/01.07.2005/22.07.2004, Rottleben, Großer Schweinskopf, 4632/1, EKL, leg. Weipert, coll. Apfel.
- 39 *Atheta boletophila*: Wiederfund, 1 Ex. 29.06.2003, Burgk/Saale, Bleiberg, 5436/3, Lufttektor, leg. Kopetz, coll. Apfel.
- 40 *Atheta canescens*: Erstnachweis, 1 Ex. 18.07.2005 Apfelstädt, Apfelstädter Ried, 5131/1, Gelbschale, leg. Weipert, coll. Apfel.
- 41 *Atheta dilaticornis*: Wiederfund, 1 Ex. 03.06.2006 Marktgrörlitz, Gabes Gottes, 5434/3, BF, leg. Bellstedt, coll. Apfel.
- 42 *Atheta knabli*: leg. Kellner vor 1873, coll. Museum Berlin.
- 43 *Atheta parapicipennis*: Erstnachweis, 2 Ex. 17.08.1997 Schnellbach, Weidmannsruh, 5229/1, Fensterfalle, leg. Bellstedt, coll. Apfel // 1 Ex. 17.10.1995 Arnstadt, Gottesholz, 5131/3, Lufttektor, leg. Weigel, coll. Apfel // 1 Ex. 25.05.2007 Craula, Weberstedter Holz, 4928/2, Lufttektor, leg./coll. Apfel.
- 44 *Atheta pruinosa*: Erstnachweis, 13 Ex. 2003 - 2006: Erfurt, Roter Berg// Burg/Saale// Berka v.d.H., leg. Weipert, coll. Apfel.
- 45 *Atheta strandiella*: Benick und Lohse melden die Art für Thüringen. Genaue Funddaten sind dem Autor nicht bekannt.
- 46 *Acrotone pseudotenera*: Erstnachweis, 1 Ex. 25.04.1998 Stadtlangsfeld, Müllplatz, 5226/2, leg./coll. Apfel // 4 Ex. 15.04.2003, Eisenach, E, 5028/1, Gesiebe, leg./coll. Apfel // 1 Ex. 03.05.2005, Erfurt, Hauptfriedhof, Gesiebe, leg. Kopetz, coll. Apfel // 1 Ex. 21.06.2006 Erfurt, Roter Berg, Tongrube, Lufttektor, leg. Weipert, coll. Apfel // zahlreich 2012 Schönau/Hörsel, Gewerbegebiet, 5028/4 im Kompost, leg./coll. Apfel.

- 47 *Zyras collaris*: Wiederfund, 1 Ex. 08.08.2008, Jüchsen, Wirtswiese, 5528/2, BF, leg. Bellstedt, coll. Apfel.
- 48 *Phloeopora nitidiventris*: Erstnachweis, 1Ex. Burgk/Saale, Bleiberg, 5436/3, Auto-Kescherfang, leg./coll. Apfel.
- 49 *Zoosetha rufescens*: Erstnachweis, 1Ex. 07.06.2005 Apfelstädt, Apfelstädter Ried, 5131/1, Gelbschale, leg. Weipert, coll. Apfel.
- 50 *Ischnoglossa prolixa*: Aktuelle Nachweise erwiesen sich als *Ischnoglossa obscura*. Es ist somit nicht sicher, ob die Art in Thüringen noch vorkommt.
- 51 *Thiasophila canaliculata*: Wiederfund, 1 Ex. 27.04.2009 Eschenbergen, NE, Waldrand, 4930/4, bei Formica exsecta, leg./coll. Apfel // 68 Ex. 16.04.2008 Eschenbergen, NE, Waldrand, 4930/4, bei Formica exsecta, leg./coll. Zerche.
- 52 *Aleochara irmgardis*: Erstnachweis, 1Ex. 07.07.2003, Seega/Rhön, Buchleite, 5427/2, EKL, leg. Weigel, coll. Apfel.
- 53 *Aleochara laticornis*: Die aktuellen Funde waren nur kleine Exemplare von *A. curtula*.

Literatur

- APFEL, W. (1995): Checkliste der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten 3: 14-39.
- (1998): Ergänzung zur Checklist der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten 6: 41-43.
- (2002): Aktualisierte Checkliste der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten 10: 19-53.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (2011): Staphylinidae I. - in: FREUDE-HARDE-LOHSE-KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Zweite neubearbeitete Auflage, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, I-XII, 1-560.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (2004): Catalogue of Palaearctic Coleoptera: Vol. 2: Hydrophiloidea-Histeroidea-Staphylinidoidea. - Apollo Books, Stenstrup.
- RAPP, O. (1933-35): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Band 1-3. - Selbstverlag, Erfurt.
- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. - 1. Nachtrag (unveröff. Manuskript), Erfurt.
- ZERCHE, L. (2009): *Stenus „aterrimus“* - ein Komplex aus sechs wirtsspezifischen myrmecophilen Arten (Coleoptera: Staphylinidae; Hymenoptera: Formicidae). - Beiträge zur Entomologie 59 (2): 423-480.

Anschrift des Autors: Wolfgang Apfel
 Hellwigstraße 6
 D-99817 Eisenach
 eMail: Wolfgang.Apfel@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang

Artikel/Article: [Aktualisierte Checkliste der Kurzflügelkäfer \(Coleoptera: Staphylinidae\) Thüringens 5-38](#)