

# Kommentierte Checkliste der Microlepidoptera Thüringens

Stand: März 2013

UWE BÜCHNER, Bad Salzungen

Überarbeitete Kleinschmetterlingsfamilien:

**Micropterigidae, Eriocraniidae, Nepticulidae, Opostegidae, Heliozelidae, Adelidae, Prodoxidae, Incurvariidae, Tischeriidae, Tineidae, Lypusidae, Roeslerstammiidae, Douglasiidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Ypsolophidae, Plutellidae, Acrolepiidae, Glyphipterigidae, Heliodinidae, Bedelliidae, Lyonetiidae, Elachistidae (Elachistinae, Depressariinae, Ethmiinae, Parametriotinae), Scythrididae, Chimabachidae, Oecophoridae, Batrachedridae, Colleophoridae, Momphidae, Blastobasidae, Autostichidae, Amphisbatidae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Choreutidae, Urodidae, Schreckensteinidae, Epermeniidae, Alucitidae, Pterophoridae, Pyralidae und Crambidae**

## Einleitung

Umfangreiche Literaturrecherchen zu den Thüringer Kleinschmetterlingen und Durchsichten in alten Museumssammlungen haben viele neue Erkenntnisse zu älteren Art-nachweisen erbracht, die noch nicht in den Thüringer Checklisten aufgeführt waren. Erfreulicherweise haben Thüringer Entomologen durch Beifänge oder gezielte Suche neue und vor allem aktuelle Fundmeldungen von Kleinschmetterlingen geliefert. Dadurch ist eine Überarbeitung der Checkliste Thüringer Lepidoptera, speziell der sogenannten Kleinschmetterlinge, möglich und erforderlich geworden. In diese Liste fließen auch Nachweise aus Thüringen mit ein, die Entomologen anderer Bundesländer dem Autor gemeldet haben.

Seit Erscheinen des Verzeichnisses der Schmetterlinge Deutschlands von GAEDIKE & HEINICKE (1999), dessen Nachträge in GAEDIKE (2008 bis 2012), den Thüringer Checklisten in BUCHSBAUM (1996a, b; 1997a, b, c), BUCHSBAUM & LÖBEL (2000) und BÜCHNER (2008) sowie den Nachträgen in BUCHSBAUM (2001a, b), konnten folgende 14 Arten neu für Thüringen nachgewiesen werden:

*Micropterix osthederi* Heath, 1975; *Nemophora violellus* (Stainton, 1851); *Lampronia redimitella* (Lienig & Zeller, 1846); *Caloptilia fidella* (Reutti, 1853); *Zelleria hepariella* Stainton, 1849; *Argyresthia trifasciata* (Staudinger, 1871); *Herrichia excelsella* Staudinger, 1871; *Colleophora spiraeella* Rebel, 1916; *Cosmopterix lienigiella* (Lienig & Zeller, 1846); *Phteochoroa rugosana* (Hübner, 1799); *Ditula angustiorana* (Haworth, 1811); *Lobesia littoralis* (Humphreys & Westwood, 1854); *Mecyna lutealis* (Duponchel, 1833); *Duponchelia fovealis* Zeller, 1847.

## **Methode**

Für die Erstellung der Liste wurden 114 Publikationen ausgewertet. Angaben von GÖBEL (1859), KEFERSTEIN & WERNEBURG (1860), SCHMIDT (1860) und SCHRECK (1867, 1868) sind hier nicht berücksichtigt. Das betrifft - mit Ausnahmen - ebenso die Literaturangaben von MÖLLER (1854) und SCHLÄGER (1843, 1844/45, 1846, 1847). Fragwürdige Angaben in RAPP (1936a) konnten in den Sammlungen der Museen Erfurt und Gotha überprüft werden. Die Ergebnisse sind mit in diese Checkliste eingeflossen. Zu einigen Fundmeldungen in RAPP (1936a) besteht aber immer noch Klärungsbedarf. Die Auswertung wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Sehr aufschlußreich waren die Angaben in der Datenbank von Rolf-Peter Rommel (Ammern). Sie enthält neben seinen eigenen Aufzeichnungen auch überprüfte Meldungen von Helmut Platt (Mühlhausen), Frank Strietzel (Erfurt), die Thüringer Funde von Franz Theimer (Berlin) und Andreas Stübner (Peitz). In diese Datenbank sind auch die Aufzeichnungen von Helmut Steuer über die von ihm genitaluntersuchten Falterbelege übernommen worden. Weiterhin ist darin die Datenaufsammlung von Timm Karisch (Dessau) zu den Thüringer Cochylidae enthalten. Die Sammlung von Rolf-Peter Rommel (1945-2009) befindet sich im Naturkundemuseum Erfurt.

Von Dietger Hausenblas wurden ebenfalls aktuelle Nachweise gemeldet. Die Belegtiere zu den Meldungen von Andreas Heuer (Erfurt), Hartmut Strutzberg (Weimar) und Michael Hofmann (Eisenach) wurden durch den Autor nachbestimmt, wenn erforderlich, anhand eines Genitalpräparates. Fundmeldungen von Heidrun Melzer (Leipzig), Jens Philipp (Leipzig), und Helga Schöps (Hermsdorf) beruhen auf Angaben in der Bestimmungshilfe des Lepiforum. Die Belegexemplare von Melzer befinden sich in der Sammlung Kaiser (Leipzig). In dieser Liste wurden auch die Angaben aus der Sammlung des Autors mit berücksichtigt.

## **Arten aus der Literatur, die nicht mit in die Liste übernommen werden.**

*Stigmella filipendulae* (Wocke, 1871): BUHR (1960) führt Minenfunde von der Ochsenburg im Kyffhäuser an *Filipendulae hexapetala* auf. Die Minen können sehr leicht mit anderen *Stigmella*-Arten verwechselt werden. Belege sind nicht bekannt.

*Stigmella torminalis* (Wood, 1890): MICHEL (1960) führt Minenfunde von Erfurt an *Sorbus torminalis* auf. Die Minen können sehr leicht mit *Stigmella mespilicola* (Frey, 1856) verwechselt werden. Belege sind nicht bekannt.

*Trifurcula pallidella* (Duponchel, 1843): HAASE (1968) zitiert die Meldung von MARTINI (1916) ohne weitere Bewertung. Eine Überprüfung von Belegen ist nicht möglich. Die Meldungen von STEUER (1984) ergaben nach Überprüfung durch Nieukerken *Trifurcula beirnei* Puplesis, 1984 (siehe STEUER 1991).

*Lampronia intermediella* (Heinemann, 1870): Die Fundmeldung in RAPP (1936a) beruht auf einer Fehlbestimmung. Der Beleg befindet sich in der Sammlung Hockemeyer im Museum der Natur Gotha. Der Falter wurde (von Unbekannt) als *Incurvaria koernerella* (Zeller, 1839) bestimmt.

*Agonopterix parilella* (Treitschke, 1835) und *Elachista triatomea* (Haworth, 1828): Meldungen für diese beiden Arten in KNAPP (1887) und MARTINI (1916) sind nicht überprüfbar.

*Elachista squamosella* (Duponchel, 1843): Die Belegfalter aus der Sammlung Lenthe wurden durch Steuer überprüft (GU Nr. 3170). Die Bestimmung ergab *Elachista coeneni* Traugott-Olsen, 1985.

*Scythris seliniella* (Zeller, 1839): Die Belegtiere von Petry waren fehlbestimmt (siehe SUTTER 1994).

*Aploita palpella* (Haworth, 1828): Die Meldung von MARTINI (1916) ist nicht überprüfbar.

*Coleophora genistae* Stainton, 1857: Die Fundmeldung in RAPP (1936a) beruht auf einer Fehlbestimmung von *C. discordella* (siehe PATZAK 1969).

*Coleophora antennariella* Herrich-Schäffer, 1861: Die Meldung von MARTINI (1916) ist nicht überprüfbar. Nach PATZAK (1974) kommt die Art nur im Norden Deutschlands vor.

*Coleophora gnaphalii* Zeller, 1839: Die Meldungen von KNAPP (1887) und MARTINI (1916) sind nicht überprüfbar. Das Belegtier aus der Sammlung Petry ist nicht sicher bestimmbar (siehe PATZAK 1969).

*Coleophora linosyridella* Fuchs, 1880: Nach HOCKEMEYER (1958) beziehen sich alle Angaben in RAPP (1936a) auf *C. ramosella* Zeller, 1849.

*Coleophora nubivagella* ZELLER, 1849: Nach PATZAK (1969) sind die Falter in der Petry-Sammlung *C. galatella* M. Hering, 1942.

*Coleophora graminicollella* Heinemann, 1876: Die Meldung von MARTINI (1916) ist nicht überprüfbar.

*Cosmopterix schmidiella* Frey, 1856: Die Meldung von KNAPP (1887) ist nicht überprüfbar.

*Scrobipalpa halonella* (Herrich-Schäffer, 1854): Die Meldungen von KNAPP (1887) können nicht überprüft werden. Nach HUEMER & KARSHOLD (2010) kommt diese Art nicht in Deutschland vor.

*Scrobipalpa suaedella* (Richardson, 1893): Diese Art kommt nach GERSTBERGER (2003) nicht auf Binnensalzstellen vor. Die Meldung bei STEUER (2002) beruht auf einer Fehlbestimmung, siehe dazu auch GAEDIKE (2008).

*Klimeschiopsis kiningerella* (Duponchel, 1843): MARTINI (1916) übernimmt die Meldung von KNAPP (1887). Belege dieser montanen Art sind nicht überprüfbar.

*Caryocolum marmorea* (Haworth, 1828): Die Meldungen von MARTINI (1916) und KNAPP (1887) können wegen fehlender Belege nicht überprüft werden. Nach KARSHOLT (1995) kommt diese Art nicht in Ostdeutschland vor.

*Syncopacma albipalpella* (Herrich-Schäffer, 1854): Belege von Petry in RAPP (1936a) sind fehlbestimmt, siehe KARSHOLT (1995).

*Iwaruna biguttella* (Herrich-Schäffer, 1854): Die Meldungen von MARTINI (1916) können nicht überprüft werden. Petry, in RAPP (1936a), bezeichnet seine Bestimmung als „sehr unsicher“. KARSHOLT (1995) bestimmte die Falter aus der Petry-Sammlung als *Syncopacma patruella* (Mann, 1857) und *S. coronillella* (Treitschke, 1833).

*Cochylidia heydeniana* (Herrich-Schäffer, 1851): Die Meldung von KNAPP (1887) kann wegen fehlender Belege nicht überprüft werden. Es gibt keine weiteren Meldungen für Thüringen.

*Isotrias hybridana* (Hübner, 1817): Die Meldung von KNAPP (1887) kann wegen fehlender Belege nicht überprüft werden. Es gibt keine weiteren Meldungen für Thüringen.

*Argyroploce lediana* (Linnaeus, 1758): Die Belege Beers zu der Fundmeldung in RAPP (1936a: 59) sind fehlbestimmt. Die Nachbestimmung der drei Falter durch den Autor ergab *Argyroploce roseomaculana* (Herrich-Schäffer, 1851).

*Epinotia hungaricana* (Herrich-Schäffer, 1851): In der Sammlung Petry/ Beer wurde kein Belegtier gefunden. Zu der Fundmeldung von Beer ist sich Petry mit der Bestimmung nicht sicher, siehe RAPP (1936a: 66).

*Lamoria anella* (Denis & Schiffermüller, 1775): Die Meldungen von MÖLLER (1854) und KNAPP (1887) können nicht durch Belege überprüft werden. MARTINI (1916) und RAPP (1936a) übernehmen die Meldung von Knapp. Es besteht aber große Verwechslungsgefahr mit *Aphomia zelleri* Joannis, 1932. Diese Art wird bei KNAPP (1887) nicht angegeben.

*Ephestia mistralella* (Millière, 1874): In der Sammlung Petry/ Beer wurde kein Belegtier gefunden. Siehe auch GAEDIKE & PETERSEN (1985).

*Scoparia manifestella* (Herrich-Schäffer, 1848). Die Meldungen von Meurer für Rudolstadt in MARTINI (1916) können nicht übernommen werden. Es ist eine endemische Art der Alpen, siehe NUß (2005).

## **Aus der Thüringen-Spalte des Verzeichnisses der Schmetterlinge Deutschlands (GAEDIKE & HEINICKE 1999) zu streichende Arten**

*Eudarcia pagenstecherella* Hübner, 1825: Der angegebene Fundort in RAPP (1936a) gehört nicht zu Thüringen. Dem Autor sind keine weiteren Fundmeldungen bekannt.

*Infurcitinea roesslerella* (Heyden, 1865), *Infurcitinea argentimaculella* (Stainton, 1849), *Tinea flavescentella* Haworth, 1828, *Digitivalva arnicella* (Heyden, 1863): Zu diesen vier Arten konnten keine Fundmeldungen aus Thüringen ermittelt werden.

*Tinea pallescentella* Stainton, 1851: Der angegebene Fundort in RAPP (1936a) gehört nicht zu Thüringen. Dem Autor sind keine weiteren Fundmeldungen bekannt.

*Coleophora ledi* Stainton, 1860: Die Angabe für Thüringen in GAEDIKE & HEINICKE (1999) ist sehr unwahrscheinlich. In Thüringen gibt es die Futterpflanze der Raupe nicht.

*Xystophora pulveratella* (Herrich-Schäffer, 1854): STEUER (2002) revidiert seine Meldungen von 1998 als Fehlbestimmung. Dem Autor sind keine weiteren Fundmeldungen bekannt.

*Eudonia laetella* (Zeller, 1846): Bei GAEDIKE & HEINICKE (1999) für Thüringen von vor 1980 angegeben. Es konnten keine Fundmeldungen ermittelt werden. In BUCHSBAUM & LÖBEL (2000) (nur im Inhaltsverzeichnis und Seite 16) aus der Liste entfernt.

*Udea cyanalis* (La Harpe, 1855): Petry, in RAPP (1936a), vermutet, daß das Tier von Völker gezüchtet wurde. GAEDIKE (1980) schließt eine Fundortverwechslung nicht aus, da es sich hier um eine montane Art handelt. Es gibt keine weiteren Fundmeldungen für Thüringen.

## **Aus der Thüringen-Spalte des Verzeichnisses der Schmetterlinge Deutschlands (GAEDIKE & HEINICKE 1999) und der Checkliste Thüringens (BUCHSBAUM & LÖBEL 2000), zu streichende Arten**

*Stigmella continua* (Stainton, 1856) und *Celypha flavipalpana* (Herrich-Schäffer, 1851): STEUER (2002) revidiert seine Meldungen von 1981, bzw. 1984 und 1995 als Fehlbestimmungen. Dem Autor sind keine weiteren Fundmeldungen bekannt.

*Pelochrista mollitana* (Zeller, 1847): Der angegebene Fundort in RAPP (1936a) gehört nicht zu Thüringen. Dem Autor sind keine weiteren Fundmeldungen bekannt.

*Udea alpinalis* (Denis & Schiffermüller, 1775): In der Sammlung von Petry befinden sich Belege aus den Jahren 1902, 1909, 1910. Auf den Fundortetiketten steht eindeutig „Brockenspitze“. Die aktuelle Meldung in GAEDIKE & HEINICKE (1999) für Thüringen ist wahrscheinlich ein Übertragungsfehler. Dem Autor sind keine Funde aus Thüringen bekannt.

*Pyrausta falcatalis* Guenée, 1854: Nur in GAEDIKE & HEINICKE (1999) für Thüringen von vor 1980 angegeben. Buchsbaum in BUCHSBAUM & LÖBEL (2000) übernimmt diese Meldung allgemein für Thüringen. Dem Autor sind keine Funde aus Thüringen bekannt.

## **Aus der Checkliste Thüringens (BUCHSBAUM & LÖBEL 2000) zu streichende Arten.**

*Eriocrania chrysolepidella* Zeller, 1851: Bei allen bisherigen Angaben zu Thüringen handelt es sich um Fehlbestimmungen (SUTTER 2000).

*Blastotere amiantella* (Zeller, 1847): Für Thüringen ohne genauere Fundangaben eingetragen. Dem Autor sind keine Fundmeldungen bekannt.

*Elachista regificella* Sircom, 1849: GAEDIKE (2008) gibt an, daß Angaben unter diesem Artnamen einem Artkomplex aus *E. regificella* Sircom, 1849, *E. geminatella* (Herrich-Schäffer, 1855) und *E. tengstromi* Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001 zuzuordnen sind. Die Art *E. regificella* ist nur aus Großbritannien bekannt. Die vorhandenen Belege aus der Petry-Sammlung müssen noch überprüft werden. Die Meldungen in MARTINI (1916) und RAPP (1936a) werden nicht übernommen. Nach GAEDIKE (2008) hat Steuer sicher bestimmte Belege von *E. tengstromi*.

*Batia lunaris* (Haworth, 1828): Buchsbaum in BUCHSBAUM & LÖBEL (2000) bezieht sich auf HANNEMANN (1997). Hier wird nur allgemein Thüringen angegeben. Einzige, dem Autor bekannte Literaturzitate sind von MARTNI (1916). Die Belege sind nicht vorhanden. STEUER (1991) teilt mit, daß seine Meldung von 1984 fehlbestimmt ist. Es handelt es sich um *B. internella* Jäckh, 1972.

*Coleophora hydrolapathella* M. Hering, 1924, *Coleophora flaviella* Mann, 1857: Zu diesen zwei Arten steht nur der Name in der Liste, ohne jede Wertung. Dem Autor sind keine Fundmeldungen bekannt.

*Apodia martini* Petry, 1911: Ist ein Synonym zu *A. bifractella* (Duponchel, 1843) (GAEDIKE 2009).

*Pandemis dumetana* (Treitschke, 1835): Es konnten keine Meldungen für Thüringen ermittelt werden.

*Eucosma tripoliana* (Barrett, 1880): Nach GERSTBERGER (2003) kommt diese Art nicht auf Binnensalzstellen vor. Alle Angaben für Thüringen beruhen auf Fehlbestimmungen. Im Nachtrag von GAEDIKE (2008) wurden die Angaben korrigiert.

## Familienübersicht

Entgegen der Checkliste von BÜCHNER (2008) werden hier die Erfassungszeiträume von GAEDIKE & HEINICKE (1999) übernommen. So ist ein besserer Vergleich mit Nachträgen oder Veröffentlichungen aus anderen Bundesländern gegeben.

Die folgende Tabelle fasst den aktuellen Kenntnisstand der einzelnen Familien zusammen.

Familie	Anzahl Thüringer Arten			
	Vor 1900	Bis 1980	Ab 1981	gesamt
Micropterigidae			6	6
Eriocraniidae			6	6
Nepticulidae		43	48	91
Opostegidae		1	1	2
Heliozelidae			4	4
Adelidae		6	18	24
Prodoxidae		2	6	8
Incurvariidae		1	5	6
Tischeriidae			6	6
Tineidae,	1	7	38	46
Lypusidae		1		1
Roeslerstammiidae			2	2
Douglasiidae			4	4
Bucculatricidae		3	11	14
Gracillariidae	1	12	89	102
Yponomeutidae		11	43	54
Ypsolophidae		1	16	17
Plutellidae			4	4
Acrolepiidae		5	2	7
Glyphipterigidae		1	5	6
Heliodinidae		1		1
Bedelliidae			1	1
Lyonetiidae		1	8	9
Elachistinae		10	53	63
Depressariinae		14	49	63
Ethmiinae			5	5
Parametriotinae (Agonoxenidae)		4	4	8
Scythrididae		3	13	16
Chimabachidae			3	3
Oecophoridae		3	23	26
Batrachedridae			2	2
Colleophoridae		23	97	120
Momphidae		1	12	13

Familie	Anzahl Thüringer Arten			
	Vor 1900	Bis 1980	Ab 1981	gesamt
Blastobasidae			2	2
Autostichidae			2	2
Amphisbatidae			6	6
Cosmopterigidae		1	9	10
Gelechiidae		24	150	174
Tortricidae	2	80	317	399
Choreutidae			5	5
Urodidae		1		1
Schreckensteiniidae			1	1
Epermeniidae		3	7	10
Alucitidae		1	3	4
Pterophoridae		10	38	48
Pyraloidea	1	37	153	191
<b>Gesamt</b>	<b>4</b>	<b>306</b>	<b>975</b>	<b>1593</b>

## Artenliste

Legende:

Spalte „K&R“: Nummerierung aus der Liste KARSHOLT & RAZOWSKI (1996). Durch Veränderungen in der Systematik stehen die Zahlen nicht mehr chronologisch hintereinander.

Spalte „Taxon“: Die Artenliste und die systematische Reihenfolge wurden der Bestimmungshilfe des Lepiforum entnommen. Sie beruht auf einem Abgleich der Checkliste von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) mit der Fauna Europaea (Fauna Europaea Web Service. Last update 23 July 2012. Version 2.5. Available online at <http://www.faunaeur.org>) Die eingetragenen Synonyme wurden aus GAEDIKE & HEINICKE (1999) übernommen.

Spalte „N“: Die eingetragenen Symbole bedeuten:  
 o = Fundmeldungen vor 1900  
 + = Fundmeldungen von 1901 bis 1980  
 \* = Fundmeldungen ab 1981

Spalte „Quelle“: Es wird zu jeder Art ein glaubwürdiges Literaturzitat (Autor in Kapitälchen, Jahreszahl in Klammer) oder eine überprüfte Fundmeldung (Autor ohne Kapitälchen, Jahreszahl ohne Klammer) angegeben.

Spalte „Bemerkung“: Hier sind kurze Anmerkungen eingetragen, die die Quellenangaben ergänzen.

Spalte „A“: Ein „A“ weist auf eine Anmerkung am Ende der Tabelle hin. Die jeweilige K&R-Nummer und die Nummer der Anmerkung sind dabei identisch.

#### Allgemeine Hinweise:

Die zeitlichen Angaben von Steuer in der Spalte „Bemerkung“ sind aus den Literaturzitaten, mit den fett gedruckten Jahreszahlen, entnommen worden.

Steht in der Spalte „Quelle“ „Steuer + Jahreszahl“ und in der Spalte „Bemerkung“ eine Genitalpräparatenummer, so sind diese Angaben aus der Datenbank von R.-P. Rommel entnommen worden.

Für die Arten mit der Quellenangabe GAEDIKE & HEINICKE (1999) wurden die Fundmeldungen (ab 1981) aus dieser Arbeit übernommen. Diese Arten kommen in Thüringen vor. Dem Autor sind allerdings nur Fundmeldungen von 1901 bis 1980 bekannt. Woher die aktuellen Nachweise kommen, konnte noch nicht ermittelt werden.

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1	<b>Micropterigoidea</b>				
2	<b>Micropterigidae</b>				
3	<b>Micropterix Hübner, 1825</b>				
7	<i>caruncella</i> (Scopoli, 1763) = <i>seppella</i> Fabricius, 1777 = <i>atricapilla</i> Wocke, 1877	*	Büchner, 2010		
8	<i>aureatella</i> (Scopoli, 1763) = <i>ammanella</i> Hübner, 1813	*	STEUER (1984, 1995)		
10	<i>calthella</i> (Linnaeus, 1761) = <i>silesiaca</i> Toll, 1942	*	Rommel, 2008		
32	<i>osthelderi</i> Heath, 1975	*	Büchner, 2010		A
36	<i>schaefferi</i> Heath, 1975 = <i>anderschella</i> Hübner, 1813, sensu Herrich-Schäffer, 1851 = <i>ammanella</i> auct. nec Hübner, 1813	*	Rommel, 2006		
38	<i>tunbergella</i> (Fabricius, 1787)	*	Büchner, 2007		
45	<b>Eriocranioidea</b>				
46	<b>Eriocraniidae</b>				
	<b>Dyseriocrania Spuler 1910</b>				
48	<i>subpurpurella</i> (Haworth, 1828) = <i>fastuosella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2011		
	<b>Heringocrania Kusnezov 1941</b>				
50	<i>unimaculella</i> (Zetterstedt, 1839)	*	Rommel, 2007		
47	<b>Eriocrania Zeller, 1851</b>				
51	<i>sparrmannella</i> (Bosc, 1791)	*	SUTTER (2000) Büchner, 1997		
53	<i>cicatricella</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>purpurella</i> Haworth, 1828 = <i>haworthi</i> Bradley, 1966	*	STEUER (1984, 1995) SUTTER (2000)		
55	<i>sangii</i> (Wood, 1891)	*	STEUER (1984, 1995) SUTTER (2000)		
56	<i>semipurpurella</i> (Stephens, 1835) = <i>amentella</i> Zeller, 1850 = <i>inconspicuella</i> Wood, 1891	*	Büchner, 2000		
81	<b>Nepticuloidea</b>				
82	<b>Nepticulidae</b>				
85	<b>Enteucha Meyrick, 1915</b> = <i>Johanssonia</i> Borkowski, 1972				
86	<i>acetosae</i> (Shield, 1853)	+	MARTINI (1916)		A
87	<b>Stigmella Schrank, 1802</b> = <i>Nepticula</i> Heyden, 1843				
89	<i>lapponica</i> (Wocke, 1862)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1969	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
90	<i>confusella</i> (Wood & Walsingham, 1894)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1987	
92	<i>freyella</i> (Heyden, 1858)	*	STEUER (1995)	Nachweis 1992	
95	<i>tiliae</i> (Frey, 1856)	*	Büchner, 2009		
96	<i>betulicolla</i> (Stainton, 1856) = <i>nanivora</i> W. Petersen, 1930	+	STEUER (1984, 1995)		
98	<i>sakhalinella</i> Puplesis, 1984 = <i>distinguenda</i> auct. nec Heinemann, 1862 = <i>discidia</i> Schoorl & Wilkinson, 1986	+	STEUER (1991, 1995)		
99	<i>luteella</i> (Stainton, 1857) = <i>luteellina</i> Skala, 1941	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1969, 1978, 1980	
100	<i>glutinosae</i> (Stainton, 1858) = <i>distinguenda</i> Heinemann, 1862 = <i>rubescens</i> Heinemann, 1871 = <i>incanae</i> Skala, 1939	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1971, 1982	
101	<i>alnetella</i> (Stainton, 1856)	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1982	
102	<i>microtheriella</i> (Stainton, 1854)	+	STEUER (1984, 1995)		
103	<i>prunetorum</i> (Stainton, 1855) = <i>perpusillella</i> Herrich-Schäffer, 1855	+	STEUER (1984, 1995)		
104	<i>aceris</i> (Frey, 1857) = <i>szoecsi</i> Klimesch, 1956	+	STEUER (1984, 1995)		
105	<i>malella</i> (Stainton, 1854)	+	STEUER (1984, 1995)		
106	<i>rhamnella</i> (Herrich-Schäffer, 1860)	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1966	
109	<i>catharticella</i> (Stainton, 1853)	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1964	
110	<i>anomalella</i> (Goeze, 1783) = <i>rosella</i> Schrank, 1802 = <i>aeneella</i> Heinemann, 1862 = <i>fletcheri</i> Tutt, 1899 = <i>zermattensis</i> Weber, 1936	*	GAEDIKE (2009)	2005, leg. Stübner	
112	<i>centifoliella</i> (Zeller, 1848) = <i>hodginsoni</i> Stainton, 1884	+	STEUER (1984, 1995)		
113	<i>ulmivora</i> (Folgone, 1860) = <i>ulmifoliae</i> M. Hering, 1931 = <i>ulmicola</i> M. Hering, 1932	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1982	
116	<i>viscerella</i> (Stainton, 1853)	+	RAPP (1936b) (Harz)		A
118	<i>thuringiaca</i> (Petry, 1904) = <i>nickerli</i> Rebel, 1908	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1982	
125	<i>regiella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>corvimontana</i> M. Hering, 1935	*	Platt, 2002		
126	<i>crataegella</i> (Klimesch, 1936)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1988	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
128	<i>magdalenae</i> (Klimesch, 1950) = <i>nylandriella</i> auct. nec Tengström, 1848	+	STEUER (1984, 1995)		
129	<i>nylandriella</i> (Tengström, 1848) = <i>aucupariae</i> Frey, 1857	*	Platt, 2002		
130	<i>oxyacanthella</i> (Stainton, 1854) = <i>cotoneastri</i> Sorhagen, 1922 = <i>oxysorbi</i> Skala, 1933 = <i>oxymalella</i> Skala, 1933 = <i>mespili</i> Skala, 1941 = <i>aeneella</i> auct. nec Heinemann	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1965	
131	<i>pyri</i> (Glitz, 1865)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
132	<i>minusculella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>stettinensis</i> Heinemann, 1871 = <i>embonella</i> Klimesch, 1978	+	STEUER (1984, 1995)		
133	<i>desperatella</i> (Frey, 1856) = <i>pyricola</i> Wocke, 1877	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1973	
134	<i>hybnerella</i> (Hübner, 1813) = <i>gratiosella</i> Duponchel, 1843 = <i>ignobilella</i> Stainton, 1849	*	Steuer, 1993	GU Nr. 3965	
135	<i>mespilicolla</i> (Frey, 1856) = <i>ariella</i> Herrich-Schäffer, 1860 = <i>cotoneastri</i> sensu Klimesch, 1948	+	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1969	
136	<i>floslactella</i> (Haworth, 1828)	*	Steuer, 1992	GU Nr. 4344	
137	<i>carpinella</i> (Heinemann, 1862)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1984, 1989	
138	<i>tityrella</i> (Stainton, 1854) = <i>turicella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>hemargyrella</i> auct. nec Kollar	*	Platt, 2002		
139	<i>salicis</i> (Stainton, 1854) = <i>auritella</i> Skala, 1939 = <i>arbusculae</i> Klimesch, 1951	+	STEUER (1984, 1995)		
141	<i>myrtillella</i> (Stainton, 1857)	+	STEUER (1984, 1995)		
144	<i>obliquella</i> (Heinemann, 1862) = <i>wockeella</i> Heinemann, 1871 = <i>diversa</i> Glitz, 1872 = <i>vimineticola</i> auct. nec Frey	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1974	
146	<i>trimaculella</i> (Haworth, 1828) = <i>populella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>populicola</i> Sorhagen, 1922 = <i>subtrimaculella</i> Dufrane, 1949	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1968	
147	<i>assimilella</i> (Zeller, 1848)	+	STEUER (1984, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
148	<i>sorbi</i> (Stainton, 1861) = <i>cotoneastrella</i> Weber, 1861	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1968	
149	<i>plagicollella</i> (Stainton, 1854)	+	STEUER (1984, 1995)		
150	<i>lemniscella</i> (Zeller, 1839) = <i>marginicolella</i> Stainton, 1853 = <i>suberosella</i> Toll, 1934	+	STEUER (1984, 1995)		
152	<i>aurella</i> (Fabricius, 1775) = <i>fragariella</i> Heyden, 1862 = <i>gei</i> Wocke, 1871 = <i>nitens</i> Fologne, 1871 = <i>fruticosella</i> Müller-Rutz, 1914	*	Steuer, 1991	GU Nr. 4124	
154	<i>splendidissimella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>dulcella</i> Heinemann, 1862 = <i>fragariella</i> auct. nec Heyden	*	Platt, 2002		
155	<i>pretiosa</i> (Heinemann, 1862) = <i>bolii</i> Frey, 1873	+	MICHEL (1960)		A
157	<i>aeneofasciella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1988	
158	<i>tormentillella</i> (Herrich-Schäffer, 1860)	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1982	
161	<i>poterii</i> (Stainton, 1857) = <i>comari</i> Wocke, 1862 = <i>occultella</i> Heinemann, 1871 = <i>diffinis</i> Wocke, 1874 = <i>serella</i> Stainton, 1888	+	STEUER (1995)		
165	<i>incognitella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>pomella</i> Vaughan, 1858 = <i>mali</i> M. Hering, 1932	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1982	
166	<i>perpygmaeella</i> (Doubleday, 1859) = <i>pygmaeella</i> Haworth, 1828	*	Steuer, 1995	GU Nr. 4123	
169	<i>hemargyrella</i> (Kollar, 1832) = <i>basalella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>fagella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>fulgens</i> Stainton, 1888 = <i>fagi</i> Frey, 1856	*	Platt, 2002		
170	<i>speciosa</i> (Frey, 1857) = <i>pseudoplatanella</i> Skala, 1933	+	STEUER (1984, 1995)		
172	<i>lonicerarum</i> (Frey, 1856)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1989	
173	<i>basiguttella</i> (Heinemann, 1862)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1986	
174	<i>svenssoni</i> (Johansson, 1971)	+	STEUER (1998)	Nachweis 1968	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
178	<i>dorsiguttella</i> (Johansson, 1971)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1977	
179	<i>ruficapitella</i> (Haworth, 1828)	*	Steuer, 1985	GU Nr. 3505	
181	<i>samiatella</i> (Zeller, 1839)	*	Steuer, 1990	GU Nr. 4343	
182	<i>roborella</i> (Johansson, 1971)	*	Steuer, 1991	GU Nr. 4340	
191	<b><i>Trifurcula</i> Zeller, 1848</b> -- <i>Fedalmia</i> Beirna, 1945				
196	<i>headleyella</i> (Stainton, 1854) = <i>argyrostigma</i> Frey, 1856 = <i>dubiella</i> Hauder, 1912	*	GAEDIKE (2009)	2005, leg. Stübner	
207	<i>cryptella</i> (Stainton, 1856)	*	Brainich, 1999	det. Steuer GU Nr. 4450	
208	<i>eurema</i> (Tutt, 1899) = <i>dorycnella</i> Suire, 1928	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1984	
209	<i>ortneri</i> (Klimesch, 1951)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1987, 1989	
217	<i>subnitidella</i> (Duponchel, 1843) = <i>griseella</i> Wolff, 1957	*	NIEUKERKEN et. al. (2010)	2007, leg. Werno	
222	<i>immundella</i> (Zeller, 1839)	*	NIEUKERKEN et. al. (2010)	1984, 1989, leg. Steuer	
229	<i>beirnei</i> Puplesis, 1984 = <i>pallidella</i> auct. nec Duponchel	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1964 als <i>T. palidella</i> Zeller, 1848	
231	<b><i>Parafomoria</i> Nieukerken, 1983</b>				
234	<i>helianthemella</i> (Herrich-Schäffer, 1860)	*	Strutzberg, 2012		
238	<b><i>Bohemannia</i> Stainton, 1859</b> = <i>Scoliaula</i> Meyrick, 1895				
239	<i>pulverosella</i> (Stainton, 1849)	+	STEUER (1984, 1995)		
242	<b><i>Ectoedemia</i> Busck, 1907</b>				
244	<i>sericepeza</i> (Zeller, 1839) = <i>maryella</i> Duponchel, 1843	*	Büchner, 2009		
245	<i>louisella</i> (Sircom, 1849) = <i>sphendamni</i> M. Hering, 1937	+	STEUER (1995)		
246	<i>decentella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
253	<i>weaveri</i> (Stainton, 1855)	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
254	<i>septembrella</i> (Stainton, 1849)	*	Büchner, 2009		
260	<i>atrifrontella</i> (Stainton, 1851) = <i>heringiella</i> Doets, 1947	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1983	
261	<i>liebwerdella</i> (Zetterstedt, 1839)	*	Steuer, 1988	GU Nr. 3316	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
262	<i>longicaudella</i> Klimesch, 1953 = <i>peiuui</i> Nemes, 1972	*	Steuer, 1986	GU Nr. 3036	
268	<i>intimella</i> (Zeller, 1848)	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis von 1964 - 1971	
269	<i>hannoverella</i> (Glitz, 1872)	*	Büchner, 2010		
270	<i>turbidella</i> (Zeller, 1848) = <i>marionella</i> Ford, 1950 = <i>populialbae</i> M. Hering, 1953	+	STEUER (1984, 1995)		
273	<i>argyropeza</i> (Zeller, 1839) = <i>apicella</i> Stainton, 1854 = <i>simplicella</i> Heinemann, 1862	*	Büchner, 2010		
288	<i>albifasciella</i> (Heinemann, 1871) = <i>subapicella</i> Stainton, 1886	*	Stübner, 2005		
292	<i>subbimaculella</i> (Haworth, 1828) = <i>nigrociliella</i> Stephens, 1843 = <i>cursoriella</i> Zeller, 1848 = <i>bistrimaculella</i> Heyden, 1861	*	Büchner, 2008		
293	<i>heringi</i> (Toll, 1934) = <i>quercifoliae</i> Toll, 1937 = <i>sativella</i> Klimesch, 1936 = <i>zimmermanni</i> M. Hering, 1942	*	Büchner, 2008		
299	<i>agrimoniae</i> (Frey, 1858)	*	Büchner, 2008		
301	<i>angulifasciella</i> (Stainton, 1849) = <i>schleichiella</i> Frey, 1870 = <i>utensis</i> Weber, 1937 = <i>minorella</i> Zimmermann, 1944	+	STEUER (1984, 1995)		
302	<i>atricollis</i> (Stainton, 1857) = <i>aterrima</i> Wocke, 1865	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1976 als <i>S. aterrima</i> Wocke, 1865	
303	<i>arcuatella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	+	STEUER (1984, 1995)		
304	<i>rubivora</i> (Wocke, 1860)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1988	
305	<i>spinosella</i> (Joannis, 1908)	+	STEUER (1984, 1995)		
307	<i>occultella</i> (Linnaeus, 1767) = <i>strigilella</i> Thunberg, 1794 = <i>mediofasciella</i> Haworth, 1828 = <i>argentipedella</i> Zeller, 1839	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1981	
308	<i>minimella</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>woolhoepiella</i> Stainton, 1887 = <i>viridicola</i> Weber, 1938 = <i>medifasciella</i> auct. nec Haworth	+	STEUER (1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
309	<b>Opostegidae</b>				
314	<b><i>Opostega</i> Zeller, 1839</b>				
315	<i>salaciella</i> (Treitschke, 1833) = <i>reliquella</i> Zeller, 1848	+	STEUER (1984, 1995)		
318	<b><i>Pseudopostega</i> Kozlov, 1985</b>				
319	<i>crepusculella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2005		
321	<b>Incurvarioidea</b>				
322	<b>Heliozelidae</b>				
325	<b><i>Antispila</i> M. Hering, 1941</b>				
326	<i>metallella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>pfeifferella</i> Hübner, 1813	*	Theimer, 2007		
327	<i>treitschiella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1843) = <i>petryi</i> Martini, 1898	*	Steuer, 1992	GU Nr. 4337	
328	<b><i>Heliozela</i> Herrich-Schäffer, 1828</b>				
329	<i>sericiella</i> (Haworth, 1828) = <i>stannella</i> Fischer v. Röslerstamm, 1841 = <i>saltatricella</i> Fischer v. Röslerstamm, 1841	*	Rommel, 2005		
330	<i>resplendella</i> (Stainton, 1851)	*	Büchner, 2011	Minenfund	
335	<b>Adelidae</b>				
336	<b>Adelinae</b>				
337	<b><i>Nemophora</i> Illiger &amp; Hoffmannsegg, 1798</b>				
338	<i>degeerella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2012		
341	<i>congruella</i> (Zeller, 1839)	+	RAPP (1936a)		
342	<i>ochsenheimerella</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2012		
346	<i>metallica</i> (Poda, 1761) = <i>scabiosella</i> Scopoli, 1763 = <i>viridella</i> Hübner, 1796 = <i>aerosellus</i> Zeller, 1850	*	Rommel, 2008		
349	<i>cupriacella</i> (Hübner, 1819)	+	STEUER (1984, 1995)		
350	<i>violellus</i> (Stainton, 1851) = <i>violaria</i> Razowski, 1978	*	Platt, 2006		A
352	<i>fasciella</i> (Fabricius, 1775) = <i>schiffmillerella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	*	Platt, 2006	det. Gerstberger, coll. Rommel	
356	<i>minimella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>lenellus</i> Zeller, 1853	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1982	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
359	<i>Adela Latreille, 1796</i>				
360	<i>violella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>tombacinella</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	Platt, 2006	det. Gerstberger, coll. Rommel	
361	<i>mazzolella</i> Hübner, 1796	*	RAPP (1936a) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
365	<i>reaumurella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>viridella</i> Scopoli, 1763	*	Büchner, 2007		
366	<i>cuprella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1958	
371	<i>croesella</i> (Scopoli, 1763) = <i>sulzeriella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2012		
372	<b><i>Cauchas Zeller, 1839</i></b>				
375	<i>rufifrontella</i> (Treitschke, 1833)	+	RAPP (1936a)		
377	<i>sibulella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
378	<i>leucocerella</i> (Scopoli, 1763) = <i>bimaculella</i> Fischer v. Röslerstamm, 1840	+	RAPP (1936a)		
382	<i>rufimitrella</i> (Scopoli, 1763)	*	Büchner, 2009		
383	<b><i>Nematopogoninae</i></b>				
384	<b><i>Nematopogon Zeller, 1839</i></b>				
385	<i>pilella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	GAEDIKE (2009)	2006, leg. Stübner	
387	<i>schwarzellus</i> Zeller, 1839	*	Rommel, 2006	det. Gerstberger	
388	<i>magna</i> (Zeller, 1878)	+	STEUER (2002)	Nachweis 1972	
389	<i>adansoniella</i> (Villers, 1789) = <i>panzerella</i> Fabricius, 1794	*	Büchner, 2006		
390	<i>metaxella</i> (Hübner, 1813)	*	Gerstberger, 2002 Stübner, 2005		
391	<i>swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2005		
393	<i>robertella</i> (Clerck, 1759) = <i>pilulella</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2011		
394	<b><i>Prodoxidae</i></b>				
395	<b><i>Lampronia Stephens, 1829</i></b>				
397	<i>capitella</i> (Clerck, 1759)	*	Büchner, 1993		
398	<i>luzella</i> (Hübner, 1817)	+	Steuer (1984, 1995)	Nachweis 1969	
399	<i>corticella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>rubiella</i> Bjerkanter, 1781	*	Büchner, 2012		
400	<i>morosa</i> Zeller, 1852	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1961	
401	<i>flavimitrella</i> (Hübner, 1817)	*	Büchner, 2010		
403	<i>redimitella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Melzer, 2012		A
406	<i>rupella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2010		

K&R	TAXON	N	QUELLE	BEMERKUNGEN	A
407	<i>fuscatella</i> (Tengström, 1848) = <i>tenuicornis</i> Stainton, 1854	*	STEUER (1998)	Nachweis 1997	
417	<b>Incurvariidae</b>				
422	<b><i>Incurvaria</i> Haworth, 1828</b>				
423	<i>pectinea</i> Haworth, 1828	*	Büchner, 2010, 2011		
424	<i>musculella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>musculella</i> Fabricius, 1787	*	Büchner, 2011 Melzer, 2012		
429	<i>oehlmaniella</i> (Hübner, 1796)	*	GAEDIKE (2009)	2006, leg. Stübner	
430	<i>praelatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Sutter, 1996		
431	<i>koernerella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2011		
432	<b><i>Phylloporia</i> Heinemann, 1870</b>				
433	<i>bistrigella</i> (Haworth, 1828)	+	STEUER (1984, 1995)		
437	<b>Tischerioidea</b>				
438	<b>Tischeriidae</b>				
439	<b><i>Tischeria</i> Zeller, 1839</b>				
440	<i>ekebladella</i> (Bjerkander, 1795) = <i>complanella</i> Hübner, 1817	*	Büchner, 2010		
441	<i>dodonaea</i> Stainton, 1858	*	Büchner, 2004		
443	<b><i>Emmetia</i> Leraut, 1993</b>				
444	<i>marginea</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2010		
447	<i>heinemanni</i> (Wocke, 1871)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis von 1982 - 1991	
448	<i>gaunacella</i> (Duponchel, 1843)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1984	
449	<i>angusticolllella</i> (Duponchel, 1843)	*	Büchner, 2010		
450	<b>Tineidoidea</b>				
451	<b>Tineidae</b>				
452	<b>Myrmecozelinae</b>				
474	<b><i>Haplotinea</i> Diakonoff &amp; Hinton, 1956</b>				
475	<i>ditella</i> (Pierce & Metcalfe, 1938)	*	GAEDIKE & HEINICKE (1999)	Nachweise 1981, 1987, 1988, det. Petersen	
476	<i>insectella</i> (Fabricius, 1794)	*	Büchner, 2005		
492	<b>Meesiinae</b>				
529	<b><i>Infurcitinea</i> Spuler, 1910</b>				
545	<i>ignicomella</i> (Heydenreich, 1851)	*	ROMMEL (2005)		
565	<i>albicomella</i> (Stainton, 1851) = <i>albicomella</i> Herrich-Schäffer, 1854	+	PETERSEN (1969) GAEDIKE (1983)	Nachweis 1979	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
589	<b><i>Stenoptinea</i> Dietz, 1905</b>				
590	<i>cyaneimarmorella</i> (Millière, 1854) = <i>angustipennis</i> Herrich-Schäffer, 1854	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1976	
591	<b><i>Karsholtia</i> Gaedike, 1986</b>				
592	<i>mariannii</i> (Rebel, 1936)	*	ROMMEL (2007) GAEDIKE (2009)		
593	<b><i>Agnathosia</i> Amsel, 1954</b>				
594	<i>mendicella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>mendicella</i> Hübner, 1796 = <i>propulsatella</i> Rebel, 1892 = <i>flavimaculella</i> Toll, 1942 = <i>austriacella</i> Amsel, 1954	*	ROMMEL (2005)		
601	<b><i>Scardiinae</i></b>				
604	<b><i>Montescardia</i> Amsel, 1952</b>				
605	<i>tessulatellus</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Büchner, 2012		
608	<b><i>Morophaga</i> Herrich-Schäffer, 1853</b>				
609	<i>choragella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>boleti</i> Fabricius, 1777	*	ROMMEL (2005) Büchner, 2006		
611	<b><i>Nemapogoninae</i></b>				
612	<b><i>Triaxomera</i> Zagulajev, 1959</b>				
613	<i>fulvimitrella</i> (Sodoffsky, 1830)	*	Büchner, 2010		
617	<i>parasitella</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2012		
618	<b><i>Archinemapogon</i> Zagulajev, 1962</b>				
619	<i>yildizae</i> Koçak, 1981 = <i>laterella</i> Thunberg, 1794	*	ROMMEL (2005)		
620	<b><i>Nemaxera</i> Zagulajev, 1964</b>				
621	<i>betulinella</i> (Paykull, 1785) = <i>emortuella</i> Zeller, 1839	*	ROMMEL (2005)		
622	<b><i>Nemapogon</i> Schrank, 1802</b>				
623	<i>granella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2008		
624	<i>cloacella</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2008		
625	<i>wolfiella</i> Karsholt & Nielsen, 1976 = <i>albipunctella</i> Haworth, 1828	*	Büchner, 2011		
629	<i>inconditella</i> (D. Lucas, 1956) = <i>heydeni</i> Petersen, 1957	*	Steuer, 1996	GU Nr. 4207	
630	<i>ruricolrella</i> (Stainton, 1859)	+	STEUER (1984, 1995)		
631	<i>variatella</i> (Clemens, 1859) = <i>personela</i> Pierce & Metcalfe, 1934	*	Steuer, 1983	GU Nr. 2451	
635	<i>gliriella</i> (Heyden, 1865)	*	STEUER (1998)	Nachweis von 1996 - 1998	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
641	<i>clematella</i> (Fabricius, 1781) = <i>arcella</i> auct. nec Fabricus, 1775	+	STEUER (1984, <b>1991</b> , 1995)	Vor 20 Jahren letzter Fund	
642	<i>fungivorella</i> (Benander, 1939)	*	GAEDIKE (2010)	2009, leg. Büchner	
643	<i>picarella</i> (Clerck, 1759)	*	GAEDIKE (2009)	1999, leg. Stübner	
644	<i>nigralbella</i> (Zeller, 1839)	*	STEUER (1984, <b>1991</b> , 1995)	Seit 1989 kein Nachweis	
649	<b><i>Triaxomasia Zagulajev, 1964</i></b>				
650	<i>caprimulgella</i> (Stainton, 1851)	*	STEUER (1991)	Nachweis 1982, 1989	
655	<b>Tineinae</b>				
477	<b><i>Cephimallota Bruand, 1851</i></b>				
478	<i>praetoriella</i> (Christoph, 1872)	+	RAPP (1936a) PETERSEN (1969)		
480	<i>crassiflavella</i> Bruand, 1851 = <i>simplicella</i> Zeller, 1852	*	RAPP (1936a) PETERSEN (1969) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
660	<b><i>Trichophaga Ragonot, 1894</i></b>				
661	<i>tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 1989		
668	<b><i>Tineola Herrich-Schäffer, 1853</i></b>				
669	<i>bisselliella</i> (Hummel, 1823)	*	Büchner, 2007		
670	<b><i>Tinea Linnaeus, 1758</i></b>				
671	<i>pellionella</i> Linnaeus, 1758	*	Büchner, 2004		
674	<i>translucens</i> Meyrick, 1917 = <i>metonella</i> Pierce & Metcalfe, 1934	+	PETERSEN (1987)		
681	<i>steueri</i> G. Petersen, 1966	+	PETERSEN, GAEDIKE (1983)		
683	<i>columbariella</i> Wocke, 1877	*	Steuer, 1988	GU Nr. 3202	
686	<i>semifulvella</i> Haworth, 1828	*	Melzer, 2009		
687	<i>trinotella</i> Thunberg, 1794	*	Büchner, 2005		
688	<b><i>Niditinea Petersen, 1957</i></b>				
689	<i>fuscella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>fuscipunctella</i> Haworth, 1828	*	ROMMEL (2005) Büchner, 2007		
690	<i>striolella</i> (Matsumura, 1931) = <i>piercella</i> Bentinck, 1935	*	ROMMEL (2005)		
691	<i>truncicolella</i> (Tengström, 1848)	*	SUTTER (1988)		
699	<b><i>Monopis Hübner, 1825</i></b>				
700	<i>laevigella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>rusticella</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2011		
701	<i>weaverella</i> (Scott, 1858)	*	Büchner, 2012		

K&R	TAXON	N	Quelle	Bemerkungen	A
704	<i>obviella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>ferruginella</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2004 Behnke, 2010		
707	<i>imella</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2011		
708	<i>monachella</i> (Hübner, 1796)	*	Melzer, 2009		
711	<i>fenestratella</i> (Heyden, 1863)	*	STEUER (1991)	Nachweis 1989	
722	<b>Euplocaminae</b>				
723	<b><i>Euplocamus</i> Latreille, 1796</b>				
724	<i>anthracinalis</i> (Scopoli, 1763) = <i>fuesslinella</i> Sulzer, 1777	*	Heuer, 2011		
726	<b>Teichobiinae</b>				
727	<b><i>Psychooides</i> Bruand, 1847</b>				
728	<i>verhuella</i> Bruand, 1853 = <i>verhuellella</i> Stainton, 1854	0	RAPP (1936a)		A
740	<b>Lypusidae</b>				
741	<b><i>Lypusa</i> Zeller, 1852</b>				
742	<i>maurella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	RAPP (1936a) STEUER (1984)	Nachweis 1976	A
1027	<b>Gracillarioidea</b>				
1028	<b>Roeslerstammiidae</b>				
1029	<b><i>Roeslerstammia</i> Zeller, 1839</b>				
1030	<i>erxlebella</i> (Fabricius, 1787) = <i>erxlebeniella</i> Zeller, 1839	*	BÜCHNER (2008)		
1031	<i>pronubella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	BÜCHNER (2008)		
1032	<b>Douglasiidae</b>				
1033	<b><i>Tinagma</i> Zeller, 1839</b>				
1034	<i>perdicella</i> Zeller, 1839	*	Melzer, 2012		
1037	<i>ocnerostomella</i> (Stainton, 1850) = <i>echii</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	BÜCHNER (2008)	STEUER (1991) Nachweis 1989	
1039	<i>anchusella</i> (Benander, 1936)	*	BÜCHNER (2008)		
1040	<i>balteolella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1841) = <i>borkhauseniella</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	BÜCHNER (2008)	STEUER (1991) Nachweis 1989	
1048	<b>Bucculatricidae</b>				
1049	<b><i>Bucculatrix</i> Zeller, 1839</b>				
1052	<i>albedinella</i> (Zeller, 1839) = <i>boyerella</i> Duponchel, 1840	+	BÜCHNER (2008)		
1057	<i>argentisignella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>gracilella</i> Frey, 1860	+	BÜCHNER (2008)		
1060	<i>bechsteinella</i> (Bechstein & Scharfenberg, 1805) = <i>crataegi</i> Zeller, 1839	*	BÜCHNER (2008)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1065	<i>cidarella</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1066	<i>cristatella</i> (Zeller, 1839) = <i>imitatella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>jugicola</i> Wocke, 1877	*	Büchner, 2009, 2011		
1067	<i>demaryella</i> (Duponchel, 1840) = <i>scoticella</i> Herrich-Schäffer, 1855	+	BÜCHNER (2008)		
1070	<i>frangutella</i> (Goeze, 1783)	*	BÜCHNER (2008)		
1071	<i>gnaphaliella</i> (Treitschke, 1833)	*	BÜCHNER (2008)		
1081	<i>maritima</i> Stainton, 1851	*	Büchner, 2012		
1083	<i>nigricomella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2012		
1084	<i>noltei</i> Petry, 1912	*	Melzer, 2009		
1093	<i>thoracella</i> (Thunberg, 1794)	*	BÜCHNER (2008)		
1094	<i>ulmella</i> Zeller, 1848	*	BÜCHNER (2008)		
1095	<i>ulmifoliae</i> M. Hering, 1931	*	BÜCHNER (2008)		
1097	<b>Gracillariidae</b>				
1098	<b>Gracillariinae</b>				
1099	<b>Parectopa Clemens, 1860</b>				
1100	<i>ononidis</i> (Zeller, 1839)	*	Melzer, 2011		
1102	<b>Micrurapteryx Spuler, 1910</b>				
1104	<i>kollarisella</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1109	<b>Caloptilia Hübner, 1825</b>				
1110	<i>alchimiella</i> (Scopoli, 1763)	*	BÜCHNER (2008)		
1111	<i>azaleella</i> (Brants, 1913)	+	BÜCHNER (2008)		
1112	<i>betulicolla</i> (M. Hering, 1928)	*	BÜCHNER (2008)		
1115	<i>cuculipennella</i> (Hübner, 1796)	*	BÜCHNER (2008)		
1116	<i>elongella</i> (Linnaeus, 1761)	*	BÜCHNER (2008)		
1117	<i>falconipennella</i> (Hübner, 1813) = <i>oneratella</i> Zeller, 1847	*	BÜCHNER (2008)		
1118	<i>fidella</i> (Reutti, 1853)	*	Büchner, 2012		A
1120	<i>fribergensis</i> (Fritzsche, 1871)	o	BÜCHNER (2008)		
1122	<i>hemidactylella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	BÜCHNER (2008)		
1125	<i>populetorum</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1127	<i>robustella</i> Jäckh, 1973	*	BÜCHNER (2008)		
1128	<i>roscipennella</i> (Hübner, 1796)	+	BÜCHNER (2008)		
1129	<i>rufipennella</i> (Hübner, 1796)	*	BÜCHNER (2008)		
1130	<i>semifascia</i> (Haworth, 1828)	*	GAEDIKE (2009)	2008, leg. Stübner	A
1131	<i>stigmatella</i> (Fabricius, 1781)	*	BÜCHNER (2008)		
1132	<i>suberinella</i> (Tengström, 1848)	+	BÜCHNER (2008)		
1133	<b>Gracillaria Haworth, 1828</b>				
1135	<i>syringella</i> (Fabricius, 1794)	*	Strutzberg, 2009		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1138	<b><i>Aspilapteryx Spuler, 1910</i></b>				
1140	<i>limosella</i> (Duponchel, 1843)	*	Melzer, 2011, 2012		
1143	<i>tringipennella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2012		
1144	<b><i>Euspilapteryx Stephens, 1835</i></b>				
1145	<i>auroguttella</i> (Stephens, 1835)	*	BÜCHNER (2008)		
1146	<b><i>Calybites Hübner, 1822</i></b>				
1147	<i>phasianipennella</i> (Hübner, 1813)	*	BÜCHNER (2008)		
1148	<i>quadrisignella</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1151	<b><i>Sauterina Kuznetzov, 1979</i></b>				
1152	<i>hofmanniella</i> (Schleich, 1867)	+	BÜCHNER (2008)		
1153	<b><i>Acrocercops Wallengreen, 1881</i></b>				
1154	<i>brongniardella</i> (Fabricius, 1798)	*	Büchner, 2012		
1156	<b><i>Dialectica Walsingham, 1897</i></b>				
1157	<i>imperialella</i> (Zeller, 1847)	+	BÜCHNER (2008)		
1166	<b><i>Leucospilapteryx Spuler 1910</i></b>				
1167	<i>omissella</i> (Stainton, 1848)	*	BÜCHNER (2008)		
1168	<b><i>Ornixola Kuznetzov, 1979</i></b>				
1169	<i>caudulatella</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1170	<b><i>Callisto Stephens, 1834</i></b>				
1172	<i>denticulella</i> (Thunberg, 1794) = <i>guttea</i> Haworth, 1828	*	Strutzberg, 2011		
1174	<b><i>Parornix Spuler, 1910</i></b>				
1178	<i>anglicella</i> (Stainton, 1850)	*	BÜCHNER (2008)		
1179	<i>anguliferella</i> (Zeller, 1847)	+	BÜCHNER (2008)		
1181	<i>betulae</i> (Stainton, 1854)	*	BÜCHNER (2008)		
1182	<i>carpinella</i> (Frey, 1863)	*	BÜCHNER (2008)		
1184	<i>devoniella</i> (Stainton, 1850) = <i>avellanaella</i> Stainton, 1854	*	BÜCHNER (2008)		
1186	<i>fagivora</i> (Frey, 1861)	*	BÜCHNER (2008)		
1187	<i>finitimella</i> (Zeller, 1850)	*	BÜCHNER (2008)		
1197	<i>scoticella</i> (Stainton, 1850) = <i>sauberiella</i> Sorhagen, 1886	*	BÜCHNER (2008)		
1200	<i>torquillella</i> (Zeller, 1850)	*	BÜCHNER (2008)		
1202	<b>Lithocolletinae</b>				
1203	<b><i>Phyllonorycter Hübner, 1822</i></b> = <i>Lithocolleris</i> Hübner, [1825]				
1206	<i>acerifoliella</i> (Zeller, 1839) = <i>sylvella</i> Haworth, 1828	*	BÜCHNER (2008)		
1208	<i>agilella</i> (Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)		
1213	<i>anderidae</i> (W. Fletcher, 1885)	*	BÜCHNER (2008)		
1214	<i>apparella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	*	BÜCHNER (2008)	STEUER (1984) Nachweis 1983	

K&R	TAXON	N	QUELLE	BEMERKUNGEN	A
1220	<i>blancardella</i> (Fabricius, 1781) = <i>pyrariella</i> Tutt, 1898 = <i>concomitella</i> Banks, 1899	*	BÜCHNER (2008)		
1223	<i>cavella</i> (Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)	Steuer, 1988	
1232	<i>comparella</i> (Duponchel, 1843) = <i>cerrutiella</i> Hartig, 1952	*	BÜCHNER (2008)		
1233	<i>connexella</i> (Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)		
1234	<i>coryli</i> (Nicelli, 1851)	*	BÜCHNER (2008)		
1235	<i>corylifoliella</i> (Hübner, 1796) = <i>betulae</i> Zeller, 1839	*	BÜCHNER (2008)		
1236	<i>cydoniella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>gregori</i> Povolny, 1949	+	BÜCHNER (2008)		
1240	<i>distentella</i> (Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)		
1241	<i>dubitella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>jäckhi</i> M. Hering, 1954	*	BÜCHNER (2008)		
1242	<i>emberizaepenella</i> (Bouché, 1855) = <i>emberizaepennella</i> Duponchel, 1843	*	BÜCHNER (2008)		
1244	<i>esperella</i> (Goeze, 1783) = <i>quinnata</i> Geoffroy, 1785 = <i>carpinicolella</i> Stainton, 1851	*	BÜCHNER (2008)		
1246	<i>fraxinella</i> (Zeller, 1846)	+	BÜCHNER (2008)		
1247	<i>froelichiella</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1248	<i>geniculella</i> (Ragonot, 1874)	*	BÜCHNER (2008)		
1253	<i>harrisella</i> (Linnaeus, 1761) = <i>cramerella</i> Fabricius, 1777 = <i>tenella</i> Duponchel, 1843	*	BÜCHNER (2008)		
1254	<i>heegeriella</i> (Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)		
1257	<i>hilarella</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>spinolella</i> Duponchel, 1840	*	BÜCHNER (2008)		
1259	<i>insignitella</i> (Zeller, 1846)	*	Melzer, 2009, 2011		
1261	<i>issikii</i> (Kutmata, 1963)	*	BÜCHNER (2008)		
1263	<i>junoniella</i> (Zeller, 1846)	*	Büchner, 2009, 2010		
1265	<i>kleemannella</i> (Fabricius, 1791)	*	BÜCHNER (2008)		
1267	<i>lantanella</i> (Schrank, 1802)	*	BÜCHNER (2008)		
1268	<i>lautella</i> (Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)		
1269	<i>leucographella</i> (Zeller, 1850)	*	BÜCHNER (2008)		
1270	<i>maestingella</i> (Müller, 1764) = <i>faginella</i> Zeller, 1846	*	BÜCHNER (2008)		
1272	<i>medicaginella</i> (Gerasimov, 1930)	*	BÜCHNER (2008)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1273	<i>mespilella</i> (Hübner, 1805) = <i>pomifoliella</i> Zeller, 1839 = <i>torminella</i> Frey, 1856 = <i>pyrivorella</i> Bankes, 1899	*	Büchner, 2008, 2011		
1274	<i>messaniella</i> (Zeller, 1839)	+	BÜCHNER (2008)		
1277	<i>muelleriella</i> (Zeller, 1839) = <i>amyotella</i> Duponchel, 1840	*	Strutzberg, 2008		
1279	<i>nicellii</i> (Stainton, 1851)	*	BÜCHNER (2008)		
1280	<i>nigrescentella</i> (Logan, 1851)	*	BÜCHNER (2008)		
1282	<i>oxyacanthae</i> (Frey, 1856)	*	BÜCHNER (2008)		
1285	<i>pastorella</i> (Zeller, 1846)	+	BÜCHNER (2008)		
1287	<i>platani</i> (Staudinger, 1870)	*	BÜCHNER (2008)		
1288	<i>platanoidella</i> (Johannis, 1920) = <i>sylvella</i> auct.	*	BÜCHNER (2008)		
1289	<i>populifoliella</i> (Treitschke, 1833)	*	BÜCHNER (2008)		
1292	<i>quercifoliella</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1294	<i>rajella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>microdactylella</i> (Dennis & Schiffermüller, 1775) = <i>alnifoliella</i> Hübner, 1796 = <i>alniella</i> Zeller, 1846	*	BÜCHNER (2008)		
1297	<i>roboris</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1299	<i>sagitella</i> (Bjerkander, 1790) = <i>tremulae</i> Zeller, 1846	*	BÜCHNER (2008)		
1300	<i>salicicollella</i> (Sircom, 1848)	*	BÜCHNER (2008)	STEUER (1991) Nachweis 1982, 1986	
1301	<i>salictella</i> (Zeller, 1846) = ssp. <i>vimiella</i> Sircom, 1848	*	BÜCHNER (2008)		
1302	<i>saportella</i> (Duponchel, 1840) = <i>hortella</i> auct. nec Fabricius	+	BÜCHNER (2008)		
1304	<i>scabiosella</i> (Douglas, 1853)	*	Büchner, 2011		
1305	<i>schreberella</i> (Fabricius, 1781)	*	Büchner, 2009, 2010		
1307	<i>scopariella</i> (Zeller, 1846)	*	Büchner, 2010		
1308	<i>sorbi</i> (Frey, 1855) = <i>padella</i> Glitz, 1863	*	BÜCHNER (2008)		
1310	<i>spinicollella</i> Zeller, 1846 = <i>pomonella</i> auct. nec Zeller, 1846 = <i>deflexella</i> Stainton, 1851 = <i>mahalebella</i> Mühlig, 1863 = <i>persicella</i> Steudel, 1882	*	BÜCHNER (2008)		
1310 a	<i>cerasicollella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	*	Büchner, 2005		A

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1312	<i>stettinensis</i> (Nicelli, 1852) = <i>desertella</i> Gregor & Povolny, 1949	*	BÜCHNER (2008)		
1313	<i>strigulatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	BÜCHNER (2008)		
1317	<i>tenerella</i> (Joannis, 1915) = <i>tenella</i> Zeller, 1846	*	BÜCHNER (2008)		
1322	<i>tristrigella</i> (Haworth, 1828)	*	BÜCHNER (2008)		
1326	<i>ulmifoliella</i> (Hübner, 1817)	*	BÜCHNER (2008)		
1327	<i>viminetorum</i> (Stainton, 1874)	+	BÜCHNER (2008)		
	<b><i>Macrosaccus</i> Davis &amp; De Prins, 2011</b>			DAVIS & DE PRINS (2011)	
1296	<i>robinella</i> (Clemens, 1859)	*	BÜCHNER (2008)		
1329	<b><i>Cameraria</i> Chapman, 1902</b>				
1330	<i>ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	*	BÜCHNER (2008)		
1331	<b><i>Phylloconistinae</i></b>				
1332	<b><i>Phylloconistis</i> Zeller, 1848</b>				
1335	<i>labyrinthella</i> (Bjerkander, 1790) = <i>sorhageniella</i> Lueders, 1900	*	BÜCHNER (2008)		
1336	<i>salina</i> (Zeller, 1839)	*	BÜCHNER (2008)		
1337	<i>unipunctella</i> (Stephens, 1834) = <i>suffusella</i> Zeller, 1839	*	Strutzberg, 2010		
1340	<b><i>Yponomeutoidea</i></b>				
1341	<b><i>Yponomeutidae</i></b>				
1342	<b><i>Scythropiinae</i></b>				
1343	<b><i>Scythropia</i> Hübner, 1825</b>				
1344	<i>crataegella</i> (Linnaeus, 1767)	*	Büchner, 1994, 2011		
1345	<b><i>Yponomeutinae</i></b>				
1346	<b><i>Yponomeuta</i> Latreille, 1796</b>				
1347	<i>evonymella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>padi</i> Zeller, 1844	*	Rommel, 2008		
1348	<i>padella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>variabilis</i> Zeller, 1844	*	Büchner, 2002		
1349	<i>malinellus</i> Zeller, 1838	+	STEUER (1984, 1995)		
1350	<i>cagnagella</i> (Hübner, 1813) = <i>cagnatella</i> Hübner, 1822 = <i>cognatella</i> Treitschke, 1832	*	Büchner, 2012		
1352	<i>rorrella</i> (Hübner, 1796)	+	STEUER (1984, 1995)		
1353	<i>irrorella</i> (Hübner, 1796)	+	STEUER (1984, 1995)		
1354	<i>plumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2010, 2012		
1355	<i>sedella</i> Treitschke, 1833 = <i>vigintipunctata</i> Retzius, 1783	*	Büchner, 2002		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1358	<b><i>Zelleria Stainton, 1849</i></b>				
1359	<i>hepariella</i> Stainton, 1849	*	Melzer, 2009, 2010		A
1363	<b><i>Euhyponeuteoides Gaj, 1954</i></b> = <i>Nordmanniana</i> Friese, 1960				
1365	<i>ribesiella</i> (Joannis, 1900)	+	RAPP (1936a)		
1397	<b><i>Pseudoswammerdamia Friese, 1960</i></b>				
1398	<i>combinella</i> (Hübner, 1786)	*	Rommel, 2008		
1399	<b><i>Swammerdamia Hübner, 1825</i></b>				
1400	<i>caesiella</i> (Hübner, 1796) = <i>heroldella</i> Hübner, 1825	*	Büchner, 2008, 2011		
1402	<i>pyrella</i> (Villers, 1789) = <i>cerasiella</i> Hübner, 1913	*	Büchner, 2008, 2011		
1402 a	<i>compunctella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>nebulosella</i> Stainton, 1870	*	Büchner, 2011		
1403	<b><i>Paraswammerdamia Friese, 1960</i></b>				
1404	<i>albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805) = <i>spiniella</i> Hübner, 1809	*	Büchner, 2011		
1405	<i>ruthiella</i> Steuer, 1993	+	STEUER (1995)		
1408	<i>lutarea</i> Haworth, 1828 = <i>nebulella</i> Goeze, 1783, nec Denis & Schiffermüller, 1775 = <i>oxyacanthella</i> Duponchel, 1842	*	Strutzberg, 2011		
1410	<b><i>Cedestis Zeller, 1839</i></b>				
1411	<i>gysseleniella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2006		
1412	<i>subfasciella</i> (Stephens, 1834) = <i>farinatella</i> Zeller, 1840	*	Büchner, 2011		
1415	<b><i>Ocnerostoma Zeller, 1847</i></b>				
1416	<i>piniariella</i> Zeller, 1847 = <i>copiosellum</i> Frey, 1847	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1417	<i>friesei</i> Svensson, 1966	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1418	<b><i>Niphonympha Meyrick, 1914</i></b>				
1419	<i>dealbatella</i> (Zeller, 1847) = <i>albella</i> Zeller, 1847	*	Rommel, 2002		
1420	<b><i>Praydinae</i></b>				
1421	<b><i>Atemelia Herrich-Schäffer, 1853</i></b>				
1422	<i>torquatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	+	MARTINI (1916) RAPP (1936a)		A
1423	<b><i>Prays Hübner, 1825</i></b>				
1424	<i>fraxinella</i> (Bjerkander, 1784) = <i>curtisella</i> Donovan, 1793	*	Büchner, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1425	<i>ruficeps</i> (Heinemann, 1854) = <i>rustica</i> Haworth, 1828, nom. praeocc. = <i>simplicella</i> Herrich-Schäffer 1851	*	Theimer, 2007		
1430	<b>Argyresthiinae</b>				
1431	<b>Argyresthia Hübner, 1825</b> = <i>Blastotere</i> Ratzeburg, 1840				
1433	<i>laevigatella</i> (Heydenreich, 1851) = <i>atmoriella</i> Bankes, 1896	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1434	<i>illuminatella</i> Zeller, 1839	+	STEUER (1984)		
1435	<i>glabratella</i> (Zeller, 1847)	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1437	<i>bergiella</i> (Ratzeburg, 1840) = <i>certella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2010		
1440	<i>praecocella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2010		
1441	<i>arceuthina</i> Zeller, 1839 = <i>argentella</i> Linnaeus, 1761 nec Clerck, 1759	*	Büchner, 2010		
1442	<i>trifasciata</i> (Staudinger, 1871)	*	Büchner, 1993, 2004 - 2006		A
1445	<i>thuiella</i> (Packard, 1871)	*	GRAF et. al. (2001) GAEDIKE (2008)		
1447	<i>dilectella</i> Zeller, 1847	+	STEUER (1984, 1995)		
1449	<i>abdominalis</i> Zeller, 1839 = <i>helvetica</i> Heinemann, 1877	*	Büchner, 2010 Strutzberg, 2010		
1450	<i>aurulentella</i> Stainton, 1849	+	STEUER (1984, 1995)		
1452	<i>ivella</i> (Haworth, 1828) = <i>andereggeriella</i> Duponchel, 1838	+	RAPP (1936a)		
1453	<i>brockeella</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2010, 2012		
1454	<i>goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Schöps, 2012		
1455	<i>pygmaeella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>rudolphella</i> Esper, 1791	*	Büchner, 1994, 1995		
1456	<i>sorbiella</i> (Treitschke, 1833)	*	Steuer, 1981	GU Nr. 2240	
1458	<i>curvella</i> (Linnaeus, 1761) = <i>arcella</i> Fabricius, 1776 = <i>cornella</i> auct.	*	Büchner, 2012		
1459	<i>retinella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2012		
1460	<i>fundella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1835)	+	STEUER (1984, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1461	<i>glaucinella</i> Zeller, 1839	*	GAEDIKE (2009)	1999, leg. Stübner	
1462	<i>spinosella</i> Stainton, 1849 = <i>mendica</i> auct.	*	Büchner, 2011		
1463	<i>conjugella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2012		
1464	<i>pulchella</i> Lienig & Zeller, 1846	*	GAEDIKE, HEINICKE (1999)		
1465	<i>semifusca</i> (Haworth, 1828) = <i>spiniella</i> Zeller, 1839	*	Rommel, 2006		
1466	<i>pruniella</i> (Clerck, 1759) = <i>ephippella</i> Fabricius, 1777	*	Büchner, 2010		
1467	<i>bonnetella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>curvella</i> Linnaeus, 1758 = <i>tetrapodella</i> Linnaeus, 1767 = <i>nitidella</i> Fabricius, 1787	*	Büchner, 2012		
1468	<i>albistria</i> (Haworth, 1828) = <i>fagetella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2010		
1469	<i>semitestacella</i> (Curtis, 1833)	*	Büchner, 2009		
1475	<b>Ypsolophidae</b>				
1476	<b>Ypsolophinae</b>				
1479	<i>Ypsolopha</i> Latreille, 1796 = <i>Ypsolophus</i> Fabricius, 1798 = <i>Cerostoma</i> Latreille, 1802 = <i>Theristis</i> Hübner, 1826				
1480	<i>mucronella</i> (Scopoli, 1763) = <i>caudella</i> Linnaeus, 1767	*	Melzer, 2009		
1481	<i>nemorella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Rommel, 2006		
1482	<i>dentella</i> (Fabricius, 1775) = <i>xylostella</i> auct. nec Linnaeus	*	Büchner, 2009		
1483	<i>falcella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Melzer, 2007, 2009		
1484	<i>asperella</i> (Linnaeus, 1761)	*	Rommel, 2008		
1486	<i>scabrella</i> (Linnaeus, 1761)	*	Büchner, 2007		
1488	<i>horridella</i> (Treitschke, 1835)	*	Melzer, 2009		
1489	<i>lucella</i> (Fabricius, 1775) = <i>antennella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2005		
1491	<i>alpella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2003, 2004		
1492	<i>sylvella</i> (Linnaeus, 1767)	*	Rommel, 2004		
1493	<i>parenthesella</i> (Linnaeus, 1761) = <i>costella</i> Fabricius, 1775	*	Büchner, 2011		
1494	<i>ustella</i> (Clerck, 1759) = <i>radiatella</i> Donovan, 1794	*	Melzer, 2009 Büchner, 2010		
1495	<i>sequella</i> (Clerck, 1759)	*	Büchner, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1496	<i>vittella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Rommel, 2004		
1515	<b>Ochsenheimeriinae</b>				
1516	<b><i>Ochsenheimeria</i> Hübner, 1825</b>				
1520	<i>taurella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>mediopectinella</i> Haworth, 1828 = <i>birdella</i> Curtis, 1831	+	SUTTER (1997)		
1521	<i>urella</i> Fischer v. Röslerstamm, 1842 = <i>bisontella</i> Lienig & Zeller, 1846	*	Büchner, 2001		
1522	<i>vacculella</i> Fischer v. Röslerstamm, 1842 = <i>danilevskii</i> Zagulajev, 1872	*	Büchner, 1997		
1523	<b>Plutellidae</b>				
1524	<b><i>Plutella</i> Schrank, 1802</b>				
1525	<i>xylostella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>maculipennis</i> Curtis, 1832	*	Büchner, 2012		
1528	<i>porrectella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2010		
1532	<b><i>Rhigognostis</i> Staudinger, 1857</b> = <i>Caunaeca</i> Wallengren, 1880 = <i>Subeidophasa</i> Weber, 1938				
1537	<i>incarnatella</i> (Steudel, 1873)	*	Büchner, 2009		
1543	<b><i>Eidophasia</i> Stephens, 1842</b>				
1544	<i>messingiella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1840)	*	Büchner, 2009		
1548	<b>Acrolepiidae</b>				
1549	<b><i>Digitivalva</i> Gaedike, 1970</b>				
1550	<i>valeriella</i> (Snellen, 1878)	+	GAEDIKE (1970)		
1552	<i>reticulella</i> (Hübner, 1796) = <i>cariosella</i> Treitschke, 1835	+	GAEDIKE (1970)		
1555	<i>perlepidella</i> (Stainton, 1849)	+	GAEDIKE (1970)		
1556	<i>pulicariae</i> (Klimesch, 1956)	+	GAEDIKE (1970)		
1562	<i>granitella</i> (Treitschke, 1833)	+	GAEDIKE (1970)		
1564	<b><i>Acrolepiopsis</i> Gaedike, 1970</b>				
1565	<i>assetella</i> (Zeller, 1839) = <i>vigliella</i> Duponchel, 1842 = <i>betulella</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2006		
1571	<b><i>Acrolepia</i> Curtis, 1838</b>				
1572	<i>autumnitella</i> Curtis, 1838 = <i>pygmeana</i> Haworth, 1811	*	Schöps, 2010		
1573	<b>Glyphipterigidae</b>				
1574	<b>Orthoteliinae</b>				
1575	<b><i>Orthotelia</i> Stephens, 1834</b>				
1576	<i>spanganella</i> (Thunberg, 1788)	*	Rommel, 2003		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1577	<b>Glyphipteriginae</b>				
1578	<b><i>Glyphipterix</i> Hübner, 1825</b>				
1580	<i>thrasonella</i> (Scopoli, 1763)	*	Büchner, 2002, 2005		
1581	<i>bergstraesserella</i> (Fabricius, 1781) = <i>pietruskii</i> Nowicki, 1864 = <i>altiorella</i> Bauer, 1923	*	Rommel, 2007		
1587	<i>equitella</i> (Scopoli, 1763) = <i>majorella</i> Heinemann & Wocke, 1870 = <i>minorella</i> Snellen, 1882 = <i>zermattensis</i> Amsel, 1933 = <i>sexguttella</i> Toll, 1936	+	MATINI (1916) RAPP (1936a)		A
1592	<i>försterella</i> (Fabricius, 1781) = <i>oculatella</i> Zeller, 1850	*	Strutzberg, 2010		
1594	<i>simpliciella</i> (Stephens, 1834) = <i>conjunctella</i> O.G. Costa, 1834 = <i>fischerella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2010		
1596	<b>Heliodinidae</b>				
1597	<b><i>Heliodines</i> Stainton, 1849</b>				
1598	<i>roesella</i> (Linnaeus, 1758)	+	RAPP (1936a)		A
1599	<b>Bedelliidae</b>				
1600	<b><i>Bedellia</i> Stainton, 1849</b>				
1602	<i>somnulentella</i> (Zeller, 1847)	*	Büchner, 2009		
1603	<b>Lyonetiidae</b>				
1604	<b>Cemiostominae</b>				
1605	<b><i>Leucoptera</i> Hübner, 1825</b> = <i>Paraleucoptera</i> Heinrich, 1918				
1607	<i>onobrychidella</i> Klimesch, 1937	*	Karisch, 1988	det . Steuer GU Nr. 3382	
1608	<i>lustratella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	*	STEUER (1991)	Nachweis 1983, 1984, 1989	
1610	<i>laburnella</i> (Stainton, 1851) = <i>wailesella</i> Stainton, 1858	*	Büchner, 2009		
1611	<i>spartifoliella</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2008		
1616	<i>lathyrifoliella</i> (Stainton, 1866) = <i>orobi</i> Stainton, 1870	+	RAPP (1936a)		
1618	<i>malifoliella</i> (O. Costa, 1836) = <i>scitella</i> Zeller, 1839	*	MICHEL (1960) Büchner, 2010		A
1623	<i>sinuella</i> (Reutti, 1853) = <i>susinella</i> Herrich-Schäffer, 1854	*	STEUER (2002)		
1625	<b>Lyonetiinae</b>				
1626	<b><i>Lyonetia</i> Hübner, 1825</b>				
1627	<i>clerkella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2007		
1630	<i>prunifoliella</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1636	<b>Gelechioidea</b>				
	<b>Elachistidae</b>				
1826	<b>Elachistinae</b>				
1836	<b>Peritia Stainton, 1858</b> = <i>Mendesia Joannis</i> , 1902				
1834	<i>farinella</i> (Thunberg, 1794)	+	STEUER (1984, 1995)		
1837	<i>herrichiella</i> (Herrick-Schäffer, 1855)	*	GAEDIKE (2009)	2004, 2005, leg. Stübner	
1843	<b>Stephensia Stainton, 1858</b>				
1844	<i>abbreviatella</i> (Stainton, 1851) = <i>myosotivora</i> Müller-Rutz, 1937	+	BUHR (1956)		A
1845	<i>brunnichella</i> (Linnaeus, 1767)	*	Melzer, 2010		
1849	<b>Elachista Treitschke, 1833</b> = <i>Biselachista</i> Traugott-Olsen & Nielsen, 1977 = <i>Cosmiotes</i> Clemens, 1860				
1828	<i>consortella</i> (Stainton, 1851) = <i>roesslerella</i> Wocke, 1876 = <i>exiguella</i> Frey, 1885	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3944	
1829	<i>exactella</i> (Herrick-Schäffer, 1855)	*	Steuer, 1996	GP Nr. 4336	
1830	<i>freyerella</i> (Hübner, 1825) = <i>nigrella</i> Hübner, 1805 = <i>gregsoni</i> Stainton, 1855 = <i>balica</i> M. Hering, 1891	*	Steuer, 1995	GP Nr. 4335	
1831	<i>stabilella</i> (Stainton, 1858)	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3946	
1852	<i>adscitella</i> Stainton, 1851 = <i>revinctella</i> auct. nec Zeller, 1850	*	Steuer, 1992	GP Nr. 3975	
1856	<i>albifrontella</i> (Hübner, 1817)	*	Steuer, 1991	GP Nr. 3959	
1857	<i>alpinella</i> Stainton, 1854 = <i>monticola</i> Wocke, 1876	*	Steuer, 1988	GP Nr. 3212	
1861	<i>anserinella</i> Zeller, 1839	*	Steuer, 1986	GP Nr. 2925	
1862	<i>apicipunctella</i> Stainton, 1849	*	Steuer, 1991	GP Nr. 3953	
1863	<i>argentella</i> (Clerck, 1759) = <i>cygnipennella</i> Hübner, 1796	*	Rommel, 2001		
1865	<i>atricomella</i> Stainton, 1849 = <i>holdenella</i> Stainton, 1854 = <i>helvetica</i> Frey, 1856	+	Steuer, 1974	GP Nr. 799	
1871	<i>bedellella</i> (Sircom, 1848) = <i>lugdunensis</i> Frey, 1859	*	Rommel, 2006		
1874	<i>biatomella</i> (Stainton, 1848)	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1875	<i>bifasciella</i> Treitschke, 1833	*	GAEDIKE (2009)	1999, leg. Stübner	
1877	<i>bisulcella</i> (Duponchel, 1843)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1989	
1883	<i>canapennella</i> (Hübner, 1813) = <i>pulchella</i> Haworth, 1828 = <i>obscurella</i> Stainton, 1849 = <i>incanella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>humilis</i> sensu Hering	*	Steuer, 1996	GP Nr. 4315	
1888	<i>chrysodesmella</i> Zeller, 1850	*	Melzer, 2009, 2010		
1889	<i>cinereopunctella</i> (Haworth, 1828)	*	GAEDIKE (2009)	2005, leg. Stübner	
1890	<i>cingillella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1986	
1892	<i>lugdunensis</i> Frey, 1859 = <i>coeneni</i> Traugott-Olsen, 1985	*	GAEDIKE (2009)	2005 – 2007, leg. Stübner	
1893	<i>collitella</i> (Duponchel, 1843) = <i>grossepunctella</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	Theimer, 2007		
1894	<i>compsa</i> Traugott-Olsen, 1974 = <i>holdenella</i> auct. nec Stainton	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1901	<i>diederichiella</i> E. Hering, 1889	+	RAPP (1936a)		A
1902	<i>differens</i> Parenti, 1978	*	Steuer, 1990	GP Nr. 4342	
1905	<i>dispilella</i> Zeller, 1839	+	RAPP (1936a)		A
1906	<i>dispunctella</i> (Duponchel, 1843)	*	RAPP (1936a) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1909	<i>elegans</i> Frey, 1859	*	Steuer, 1990	GP Nr. 3671	
1921	<i>gangabella</i> Zeller, 1850	*	Melzer, 2009		
1925	<i>gleichenella</i> (Fabricius, 1781) = <i>magnificella</i> Duponchel, 1843	*	Steuer, 1995	GP Nr. 4341	
1928	<i>gregori</i> Traugott-Olsen, 1988	*	GAEDIKE (2009)	1999, leg. Stübner	
1932	<i>hedemanni</i> Rebel, 1899	+	RAPP (1936a)		
1935	<i>herrichii</i> Frey, 1859 = <i>reutiana</i> Frey, 1841	*	Steuer, 1986	GP Nr. 2921	
1937	<i>humilis</i> Zeller, 1850 = <i>perplexella</i> Stainton, 1859	*	Theimer, 2007		
1948	<i>juliensis</i> Frey, 1870 = <i>freyi</i> Staudinger, 1870 = <i>serricornis</i> auct. nec Stainton	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3970	
1951	<i>kilmunella</i> Stainton, 1849	*	RAPP (1936a) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1958	<i>lastrella</i> Chrétien, 1896	*	Melzer, 2010		
1965	<i>luticomella</i> Zeller, 1839	*	Steuer, 1982	GP Nr. 2673	
1972	<i>martinii</i> O. Hofmann, 1898	*	STEUER (1984, 1991, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1974	<i>maculicerusella</i> (Bruand, 1859) = <i>monosemiella</i> Rössler, 1881 = <i>cerusella</i> Hübner, 1796, nom. praeocc.	*	Rommel, 2006		
1983	<i>nobilella</i> Zeller, 1839	*	Steuer, 1986	GP Nr. 2920	
1989	<i>ornithopodella</i> Frey, 1859	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1982	
1990	<i>orstadii</i> N. Palm, 1943	*	Sutter, 1983	Beleg in coll. Sutter, Steuer det. GU 2413	
1994	<i>pigerella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1968 - 1975	
1995	<i>poae</i> Stainton, 1855	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1966	
1997	<i>pollinariella</i> Zeller, 1839	*	Steuer, 1990	GP Nr. 3684	
2002	<i>pullicomella</i> Zeller, 1839	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3930	
2004	<i>quadripunctella</i> (Hübner, 1825) = <i>quadrella</i> Hübner, 1805	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
2005 b	<i>tengstromi</i> Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001	*	GAEDIKE (2008)		
2012	<i>serricornis</i> Stainton, 1854 = <i>mitterbergeri</i> Rebel, 1906 = <i>preisseckeri</i> Krone, 1911	*	STEUER (1995)	Nachweis 1993	
2019	<i>steueri</i> Traugott-Olsen, 1990	*	GAEDIKE (2009)	2004, 2005, leg. Stübner	
2020	<i>subalbidella</i> Schläger, 1847	*	Rommel, 2004		
2021	<i>subnigrella</i> Douglas, 1853	*	Hausenblas, 1995	Beleg in coll. Hausenblas Steuer det. GU 4136	
2022	<i>subocellea</i> (Stephens, 1834) = <i>disertella</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	Steuer, 1992	GP Nr. 3870	
2027	<i>tetragonella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
2030	<i>trapeziella</i> Stainton, 1849	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1986, 1990	
2034	<i>unifasciella</i> (Haworth, 1828) = <i>gangabella</i> auct. nec Zeller	*	Steuer, 1989		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2035	<i>utonella</i> Frey, 1856 = <i>paludum</i> Frey, 1859	*	STEUER (1995)	Nachweis 1993	
2042	<i>zernyi</i> Hartig, 1941 = <i>ingvarella</i> Traugott-Olsen, 1974	*	Steuer, 1986	GP Nr. 3178	
2044	<b><i>Dibrachia Sinev &amp; Sruoga, 1992</i></b>				
2045	<i>kalki</i> Parenti, 1978	*	GAEDIKE (2009)	2005 – 2007, leg. Stübner	
1666	<b>Depressariinae</b>				
	<b>Depressariini</b>				
1667	<b><i>Semioscopis Hübner, 1825</i></b> = <i>Epigraphia</i> Stephens, 1829				
1668	<i>avellanella</i> (Hübner, 1793)	*	Erlacher, 2006		
1669	<i>oculella</i> (Thunberg, 1794) = <i>anella</i> Hübner, 1796	+	STEUER (1984, 1995)		
1670	<i>steinkellneriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Melzer, 2009, 2012		
1671	<i>strigulana</i> (Fabricius, 1787)	+	RAPP (1936a)		
1673	<b><i>Luquetia Leraut, 1991</i></b> = <i>Enicostoma</i> auct. nec Stephens, 1829				
1674	<i>lobella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2007 Melzer, 2008		
1675	<b><i>Levipalpus Hannemann, 1953</i></b>				
1676	<i>hepatariella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	+	STEUER (2002) GAEDIKE (2008)	Nachweis 1958	
1677	<b><i>Exaeretia Stanton, 1849</i></b> = <i>Depressaroides</i> Turati, 1924 = <i>Marthyrida</i> Clarke, 1941				
1678	<i>allisella</i> Stanton, 1849	*	Büchner, 1995 Phillip, 2005		
1684	<i>culcitella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	+	HEINEMANN (1870) RAPP (1936a)		A
1690	<b><i>Agonopterix Hübner, 1825</i></b>				
1691	<i>ocellana</i> (Fabricius, 1775) = <i>characterella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2005		
1707	<i>assimilella</i> (Treitschke, 1832)	*	Büchner, 2008		
1712	<i>nanatella</i> (Stanton, 1849)	*	STEUER (1995)	Nachweis 1989	
1713	<i>putridella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>peucedanella</i> Millière, 1881	*	STEUER (1991)	Nachweis 1990	
1714	<i>atomella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>pulverella</i> Hübner, 1825	*	ROMMEL (2007)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1715	<i>scopariella</i> (Heinemann, 1870) = <i>rubescens</i> Heinemann, 1870	*	Büchner, 2007		
1718	<i>ciliella</i> (Stainton, 1849)	*	Melzer, 2008, 2009		
1719	<i>arenella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
1721	<i>propinquella</i> (Treitschke, 1835)	*	Rommel, 2004		
1722	<i>subpropinquella</i> (Stainton, 1849) = <i>rhodochrella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>variabilis</i> Heinemann, 1870	+	STEUER (2002)	Nachweis 1969	
1724	<i>laterella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>incarnatella</i> Zeller, 1854	+	STEUER (1984, 1991, 1995)	Letzter Nachweis 1966	
1725	<i>carduella</i> (Hübner, 1817)	*	Melzer, 2011		
1726	<i>curvipunctosa</i> (Haworth, 1811) = <i>zephyrella</i> Hübner, 1813	*	ROMMEL (2007)		
1729	<i>yeatiana</i> (Fabricius, 1781)	+	STEUER (1984, 1995)	Letzter Nachweis 1974	
1730	<i>alstromeriana</i> (Clerck, 1759)	*	ROMMEL (2007)		
1732	<i>purpurea</i> (Haworth, 1811)	*	Melzer, 2009 Büchner, 2011		
1733	<i>hypericella</i> (Hübner, 1796) = <i>impurella</i> Treitsche, 1835	*	STEUER (1998)	Nachweis 1996, A 1998	
1735	<i>conterminella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2011		
1736	<i>heracliana</i> (Linnaeus, 1758) = <i>applana</i> Fabricius, 1775	*	Melzer, 2009		
1737	<i>capreolella</i> (Zeller, 1839)	*	ROMMEL (2007)		
1739	<i>rotundella</i> (Douglas, 1846) = <i>peloritanella</i> Zeller, 1847	*	Steuer, 1991	GU Nr. 3762	
1740	<i>angelicella</i> (Hübner, 1813)	*	ROMMEL (2007)		
1741	<i>astrantiae</i> (Heinemann, 1870)	+	STEUER (1991, 1995)		
1743	<i>cnicella</i> (Treitschke, 1832)	*	Büchner, 1994, 2007		
1745	<i>senecionis</i> (Nickerl, 1864) = <i>sarracenella</i> Rössler, 1881	*	Steuer, 1992	GU Nr. 3816	
1747	<i>selini</i> (Heinemann, 1870)	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
1754	<i>furvella</i> (Treitschke, 1832)	+	RAPP (1936a)		
1756	<i>pallorella</i> (Zeller, 1839) = <i>subpallorella</i> Staudinger, 1870	*	Melzer, 2011		
1757	<i>kaekeritziana</i> (Linnaeus, 1767) = <i>liturella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775 = <i>flavella</i> Hübner, 1796	*	Melzer, 2009, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
1758	<i>liturosa</i> (Haworth, 1811) = <i>liturella</i> Hübner, 1796 = <i>huebneri</i> Bradley, 1966	*	Melzer, 2009		
1763	<i>nervosa</i> (Haworth, 1811) = <i>costosa</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2003		
1775	<b><i>Depressaria Haworth, 1811</i></b>				
1776	<i>pastinacella</i> (Duponchel, 1838) = <i>heracliana</i> auct.	*	Melzer, 2008		
1781	<i>depressana</i> (Fabricius, 1775)	*	Melzer, 2008 Büchner, 2010		
1782	<i>chaerophylli</i> Zeller, 1839	*	Melzer, 2009		
1783	<i>ultimella</i> Stainton, 1849	+	RAPP (1936a)		
1786	<i>pimpinellae</i> Zeller, 1839 = <i>reichlini</i> Heinemann, 1870	*	ROMMEL (2007)		
1787	<i>bupleurella</i> Heinemann, 1870	*	Melzer, 2011		
1788	<i>badiella</i> (Hübner, 1796) = <i>bruneella</i> Ragonot, 1874	*	ROMMEL (2007)		
1791	<i>libanotidella</i> Schläger, 1849 = <i>laserpitti</i> Nickerl, 1864	*	ROMMEL (2007)		
1793	<i>daucella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>rubricella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775 = <i>nervosa</i> auct. nec Heinemann, 1870	+	STEUER (1984, 1995)		
1795	<i>beckmanni</i> Heinemann, 1870	*	ROMMEL (2007)		
1796	<i>sordidatella</i> Tengström, 1848 = <i>weirella</i> Stainton, 1849 = <i>gudmanni</i> Rebel, 1927	*	ROMMEL (2007)		
1798	<i>pulcherrimella</i> Stainton, 1849 = <i>semenovi</i> Krulikovski, 1903	*	ROMMEL (2007)		
1799	<i>douglasella</i> Stainton, 1849	*	ROMMEL (2007) Büchner, 2011		
1805	<i>emeritella</i> Stainton, 1849	*	Büchner, 2009		
1806	<i>albibunctella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>aegipodiella</i> Hübner, 1825	*	ROMMEL (2007)		
1807	<i>olerella</i> Zeller, 1854	*	Melzer, 2009, 2011		
1820	<i>discipunctella</i> Herrich-Schäffer, 1854	+	ROMMEL (2007) GAEDIKE (2009)	Die Meldungen beziehen sich auf RAPP (1936a)	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
	<b>Cryptolechiini</b>				
2387	<i>Orophia</i> Hübner, 1825 = <i>Cephalispheira</i> Bruand, 1850				
2388	<i>denisella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>monastrichella</i> Fischer von Röslerstamm, 1843	*	Schöps, 2009, 2010 Leillinger, 2012 Melzer, 2012		
2389	<i>ferrugella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2007		
2390	<i>sordidella</i> (Hübner, 1796)	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
	<b>Telchrysidini</b>				
2397	<b><i>Telechrysis</i> Toll, 1956</b>				
2398	<i>tripuncta</i> (Haworth, 1828)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
	<b>Hypercalliini</b>				
3077	<b><i>Hypercallia</i> Stephens, 1829</b>				
3078	<i>citrinalis</i> (Scopoli, 1763)	*	ROMMEL (2006)		
3079	<b><i>Anchinia</i> Hübner, 1825</b>				
3080	<i>daphnella</i> (Hübner, 1796)	+	RAPP (1936a) + Harz		
3084	<i>cristalis</i> (Scopoli, 1763)	*	Büchner, 2008		
1637	<b>Ethmiinae</b>				
1638	<b><i>Ethmia</i> Hübner, 1819</b>				
1643	<i>dodecea</i> (Haworth, 1828) = <i>decemguttella</i> Hübner, 1810	*	Sutter, 1996		
1644	<i>quadrillella</i> (Goeze, 1783) = <i>inversella</i> Fourcroy, 1785 = <i>funerella</i> Fabricius, 1787	*	Büchner, 2012		
1647	<i>pusiella</i> (Linnaeus, 1758)	*	ROMMEL (2003)		
1648	<i>terminella</i> T. Fletcher, 1938 = <i>sexpunctella</i> Hübner, 1810	*	Büchner 1994		
1655	<i>bipunctella</i> (Fabricius, 1775)	*	ROMMEL (2003)		
2046	<b>Parametriotinae (Agonoxenidae)</b>				
2047	<b><i>Chrysoclista</i> Stainton, 1854</b>				
2048	<i>linneella</i> (Clerck, 1759)	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1966, 1977	
2049	<i>lathamella</i> T. Fletcher, 1936 = <i>bimaculella</i> Haworth, 1828, nom. praeocc. = <i>razowskii</i> Riedl, 1965	+	RAPP (1936a)		A

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2051	<b><i>Heinemannia Wocke, 1876</i></b>				
2053	<i>festivella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
2055	<b><i>Blastodacna Wocke, 1876</i></b>				
2056	<i>atra</i> (Haworth, 1828) = <i>putripennella</i> Zeller, 1839	*	Steuer, 1981	GP Nr. 2119	
2057	<i>hellerella</i> (Duponchel, 1838)	+	STEUER (1984, 1995)		
2058	<i>vinolentella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	*	GAEDIKE (2008)		
2059	<b><i>Spuleria O. Hofmann, 1897</i></b>				
2060	<i>flavicaput</i> (Haworth, 1828) = <i>aurifrontella</i> Geyer, 1832	*	RAPP (1936a), STEUER (1991, 1995) Büchner, 2012		A
2061	<b><i>Dystebenna Spuler, 1910</i></b>				
2062	<i>stephensi</i> (Stainton, 1849)	+	RAPP (1936a)		A
2071	<b><i>Scythrididae</i></b>				
2072	<b><i>Scythris Hübner, 1825</i></b>				
2074	<i>cuspidella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	SUTTER (1994)		
2080	<i>clavella</i> (Zeller, 1855)	*	SUTTER (1994)		
2083	<i>fallacella</i> (Schläger, 1847) = <i>hdrargyrella</i> Steudel & Hofmann, 1882	*	Büchner, 2012		
2098	<i>fuscoaenea</i> (Haworth, 1828)	*	SUTTER (1994)		
2105	<i>picaepennis</i> (Haworth, 1828) = <i>senescens</i> Stainton, 1850 = <i>vagabundella</i> Herrich-Schäffer, 1856 = <i>aeneosperella</i> Rössler, 1866	*	Büchner, 2011, 2012		
2110	<i>crassiuscula</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>fuscocuprea</i> auct. nec Haworth	*	Büchner, 2009		
2112	<i>bifissella</i> (O. Hofmann, 1889)	*	SUTTER (1994)		
2131	<i>tributella</i> (Zeller, 1847) = <i>terrenella</i> Zeller, 1847 = <i>parvella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>denigratella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>serella</i> Constant, 1885 = <i>bulbosella</i> Lhomme, 1949	*	SUTTER (1994)		
2134	<i>laminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>succisae</i> Rössler, 1866	*	Melzer, 2011		
2140	<i>knochella</i> (Fabricius, 1794)	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2168	<i>scopolella</i> (Linnaeus, 1767) = <i>triguttella</i> Duponchel, 1839 = <i>heleniella</i> Millière, 1876	*	Melzer, 2011		
2169	<i>limbella</i> (Fabricius, 1775) = <i>variella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775 = <i>chenopodiella</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2005		
2172	<i>noricella</i> (Zeller, 1843)	+	SUTTER (1994)		
2173	<i>dissimilella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	*	SUTTER (1994)		
2174	<i>inspersella</i> (Hübner, 1817)	*	SUTTER (1994)		
2177	<i>siccella</i> (Zeller, 1839)	+	RAPP (1936a) SUTTER (1994)		A
2229	<b>Chimabachidae</b>				
2230	<b><i>Diurnea</i> Haworth, 1811</b> = <i>Chimbache</i> Hübner, 1825 = <i>Cheimophila</i> Hübner, 1825				
2231	<i>fagella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
2232	<i>lipsiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
2233	<b><i>Dasytroma</i> Curtis, 1833</b> = <i>Cheimophila</i> Hübner, 1825				
2234	<i>salicella</i> (Hübner, 1796)	*	Melzer, 2009		
2238	<b>Oecophoridae</b>				
2239	<b>Oecophorinae</b>				
2241	<b><i>Bisigna</i> Toll, 1956</b>				
2242	<i>procerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
2245	<b><i>Schiffermuelleria</i> Hübner, 1825</b>				
2246	<i>schaefferella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2012		
2253	<b><i>Denisia</i> Hübner, 1825</b>				
2261	<i>albimaculea</i> (Haworth, 1828)	o	KNAPP (1887)		
2262	<i>similella</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2007		
2264	<i>stipella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2004		
2277	<b><i>Metalampra</i> Toll, 1956</b>				
2278	<i>cinnamomea</i> (Zeller, 1839)	*	ROMMEL (2006)		
2281	<b><i>Endrosis</i> Hübner, 1825</b>				
2282	<i>sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>lacteella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2005		
2283	<b><i>Hofmannophila</i> Spuler, 1910</b>				
2284	<i>pseudospretella</i> (Stainton, 1849)	*	Büchner, 2009		
2285	<b><i>Borkhausenia</i> Hübner, 1825</b>				
2286	<i>minutella</i> (Linnaeus, 1758)	*	ROMMEL (2006)		
2287	<i>fuscescens</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2288	<i>luridicomella</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1987	
2292	<b><i>Herrichia</i> Staudinger, 1871</b>				
2293	<i>excelsella</i> Staudinger, 1871 = <i>hirticruralis</i> Peyerimhoff, 1872 = <i>grandli</i> Rebel, 1922	*	Büchner, 2008		A
2297	<b><i>Crassa</i> Bruand, 1850</b> = <i>Tichonia auct. nec</i> Hübner, 1825				
2298	<i>tinctella</i> (Hübner, 1796)	*	Rommel, 2008		
2299	<i>unitella</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2010		
2300	<b><i>Batia</i> Stephens, 1834</b>				
2301	<i>lambdella</i> (Donovan, 1793) = <i>magnatella</i> Jäckh, 1942	*	Büchner, 2006		
2302	<i>internella</i> Jäckh, 1972 = <i>lambdella</i> sensu Jäckh, 1942	*	ROMMEL (2006)		
2306	<b><i>Epicallima</i> Dyar, 1903</b> = <i>Callima</i> Clemens, 1860, nec Herrich-Schäffer, 1853				
2310	<i>formosella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	ROMMEL (2006)		
2311	<b><i>Esperia</i> Hübner, 1825</b> = <i>Dasycera</i> Stephens, 1829				
2314	<i>oliviella</i> (Fabricius, 1794)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
2316	<b><i>Oecophora</i> Latreille, 1786</b>				
2317	<i>bractella</i> (Linnaeus, 1758)	*	ROMMEL (2006)		
2319	<b><i>Alabonia</i> Hübner, 1825</b>				
2321	<i>geoffrella</i> (Linnaeus, 1767)	*	ROMMEL (2006)		
2325	<b><i>Harpella</i> Schrank, 1802</b>				
2326	<i>forficella</i> (Scopoli, 1763)	*	Büchner, 2010		
2327	<b><i>Carcina</i> Hübner, 1825</b>				
2328	<i>quercana</i> (Fabricius, 1775)	*	ROMMEL (2006)		
2339	<b><i>Pleurota</i> Hübner, 1825</b>				
2348	<i>bicostella</i> (Clerck, 1759)	*	Büchner, 1995		
2360	<i>aristella schlaegeriella</i> Zeller, 1887	*	Melzer, 2008		
2379	<b><i>Holoscollia</i> Zeller, 1839</b>				
2380	<i>huebneri</i> Koçak, 1980 = <i>forficella</i> Hübner, 1813, nec Thunberg, 1794	+	RAPP (1936a)		
2399	<b><i>Stathmopodinae</i></b>				
2402	<b><i>Stathmopoda</i> Herrich-Schäffer, 1853</b>				
2403	<i>pedella</i> (Linnaeus, 1761)	*	Büchner, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2426	<b>Batrachedridae</b>				
2427	<b><i>Batrachedra</i> Herrich-Schäffer, 1853</b>				
2428	<i>praeangusta</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2008		
2429	<i>pinicollella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2009		
2434	<b>Colleophoridae</b>				
2435	<b><i>Augasma</i> Herrich-Schäffer, 1853</b>				
2436	<i>aeratella</i> (Zeller, 1839)	+	RAPP (1936a)		
2437	<b><i>Metriotes</i> Herrich-Schäffer, 1853</b>				
2438	<i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	*	Strutzberg, 2008		
2448	<b><i>Coleophora</i> Hübner, 1825</b>				
2449	<i>albella</i> (Thunberg, 1788) = <i>leucapennella</i> Hübner, 1827	+	RAPP (1936a)		
2452	<i>spiraeella</i> Rebel, 1916	*	Büchner, 2010		A
2453	<i>lutipennella</i> (Zeller, 1838)	*	Büchner, 2011		
2455	<i>ochripennella</i> Zeller, 1849	*	Melzer, 2012		
2456	<i>gryphipennella</i> (Hübner, 1796) = <i>mariniella</i> Hodgkinson, 1881 = <i>scolopiphora</i> O. Hering, 1926	*	Büchner, 2012		
2457	<i>flavipennella</i> (Duponchel, 1843)	*	Büchner, 2008		
2460	<i>milvipennis</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2010		
2461	<i>alnifoliae</i> Barasch, 1934	*	Steuer, 1996	GP Nr. 4225	
2462	<i>badiipennella</i> (Duponchel, 1843)	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4140	
2463	<i>limosipennella</i> (Duponchel, 1843)	+	STEUER (1991, 1995)		
2464	<i>siccifolia</i> Stainton, 1856	*	Steuer, 1988	GP Nr. 3294	
2467	<i>coracipennella</i> (Hübner, 1796) = <i>nigricella</i> Stephens, 1835 = <i>varii</i> Patzak, 1969	*	Steuer, 1991	GP Nr. 4120	
2468	<i>serratella</i> (Linnaeus, 1761) = <i>fuscedinella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2008		
2469	<i>spinella</i> (Schrink, 1802) = <i>cerasivorella</i> Packard, 1870	*	Büchner, 2010		
2470	<i>prunifoliae</i> Doets, 1944	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4504	
2474	<i>trigeminella</i> Fuchs, 1881	*	Büchner, 2004		
2476	<i>fuscocuprella</i> Herrich-Schäffer, 1855	+	STEUER (1984, 1995)		
2479	<i>lusciniaeppennella</i> (Treitschke, 1833) = <i>viminetella</i> Zeller, 1849	*	Büchner, 2011		
2480	<i>idaeella</i> O. Hofmann, 1869	*	Steuer, 1986	GP Nr. 3027	
2481	<i>vacciniella</i> Herrich-Schäffer, 1861 = <i>rhododendri</i> Hofmann, 1869	*	Büchner, 2008		
2484	<i>vitisella</i> Gregson, 1856	+	STEUER (1984, 1995)		
2485	<i>glitzella</i> O. Hofmann, 1869	+	STEUER (1984, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2487	<i>violacea</i> (Ström, 1783) = <i>hornigi</i> Toll, 1952	*	Steuer, 1987	GP Nr. 4009	
2488	<i>potentillae</i> Elisha, 1885	*	GAEDIKE (2009)	2001, 2005, leg. Stübner	
2492	<i>juncicollella</i> Stainton, 1851	+	STEUER (1984, 1995)		
2493	<i>orbitella</i> Zeller, 1849 = <i>wilkinsoni</i> Scott, 1861	*	Büchner, 2010		
2494	<i>binderella</i> (Kollar, 1832) = <i>luscianaeppennella</i> Zeller, 1839 = <i>politella</i> Scott, 1861	*	Steuer, 1989	GP Nr. 3999	
2495	<i>ahenella</i> Heinemann, 1876	*	Büchner, 2002	Raupensack, det. Stübner	
2496	<i>albitarsella</i> Zeller, 1849	*	Melzer, 2011		
2497	<i>pulmonariella</i> Ragonot, 1874	+	BUHR (1956) PATZAK (1974)		
2498	<i>trifolii</i> (Curtis, 1832) = <i>frischella</i> auct. nec Linnaeus	*	Büchner, 2004		
2499	<i>frischella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>alcyonipennella</i> auct. nec Kollar	*	STÜBNER (2007)		
2500	<i>alcyonipennella</i> (Kollar, 1832) = <i>cuprariella</i> Zeller, 1847	*	STÜBNER (2007)		
2502	<i>conyzae</i> Zeller, 1868	*	Melzer, 2010		
2518	<i>lineolea</i> (Haworth, 1828) = <i>crocogrammos</i> Zeller, 1849	*	Melzer, 2012		
2524	<i>hemerobiella</i> (Scopoli, 1763) = <i>anseripennella</i> Hübner, 1813	*	Melzer, 2011		
2546	<i>lithargyrinella</i> Zeller, 1849 = <i>olivaceella</i> Stainto, 1854 = <i>fuscastella</i> Toll, 1952	*	GRAF et. al. (2001) GAEDIKE (2008)		
2552	<i>onobrychiella</i> Zeller, 1849 = <i>arenariella</i> Zeller, 1965	*	STEUER (1998)		
2561	<i>collutella</i> (Fabricius, 1794) = <i>serenella</i> Duponchel, 1843 = <i>crocinella</i> Tengström, 1848	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
2563	<i>trifariella</i> Zeller, 1849	*	GAEDIKE (2009)	2002, 2007, leg. Stübner	
2566	<i>saturatella</i> Stainton, 1850 = <i>bilineatella</i> auct. nec Zeller	*	Rommel, 2005		
2567	<i>niveicostella</i> Zeller, 1839	*	Büchner, 2008		
2568	<i>albicostella</i> (Duponchel, 1842)	*	Steuer, 1986	GP Nr. 2961	
2572	<i>discordella</i> Zeller, 1849 = <i>dorycniella</i> Hartig, 1938	*	Büchner, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2581	<i>vulpecula</i> Zeller, 1849	*	GAEDIKE (2009)	2001, 2005, 2007, leg. Stübner	
2583	<i>chalcogrammella</i> Zeller, 1839	*	GAEDIKE (2009)	2007, leg. Stübner	
2585	<i>deauratella</i> Lienig & Zeller, 1846	*	STÜBNER (2007) Büchner, 2011		
2587	<i>mayrella</i> (Hübner, 1813) = <i>spissicornis</i> Haworth, 1828	*	STÜBNER (2007)		
2591	<i>ballotella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1839)	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4056	
2592	<i>anatipenella</i> (Hübner, 1796) = <i>bernoniella</i> auct. nec Goeze, 1783 = <i>pedifera</i> auct. nec Fourcroy, 1785 = <i>tiliella</i> Schrank, 1802	*	Rommel, 2002		
2593	<i>albidella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2007		
2594	<i>kuehnella</i> (Goeze, 1783) = <i>palliatella</i> Zincken, 1830	*	Rommel, 2005		
2595	<i>ibipennella</i> Zeller, 1849 = <i>nemorum</i> Heinemann, 1854 = <i>ardeaepennella</i> Scott, 1861	*	Büchner, 2002	Raupensack det. Stübner	
2596	<i>betulella</i> Heinemann, 1876 = <i>buettneri</i> Rössler, 1881	*	Büchner, 2008		
2597	<i>zelleriella</i> Heinemann, 1854	*	Büchner, 2008	Raupensack det. Stübner	
2598	<i>currucipennella</i> Zeller, 1839 = <i>tristrigella</i> Heinemann & Wocke, 1877	*	Steuer, 1986	GP Nr. 3016	
2601	<i>pyrrhulipennella</i> Zeller, 1839	+	RAPP (1936a)		
2609	<i>serpyllorum</i> E. Hering, 1889	*	Melzer, 2012		
2610	<i>auricella</i> (Fabricius, 1794)	*	GAEDIKE (2009)	2001, 2007, leg. Stübner	
2611	<i>gallipennella</i> (Hübner, 1796)	*	Melzer, 2012		
2617	<i>coronillae</i> Zeller, 1849	*	Rommel, 2005		
2619	<i>vibicigerella</i> Zeller, 1839	+	RAPP (1936a)		
2620	<i>conspicuella</i> Zeller, 1849	*	Melzer, 2011		
2621	<i>partitella</i> Zeller, 1849	+	PATZAK (1987)		
2628	<i>pseudoditella</i> Baldizzone & Patzak, 1983 = <i>ditella</i> sensu Patzak, 1974	*	PATZAK (1987) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
2631	<i>caelebipennella</i> Zeller, 1839	*	STEUER (1995)	Nachweis 1994	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2639	<i>vibicella</i> (Hübner, 1813)	*	GAEDIKE (2009)	2006, 2007, leg. Stübner	
2647	<i>ochrea</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2009		
2654	<i>lixella</i> Zeller, 1849	*	Büchner, 2011		
2656	<i>ornatipennella</i> (Hübner, 1796)	*	Rommel, 2007		
2660	<i>hartigi</i> Toll, 1959 = <i>albicosta</i> auct. nec Haworth	+	PATZAK (1980)		
2664	<i>vulnerariae</i> Zeller, 1839	+	PATZAK (1974)		
2680	<i>pennella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>onosmella</i> Brahm, 1791 = <i>hispanicella</i> Möschler, 1866 = <i>diffinis</i> Staudinger, 1880 = <i>nervosella</i> Müller-Rutz, 1927	*	GAEDIKE (2009)	2007, leg. Stübner	
2683	<i>laricella</i> (Hübner, 1817)	*	Büchner, 2005		
2686	<i>adjunctella</i> Hodgkinson, 1882	*	GAEDIKE (2008) Büchner, 2012		
2687	<i>caespitiella</i> Zeller, 1839 = <i>agrammella</i> Wood, 1892	*	Büchner, 2012		
2688	<i>tamesis</i> Waters, 1929 = <i>cratipennella</i> auct. nec Clemens, 1864	*	Steuer, 1983	GP Nr. 2633	
2689	<i>glaucicollella</i> Wood, 1892	*	Büchner, 2012		
2690	<i>otidipennella</i> (Hübner, 1817) = <i>murinipennella</i> Duponchel, 1844	*	Büchner, 2010		
2692	<i>alticollella</i> Zeller, 1849 = <i>caespitiella</i> auct. nec Zeller	*	Büchner, 2012		
2693	<i>taenipennella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>galactaula</i> Meyrick, 1925	*	Büchner, 1999		
2696	<i>sylvaticella</i> Wood, 1892	*	Theimer, 2007		
2707	<i>obscenella</i> Herrich-Schäffer, 1855 = <i>virgaureae</i> Stainton, 1857 = <i>cinerea</i> Toll, 1953	*	GAEDIKE (2009) Büchner, 2004		
2712	<i>therinella</i> Tengström, 1848	*	Steuer, 1997	GP Nr. 4365	
2714	<i>pratella</i> Zeller, 1871	*	Büchner, 2005		
2717	<i>saxicollella</i> (Duponchel, 1843) = <i>annulatella</i> Tengström, 1848 = <i>flavaginella</i> auct. nec Lienig & Zeller = <i>benanderi</i> Kanerva, 1941	*	Büchner, 2011, 2012		
2720	<i>motacillella</i> Zeller, 1849	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3997	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2721	<i>sternipennella</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>flavaginella</i> Lienig & Zeller 1846 = <i>moeniacella</i> Stainton, 1887 = <i>albisquamella</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	Büchner, 2002		
2729	<i>versurella</i> Zeller, 1849 = <i>agricolella</i> Fuchs, 1886 = <i>pallorella</i> Benander, 1939 = <i>constantii</i> M. Hering 1942 = <i>klimeschi</i> Vlach, 1942	*	Steuer, 1998	GP Nr. 4369	
2733	<i>vestianella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>laripennella</i> Zetterstedt, 1839	*	Steuer, 1992	GP Nr. 3875	
2738	<i>pappiferella</i> O. Hofmann, 1869	+	STEUER (1984, 1995)		
2748	<i>artemisicollella</i> Bruand, 1855	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3923	
2766	<i>succursella</i> Herrich-Schäffer, 1855	+	RAPP (1936a)		
2772	<i>galbulipennella</i> Zeller, 1838 = <i>otitae</i> Zeller, 1839	*	PATZAK (1974) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
2778	<i>galatellae</i> M. Hering, 1942	+	PATZAK (1969) PATZAK (1974)		
2780	<i>millefolii</i> Zeller, 1849	*	Brainich, 1999	Beleg in coll. Brainich, Steuer det., GU 4451	
2781	<i>kyffhusana</i> Petry, 1898	*	PATZAK (1974) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
2786	<i>peribenanderi</i> Toll, 1943	*	Büchner, 2012		
2791	<i>amellivora</i> Baldizzone, 1979 = <i>linearIELLA</i> auct. nec Zeller = <i>calcarIELLA</i> auct. nec Chrétien	*	Steuer, 1992	GP Nr. 4452	
2792	<i>ramosella</i> Zeller, 1849 = <i>albicornis</i> Benander, 1936 = <i>vlachi</i> Toll, 1952	*	Melzer, 2011		
2793	<i>trochilella</i> (Duponchel, 1843) = <i>troglodytella</i> auct. nec Duponchel = <i>lineatella</i> Tengström, 1847 = <i>corymbosiella</i> Bauer, 1917 = <i>axana</i> M. Hering 1942	*	Melzer, 2011		
2804	<i>directella</i> Zeller, 1849	+	PATZAK (1974)		
2805	<i>expressella</i> Klemensiewicz, 1883	*	PATZAK (1983) STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1982	
2809	<i>striatipennella</i> Nylander, 1848 = <i>alpicella</i> Stainton, 1858	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2811	<i>solitariella</i> Zeller, 1849	*	Büchner, 2010		
2812	<i>tanaceti</i> Mühlig, 1865	*	Büchner, 2005	Raupensäcke det. Stübner	
2816	<i>artemisiella</i> Scott, 1861 = <i>simillimella</i> Fuchs, 1881	+	RAPP (1936a)		
2823	<i>argentula</i> (Stephens, 1834) = <i>cothurnella</i> Duponchel, 1843	*	Steuer, 1999	GP Nr. 4510	
2830	<i>granulatella</i> Zeller, 1849 = <i>artemisiae</i> Mühlig, 1864	+	STEUER (1984, 1995)		
2837	<i>adspersella</i> Benander, 1939 = <i>salinella</i> auct. nec Stainton	*	Melzer, 2010 Büchner, 2012		
2845	<i>nutantella</i> Mühlig & Frey, 1857 = <i>silenella</i> sensu Patzak, 1974	+	PATZAK (1974) STEUER (1984)		
2848	<i>saponariella</i> Heeger, 1848	+	PATZAK (1974)		
2850	<i>paripennella</i> Zeller, 1839 = <i>aeripennis</i> auct. nec Wocke 1876	*	GAEDIKE (2008) Melzer, 2011		
2853	<i>niveistrigella</i> Wocke, 1876 = <i>muehligella</i> Wocke, 1876	*	PATZAK (1974) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
2854	<i>clypeiferella</i> O. Hofmann, 1871	*	Steuer, 1990	GP Nr. 3980	
2857	<i>squalorella</i> Zeller, 1849	*	Steuer, 1990	GP Nr. 4000	
2858	<i>salicorniae</i> Heinemann & Wocke, 1876	+	PATZAK (1974)		
2861	<i>unipunctella</i> Zeller, 1849	+	PATZAK (1974) STEUER (1984, 1991, 1995)		
2869	<b>Momphidae</b>				
2870	<b><i>Mompha</i> Hübner, 1825</b>				
2872	<i>miscella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
2874	<i>idaei</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2000		
2876	<i>langiella</i> (Hübner, 1796) = <i>epilobiella</i> Roemer, 1794	*	Büchner, 2009		
2878	<i>terminella</i> (Humphreys & Weswood, 1845) = <i>chrysargyrella</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	Rommel, 2006		
2879	<i>locupletella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>schrankella</i> Hübner, 1805	*	Büchner, 2000		
2880	<i>raschkiella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2008		
2883	<i>conturbatella</i> (Hübner, 1819)	*	Büchner, 2009		
2885	<i>lacteella</i> (Stephens, 1834)	*	Büchner, 1994		
2886	<i>propinquella</i> (Stainton, 1851)	*	Büchner, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
2887	<i>divisella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>decorella</i> Stephens, 1854	+	RAPP (1936a)		A
2890	<i>sturnipennella</i> (Treitschke, 1833) = <i>nodicolella</i> Fuchs, 1902	*	Philipp, 2008		
2891	<i>subbistrigella</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2007		
2892	<i>epilobiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>fulvescens</i> Haworth, 1828	*	Büchner, 2005		
2895	<b>Blastobasidae</b>				
2896	<b><i>Blastobasis</i> Zeller, 1855</b>				
2898	<i>phycidella</i> (Zeller, 1839)	*	Steuer, 1985	GP Nr. 2720	
2909	<b><i>Hypatopa</i> Walsingham, 1908</b>				
2910	<i>binotella</i> (Thunberg, 1794)	*	Büchner, 2011		
2931	<b>Autostichidae</b>				
2935	<b>Symmocinae</b>				
2936	<b><i>Oegoconia</i> Stainton, 1854</b>				
2939	<i>deauratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>kindermanniella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>bacescui</i> Popescu-Gorj & Capuse, 1965	*	GAEDIKE (2008)		
2939	<i>uralskella</i> Popescu-Gorj & Capuse, a 1965	*	GAEDIKE (2008)		
3050	<b>Amphisbatidae</b>				
3052	<b><i>Pseudatemelia</i> Rebel, 1910</b> = <i>Tubuliferola</i> Strand, 1917				
3054	<i>latipennella</i> (Jäckh, 1959)	*	Theimer, 2007		
3055	<i>josephinae</i> (Toll, 1956)	*	Steuer, 1990	GP Nr. 4063	
3058	<i>flavifrontella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Steuer, 1989	GP Nr. 4047	
3062	<i>subochreella</i> (Doubleday, 1859) = <i>panzerella</i> Stephens, 1835 = <i>incolorella</i> Constant, 1890	*	Steuer, 1987	GP Nr. 4040	
3069	<i>synchrozella</i> (Jäckh, 1959)	*	GAEDIKE (2009)	1999, leg. Stübner	
3070	<b><i>Amphisbatis</i> Zeller, 1870</b>				
3071	<i>inconcruella</i> (Stainton, 1849)	*	GAEDIKE (2009)	2005, leg. Stübner	
3085	<b>Cosmopterigidae</b>				
3094	<b><i>Sorhagenia</i> Spuler, 1910</b>				
3095	<i>rhamniella</i> (Zeller, 1839)	*	GAEDIKE (2009)	2004, leg. Stübner	
3091	<i>janiszewkae</i> Riedl, 1962	*	Steuer, 1983	GP Nr. 2415a	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3098	<i>lophyrella</i> (Douglas, 1846) = <i>tollii</i> Riedl, 1962	*	Steuer, 1986	GP Nr. 3083	
3103	<b><i>Pancalia Stephens, 1829</i></b>				
3104	<i>leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761)	*	Melzer, 2007, 2011		
3105	<i>schwarzella</i> (Fabricius, 1798) = <i>latreillella</i> Curtis, 1830	*	Büchner, 2007		
3130	<b><i>Eteobalea Hedges, 1962</i></b>				
3131	<i>anonymella</i> Riedl, 1965 = <i>serratella</i> auct. nec Treitschke	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
3143	<b><i>Stagmatophora Herrich-Schäffer, 1853</i></b>				
3144	<i>heydeniella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1833)	+	RAPP (1936a)		A
3153	<b><i>Limnaecia Stainton, 1851</i></b>				
3154	<i>phragmitella</i> Stainton, 1851	*	Büchner, 2011		
3162	<b><i>Cosmopterix Hübner, 1825</i></b>				
3163	<i>zieglerella</i> (Hübner, 1810) = <i>eximia</i> Haworth, 1828	*	Büchner, 2009	Blattmine	
3170	<i>lienigiella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Büchner, 2004, 2012		A
3171	<b>Gelechiidae</b>				
3172	<b>Gelechiinae</b>		-		
3226	<b><i>Aristotelia Hübner, 1825</i></b>				
3227	<i>decurtella</i> (Hübner, 1813)	+	STEUER (1984, 1991, 1995)		
3230	<i>ericinella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2010		
3237	<i>brizella</i> (Treitschke, 1833)	+	STEUER (1984, 1995)		
3241	<b><i>Chrysoestia Hübner, 1825</i></b>				
3242	<i>drurella</i> (Fabricius, 1775) = <i>hermannella</i> auct. = <i>zinckenella</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2008		
3243	<i>verucosa</i> Tokar, 1999	*	PRÖSE (2001)		
a					
3244	<i>sexguttella</i> (Thunberg, 1794) = <i>stipella</i> auct. = <i>naevifera</i> Duponchel, 1843	*	Büchner, 2009		
3248	<b><i>Xystophora Wocke, 1876</i></b>				
3249	<i>carchariella</i> (Zeller, 1839)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1989	
3253	<b><i>Isophrictis Meyrick, 1917</i></b>				
3261	<i>striatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>tanacetella</i> Schrank, 1802	*	Büchner, 2005, 2008		
3264	<i>anthemidella</i> (Wocke, 1871)	*	Melzer, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3268	<i>Metzneria</i> Zeller, 1839				
3269	<i>paucipunctella</i> (Zeller, 1839) = <i>zimmermanni</i> M. Hering, 1940	*	Thiemer, 2005		A
3271	<i>neuropterella</i> (Zeller, 1839)	*	Rommel, 2004		
3272	<i>aestivella</i> (Zeller, 1839) = <i>carlinella</i> Stainton, 1851	*	Büchner, 1994		
3273	<i>lappella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2011		
3279	<i>ehikeella</i> Gozmány, 1954	*	Steuer, 1997	GP Nr. 4302	
3280	<i>metzneriella</i> (Stainton, 1851)	*	Büchner, 2007		
3288	<i>santolinella</i> (Amsel, 1936) = <i>consimilella</i> Hackmann, 1946	*	Steuer, 1997	GP Nr. 4319	
3291	<i>Apodia</i> Heinemann, 1870				
3292	<i>bifractella</i> (Duponchel, 1843) = <i>martinii</i> Petry, 1911	*	Melzer, 2008		
3294	<i>Ptocheuusa</i> Heinemann, 1870				
3296	<i>inopella</i> (Zeller, 1839) = <i>paupella</i> sensu Gerstberger & Stiesy	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1968	
3303	<i>Psamathocrita</i> Meyrick, 1925				
3304	<i>osseella</i> (Stainton, 1860)	+	RAPP (1936b) Harz		
3307	<i>Argolamprotes</i> Benander, 1845				
3308	<i>micella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>astrella</i> Treitschke, 1833	*	Büchner, 2008		
3311	<i>Monochroa</i> Heinemann, 1870 = <i>Paltodora</i> Meyrick, 1894 = <i>Catabrachmis</i> Rebel, 1909				
3312	<i>cytisella</i> (Curtis, 1837)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1989	
3313	<i>rumicetella</i> (O. Hofmann, 1868) = <i>acutangulella</i> Heinemann, 1870 = <i>leptotechna</i> Meyrick, 1937	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1963	
3315	<i>tenebrella</i> (Hübner, 1817) = <i>fuscocuprea</i> Haworth, 1829 = <i>buffonella</i> Millière, 1876	*	Büchner, 2010		
3318	<i>servella</i> (Zeller, 1839) = <i>farinosae</i> Stainton, 1867	*	Steuer, 1999	GP Nr. 4459	
3319	<i>conspersella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>queationella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>morosa</i> Mühlig, 1864	+	STEUER (1998)	Nachweis 1978, 1979	
3321	<i>elongella</i> (Heinemann, 1870)	*	Steuer, 2000	GP Nr. 4561	
3323	<i>lutulentella</i> (Zeller, 1839) = <i>brunicki</i> Rebel, 1913	*	Büchner, 2007		
3324	<i>lucidella</i> (Stephens, 1834)	*	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1984	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3328	<i>simplicella</i> (Lienig & Zeller, 1846) = <i>impella</i> Piskunov, 1975	*	KARSHOLT (1995) STEUER (1998)	Nachweis 1993	
3334	<i>hornigi</i> (Staudinger, 1883)	*	STEUER (1984, 91, 95)	Nachweis 1989	
3338	<b><i>Eulamprotes</i> Bradley, 1971</b>				
3339	<i>wilkella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>pictella</i> Zeller, 1839	+	STEUER (1984, 1995)		
3340	<i>superbella</i> (Zeller, 1839)	*	GAEDIKE (2009)	2001, 2006, leg. Stübner	
3344	<i>unicollorella</i> (Duponchel, 1843)	*	Melzer, 2012		
3345	<i>atrella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2002		
3370	<b><i>Bryotropha</i> Heinemann, 1870</b>				
3373	<i>terrella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>suspectella</i> Heinemann, 1870	*	Büchner, 2010		
3374	<i>desertella</i> (Douglas, 1850) = <i>descrepidella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>lutescens</i> Constant, 1865	*	Steuer, 1981	GP Nr. 2143	
3379	<i>galbanella</i> (Zeller, 1839) = <i>ilmataria</i> Hoffmann, 1893	*	Büchner, 2004, 2010		
3384	<i>senectella</i> (Zeller, 1839) = <i>ciliatella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>obscurella</i> Heinemann, 1870	*	Steuer, 1999	GP Nr. 4512	
3386	<i>similis</i> (Stainton, 1854) = <i>fuliginosella</i> Snellen, 1882	*	Steuer, 1996 .	GP Nr. 4301	
3387	<i>umbrosella</i> (Zeller, 1839) = <i>mundella</i> Douglas, 1850 = <i>portlandicella</i> Richardson, 1890 = <i>anacampsoidella</i> Hering, 1924	*	Steuer, 1999	GP Nr. 4432	
3389	<i>affinis</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2009		
3390	<i>basaltinella</i> (Zeller, 1839)	*	Steuer, 1989	GP Nr. 3462	
3398	<b><i>Recurvaria</i> Haworth, 1828</b>				
3399	<i>nanella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2006		
3400	<i>leucatella</i> (Clerck, 1759)	*	Schöps, 2010		
3403	<b><i>Exoteleia</i> Wallengren, 1881</b>				
3404	<i>dodecella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2007		
3406	<b><i>Stenolechia</i> Meyrick, 1894</b>				
3407	<i>gemmella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>nivea</i> Haworth, 1828 = <i>lepidella</i> Zeller, 1839	*	Hausenblas, 1994 - 1998	Hausenblas in Lit.	
3407 a	<b><i>Stenolechoides</i> Elsner, 1995</b>				
3407 b	<i>pseudogemmellus</i> Elsner, 1995	*	Rommel, 2002		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3409	<b><i>Parachronistis</i> Meyrick, 1894</b>				
3410	<i>albiceps</i> (Zeller, 1839)	*	Rommel, 2006		
3414	<b><i>Teleiodes</i> Sattler, 1960</b> = <i>Teleia</i> Heinemann, 1870 = <i>Telphusa</i> auct. nec Chambers, 1872				
3415	<i>vulgella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2004		
3419	<i>luculella</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2007		
3420	<i>flavimaculella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>rufipunctella</i> Steudel, 1882	*	Steuer, 1988	GP Nr. 3433	
3421	<i>saltuum</i> (Zeller, 1878)	*	Büchner, 2007		
3431	<i>wagae</i> (Nowicki, 1860) = <i>marsata</i> Piskunov, 1973	*	Büchner, 1995		
3434	<i>sequax</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 2009		
	<b><i>Carpatolechia</i> Capuse, 1964</b>				
3424	<i>decorella</i> (Haworth, 1812) = <i>humeralis</i> Zeller, 1839	*	Brainich, 1988	Beleg in coll. Steuer. Steuer det. GU 3435	
3426	<i>fugacella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2008		
3427	<i>fugitivella</i> (Zeller, 1839)	*	Steuer, 1996	GP Nr. 4300	
3428	<i>alburnella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2010		
3429	<i>notatella</i> (Hübner, 1813) = <i>euratella</i> Herrich-Schäffer, 1854	*	Büchner, 2005		
3430	<i>proximella</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2009		
3433	<i>aenigma</i> Sattler, 1983	*	Steuer, 1992	GP Nr. 3877	
3445	<b><i>Teleiopsis</i> Sattler, 1960</b>				
3448	<i>difinis</i> (Haworth, 1828)	*	Büchner, 1994		
3452	<b><i>Pseudotelphusa</i> Janse, 1958</b>				
3453	<i>scalella</i> (Scopoli, 1763) = <i>alternella</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2007		
3432	<i>paripunctella</i> (Thunberg, 1794) = <i>triparella</i> Zeller, 1839 = <i>trijugella</i> Erschoff, 1877	*	Büchner, 1994		
3460	<b><i>Altenia</i> Sattler, 1960</b>				
3461	<i>scriptella</i> (Hübner, 1796) = <i>tremella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2005		
3467	<b><i>Gelechia</i> Hübner, 1825</b>				
3469	<i>rhombella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Melzer, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3470	<i>scotinella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>consprucatella</i> Heinemann, 1870 = <i>kiesenwetteri</i> Heuäcker, 1873 = <i>baueri</i> Rebel, 1917	*	Büchner, 2008		
3472	<i>sabinellus</i> (Zeller, 1839)	*	Melzer, 2007, 2012		
3474	<i>sororculella</i> (Hübner, 1817)	*	Büchner, 2009		
3476	<i>basipunctella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>basiguttella</i> Heinemann, 1870 = <i>albicans</i> Heinemann, 1870	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1986	
3477	<i>muscosella</i> Zeller, 1839 = <i>cuneatella sensu</i> Ostheder, 1951	*	Büchner, 2010		
3478	<i>cuneatella</i> Douglas, 1852	*	Büchner, 2004		
3482	<i>nigra</i> (Haworth, 1828) = <i>cautella</i> Zeller, 1839	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
3483	<i>turpella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>pinguinella</i> Treitsche, 1832	*	Steuer, 1993	GP Nr. 4184	
3484	<i>rhombelliformis</i> Staudinger, 1871	+	STEUER (1984, 1995)		
3486	<i>sestertiella</i> Herrich-Schäffer, 1854	*	Rommel, 2003		
3489	<b><i>Psoricoptera</i> Stainton, 1854</b>				
3490	<i>speciosella</i> Teich, 1892	*	Steuer, 1988	GP Nr. 3383	
3491	<i>gibbosella</i> (Zeller, 1839)	*	Rommel, 2004		
3492	<b><i>Mirificarma</i> Gozmany, 1955</b>				
3495	<i>maculatella</i> (Hübner, 1796)	*	Melzer, 2007, 2009		
3500	<i>lentiginosella</i> (Zeller, 1839)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1989	
3503	<i>interrupta</i> (Curtis, 1827) = <i>interruptella</i> Hübner, 1993 nec Götze 1783	*	Büchner, 1994		
3507	<i>mulinella</i> (Zeller, 1839) = <i>caminariella</i> Fuchs, 1902 = <i>nigraesilvae</i> Amsel, 1950	*	Büchner, 2010		
3508	<b><i>Chionodes</i> Hübner, 1825</b>				
3510	<i>tragicella</i> (Heyden, 1865)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1987	
3511	<i>luctuella</i> (Hübner, 1793)	*	Hausenblas, 1998	Hausenblas in lit.	
3517	<i>continuella</i> (Zeller, 1839)	+	Rapp (1936a)		A
3520	<i>distinctella</i> (Zeller, 1839)	*	Steuer, 2001	GP Nr. 4613	
3524	<i>electella</i> (Zeller, 1839)	*	Rommel, 2002		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3527	<i>fumatella</i> (Douglas, 1850) = <i>celerella</i> Stainton, 1851 = <i>oppletella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>nigricans</i> Heinemann, 1870 = <i>reuttiella</i> Heinemann, 1870	*	Steuer, 2000	GP Nr. 4550	
3529	<b><i>Aroga Busck, 1914</i></b>				
3530	<i>velocella</i> (Zeller, 1839)	*	Steuer, 1995	GP Nr. 4627	
3532	<i>flavicomella</i> (Zeller, 1839)	+	STEUER (1984, 1995)		
3535	<b><i>Filatima Busck, 1939</i></b>				
3536	<i>spurcella</i> (Duponchel, 1843)	*	GAEDIKE (2009)	2005, 2007, leg. Stübner	
3537	<i>incomptella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	+	RAPP (1936a)		
3544	<b><i>Neofriseria Sattler, 1960</i></b>				
3545	<i>peliella</i> (Treitschke, 1835)	*	Büchner, 1994		
3546	<i>singula</i> (Staudinger, 1876) = <i>suppeliella</i> Walsingham, 1896	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1972	
3548	<b><i>Prolita Leraut, 1993</i></b>				
3549	<i>sexpunctella</i> (Fabricius, 1794) = <i>virgella</i> Thunberg, 1794 = <i>longicornis</i> Curtis, 1827 = <i>zebrella</i> Treitschke, 1833	+	STEUER (1984, 1995)		
3551	<b><i>Athrips Billberg, 1820</i></b>				
3554	<i>rancidella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>triatomea</i> Mühlig, 1864 = <i>vepretella</i> Zeller, 1870 = <i>superfetella</i> Peymerimhoff, 1877	*	Melzer, 2009		
3557	<i>nigricostella</i> (Duponchel, 1842)	+	RAPP (1936a)	Belege det. Karsholt	
3559	<i>mouffetella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>pedisequella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2009		
3563	<b><i>Gnorimoschema Busck, 1900</i></b>				
3569	<i>steueri</i> Povolny, 1975	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3935	
3576	<b><i>Scrobipalpa Janse, 1951</i></b> = <i>Ilseopsis</i> Povolny, 1965 = <i>Euscoripalpa</i> Povolny, 1968				
3580	<i>acuminatella</i> (Sircom, 1850) = <i>porectella</i> Heinemann, 1870	*	Melzer, 2009, 2011		
3584	<i>artemisiella</i> (Treitschke, 1833)	*	Steuer, 2001	GP Nr. 4580	
3585	<i>atriplicella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1841) = <i>atrella</i> Thunberg, 1788 nom. praeocc.	*	Melzer, 2011		

K&R	TAXON	N	QUELLE	BEMERKUNGEN	A
3590	<i>chrysanthemella</i> (E. Hofmann, 1867) = <i>opificella</i> Mann, 1878	*	STEUER (1998)	Nachweis 1994	
3616	<i>nitentella</i> (Fuchs, 1902) = <i>seminella</i> Pierce & Metcalfe, 1935	*	Büchner, 2010, 2012		
3618	<i>obsoletella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1841)	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4193	
3620	<i>pauperella</i> (Heinemann, 1870) = <i>klimeschi</i> auct. nec Povolny, 1967	*	STEUER (1998)	Nachweis 1994, 1996	
3623	<i>proclivella</i> (Fuchs, 1886) = <i>rancidella</i> auct.	*	Büchner, 2006		
3628	<i>salinella</i> (Zeller, 1847)	+	RAPP (1936a) GERSTBERGER (2003)	Nachweis vor 1931	
3645	<b><i>Scrobipalpula</i> Povolny, 1964</b>				
3646	<i>psilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>pallidella</i> Heinemann, 1870	+	STEUER (1984, 1995)		
3645 a	<i>tussilaginis</i> (Frey, 1867) = <i>tussilaginella</i> Heinemann, 1870	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4196	
3647	<b><i>Phthorimaea</i> Meyrick, 1902</b>				
3648	<i>operculella</i> (Zeller, 1873) = <i>solanella</i> Boiduval, 1874	*	STEUER (2002)	Nachweis 1999 leg. Hausenblas	
3649	<b><i>Ephysteris</i> Meyrick, 1908</b>				
3660	<i>inustella</i> (Zeller, 1847)	*	GAEDIKE (2009)	2002, 2005, 2007, leg. Stübner	
3668	<b><i>Cosmardia</i> Povolny, 1965</b>				
3669	<i>moritzella</i> (Treitschke, 1835) = <i>morizella</i> Geyer, 1836	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1989	
3678	<b><i>Caryocollum</i> Gregor &amp; Povolny, 1954</b>				
3679	<i>fischerella</i> (Treitschke, 1833)	+	STEUER (1984, 1995)		
3680	<i>tischeriella</i> (Zeller, 1839)	+	Steuer, 1997	GP Nr. 4310	
3682	<i>viscariella</i> (Stainton, 1855)	*	GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
3684	<i>vicinella</i> (Douglas, 1851) = <i>inflatella</i> Chrétien, 1901	*	Steuer, 1983	GP Nr. 2458	
3686	<i>amaurella</i> (M. Hering, 1924) = <i>viscariae</i> Schütze, 1926	*	Steuer, 1996	GP Nr. 4311	
3689	<i>petryi</i> (O. Hofmann, 1899) = <i>rougemonti</i> Rebel, 1907	*	Gaedike (2008)	2002, leg. Stübner	
3699	<i>leucomelanella</i> (Zeller, 1839) = <i>gypsophilae</i> Stainton, 1889	*	Steuer, 1997	GP Nr. 4309	
3712	<i>blandella</i> (Douglas, 1852) = <i>maculea</i> auct.	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3715	<i>proxima</i> (Haworth, 1828) = <i>maculifera</i> Douglas, 1851 = <i>horticola</i> Peyerimhoff, 1871	*	Steuer, 1991	GP Nr. 3780	
3718	<i>tricolorella</i> (Haworth, 1812) = <i>arcernella</i> Herrich-Schäffer, 1854	*	Büchner, 2010		
3720	<i>junctella</i> (Douglas, 1851)	*	Büchner, 2011		
3721	<i>cassella</i> (Walker, 1864) = <i>vicinella</i> sensu Petry, 1912 = <i>albifasciella</i> Toll, 1936	*	Sutter, 1996		
3724	<i>huebneri</i> (Haworth, 1828) = <i>knaggsiella</i> Stainton, 1866	*	Steuer, 1991	GP Nr. 3733	
3725	<i>kroesmanniella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>heubneri</i> auct.	*	Büchner, 2010		
3726	<b><i>Tila Povolny, 1965</i></b>				
3727	<i>capsophilella</i> (Chrétien, 1900)	*	HOCKEMEYER (1958) Strutzberg, 2012		
3748	<b><i>Sophronia Hübner, 1825</i></b>				
3749	<i>semicostella</i> (Hübner, 1813) = <i>marginella</i> Thunberg, 1794	*	Büchner, 2012		
3754	<i>ascalis</i> Gozman, 1951	*	STEUER (2002)	Nachweis 1995	
3756	<i>chilonella</i> (Treitschke, 1833)	*	Rapp (1936a) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
3757	<i>humeralis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 1994		
3759	<i>sicariellus</i> (Zeller, 1839)	*	Melzer, 2011, 2012		
3764	<b><i>Stomopteryx Heinemann, 1870</i></b>				
3771	<i>remissella</i> (Zeller, 1847) = ? <i>vetusella</i> Herrich-Schäffer, 1854 = <i>rufobasella</i> Rebel, 1916	*	Steuer, 1993	GP Nr. 3905+3906	
3775	<b><i>Synycopacma Meyrick, 1925</i></b> = <i>Lixcodessa</i> Gozman, 1957				
3776	<i>patruella</i> (Mann, 1857) = <i>fulvistriella</i> Rebel, 1981	*	Steuer, 1995	GP Nr. 4095	
3777	<i>coronillella</i> (Treitschke, 1833)	*	Melzer, 2009, 2010		
3779	<i>sangiella</i> (Stainton, 1863) = <i>nigritella</i> sensu Ostheder, 1951	+	STEUER (1984, 1995)		
3780	<i>cinctella</i> (Clerck, 1759) = <i>vorticella</i> Scopoli, 1763 = <i>ligulella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	+	STEUER (1984, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3781	<i>larseniella</i> Gozmány, 1957 = <i>ligulella</i> auct.	*	Büchner, 1995, 2007		
3782	<i>wormiella</i> (Wolff, 1958)	*	Büchner, Gregersen, 2011, GAEDIKE (2012)		
3784	<i>ochrofasciella</i> (Toll, 1936)	*	Melzer, 2008, 2009 Strutzberg, 2011		
3785	<i>taeniolella</i> (Zeller, 1839)	*	Strutzberg, 2009 Melzer, 2011		
3789	<i>vinella</i> (Bankes, 1898) = <i>biformella</i> Schütze, 1902	*	Büchner, 2011		
3797	<b><i>Aproaerema Durrant. 1897</i></b>				
3798	<i>anthyllidella</i> (Hübner, 1813)	*	Melzer, 2010 Büchner, 2011		
3803	<b><i>Anacampsis Curtis, 1827</i></b>				
3804	<i>populella</i> (Clerck, 1759) = <i>fuscatella</i> Bentinck, 1934	*	Melzer, 2009 Büchner, 2011		
3805	<i>blattariella</i> (Hübner, 1796) = <i>betulinella</i> Väri, 1941	*	Büchner, 2008		
3806	<i>timidella</i> (Wocke, 1887) = <i>Quercella</i> Chrétien, 1907 = <i>disquei</i> Mees, 1907	*	Rommel, 2004 .		
3807	<i>scintillella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1841)	*	Strutzberg, 2012		
3812	<i>obscurella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>subsequella</i> Hübner, 1796	*	Melzer, 2008, 2009, 2011		
3813	<b><i>Mesophleps Hübner, 1825</i></b> = <i>Brachyacma</i> Meyrick, 1886				
3816	<i>silacella</i> (Hübner, 1796)	*	Gregersen, 2011		
3821	<b><i>Anarsia Zeller, 1839</i></b>				
3822	<i>lineatella</i> Zeller, 1839	*	Rommel, 2004		
3823	<i>spartiella</i> (Schrank, 1802)	*	Büchner, 2008		
3826	<b><i>Hypatima Hübner, 1825</i></b> = <i>Chelarta</i> Haworth, 1828				
3827	<i>rhomboidella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>conscriptella</i> Hübner, 1805 = <i>huebnerella</i> Donovan, 1806	*	Melzer, 2009		
3828	<b><i>Nothris Hübner, 1825</i></b>				
3829	<i>verbascella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
3832	<b><i>Neofaculta Gozmany, 1955</i></b>				
3833	<i>ericetella</i> (Geyer, 1832)	*	Büchner, 2007		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3834	<i>infernella</i> (Herrich-Schäffer, 1854) = <i>infernalis</i> (nicht verfügbar)	*	Büchner, 2009		
3840	<b><i>Dichomeris</i> Hübner, 1818</b> = <i>Gaesota</i> Walker, 1864 = <i>Acanthophila</i> Heinemann, 1870 = <i>Mimomeris</i> Povolny, 1978				
3848	<i>juniperella</i> (Linnaeus, 1761)	+	RAPP (1936a)		
3849	<i>marginella</i> (Fabricius, 1781) = <i>striatella</i> Hübner, 1796 = <i>clarella</i> Treitschke, 1833	*	Melzer, 2007, 2009, 2012		
3850	<i>ustalella</i> (Fabricius, 1794)	*	Rommel, 2008		
3851	<i>derasella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>fasciella</i> Hübner, 1796	*	Melzer 2008 2009		
3852	<i>limosellus</i> (Schläger, 1849) = <i>deflectivella</i> Reutti, 1853	+	KNAPP (1887) KARSHOLT (1995)	Typenfundort Jena	A
3855	<i>barbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	RAPP (1936a)		
3857	<i>alacella</i> (Zeller, 1839)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1984	
3858	<i>latipennella</i> (Rebel, 1937) = <i>scotosiella</i> Hackmann, 1945 = <i>piceana</i> Sulcs, 1945 = <i>steueri</i> Povolny, 1978	*	Hauserblas, 1996	Beleg in coll. Hauserblas . Steuer det. GU 4408	
3861	<b><i>Brachmia</i> Hübner, 1825</b>				
3863	<i>blandella</i> (Fabricius, 1798) = <i>gerronella</i> Zeller, 1850	*	Büchner, 2010		
3865	<i>inornatella</i> (Douglas, 1850)	*	Büchner, 2004		
3866	<b><i>Helcystogramma</i> Zeller, 1877</b> = <i>Ceratophora</i> Heinemann, 1870 nec Gray, 1835				
3869	<i>lutatella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	*	Büchner, 2008		
3870	<i>rufescens</i> (Haworth, 1828) = <i>diaphanella</i> Lienig & Zeller, 1846	*	Melzer, 2012		
3873	<b><i>Acompsia</i> Hübner, 1825</b>				
3874	<i>cinerella</i> (Clerck, 1759)	*	Strutzberg, 2010		
3882	<b><i>Telephila</i> Meyrick, 1895</b>				
3883	<i>schmidtiellus</i> (Heyden, 1848) = <i>durdhamellus</i> Stainton 1849	*	Melzer, 2010, 2012		
3887	<b><i>Pexicopia</i> Common, 1958</b>				
3888	<i>malvella</i> (Hübner, 1805) = <i>umbrella</i> auct. nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2006		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
3889	<b><i>Platyedra</i> Meyrick, 1895</b>				
3890	<i>subcinerea</i> (Haworth, 1828) = <i>vilella</i> Zeller, 1847	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis von 1964 - 1972	
3894	<b><i>Thiotricha</i> Meyrick, 1896</b>				
3896	<i>subocellea</i> (Stephens, 1834) = <i>internella</i> Lienig & Zeller, 1846 = <i>dissonella</i> Herrich-Schäffer, 1854	*	Melzer, 2008		
4182	<b>Tortricoidea</b>				
4183	<b>Tortricidae</b>				
4184	<b>Tortricinae</b>				
4185	<b>Cochylini</b>				
4186	<b><i>Phtheochroa</i> Stephens, 1829</b> = <i>Trachysmia</i> Guenèe, 1845				
4188	<i>schreibersiana</i> (Frölich, 1828)	*	Rommel, 2005		A
4191	<i>pulvillana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Strietzel, 2006		
4193	<i>sodaliana</i> (Haworth, 1811) = <i>amandana</i> Herrich-Schäffer, 1854	*	Sutter, 1987		
4214	<i>rugosana</i> (Hübner, 1799) = <i>v-albana</i> Donovan, 1806	*	Schadewald, 1988		A
4220	<b><i>Cochylimorpha</i> Ratowski, 1959</b> = <i>Stenodes</i> Guenèe, 1845 nec Dujardin, 1844		.		
4221	<i>hilarana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	+	RAPP (1936a)		A
4228	<i>elongana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1839) = <i>impurana</i> Mann, 1855	+	KARISCH (1993)		
4237	<i>woliniana</i> (Schleich, 1868)	+	RAPP (1936a)		A
4247	<i>straminea</i> (Haworth, 1811) = <i>tischerana</i> Treitschke, 1830	+	RAPP (1936a)		A
4251	<i>alternana</i> (Stephens, 1834)	*	Rommel, 2008		
4252	<b><i>Phalonidia</i> Le Marchand, 1933</b>				
4253	<i>gilvicomana</i> (Zeller, 1847) = <i>flaviscapulana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Steuer, 1989	GP Nr. 3469	
4254	<i>curvistrigana</i> (Stainton, 1859)	*	Rommel, 2003		A
4255	<i>manniana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1839) = <i>udana</i> Guenèe, 1845 = <i>notulana</i> Zeller, 1847	*	Theimer, 2007		
4256	<i>affinitana</i> (Douglas, 1846)	*	GERSTBERGER (2003) GAEDIKE (2008)	Nachweis 2002	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4260	<b><i>Gynnidiomorpha</i> Turner, 1916</b> = <i>Pierceia</i> Filipjev, 1940				
4263	<i>vectisana</i> (Humphreys & Westwood, 1845) = <i>geyeriana</i> Herrich-Schäffer, 1851 = <i>griseana</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2012		
4265	<i>permixtana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>mussehliana</i> Treitschke, 1835	+	RAPP (1936a)		A
4266	<i>alismana</i> (Ragonot, 1883) = <i>udana</i> auct.	*	Büchner, 2012		
4267	<b><i>Agapeta</i> Hübner, 1822</b>				
4268	<i>hamana</i> (Linnaeus, 1758) = <i>trigonana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
4271	<i>zoegana</i> (Linnaeus, 1767)	*	Büchner, 2011		
4276	<b><i>Fulvoclyisia</i> Obraztsov, 1943</b>				
4277	<i>nerminae</i> Koçak, 1982 = <i>fulvana</i> Fischer v. Röslerstamm, 1836	*	Sutter, 1988		
4285	<b><i>Eupoecilia</i> Stephens, 1829</b>				
4286	<i>cebrana</i> (Hübner, 1813)	+	HEINEMANN (1863) RAPP (1936a)		A
4287	<i>angustana</i> (Hübner, 1799) = <i>cruentana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2008		
4288	<i>ambiguella</i> (Hübner, 1796) = <i>uvae</i> Menning, 1811 = <i>roserana</i> Frölich, 1828	*	STEUER (1970, 1991, 1995)	Nachweis 1982	
4289	<i>sanguisorbana</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	*	STEUER (1970, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
4293	<b><i>Aethes</i> Billberg, 1820</b>				
4294	<i>hartmanniana</i> (Clerck, 1758) = <i>baumanniana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Melzer, 2011		
4295	<i>piercei</i> (Obraztsov, 1952)	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1963, 1968	
4296	<i>williana</i> (Brahm, 1791) = <i>zephyrana</i> Treitschke, 1830 = <i>dubrisana</i> Curtis, 1834	*	Strutzberg, 2009 Büchner, 2011		
4303	<i>margaritana</i> (Haworth, 1811) = <i>dipoltella</i> Hübner, 1813	*	Rommel, 2006		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4308	<i>rutilana</i> (Hübner, 1817) = <i>roridana</i> Mann, 1867	+	RAPP (1936a)		A
4309	<i>smeathmanniana</i> (Fabricius, 1781)	*	Büchner, 2012		
4310	<i>tesserana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>aleella</i> Schulze, 1776 = <i>heiseana</i> Fabricius, 1794	*	Büchner, 2012		
4315	<i>flagellana</i> (Duponchel, 1836) = <i>eryngiana</i> Heyden, 1865	*	Sutter, 1985		
4321	<i>francillana</i> (Fabricius, 1794)	*	Steuer, 1995	GP Nr. 4088	
4323	<i>tornella</i> (Walsingham, 1898)	+	Petry, 1912		A
4326	<i>cnicana</i> (Westwood, 1854)	*	Rommel, 1996		
4327	<i>rubigana</i> (Treitschke, 1830) = <i>badiana</i> Hübner, 1799, nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2007		
4331	<i>kindermanniana</i> (Treitschke, 1830)	*	Rommel, 2008		A
4333	<b><i>Cochylidia Obraztsov, 1956</i></b>				
4334	<i>rupicolla</i> (Curtis, 1834)	*	Steuer, 1991	GP Nr. 3800	
4335	<i>subroseana</i> (Haworth, 1811) = <i>phaleratana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Steuer, 1981		
4336	<i>richteriana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1837)	+	RAPP (1936a)		A
4339	<i>implicitana</i> (Wocke, 1856) = <i>coercitana</i> Staudinger, 1859	*	Büchner, 2010		
4346	<b><i>Cochylis Treitschke, 1829</i></b>				
4347	<i>nana</i> (Haworth, 1811) = <i>ambiguana</i> Frölich, 1828	*	Schöps, 2009		
4348	<i>roseana</i> (Haworth, 1811) = <i>rubellana</i> Hübner, 1823 = <i>dipsaceana</i> Duponchel, 1842	*	Büchner, 1994		
4349	<i>flaviciliana</i> (Westwood, 1854) = <i>amseli</i> Obraztsov, 1956	*	Steuer, 1992	GP Nr. 3900	
4350	<i>epilinana</i> Duponchel, 1842	+	STEUER (1970, 1991, 1995)	Nachweis 1960, 1966 1970 als <i>C. phaleratana</i>	
4351	<i>hybridella</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2010		
4353	<i>dubitana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2011		
4355	<i>atricapitana</i> (Stephens, 1852)	*	Büchner, 1994		
4358	<i>pallidana</i> Zeller, 1847	+	RAPP (1936a)		A
4359	<i>posterana</i> Zeller, 1847 = <i>ambiguana</i> Treitschke, 1830, nom. praeocc.	*	STEUER (1970, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4361	<i>Cryptocochylis</i> Razowski, 1960				
4362	<i>conjunctionana</i> (Mann, 1864)	+	RAPP (1936a)		
4363	<i>Falseuncaria</i> Obraztsov & Swatschek, 1958				
4365	<i>ruficiliana</i> (Haworth, 1811) = <i>ciliella</i> Hübner, 1799, nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
4366	<i>Tortricini</i>				
4367	<i>Spatialistis</i> Meyrick, 1907				
4368	<i>bifasciana</i> (Hübner, 1787)	*	Rommel, 2001		
4369	<i>Tortrix</i> Linnaeus, 1758				
4370	<i>viridana</i> Linnaeus, 1758	*	Büchner, 2011		
4371	<i>Aleimma</i> Hübner, 1825				
4372	<i>loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2012		
4373	<i>Acleris</i> Hübner, 1825 = <i>Croesia</i> Hübner, 1825				
4374	<i>holmiana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2011		
4375	<i>forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2010		
4376	<i>bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Melzer, 2007		
4378	<i>comariana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Sutter, 1996		
4379	<i>laterana</i> (Fabricius, 1794) = <i>latifasciana</i> Haworth, 1811 = <i>schalleriana</i> auct. nec Linnaeus = <i>comparana</i> Hübner, 1823 = <i>labeculana</i> Freyer, 1831	*	Hofmann, 2001	Beleg in coll. Büchner	
4380	<i>abietana</i> (Hübner, 1822)	*	Steuer, 1985	GP Nr. 2699	
4382	<i>maccana</i> (Treitschke, 1835) = <i>torquana</i> Zetterstedt, 1840	+	RAPP (1936a)		A
4383	<i>sparsana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>sponsana</i> Fabricius, 1787 = <i>favillaceana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2010 Melzer, 2011		
4384	<i>rhombana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>reticulana</i> Ström, 1783 = <i>contaminana</i> Stainton, 1859	*	Melzer, 2010		
4385	<i>emargana</i> (Fabricius, 1775)	*	Büchner, 2005		
4386	<i>schalleriana</i> (Linnaeus, 1761) = <i>logiana</i> Fabricius, 1775 = <i>tristana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2008 Melzer, 2008,09,11		A
4387	<i>lorquiniana</i> (Duponchel, 1835)	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1964, 1969	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4388	<i>umbrana</i> (Hübner, 1799)	+	RAPP (1936a)		A
4389	<i>cristana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2010		
4390	<i>variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>abildgaardana</i> Fabricius, 1794 = <i>cristana</i> Hübner, 1799	*	Melzer, 2009		
4391	<i>aspersana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2002		
4392	<i>shepherdana</i> (Stephens, 1852)	*	Büchner, 2004		
4394	<i>hastiana</i> (Linnaeus, 1775)	*	Philipp, 2009		
4396	<i>permutana</i> (Duponchel, 1836)	*	Rommel, 2002		
4397	<i>hyemana</i> (Haworth, 1811) = <i>mixtana</i> Hübner, 1813	+	RAPP (1936a)		A
4398	<i>scabrana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>sparsana</i> Frölich, 1828	+	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1960, 1962	
4402	<i>ferrugana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>rufana</i> Hübner, 1799 = <i>lithargyrana</i> Herrich-Schäffer, 1851 = <i>selasana</i> Herrich-Schäffer, 1851 = <i>fissurana</i> Pierce & Metcalfe, 1915	*	Rommel, 2007	GP Nr. 304/2008	
4403	<i>notana</i> (Donovan, 1806) = <i>tripunctana</i> Hübner, 1799 nom. praeocc. = <i>ferrugana</i> auct. nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2004	GP Nr. 155/2005	
4405	<i>kochiella</i> (Goeze, 1783) = <i>boscana</i> Fabricius, 1794 = <i>parisiana</i> Guenée, 1845	+	RAPP (1936a)		A
4407	<i>logiana</i> (Clerck, 1759) = <i>niveana</i> Fabricius, 1787	*	Rommel, 2003		
4408	<i>roscidana</i> (Hübner, 1799) = <i>nebulana</i> Hübner, 1799	+	RAPP (1936a)		A
4409	<i>literana</i> (Linnaeus, 1758) = <i>squamana</i> Fabricius, 1775	*	STEUER (1970, 1991, 1995)	Nachweis „nach1982“	
4411	<i>lipsiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1961, 1965	
4412	<i>rufana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>apiciana</i> Hübner, 1793	*	GAEDIKE (2011)		
4413	<i>imbriiana</i> (Thunberg, 1791) = <i>lupricana</i> Mann, 1867	+	RAPP (1936a)		A

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4414	<b>Cnephiasiini</b>				
4417	<b>Xerocnephasia Leraut, 1979</b>				
4418	<i>rigana</i> (Sodoffsky, 1829)	*	Philipp, 2007		
4419	<b>Neosphaleroptera Réal, 1953</b>				
4420	<i>nubilana</i> (Hübner, 1799) = <i>oxyacanthana</i> auct. nec Herrich-Schäffer, 1851	*	Melzer, 2009		
4427	<b>Doloploca Hübner, 1825</b>				
4428	<i>punctulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2008		
4435	<b>Exapate Hübner, 1825</b>				
4436	<i>congelatella</i> (Clerck, 1759) = <i>gelatella</i> Linnaeus, 1761	*	Büchner, 1995 Philipp, 2012		
4438	<b>Tortricodes Guenée, 1845</b>				
4439	<i>alternella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>tortricella</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2008		
4441	<b>Eana Billberg, 1820</b>				
4443	<i>osseana</i> (Scopoli, 1763) = <i>pratana</i> Hübner, 1813	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1960, 1969. Seit 1972 keine Funde.	
4444	<i>argentana</i> (Clerck, 1759) = <i>gojana</i> Linnaeus, 1761	*	Philipp, 2008		
4450	<i>incanana</i> (Stephens, 1852)	*	Strutzberg, 2008		
4455	<i>derivana</i> (La Harpe, 1858)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1988	
4460	<i>cyanescana</i> (Real, 1953)	+	STEUER (2002) GAEDIKE (2008)	Nachweis 1966	
4462	<i>penziana</i> (Thunberg, 1791)	*	Strietzel, 2007		
4469	<b>Cnephasia Curtis, 1826</b>				
4471	<i>incertana</i> (Treitschke, 1835) = <i>minorana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2011		
4474	<i>stephensiiana</i> (Doubleday, 1849) = <i>chrysanteana</i> auct. nec Duponchel = <i>wilkinsoni</i> Réal, 1952 = <i>alternella</i> auct. nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2010		
4475	<i>alticollana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Steuer, 1997	GP Nr. 4276	
4477	<i>asseclana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>interjectana</i> Haworth, 1811 = <i>virgaureana</i> Reitschke, 1835	*	Büchner, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4479	<i>pasiuana</i> (Hübner, 1799) = <i>pascuana</i> Hübner, 1822 = <i>obsoletana</i> Stephens, 1834 = <i>pasivana</i> Treitschke, 1835 = <i>pumicana</i> Zeller, 1847 = <i>bleszynskii</i> Toll, 1953	*	Melzer, 2010 Büchner, 2012		
4480	<i>genitalana</i> Pierce & Metcalfe, 1922 = <i>humeraana</i> Peyerimhoff, 1877	*	Büchner, 2009 Melzer, 2010		
4482	<i>communana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Strutzberg, 2008 Büchner, 2010		
4493	<i>longana</i> (Haworth, 1811)	*	Strietzel, 2006		
4504	<i>ecullyana</i> Réal, 1951 = <i>tyrrhaenica</i> Amsel, 1952	*	Rommel, 2003	GP Nr. 227/2005	
4513	<b>Sparganothini</b>				
4513	<b><i>Sparganothis</i> Hübner, 1825</b>				
4517	<i>pilleriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2001		
4518	<b>Euliini</b>				
4519	<b><i>Eulia</i> Hübner, 1825</b>				
4520	<i>ministrana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Schöps, 2010		
4521	<b><i>Pseudargyrotoza</i> Obraztsov, 1854</b>				
4522	<i>conwagana</i> (Fabricius, 1775) = <i>conwayana</i> Gmelin, 1790	*	Melzer, 2009 Büchner, 2011		
4523	<b>Ramapesiini</b>				
4524	<b><i>Ditula</i> Stephens, 1829</b> = <i>Batodes</i> Guenée, 1845				
4525	<i>angustiorana</i> (Haworth, 1811)	*	Hofmann, 2008		A
4530	<b><i>Epagoge</i> Hübner, 1825</b>				
4531	<i>grotiana</i> (Fabricius, 1781)	*	Schöps, 2008		
4532	<b><i>Paramesia</i> Stephens, 1829</b> = <i>Ramapesia</i> Razowski, 1981				
4533	<i>gnomana</i> (Clerck, 1759) = <i>costana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
4538	<b><i>Periclepsis</i> Bradley, 1977</b>				
4539	<i>cinctana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2002		
4540	<b><i>Philedone</i> Hübner, 1825</b>				
4541	<i>gerningana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>predotai</i> Hartig, 1939	*	Melzer, 2011 Büchner, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4546	<i>Capua Stephens, 1834</i>				
4547	<i>vulgana</i> (Frölich, 1828) = <i>favillaceana</i> Hübner, 1817 nom. praeocc.	*	Büchner, 2011		
4548	<i>Philedonides</i> Hübner, 1825				
4549	<i>lunana</i> (Thunberg, 1784) = <i>prodomania</i> Hübner, 1816	*	Büchner, 2005 Melzer, 2010		
4553	<b>Archipini</b>				
4554	<i>Archips</i> Hübner, 1822				
4555	<i>oporana</i> (Linnaeus, 1758) = <i>piceana</i> Linnaeus, 1758	*	Rommel, 2007		
4557	<i>podana</i> (Scopoli, 1763) = <i>fulvana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
4558	<i>crataegana</i> (Hübner, 1799)	*	Melzer, 2007		
4559	<i>xylosteana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2011		
4560	<i>rosana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2011		
4561	<i>Choristoneura</i> Lederer, 1859				
4562	<i>diversana</i> (Hübner, 1817)	+	GAEDIKE (1990)		
4564	<i>hebenstreitella</i> (Müller, 1764) = <i>sorbiana</i> Hübner, 1799	*	Strietzel, 2006		
4567	<i>Argyrotaenia</i> Stephens, 1852				
4568	<i>ljungiana</i> (Thunberg, 1797) = <i>pulchellana</i> Haworth, 1811 = <i>politana</i> auct. nec [Denis & Schiffermüller], 1775	+	GAEDIKE (1990)		
4571	<i>Ptycholomoides</i> Obraztsov, 1954				
4572	<i>aerifera</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Büchner, 2011		
4573	<i>Ptycholoma</i> Stephens, 1829				
4574	<i>lecheana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2010		
4476	<i>Pandemis</i> Hübner, 1825				
4577	<i>cinnamomeana</i> (Treitschke, 1830)	*	Strutzberg, 2008		
4578	<i>corylana</i> (Fabricius, 1794)	*	Büchner, 2009		
4579	<i>cerasana</i> (Hübner, 1786) = <i>ribeana</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2010		
4580	<i>heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2010		
4583	<i>Syndemis</i> Hübner, 1825				
4584	<i>musculana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2011		
4585	<i>Lozotaenia</i> Stephens, 1829				
4590	<i>försterana</i> (Fabricius, 1781)	+	GAEDIKE (1990)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4593	<b><i>Aphelia</i> Hübner, 1825</b>				
4596	<i>paleana</i> (Hübner, 1793)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1986	
4597	<i>unitana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2010		
4601	<i>ferugana</i> (Hübner, 1793)	+	MARTINI (1916)		A
4604	<i>viburnana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>viburniana</i> Fabricius, 1787	+	GAEDIKE (1990)		
4605	<b><i>Dichelia</i> Guenée, 1845</b>				
4606	<i>histriionana</i> (Frölich, 1828)	*	Büchner, 2006		
4607	<b><i>Clepsis</i> Guenée, 1845</b>				
4614	<i>rogana</i> (Guenée, 1845) = <i>lusana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	GAEDIKE (1990)		
4616	<i>senencionana</i> (Hübner, 1819) = <i>helvolana</i> Frölich, 1828 = <i>rusticana</i> Treitschke, 1830	*	Melzer, 2009		
4618	<i>rurinana</i> (Linnaeus, 1758) = <i>modeeriana</i> Linnaeus, 1761 = <i>semialbana</i> Guenée, 1845	+	GAEDIKE (1990)		
4623	<i>spectrana</i> (Treitschke, 1830) = <i>costana</i> Fabricius, 1787 nom. praeocc.	*	Büchner, 2004		
4624	<i>pallidana</i> (Fabricius, 1776) = <i>strigana</i> Hübner, 1799 = <i>stramineana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	GAEDIKE (1990)		
4628	<i>neglectana</i> (Herrich-Schäffer, 1851) = <i>betulifoliana</i> Lederer, 1859 = <i>striolana</i> Ragonot, 1879	+	GAEDIKE (1990)		
4629	<i>consimilana</i> (Hübner, 1817) = <i>unifasciana</i> Duponchel, 1843 = <i>eatoniana</i> Ragonot, 1879	*	Büchner, 2007		
4636	<b><i>Adoxophyes</i> Meyrick, 1881</b>				
4637	<i>orana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1834) = <i>reticulana</i> Hübner, 1819 nom. praeocc.	*	Strietzel, 2008		
4640	<b>Chlidanotinae</b>				
4641	<b><i>Olindia</i> Guenée, 1845</b>				
4642	<i>schumacherana</i> (Fabricius, 1787) = <i>ulmana</i> Hübner, 1823	*	Büchner, 2009		
4643	<b><i>Isotrias</i> Meyrick, 1895</b>				
4646	<i>rectifasciana</i> (Haworth, 1811)	*	Büchner, 2011		
4651	<b>Olethreutinae</b>				
4652	<b>Bactrini</b>				
4653	<b><i>Bactra</i> Stephens, 1834</b>				
4655	<i>lancealana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4656	<i>furfurana</i> (Haworth, 1811)	+	STEUER (1970, 1995)		
4657	<i>lacteana</i> (Caradja, 1916) = <i>gozmaniana</i> Toll, 1958	*	Büchner, 2012		
4659	<i>robustana</i> (Christoph, 1872)	*	Büchner, 2012		
4663	<b>Endotheniini</b>				
4664	<b>Endothenia Stephens, 1852</b>				
4665	<i>gentianaeana</i> (Hübner, 1799) = <i>gentianana</i> Hübner, 1825	*	Büchner, 2009		
4666	<i>oblongana</i> (Haworth, 1811) = <i>gentianana</i> auct. nec Hübner = <i>sellana</i> Frölich, 1828	*	Steuer, 1992	GP Nr. 4179	
4667	<i>marginana</i> (Haworth, 1811) = <i>sellana</i> auct. nec Frölich	*	Büchner, 2012		
4669	<i>ustulana</i> (Haworth, 1811) = <i>carbonana</i> Doubleday, 1849	*	Büchner, 2009		
4670	<i>lapideana</i> (Herrich-Schäffer, 1851) = <i>digitaliana</i> Mühlig, 1863	+	RAPP (1936b) (Harz) GRAF et.al. (2002) GAEDIKE (2008)		
4671	<i>nigricostana</i> (Haworth, 1811)	*	Büchner, 2009		
4672	<i>ericetana</i> (Humphreys & Westwood, 1845) = <i>trifoliana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2006		
4673	<i>quadrimaculana</i> (Haworth, 1811) = <i>antiquana</i> Hübner, 1822	*	Strietzel, 2007		
4677	<b>Olethreutini</b>				
4678	<b>Eudemis Hübner, 1825</b>				
4679	<i>porphyrana</i> (Hübner, 1799) = <i>pomedaxana</i> Pierce & Metcalfe, 1915	*	Büchner, 2011		
4680	<i>profundana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
4687	<b>Selenodes Guenée, 1845</b>				
4688	<i>karellica</i> (Tengström, 1875) = <i>textana</i> Frölich, 1828	*	Steuer, 1993	GP Nr. 4010	
4689	<b>Pseudosciaphila Obraztsov, 1966</b>				
4690	<i>branderiana</i> (Linnaeus, 1758) = <i>fuscanata</i> Linnaeus, 1758 = <i>wahlbomiana</i> Linnaeus, 1758 = <i>asinana</i> Clerck, 1759	*	Rommel, 2006		
4691	<b>Apotomis Hübner, 1825</b>				
4692	<i>semifasciana</i> (Haworth, 1811) = <i>acutana</i> Treitschke, 1835	+	RAPP (1936a)		A
4695	<i>infida</i> (Heinrich, 1926)	+	STEUER (1970, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4697	<i>lineana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>hartmanniana</i> Linnaeus, 1761 = <i>scriptana</i> Hübner, 1799	*	Strietzel, 2006		A
4698	<i>inundana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 1996		
4700	<i>turbidana</i> (Hübner, 1825) = <i>corticana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2011		
4701	<i>betuletana</i> (Haworth, 1811) = <i>carbonana</i> Doubleday, 1849 = <i>leucomelana</i> Guenée, 1845	*	Rommel, 2008		
4703	<i>capreana</i> (Hübner, 1817)	*	Büchner, 2011		
4706	<i>sororculana</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>praelongana</i> Guenée, 1845 = <i>dimidiata</i> Sodoffsky, 1830	*	Büchner, 2006		
4708	<i>sauciana</i> (Frölich, 1828)	*	Büchner, 2009		
4710	<b><i>Orthotaenia</i> Stephens, 1829</b>				
4711	<i>undulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>urticana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2010		
4712	<b><i>Hedya</i> Hübner, 1825</b>				
4713	<i>salicella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>salicana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
4714	<i>nubiferana</i> (Haworth, 1811) = <i>dimidioalba</i> Retzius, 1783 = <i>variegana</i> Hübner, 1799, nom. praeocc.	*	Büchner, 2010		
4715	<i>pruniana</i> (Hübner, 1799) = <i>schreiberiana</i> Linnaeus, 1761	*	Büchner, 2012		
4717	<i>ochroleucana</i> (Frölich, 1828)	*	Rommel, 2002		
4718	<b><i>Metendothenia</i> Diakonoff, 1972</b>				
4719	<i>atropunctana</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>dimidiata</i> Sodoffsky, 1830 sensu Amsel	*	Erlacher, 2006	Beleg in coll. Rommel Kolbeck det.	
4720	<b><i>Celypha</i> Hübner, 1825</b>				
4721	<i>rufana</i> (Scopoli, 1763) = <i>rosetana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2012		
4722	<i>striana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
4723	<i>rosaceana</i> (Schläger, 1847) = <i>purpurana</i> Haworth, 1811, nom. praeocc.	+	STEUER (1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4724	<i>rurestrana</i> (Duponchel, 1843) = <i>lucivagana</i> Lienig & Zeller, 1846	*	GAEDIKE (2009)	2001, 2005, 2006, leg. Stübner	
4728	<i>cespitanata</i> (Hübner, 1817)	*	Büchner, 2011		
4731	<i>lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2010		
4732	<i>siderana</i> (Treitschke, 1835)	*	Büchner, 2009		
4733	<i>rivulana</i> (Scopoli, 1763)	*	Strietzel, 2006		
4739	<b><i>Phiaris</i> Hübner, 1825</b>				
4740	<i>umbrosana</i> (Freyer, 1842)	*	Theimer, 2007		
4742	<i>dissolutana</i> (Stange, 1866)	+	STEUER (1970, 1995)		
4743	<i>metallicana</i> (Hübner, 1799)	+	RAPP (1936a)		A
4744	<i>schulziana</i> (Fabricius, 1776) = <i>zinkenana</i> Treitschke, 1830	*	Büchner, 1991		
4748	<i>helveticana</i> (Duponchel, 1845) = <i>fulgidana</i> Guenée, 1845 = <i>gigantana</i> Herrich-Schäffer, 1851	o	HEINEMANN (1863) MARTINI (1916)		A
4749	<i>micana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>olivana</i> Treitschke, 1830 = <i>micana</i> sensu Hübner, 1799	*	Rommel, 2002		
4750	<i>palustrana</i> (Lienig & Zeller, 1846) = <i>disertana</i> Herrich-Schäffer, 1848	*	Büchner, 2012		
4752	<i>stibiana</i> (Guenée, 1845)	*	STEUER (1970, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
4755	<i>bipunctana</i> (Fabricius, 1794)	*	Rommel, 1996		
4759	<b><i>Pristerognatha</i> Obraztsov, 1960</b>				
4760	<i>penthinana</i> (Guenée, 1845) = <i>postremana</i> Lienig & Zeller, 1846	*	Büchner, 2008		
4761	<i>fuligana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	RAPP (1936a) Büchner, 2009		A
4762	<b><i>Cymolomia</i> Lederer, 1859</b>				
4763	<i>hartigiana</i> (Saxesen, 1840)	*	Büchner, 2012		
4764	<b><i>Argyroploce</i> Hübner, 1825</b>				
4769	<i>dalecarliana</i> (Guenée, 1845)	+	RAPP (1936a)		A
4770	<i>roseomaculana</i> (Herrich-Schäffer, 1851) = <i>lienigiana</i> Heinemann, 1863	+	RAPP (1936a)		A
4773	<b><i>Sictea</i> Guenée, 1845</b>				
4774	<i>mygindiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>flammeana</i> Frölich, 1828	+	Steuer, 1971		A

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4775	<b><i>Olethreutes Hübner, 1822</i></b>				
4776	<i>arcuella</i> (Clerck, 1759) = <i>arcuana</i> Linnaeus, 1761	*	Melzer, 2012		
4776 a	<i>subtilana</i> (Falkovitsh, 1959)	+	Gaedike (2011)		A
4777	<b><i>Piniphila Falkovitsch, 1962</i></b>				
4778	<i>bifasciana</i> (Haworth, 1811) = <i>decrepitana</i> Herrich-Schäffer, 1848	*	Büchner, 2007		
4779	<b><i>Pseudohermenias Obraztsov, 1960</i></b>				
4780	<i>abietana</i> (Fabricius, 1787) = <i>hercyniana</i> Bechstein & Scharfenberg, 1805 = <i>clausthaliana</i> Saxesen, 1840	*	Büchner, 2008		
4785	<b><i>Lobesiini</i></b>				
4786	<b><i>Lobesia Guenée, 1845</i></b>				
4791	<i>botrana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>vitisana</i> Jacquin, 1788	+	RAPP (1936a)		A
4793	<i>abscisana</i> (Doubleday, 1849) = <i>fuligana</i> auct.	*	Büchner, 2011		
4794	<i>reliquana</i> (Hübner, 1825) = <i>permixtana</i> Hübner, 1799, nom. praeocc.	*	Melzer, 2010		
4794 a	<i>virulenta</i> ssp. <i>mieana</i> Falck & Karsholt, 1998	*	GAEDIKE (2008)		
4798	<i>artemisiana</i> (Zeller, 1847) = <i>amaryllana</i> Millière, 1875	*	Rommel, 2003		
4806	<i>littoralis</i> (Humphreys & Westwood, 1854)	*	Rommel, 2004		A
4808	<b><i>Eucosmini</i></b>				
4809	<b><i>Eriopsela Guenée, 1845</i></b>				
4810	<i>quadrana</i> (Hübner, 1813) = <i>roseni</i> Obraztsov, 1952 = <i>bavarica</i> Obraztsov, 1952	*	Melzer, 2012		
4813	<b><i>Thiodia Hübner, 1825</i></b>				
4814	<i>torridana</i> (Lederer, 1859) = <i>hastana</i> Hübner, 1799, nom. praeocc.	*	Melzer, 2011		
4817	<i>citrana</i> (Hübner, 1799)	*	Rommel, 2007		
4825	<b><i>Rhopobota Lederer, 1839</i></b>				
4826	<i>myrtillana</i> (Humphreys & Westwood, 1845) = <i>vacciniana</i> Lienig & Zeller, 1846	*	Büchner, 2005		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4827	<i>stagnana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>fractifasciana</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2007		
4828	<i>ustomaculana</i> (Curtis, 1831)	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1964	
4829	<i>naevana</i> (Hübner, 1817) = <i>unipunctana</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2011		
4830	<b><i>Spilonota Stephens, 1829</i></b>				
4831	<i>ocellana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2008		
4832	<i>laricana</i> (Heinemann, 1863)	*	Büchner, 2011		
4835	<b><i>Gibberifera Obraztsov, 1946</i></b>				
4836	<i>simiplana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1836)	+	STEUER (1970, 1995)		
4837	<b><i>Epinotia Hübner, 1825</i></b>				
4838	<i>sordidana</i> (Hübner, 1824)	*	Büchner, 2010		
4839	<i>caprana</i> (Fabricius, 1798) = <i>semifuscana</i> Stephens, 1834	+	STEUER (1970, 1995)		
4840	<i>trigonella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>stroemiana</i> Fabricius, 1781 = <i>similana</i> Hübner, 1793 = <i>bimaculana</i> Donovan, 1808	*	Rommel, 2001		
4842	<i>brunnichiana</i> (Linnaeus, 1767) = <i>sinuana</i> auct. nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
4843	<i>maculana</i> (Fabricius, 1775) = <i>ophthalmicana</i> Hübner, 1799	*	Strutzberg, 2011		
4844	<i>solandriana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Rommel, 2004		
4845	<i>abbreviana</i> (Fabricius, 1794) = <i>trimaculana</i> Donovan, 1806 = <i>ulmariana</i> Duponchel, 1843	*	Steuer, 1986	GP Nr. 3139	
4848	<i>granitana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Büchner, 2011		
4849	<i>signatana</i> (Douglas, 1845)	*	Steuer, 1985	GP Nr. 2697	
4850	<i>cruciana</i> (Linnaeus, 1761) = <i>angustana</i> Hübner, 1813	*	STEUER (1970, 1991, 1995)	Nachweis 1989	
4853	<i>immundana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1839)	*	Büchner, 2011		
4856	<i>kochiana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	RAPP (1936a) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
4858	<i>nanana</i> (Treitschke, 1835)	*	Büchner, 2009		
4861	<i>demarniana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1840)	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4863	<i>subocellana</i> (Donovan, 1806) = <i>cAMPOLILIANA</i> Treitschke, 1830	*	Büchner, 2011 Strutzberg, 2012		
4864	<i>tetraquetranA</i> (Haworth, 1811) = <i>triquetranA</i> Haworth, 1811 = <i>frutetana</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2011		
4866	<i>pygmaeana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2007		
4867	<i>subsequana</i> (Haworth, 1811) = <i>abiegana</i> Guenée, 1845	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1961	
4869	<i>tenerana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>penkleriana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Melzer, 2011		
4870	<i>ramella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>payculliana</i> Fabricius, 1787 = <i>ramana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2012		
4871	<i>nigricana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1969	
4872	<i>rUBIGINOSANA</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Büchner, 2007		
4875	<i>tedella</i> (Clerck, 1759) = <i>comitana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Schöps, 2009		
4876	<i>fraternana</i> (Haworth, 1811) = <i>proximana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1961, 1969	
4877	<i>bilunana</i> (Haworth, 1811) = <i>cretaceana</i> Frölich, 1828	*	Büchner, 2010		
4878	<i>nisella</i> (Clerck, 1759) = <i>siliceana</i> Hübner, 1813 = <i>cinereana</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2010		
4881	<b><i>Zeiraphera</i> Treitschke, 1829</b>				
4882	<i>griseana</i> (Hübner, 1799) = <i>diniana</i> Guenée, 1845 = <i>pinicolana</i> Zeller, 1846	*	Strietzel, 2006		
4883	<i>rufimitrana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	+	STEUER (1970, 1991, 1995)	Seit 1970 keine Funde	
4884	<i>ratzeburgiana</i> (Saxesen, 1840) = <i>bimaculana</i> Schläger, 1848 = <i>binotanta</i> Wocke, 1861	*	Sutter, 1996		
4885	<i>isertana</i> (Fabricius, 1794) = <i>corticana</i> Hübner, 1813 = <i>communana</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2011		
4888	<b><i>Phaneta</i> Stephens, 1852</b>				
4889	<i>pauperana</i> (Duponchel, 1842)	*	Rommel, 2000		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4890	<b><i>Pelochrista Lederer, 1859</i></b>				
4896	<i>caecimaculana</i> (Hübner, 1799) = <i>kollariana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2011 Melzer, 2011		
4898	<i>modicana</i> (Zeller, 1847) = <i>trisignana</i> Nolcken, 1868 = <i>commodestanata</i> Rössler, 1877	+	STEUER (1970, 1995)		
4925	<b><i>Eucosma Hübner, 1823</i></b>				
4926	<i>obumbratana</i> (Lienig & Zeller, 1846) = <i>expallidana</i> auct. nec Haworth = <i>ibiceana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2010		
4932	<i>cana</i> (Haworth, 1811)	*	Melzer, 2011, 2012		
4935	<i>hohenwartiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>scopoliana</i> Haworth, 1811 = <i>fulvana</i> Stephens, 1834 = <i>jaceana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Rommel, 2007		
4939	<i>scutana</i> (Constant, 1893)	*	Büchner, 2004		
4942	<i>balatonana</i> (Ostheder, 1937) = <i>danicana</i> Schantz, 1962 = <i>fulvana</i> auct. nec Stephens, 1834	*	Steuer, 1998	GP Nr. 4380	
4943	<i>campoliliiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>nigromaculana</i> Haworth, 1811	*	Strutzberg, 2011		
4945	<i>aemulana</i> (Schläger, 1849) = <i>latiorana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Steuer, 1981	GP Nr. 3559	
4949	<i>lacteana</i> (Treitschke, 1835) = <i>maritima</i> Humphreys & Westwood, 1845 = <i>candidulana</i> Nolcken, 1870	+	STEUER (1970, 1995)		
4950	<i>albidulana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	+	RAPP (1936a)		
4953	<i>servidana</i> (Zeller, 1847) = <i>amellana</i> Preissecker, 1930	*	Melzer, 2012		
4958	<i>metzneriana</i> (Treitschke, 1830)	*	Strietzel, 2006		
4963	<i>conterminana</i> (Guenée, 1845)	*	Büchner, 2004		
4966	<i>aspidiscana</i> (Hübner, 1817)	*	Schöps, 2010		
4968	<i>pupillana</i> (Clerck, 1759) = <i>absinthiana</i> Hübner, 1799	+	GRAF et. al. (2002)		A
4982	<b><i>Gypsonoma Meyrick, 1895</i></b>				
4983	<i>minutana</i> (Hübner, 1799) = <i>imparana</i> Müller-Rutz, 1914	+	STEUER (1970, 1995)		
4985	<i>dealbana</i> (Frölich, 1828) = <i>incarnana</i> Haworth, 1811, nom. praeocc.	*	Büchner, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
4986	<i>oppressana</i> (Treitschke, 1835)	*	Büchner, 2010		
4987	<i>sociana</i> (Haworth, 1811) = <i>neglectana</i> Duponchel, 1844	*	Büchner, 2012		
4988	<i>nitidulana</i> (Lienig & Zeller, 1846) = <i>ericetana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	RAPP (1936a)		A
4989	<i>aceriana</i> (Duponchel, 1843) = <i>comitana</i> Haworth, 1811, nom. praeocc.	*	Büchner, 2008		
4992	<b><i>Epiblema</i> Hübner, 1825</b>				
4993	<i>sticticana</i> (Fabricius, 1794) = <i>farfare</i> Fletcher, 1938 = <i>brunnichiana</i> auct. nec Linnaeus	*	Philipp, 2007 Büchner, 2012		
4994	<i>scutulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>luctuosana</i> Duponchel, 1936 = <i>pflugiana</i> Haworth, 1811	*	Büchner, 2005		
4995	<i>cirsiana</i> (Zeller, 1843) = <i>scutulana</i> auct.	*	STEUER (2002) GAEDIKE (2008)		
4998	<i>foenella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>foenana</i> Treitschke, 1830	*	Büchner, 2009		
4999	<i>costipunctana</i> (Haworth, 1811) = <i>trigeminana</i> Stephens, 1834 = <i>poecilana</i> Guenée, 1845	*	Rommel, 2006		
5000	<i>junctana</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	+	RAPP (1936a)		A
5001	<i>hepaticana</i> (Treitschke, 1835)	*	Büchner, 2011		
5002	<i>turbidana</i> (Treitschke, 1835) = <i>zelleriana</i> Schläger, 1948	*	Rommel, 1998		
5003	<i>grandaevana</i> (Lienig & Zeller, 1846) = <i>tussilaginella</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Strietzel, 2007		
5005	<i>graphana</i> (Treitschke, 1835)	*	Theimer, 2005		
5007	<i>simplicanana</i> (Duponchel, 1835) = <i>sublimana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	RAPP (1936a)		A
5009	<i>similana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>asseclana</i> Hübner, 1799	*	Melzer, 2012		
5011	<i>obscurana</i> (Herrich-Schäffer, 1851) = <i>inulivora</i> Meyrick, 1932	*	GAEDIKE (2008) Melzer, 2012		
5018	<b><i>Notocelia</i> Hübner, 1825</b>				
5019	<i>cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>tripunctana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2008		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5020	<i>tetragonana</i> (Stephens, 1834) = <i>luctuosana</i> Herrich-Schäffer, 1851 = <i>amoenana</i> Hübner, 1817	*	Steuer, 1981	GP Nr. 1978	
5021	<i>uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2008		
5022	<i>roborana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>aquana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2010 Melzer, 2010		
5024	<i>incarnatana</i> (Hübner, 1800)	*	Büchner, 2010 Strutzberg, 2011		
5025	<i>rosaecollana</i> (Doubleday, 1850)	*	Büchner, 2008		
5026	<i>trimaculana</i> (Haworth, 1811) = <i>suffusana</i> Duponchel, 1843	*	Rommel, 2006		
5027	<b><i>Blastesthia Obraztsov, 1960</i></b>				
5028	<i>posticana</i> (Zetterstedt, 1839)	+	STEUER (1970, 1995)		
5029	<i>turionella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>turionana</i> Haworth, 1811	*	Rommel, 2001		
5032	<b><i>Retinia Guenée, 1845</i></b>				
5033	<i>resinella</i> (Linnaeus, 1758)	*	STEUER (1970, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5035	<b><i>Barbara Heinrich, 1923</i></b>				
5036	<i>herrichiana</i> Obraztsov, 1960	+	RAPP (1936a)		A
5037	<b><i>Gravitarmata Obraztsov, 1960</i></b>				
5038	<i>margarotana</i> (Heinemann, 1863)	+	RAPP (1936a)		A
5043	<b><i>Rhyacionia Hübner, 1825</i></b>				
5044	<i>buolianana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2009		
5045	<i>pinicollana</i> (Doubleday, 1849)	*	Büchner, 2011		
5048	<i>pinivorana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Büchner, 2007		
5049	<i>duplana</i> (Hübner, 1813) = <i>hafneri</i> Rebel, 1937	*	Brainich, 1986	Beleg in coll. Steuer. Steuer det. GP Nr. 2987	
	<b>Enarmoniini</b>				
5052	<b><i>Eucosmomorpha Obraztsov, 1951</i></b>				
5053	<i>albersana</i> (Hübner, 1813)	*	Melzer, 2012		
5054	<b><i>Enarmonia Hübner, 1825</i></b>				
5055	<i>formosana</i> (Scopoli, 1763) = <i>woeberiana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2005		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5056	<i>Ancylis</i> Hübner, 1825				
5057	<i>unguicella</i> (Linnaeus, 1758)	*	STEUER (1970, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5058	<i>uncella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>uncana</i> Hübner, 1799	*	STEUER (1970, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5059	<i>laetana</i> (Fabricius, 1775) = <i>lactana</i> Fabricius, 1781 = <i>harpana</i> Hübner, 1799	*	Melzer, 2009		
5061	<i>obtusana</i> (Haworth, 1811)	*	GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5062	<i>comptana</i> (Frölich, 1828)	*	Büchner, 2011		
5063	<i>upupana</i> (Treitschke, 1835)	*	Büchner, 2011		
5064	<i>geminana</i> (Donovan, 1806) = <i>biacuana</i> Stephens, 1834	*	Büchner, 2005		
5066	<i>diminutana</i> (Haworth, 1811)	*	RAPP (1936a) Rommel, 2003		A
5068	<i>unculana</i> (Haworth, 1811) = <i>derasana</i> Hübner, 1813	+	STEUER (1970, 1995)		
5069	<i>myrtillana</i> (Treitschke, 1830)	*	Büchner, 2007		
5070	<i>apicella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>siculana</i> Hübner, 1799	*	Melzer, 2009		
5071	<i>paludana</i> Barrett, 1886	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1988	
5073	<i>badiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>lundana</i> Fabricius, 1777	*	Büchner, 2011 Strutzberg, 2011		
5074	<i>achatana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Melzer, 2009		
5076	<i>mitterbacheriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
5077	<i>tineana</i> (Hübner, 1799)	+	STEUER (1995)		
5081	<b>Grapholitini</b>				
5082	<i>Cydia</i> Hübner, 1825 = <i>Grapholita</i> Treitschke, 1829 = <i>Coccyx</i> Treitschke, 1829				
5083	<i>fissana</i> (Frölich, 1828)	+	STEUER (1970, 1995)		
5084	<i>compositella</i> (Fabricius, 1775) = <i>gundiana</i> Hübner, 1799 = <i>simillimana</i> Toll, 1953	*	Melzer, 2011		
5087	<i>pallifrontana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Büchner, 2011 Melzer, 2011		
5089	<i>coronillana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Melzer, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5093	<i>caecana</i> (Schläger, 1847)	*	Melzer, 2007		
5094	<i>discretana</i> (Wocke, 1861)	+	RAPP (1936a)		A
5095	<i>gemmaferana</i> (Treitschke, 1835)	*	Rommel, 2006		
5097	<i>nebritana</i> (Treitschke, 1830)	+	RAPP (1936a)		A
5098	<i>jungiella</i> (Linnaeus, 1761) = <i>perlepidana</i> Haworth, 1811	*	Melzer, 2012 Strutzberg, 2009		
5099	<i>lathyrana</i> (Hübner, 1822) = <i>scopariana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1974	
5100	<i>lunulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>dorsana</i> auct. nec Fabricius	*	Rommel, 1992		
5101	<i>orobana</i> (Treitschke, 1830)	*	Rommel, 1998		
5102	<i>funebrana</i> (Treitschke, 1835)	*	Rommel, 2007		
5103	<i>tenebrosana</i> (Duponchel, 1843) = <i>roseticolana</i> Zeller, 1849	*	Büchner, 2012		
5104	<i>janthinana</i> (Duponchel, 1843) = <i>incisana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	STEUER (1984, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)	Nachweis 1976, 1980	
5111	<i>nigricana</i> (Fabricius, 1794) = <i>rusticella</i> Clerck, 1759 = <i>nebritana</i> Zeller, 1838	*	GAEDIKE (2009)	2004, leg. Stübner	
5113	<i>oxytropidis</i> (Martini, 1912)	*	Hausenblas, 1996	Beleg in coll. Hausenblas, Steuer det., GP Nr. 4233	
5116	<i>succedana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>assceclana</i> Hübner, 1800	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4237	
5125	<i>medicaginis</i> (Kuznetsov, 1962)	*	Steuer, 2001	GP Nr. 4594	
5128	<i>microgrammana</i> (Guenée, 1845)	*	Steuer, 2000	GP Nr. 4575	
5131	<i>duplicana</i> (Zetterstedt, 1839) = <i>interruptana</i> Herrich-Schäffer, 1851	+	STEUER (1970, 1984, 1995)		
5132	<i>cognatana</i> (Barrett, 1874)	+	Steuer (1984, 1995)	Nachweis 1967	
5134	<i>conicollana</i> (Heylaerts, 1874)	*	Rommel, 2001		
5135	<i>corollana</i> (Hübner, 1823)	+	RAPP (1936a)		A
5136	<i>coniferana</i> (Saxesen, 1840)	*	Steuer, 1983	GP Nr. 2421	
5137	<i>indivisa</i> (Danilevsky, 1963) = <i>interruptana</i> sensu Obrastzov, 1952	*	Sutter, 1996		
5138	<i>cosmophorana</i> (Treitschke, 1835) = <i>obscurana</i> Frölich, 1828	*	Rommel, 2000		
5139	<i>strobilella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>strobilana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2012		
5140	<i>pactolana</i> (Zeller, 1840)	*	Rommel, 1993		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5141	<i>grunertiana</i> (Ratzeburg, 1868)	+	STEUER (2002) GAEDIKE (2008)	Nachweis 1960, 1968	
5142	<i>millenniana</i> (Adamczewski, 1967) = <i>deciduana</i> Steuer, 1969	*	Büchner, 2008		
5143	<i>zebeana</i> (Ratzeburg, 1840) = <i>santacruciana</i> Karpinsky & Toll, 1962	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1968	
5144	<i>pomonella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>putaminana</i> Staudinger, 1859	*	Rommel, 2008		
5146	<i>servillana</i> (Duponchel, 1836)	+	RAPP (1936a)		A
5152	<i>splendana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2012		
5153	<i>fagiglandana</i> (Zeller, 1841) = <i>grossana</i> Haworth, 1811, nom. praeocc.	*	Büchner, 2011		
5154	<i>amplana</i> (Hübner, 1800)	*	Büchner, 2008		
5155	<i>inquinatana</i> (Hübner, 1800)	*	Büchner, 2009		
5162	<b><i>Lathronympha</i> Meyrick, 1926</b>				
5163	<i>strigana</i> (Fabricius, 1775) = <i>politana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775 = <i>hypericana</i> Hübner, 1799	*	Büchner, 2012		
5166	<b><i>Pammene</i> Hübner, 1825</b>				
5167	<i>aurana</i> (Fabricius, 1775) = <i>mediana</i> [Denis & Schiffermüller], 1775 = <i>aurantiana</i> Kollar, 1832	*	Büchner, 1998		
5168	<i>gallicana</i> (Guenée, 1845) = <i>rufillana</i> Doubleday, 1849	*	Büchner, 2010		
5173	<i>fasciana</i> (Linnaeus, 1761) = <i>juliana</i> Stephens, 1825	*	Rommel, 2007		
5173	<i>herrichiana</i> (Heinemann, 1854) a = <i>nimbana</i> Heinemann, 1863	*	GAEDIKE (2009)	2005, leg. Stübner	
5175	<i>splendidulana</i> (Guenée, 1845) = <i>plumbatana</i> Lienig & Zeller, 1846	*	Büchner, 1991		
5178	<i>insulana</i> (Guenée, 1845) = <i>modacillana</i> Zeller, 1847	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1963	
5180	<i>gallicollana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	STEUER (1998)	Nachweis 1998	
5181	<i>inquilina</i> T. Fletcher, 1938 = <i>fimbriana</i> Haworth, 1811	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1965	
5182	<i>argyrana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 1991		
5184	<i>albuginana</i> (Guenée, 1845) = <i>reisseri</i> Rebel, 1937	*	Rommel, 2008		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5186	<i>obscurana</i> (Stephens, 1834) = <i>tomiana</i> Zeller, 1868	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1983	
5187	<i>agnotana</i> Rebel, 1914 = <i>snellenana</i> Bentinck, 1947	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1984, 1985	
5190	<i>rhediella</i> (Clerck, 1759) = <i>rhediana</i> Hübner, 1825	*	Büchner, 2004		
5192	<i>populana</i> (Fabricius, 1787) = <i>ephippiana</i> Hübner, 1817	*	Büchner, 2011		
5193	<i>spiniana</i> (Duponchel, 1843)	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1964	
5194	<i>trauniana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
5196	<i>regiana</i> (Zeller, 1849)	*	Büchner, 2008		
5197	<i>aurita</i> Razowski, 1991 = <i>aurantiana</i> Staudinger, 1871, nom. praeocc.	*	Büchner, 2007		
5198	<i>juniperana</i> (Millière, 1858) = <i>thuriferana</i> Cleu, 1926	*	Büchner, 2011		
5200	<i>ochsenheimeriana</i> (Lienig & Zeller, 1846) = <i>loxiana</i> Herrich-Schäffer, 1851	*	Büchner, 2010		
5205	<i>germmana</i> (Hübner, 1799) = <i>atropurpurana</i> Haworth, 1811 = <i>germarana</i> Hübner, 1825	*	Büchner, 2012		
5206	<b><i>Strophedra</i> Herrich-Schäffer, 1854</b>				
5207	<i>weirana</i> (Douglas, 1850)	*	Büchner, 2003		
5208	<i>nitidana</i> (Fabricius, 1794) = <i>flexana</i> Zeller, 1849	*	Rommel, 2003		
5209	<b><i>Dichrorampha</i> Guenée, 1845</b>				
5211	<i>podoliensis</i> (Toll, 1942)	*	Steuer, 1986	GP Nr. 4202	
5214	<i>plumbana</i> (Scopoli, 1763) = <i>saturana</i> Guenée, 1845 = <i>resplendana</i> Heinemann, 1870 = <i>rejectana</i> La Harpe, 1858	*	Büchner, 2009		
5215	<i>sedatana</i> Busck, 1906 = <i>saturana</i> auct. nec Guenée	*	Büchner, 2012		
5218	<i>aeratana</i> (Pierce & Metcalfe, 1915)	*	Büchner, 2009		
5220	<i>cacaleana</i> (Herrich-Schäffer, 1851) = <i>sheljuzhkoi</i> Obraztsov, 1949	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1963	
5223	<i>incursana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	*	Melzer, 2012		
5226	<i>consortana</i> (Stephens, 1852) = <i>distinctana</i> Barrett, 1882	*	Steuer, 1985	GP Nr. 3327	
5232	<i>acuminatana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	*	Büchner, 2008 Melzer, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5238	<i>sylvicollana</i> (Heinemann, 1863) = <i>cacuminana</i> Thomann, 1926	+	RAPP (1936a)		A
5239	<i>simpliciana</i> (Haworth, 1811)	*	Büchner, 2009		
5240	<i>sequana</i> (Hübner, 1799)	*	Büchner, 2010		
5246	<i>gueneeana</i> Obraztsov, 1953 = <i>strigana</i> Haworth, 1811 = <i>politana</i> Guenée, 1845	*	Büchner, 1989		
5247	<i>flavidorsana</i> Knaggs, 1867	*	Büchner, 2010		
5248	<i>alpinana</i> (Treitschke, 1830) = <i>quaestionana</i> Zeller, 1878	+	STEUER (1970, 1995)	Nachweis 1964, 1965	
5249	<i>petiverella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>dorsana</i> Fabricius, 1775	*	Büchner, 2012		
5251	<i>plumbagana</i> (Treitschke, 1830) = <i>subsequana</i> Wocke, 1871	*	Theimer, 2005		
5252	<i>obscuratana</i> (Wolff, 1955) = <i>tanaceti</i> Stange, 1900, nec Stainton	*	Theimer, 2007		
5257	<i>agilana</i> (Tengström, 1848)	*	STEUER (1984, 1991, 1995)	Nachweis 1982	
5261	<b>Choreutoidea</b>				
5262	<b>Choreutidae</b>				
5267	<b><i>Anthophila</i> Haworth, 1811</b>				
5269	<i>fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)	*	Büchner, 2007		
5270	<b><i>Prochoreutis</i> Diakonoff &amp; Heppner, 1980</b>				
5271	<i>myllerana</i> (Fabricius, 1794)	*	Steuer, 1984	GP Nr. 3565	
5272	<i>sehestediana</i> (Fabricius, 1776)	*	Büchner, 2010		
5277	<b><i>Tebenna</i> Billberg, 1811</b>				
5278	<i>bjerkandrella</i> (Thunberg, 1784) = <i>pretiosana</i> Duponchel, 1842	*	MARTINI (1916) Melzer, 2011, 2012		A
5280	<b><i>Choreutis</i> Hübner, 1825</b>				
5282	<i>pariana</i> (Clerck, 1759)	*	Büchner, 2009		
5284	<b>Urodoidea</b>				
5285	<b>Urodidae</b>				
5286	<b><i>Wockia</i> Heinemann, 1870</b>				
5287	<i>asperipunctella</i> (Bruand, 1851)	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1970, 1976	
5288	<b>Schreckensteinioidea</b>				
5289	<b>Schreckensteinidae</b>				
5290	<b><i>Schreckensteinia</i> Hübner, 1825</b>				
5291	<i>festaliella</i> (Hübner, 1819)	*	RAPP (1936a) + Harz Büchner, 2005		A

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5292	<b>Epermenioidea</b>				
5293	<b>Epermeniidae</b>				
5294	<b><i>Phaulernis</i> Meyrick, 1895</b> = <i>Aechmia</i> sensu Stainton, 1854				
5296	<i>fulviguttella</i> (Zeller, 1839) = <i>flavimaculella</i> Stainton, 1849 = <i>auromaculana</i> Frey, 1867 = <i>monticola</i> Moriuti, 1982	*	Sutter, 1996		
5298	<i>dentella</i> (Zeller, 1839)	*	Büchner, 2010, 2012		
5299	<b><i>Epermenia</i> Hübner, 1825</b> = <i>Chauliodus</i> Treitschke, 1833 = <i>Cataplectica</i> Walsingham, 1894				
5302	<i>aequidentella</i> (E. Hofmann, 1867) = <i>daucellus</i> Peyerminhoff, 1870	+	PETERSEN G., GAEDIKE R. (1975)		
5303	<i>chaerophyllella</i> (Goeze, 1783) = <i>testaceella</i> Hübner, 1813 = <i>fasciculellus</i> Stephens, 1834 = <i>nigrostriatellus</i> Heylaerts, 1883 = <i>turatiella</i> Costantini, 1923	*	Büchner, 2010		
5304	<i>illigerella</i> (Hübner, 1813)	*	Rommel, 2008		
5305	<i>falciformis</i> (Haworth, 1828)	*	Sutter, 1996		
5307	<i>pontificella</i> (Hübner, 1796)	*	Gregersen, 2011		
5311	<i>iniquella</i> (Wocke, 1867) = <i>dentosella</i> auct. nec Herrich-Schäffer = <i>kreugerala</i> Schwärdea, 1921	+	GAEDIKE (1968)		
5312	<i>profugella</i> (Stainton, 1856)	+	STEUER (1984, 1995)		
5314	<b><i>Ochromolopis</i> Hübner, 1825</b>				
5315	<i>ictella</i> (Hübner, 1813) = <i>ictipennella</i> Treitschke, 1833	*	Hausenblas, 1999	Hausenblas in Lit.	
5318	<b>Alucitoidea</b>				
5319	<b>Alucitidae</b>				
5320	<b><i>Alucita</i> Linnaeus, 1758</b>				
5323	<i>hexadactyla</i> Linnaeus, 1758 = <i>polydactyla</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2009		
5325	<i>huebneri</i> Wallengren, 1859	+	SUTTER (1990)		
5327	<i>grammodactyla</i> Zeller, 1841 = <i>perittodactyla</i> Staudinger, 1859	*	Büchner, 2008		
5336	<b><i>Pteropteryx</i> Hannemann, 1959</b>				
5337	<i>dodecadactyla</i> Hübner, 1813	*	Hausenblas, 1994, 1995	Hausenblas in Lit.	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5338	<b>Pterophoroidea</b>				
5339	<b>Pterophoridae</b>				
5341	<b><i>Agdistis</i> Hübner, 1825</b>				
5342	<i>adactyla</i> (Hübner, 1819) = <i>huebneri</i> Curtis, 1834	+	SUTTER (1991)		
5367	<b><i>Platyptilia</i> Hübner, 1825</b>				
5368	<i>gonodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>megadactyla</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2011		
5369	<i>calodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>zetterstedti</i> Zeller, 1841 = <i>chapmanni</i> Tutt, 1893 = <i>leucorrhyncha</i> Meyrick, 1902	*	Rommel, 1998	GP Nr. 299/2007	
5370	<i>nemoralis</i> Zeller, 1841	*	Rommel, 2000		
5372	<i>farsarellus</i> Zeller, 1867	*	GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5374	<i>tesseradactyla</i> (Linnaeus, 1761) = <i>fischeri</i> Zeller, 1841	+	STEUER (1984, 1995)		
	<b><i>Buszkoiana</i> Kocak, 1981</b>				
5375	<i>capnodactylus</i> (Zeller, 1841)	*	Büchner, 2009		
	<b><i>Gillmeria</i> Tutt, 1905</b>				
5377	<i>pallidactyla</i> (Haworth, 1811) = <i>bertrami</i> Rössler, 1864	*	Büchner, 2006		
5378	<i>ochroductyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>tetradactyla</i> Linnaeus, 1758	*	Büchner, 1998		
5380	<b><i>Amblyptilia</i> Hübner, 1825</b>				
5381	<i>acanthadactyla</i> (Hübner, 1813)	*	Büchner, 2012		
5382	<i>punctidactyla</i> (Haworth, 1811) = <i>cosmodactyla</i> Hübner, 1819	*	STEUER (2002)	Nachweis 2001	
5389	<b><i>Stenoptilia</i> Hübner, 1825</b>				
5390	<i>pterodactyla</i> (Linnaeus, 1761) = <i>fuscus</i> Retzius, 1783	*	Rommel, 2006		
5393	<i>stigmatodactylus</i> (Zeller, 1852) = <i>megalochroa</i> Meyrick, 1930	+	STEUER (1984, 1995)	Nachweis 1961	
5397	<i>bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763) = <i>serotinus</i> Zeller, 1852 = <i>mictodactyla</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel (2007)		
5402	<i>annadactyla</i> Sutter, 1988 = <i>annickana</i> Gibeaux, 1988	*	STEUER (2002)	Nachweis 2000	

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5414	<i>pelidnodactyla</i> (Stein, 1837) = <i>mictodactyla</i> Zeller, 1841	+	STEUER (1984, 1995)		
5424	<i>coprodactylus</i> (Stainton, 1851)	+	SUTTER (1991)		
5426	<i>zophodactylus</i> (Duponchel, 1840) = <i>loewii</i> Zeller, 1847	*	ROMMEL (2007)		
5428	<i>pneumonanthes</i> (Büttner, 1880) = <i>graphodactyla</i> auct.	+	SUTTER (1991)		
5433	<b><i>Cnaemidophorus</i> Wallengren, 1859</b>				
5434	<i>rhododactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Melzer, 2009 Schöps, 2012		
5435	<b><i>Marasmarcha</i> Meyrick, 1886</b>				
5436	<i>lunaedactyla</i> (Haworth, 1811) = <i>phaeodactyla</i> Hübner, 1813 = <i>agrorum</i> Herrich-Schäffer, 1855	*	Büchner, 2011		
5440	<b><i>Oxyptilus</i> Zeller, 1841</b>				
5441	<i>pilosellae</i> (Zeller, 1841) = <i>bohemanni</i> Wallengren, 1862	*	Büchner, 2011		
5442	<i>ericetorum</i> (Stainton, 1851)	+	SUTTER (1991)		
5443	<i>parvidactyla</i> (Haworth, 1811) = <i>obscurus</i> Zeller, 1841	*	Rommel, 2007	GP Nr. 298/2007	
5444	<i>chrysodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>hieracii</i> Zeller, 1841	*	Melzer, 2011		
5445	<i>distans</i> (Zeller, 1847)	*	GAEDIKE e.al. (2003) GAEDIKE (2008)	2001, leg. Stübner	
5458	<b><i>Capperia</i> Tutt, 1905</b>				
5459	<i>britanniodactylus</i> (Gregson, 1867) = <i>teucrii</i> Jordan, 1869	*	ROMMEL (2007)		
5460	<i>celeusi</i> (Frey, 1886)	*	Steuer, 1981	GP Nr. 2197	
5462	<i>loranus</i> (Fuchs, 1895)	*	Büchner, 2011		
5483	<b><i>Pterophorus</i> Geoffroy, 1862</b>				
5485	<i>pentadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	*	ROMMEL (2007)		
5487	<b><i>Porrittia</i> Tutt, 1905</b>				
5488	<i>galactodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	SUTTER (1991) ROMMEL (2007) GAEDIKE (2009)		A
5492	<b><i>Calyciphora</i> Kasy, 1960</b>				
5494	<i>albodactylus</i> (Fabricius, 1794) = <i>xerodactylus</i> Zeller, 1841 = <i>siculus</i> Fuchs, 1901 = <i>xanthodactyla</i> auct. nec Treitschke, 1833	*	Melzer, 2009, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5499	<b><i>Merrifieldia</i> Tutt, 1905</b>				
5500	<i>tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) = <i>fuscolimbatus</i> Duponchel, 1844 = <i>icterodactylus</i> Mann, 1855 = <i>elexidactyla</i> Buszko, 1975	*	Büchner, 2008		
5501	<i>leucodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>tetradactyla</i> auct. nec Linnaeus, 1758 = <i>fitzi</i> Rebel, 1912	*	Büchner, 2009		
5506	<i>baliодactylus</i> (Zeller, 1841)	*	Melzer, 2010, 2011, 2012		
	<b><i>Wheeleria</i> Tutt, 1905</b>				
5505	<i>spilodactylus</i> (Curtis, 1827)	+	SUTTER (1991)		
5520	<b><i>Pselnophorus</i> Wallengren, 1881</b>				
5521	<i>heterodactyla</i> (Müller, 1764) = <i>brachydactyla</i> Kollar, 1832	+	STEUER (1984,1995) ROMMEL (2007) GAEDIKE (2009)		A
5527	<b><i>Oidaematophorus</i> Wallengren, 1862</b>				
5528	<i>lithodactyla</i> (Treitschke, 1833)	*	Melzer, 2009, 2012		
5531	<i>constantii</i> Ragonot, 1875	*	SUTTER (1991)		
5533	<b><i>Hellinsia</i> Tutt, 1905</b> = <i>Euleioptilus</i> Bigot & Picard, 1996 = <i>Leioptilus</i> Wallengren, 1862, nec Gray, 1860				
5534	<i>tephradactyla</i> (Hübner, 1813)	*	ROMMEL (2007)		
5535	<i>didactylites</i> (Ström, 1783) = <i>scarodactyla</i> Hübner, 1813	*	Büchner, 2007		
5536	<i>distinctus</i> (Herrich-Schäffer, 1855) = <i>zermattensis</i> Müller-Rutz, 1930	*	Steuer, 1994	GP Nr. 4295	
5537	<i>carphodactyla</i> (Hübner, 1813)	*	Melzer, 2010		
5543	<i>lienigianus</i> (Zeller, 1852) = <i>melinodactylus</i> Herrich-Schäffer, 1953	*	Melzer, 2009, 2010		
5545	<i>osteodactylus</i> (Zeller, 1841) = <i>trimmatodactyla</i> Christoph, 1872 = <i>turbidella</i> Caradja, 1921	*	ROMMEL (2007)		
5548	<i>chrysocomae</i> (Ragonot, 1875) = <i>bowesi</i> Whalley, 1960	*	Steuer, 1988	GP Nr. 3189	
5549	<b><i>Adaina</i> Tutt, 1905</b>				
5550	<i>microdactyla</i> (Hübner, 1813)	*	Schöps, 2010		
5551	<b><i>Emmelina</i> Tutt, 1905</b>				
5552	<i>monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	*	Rommel, 2008		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5563	<b>Pyraloidea</b>				
5564	<b>Pyralidae</b>				
5565	<b>Galleriinae</b>				
5567	<b><i>Aphomia</i> Hübner, 1825</b> = <i>Melissoblabtes</i> Zeller, 1839				
5569	<b><i>sociella</i> (Linnaeus, 1758)</b> = <i>colonella</i> Linnaeus, 1758 = <i>tribunella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2007		
5574	<b><i>zelleri</i> (Joannis, 1932)</b> = <i>bipunctanus</i> Zeller, 1848	*	Rommel, 2008		
5581	<b><i>Paralipsa</i> Butler, 1879</b>				
5582	<b><i>gularis</i> (Zeller, 1877)</b> = <i>modesta</i> Butler, 1879	+	PETERSEN (1973)		
5583	<b><i>Corypha</i> Ragonot, 1885</b>				
5584	<b><i>cephalonica</i> (Stainton, 1866)</b>	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1984	
5586	<b><i>Achroia</i> Hübner, 1819</b>				
5587	<b><i>grisella</i> (Fabricius, 1794)</b> = <i>aluearia</i> Fabricius, 1798	*	Büchner, 2002		
5588	<b><i>Galleria</i> Fabricius, 1789</b>				
5589	<b><i>mellonella</i> (Linnaeus, 1758)</b> = <i>cereana</i> Linnaeus, 1767	*	Büchner, 2006		
	<b>Pyralinae</b>				
5610	<b><i>Synaphe</i> Hübner, 1825</b> = <i>Cledeobia</i> Stephens, 1829				
5620	<b><i>punctalis</i> (Fabricius, 1775)</b> = <i>angustalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2008		
5623	<b><i>Pyralis</i> Linnaeus, 1758</b>				
5627	<b><i>farinalis</i> (Linnaeus, 1758)</b> = <i>domesticalis</i> Zeller, 1847	*	Philipp, 2008		
5629	<b><i>Aglossa</i> Latreille, 1796</b> = <i>Agriope</i> Ragonot, 1894				
5632	<b><i>caprealis</i> (Hübner, 1809)</b> = <i>cuprealis</i> Hübner, 1825	+	PETERSEN, GAEDIKE (1987)		
5633	<b><i>pinguinalis</i> (Linnaeus, 1758)</b>	*	Schöps, 2012		
5651	<b><i>Hypsopygia</i> Hübner, 1825</b> = <i>Orthopygia</i> Ragonot, 1890				
5652	<b><i>costalis</i> (Fabricius, 1775)</b> = <i>fimbrialis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2008		
5658	<b><i>glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)</b> = <i>nitidalis</i> Fabricius, 1775	*	Rommel, 2008		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5660	<b><i>Endotricha</i> Zeller, 1847</b>				
5661	<i>flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
5665	<b>Phycitinae</b>				
5667	<b><i>Cryptoblabes</i> Zeller, 1848</b>				
5668	<i>bistriga</i> (Haworth, 1811) = <i>rufilella</i> Zeller, 1839 = <i>obsoletella</i> Heinmann, 1865	*	Büchner, 2010		
5675	<b><i>Salebriopsis</i> Hannemann, 1965</b> = <i>Turdoempista</i> Roesler, 1967				
5676	<i>albicilla</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	*	Büchner, 2010		
5677	<b><i>Elegia</i> Ragonot, 1887</b> = <i>Microthrix</i> Ragonot, 1888				
5679	<i>similella</i> (Zincken, 1818)	*	Rommel, 2008		
5680	<b><i>Ortholepis</i> Ragonot, 1887</b> = <i>Metriostola</i> Ragonot, 1892				
5681	<i>betulae</i> (Goeze, 1778)	*	Büchner, 2007		
5683	<b><i>Matilella</i> Leraut, 2001</b> = <i>Pyla</i> auct.				
5684	<i>fusca</i> (Haworth, 1811) = <i>carbonariella</i> Fischer von Röslerstamm, 1839	*	ROMMEL (2003)		
5685	<b><i>Pempeliella</i> Caradja, 1916</b> = <i>Pseudosyria</i> Rebel, 1927				
5686	<i>ornatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>cryptella</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2011		
5690	<i>dilutella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>dilutella</i> Hübner, 1796 = <i>subornatella</i> Duponchel, 1836 = <i>adornatella</i> Treitschke, 1835	*	Büchner, 2011		
5705	<b><i>Khorassaniana</i> Amsel, 1951</b> = <i>Abrephia</i> Amsel, 1953				
5706	<i>compositella</i> (Treitschke, 1835) = <i>murinella</i> Heinemann, 1865	*	Strietzel, 2006		
5713	<b><i>Sciota</i> Hulst, 1888</b>				
5724	<i>rhenella</i> (Zincken, 1818)	*	Strietzel, 2006		
5725	<i>hostilis</i> (Stephens, 1834)	*	Erlacher, 2006		
5727	<i>adelphella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1836)	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1958, 1959	
5731	<b><i>Selagia</i> Hübner, 1825</b>				
5732	<i>argyrella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>janthinella</i> Hübner, 1813	+	STEUER (1966, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5735	<i>spadicella</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2011		
5741	<b><i>Etiella Zeller, 1839</i></b>				
5742	<i>zinckenella</i> (Treitschke, 1832)	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1958, 1964, 1965	
5749	<b><i>Oncocera Stephens, 1829</i></b> = <i>Pollichia</i> Roesler, 1980				
5751	<i>semirubella</i> (Scopoli, 1763) = <i>canella</i> Linnaeus, 1767	*	Büchner, 2011		
5753	<i>faecella</i> (Zeller, 1839)	*	Brainich, 1986	Beleg in coll. Steuer. Steuer det. GP Nr. 2981	
5758	<b><i>Pempelia</i> Hübner, 1825</b> = <i>Salebria</i> Zeller, 1746 = <i>Neurotomia</i> Chrétien, 1911 = <i>Hoeneia</i> Caradja, 1938				
5766	<i>formosa</i> (Haworth, 1811) = <i>perfluella</i> Zincken, 1818	*	Büchner, 2004		
5767	<i>palumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>contubernella</i> Hübner, 1796	*	ROMMEL (2003)		
	<b><i>Moitrelia</i> Leraut, 2001</b>				
5770	<i>obductella</i> Zeller, 1839 = <i>origanella</i> Schläger, 1848	*	Melzer, 2011, 2012		
5780	<b><i>Dioryctria</i> Zeller, 1846</b>				
5781	<i>sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840) = <i>splendidella</i> Herrich-Schäffer, 1847	*	STEUER (1966, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5782	<i>schuetzeella</i> Fuchs, 1899	*	ROMMEL (2003)		
5783	<i>simplicella</i> Heinemann, 1863 = <i>mutatella</i> Fuchs, 1903	*	Büchner, 1994		
5784	<i>abietella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2011		
5790	<b><i>Phycita</i> Curtis, 1828</b>				
5796	<i>roborella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>spissicella</i> Fabricius, 1777	*	Büchner, 2011		
5803	<b><i>Hypochalcia</i> Hübner, 1825</b>				
5810	<i>lignella</i> (Hübner, 1796) = <i>melanella</i> Treitschke, 1832	*	GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
5811	<i>ahenella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>aneella</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5823	<b><i>Epischnia</i> Hübner, 1825</b>				
5827	<i>prodromella</i> (Hübner, 1799)	+	RAPP (1936a)		
5847	<b><i>Nephopterix</i> Hübner, 1825</b> = <i>Alispa</i> Zeller, 1848				
5848	<i>angustella</i> (Hübner, 1796)	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1965	
5851	<b><i>Acrobasis</i> Zeller, 1839</b>				
5853	<i>tumidana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>rubrotibiella</i> Fischer von Röslerstamm, 1839	*	Büchner, 2004		
5854	<i>repandana</i> (Fabricius, 1798) = <i>tumidella</i> Zincken, 1818 = <i>zelleri</i> Ragonot, 1885	*	ROMMEL (2003)		
5856	<i>advenella</i> (Zincken, 1818)	*	ROMMEL (2003)		
5857	<i>suavella</i> (Zincken, 1818)	*	Melzer, 2009, 2010		
5858	<i>legatea</i> (Haworth, 1811) = <i>legatella</i> Hübner, 1796 nec [Denis & Schiffermüller], 1775	+	RAPP (1936a)		
5860	<i>marmorea</i> (Haworth, 1811) = <i>epelydella</i> Zeller, 1839	*	Melzer, 2009 Büchner, 2011		
5868	<i>sodalella</i> Zeller, 1848	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1959, 1963	
5869	<i>consociella</i> (Hübner, 1813)	*	ROMMEL (2003)		
5871	<i>obtusella</i> (Hübner, 1796)	*	Melzer, 2008		
5872	<b><i>Apomyelois</i> Heinrich, 1956</b> = <i>Ectomyelois</i> Heinrich, 1956				
5873	<i>bistriatella</i> (Hulst, 1887)	*	Steuer, 1983	GP Nr. 2450	
5875	<i>ceratoniae</i> (Zeller, 1839) = <i>zellerella</i> Sorhagen, 1861	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1960	
5877	<b><i>Glyptoteles</i> Zeller, 1848</b>				
5878	<i>leucocrinella</i> Zeller, 1848 = <i>macra</i> Staudinger, 1870	+	STEUER (1966, 1991, 1995)		
5879	<b><i>Episcythrastis</i> Meyrick, 1937</b> = <i>Myelopsis</i> Heinrich, 1956				
5880	<i>tetricella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>chrysorrhoeella</i> Zincken, 1818	+	STEUER (1966, 1995)		
5882	<b><i>Eurhodope</i> Hübner, 1825</b>				
5888	<i>rosella</i> (Scopoli, 1763) = <i>pudorella</i> Hübner, 1796	*	ROMMEL (2007)		
5891	<i>cirrigerella</i> (Zincken, 1818)	*	Strutzberg, 2010		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
5892	<i>Myelois</i> Hübner, 1825				
5898	<i>circumvoluta</i> (Fourcroy, 1785) = <i>cibrella</i> Hübner, 1796 = <i>cibrumella</i> auct.	*	RÖMMEL (2003)		
5959	<i>Gymnancyla</i> Zeller, 1848				
5964	<i>hornigii</i> (Lederer, 1852)	*	RÖMMEL (2003)		
5972	<i>Zophodia</i> Hübner, 1825				
5973	<i>grossulariella</i> (Hübner, 1809) = <i>convolutella</i> Hübner, 1796	*	RÖMMEL (2003)		
5979	<i>Eccopisa</i> Zeller, 1848				
5980	<i>effractella</i> Zeller, 1848	*	STEUER (1998)	Nachweis 1991, 1996	
5984	<i>Assara</i> Walker, 1863				
5986	<i>terebrella</i> (Zincken, 1818)	*	RÖMMEL (2003)		
5991	<i>Euzophera</i> Zeller, 1867				
5993	<i>pinguis</i> (Haworth, 1811)	*	Rommel, 2008		
5997	<i>cinerosella</i> (Zeller, 1839) = <i>incanella</i> Eversmann, 1844	+	RAPP (1936a)		
6009	<i>fuliginosella</i> (Heinemann, 1865)	+	STEUER (1966, 1991, 1995)		
6014	<i>Nyctegretis</i> Zeller, 1848				
6015	<i>lineana</i> (Scopoli, 1786) = <i>achatinella</i> Hübner, 1824	*	Rommel, 2004		
6025	<i>Ancylosis</i> Zeller, 1839				
6027	<i>cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)	*	MELZER, 2006		
6057	<i>oblitella</i> (Zeller, 1848)	*	Steuer, 1989	GP Nr. 4609	
6070	<i>Homoeosoma</i> Curtis, 1833				
6079	<i>nebulella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>muscerdalis</i> Hübner, 1813	*	RÖMMEL (2003)		
6085	<i>Phycitodes</i> Hampson, 1917				
6086	<i>maritima</i> (Tengström, 1848) = <i>carlinella</i> Heinemann, 1865 = <i>cretacella</i> Rössler, 1866	*	MELZER, 2008, 2009		
6087	<i>binaevella</i> (Hübner, 1813)	*	Rommel (2003)		
6091	<i>albatella pseudonimbella</i> Bentinck, 1936	*	Rommel (2003)		
6092	<i>Vitula</i> Ragonot, 1887				
6094	<i>biviella</i> (Zeller, 1848)	*	STEUER (2002) MELZER, 2012	Nachweis von 1984 - 1998	
6101	<i>Plodia</i> Guenée, 1845				
6102	<i>interpunctella</i> (Hübner, 1813)	*	RÖMMEL (2003)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6103	<i>Ephestia</i> Guenée, 1845				
6105	<i>kuehniella</i> Zeller, 1879	*	RÖMMEL (2003)		
6112	<i>elutella</i> (Hübner, 1796) = <i>roxburghii</i> Gregson, 1873	*	Büchner, 2011		
6122	<i>Anerastia</i> Hübner, 1825				
6123	<i>lotella</i> (Hübner, 1813)	+	STEUER (1966, 1995)		
	<b>Crambidae</b>				
6160	<b>Scopariinae</b>				
6161	<b><i>Scoparia</i> Haworth, 1811</b>				
6165	<i>subfusca</i> (Haworth, 1811) = <i>cembrella</i> auct. nec Linnaeus = <i>zelleri</i> Wocke, 1855 = <i>pfefferi</i> Marion, 1960	*	RÖMMEL (2007)		
6166	<i>basistrigalis</i> Knaggs, 1866	*	Melzer, 2009		
6168	<i>ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	*	Büchner, 2011		
6169	<i>ancipitella</i> (La Harpe, 1855) = <i>ulmella</i> Knaggs, 1866	*	RÖMMEL (2007)		
6170	<i>conicella</i> (La Harpe, 1863) = <i>sylvestralis</i> Wolff, 1959	*	RÖMMEL (2007)		
6172	<i>pyralella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>arundniata</i> Thunberg, 1792 = <i>dubitalis</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2010		
6179	<b><i>Eudonia</i> Billberg, 1820</b>				
6180	<i>lacustrata</i> (Panzer, 1804) = <i>crataegella</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2010		
6182	<i>murana</i> (Curtis, 1827) = <i>delphinatalis</i> Guenée, 1854	*	Büchner, 2004	det. M. Nuß	
6193	<i>truncicollella</i> (Stainton, 1849)	*	Büchner, 2010		
6195	<i>mercurella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>frequentella</i> Stainton, 1849	*	Melzer, 2011 Strutzberg, 2011		
6199	<i>pallida</i> (Curtis, 1827) = <i>denigrata</i> Costantini, 1923	*	RÖMMEL (2007) Büchner, 2003		
6200	<b><i>Heliothis</i> Guenée, 1854</b>				
6201	<i>wulseniana</i> (Scopoli, 1763) = <i>atralis</i> Hübner, 1788	*	Heuer, 1996		A
6203	<b><i>Crambinae</i></b>				
6206	<b><i>Euchromius</i> Guenée, 1845</b>				
6207	<i>ocellea</i> (Haworth, 1811)	+	STEUER (1964, 1966, 1995)	Nachweis 1963	
6221	<b><i>Chilo</i> Zincken, 1817</b>				
6222	<i>phragmitella</i> (Hübner, 1805)	*	Strietzel, 2005		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6228	<b><i>Friedlanderia Agnew, 1987</i></b> = <i>Acigona</i> auct. nec Hübner, 1825				
6229	<i>cicatricella</i> (Hübner, 1824)	+	RAPP (1936a)		A
6234	<b><i>Calamotropha Zeller, 1863</i></b>				
6235	<i>paludella</i> (Hübner, 1824)	*	Büchner, 2012		
6240	<b><i>Chrysoteuchia Hübner, 1825</i></b>				
6241	<i>culmella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>hortuella</i> Hübner, 1796 = <i>cespitalis</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2011		
6242	<b><i>Crambus Fabricius, 1798</i></b>				
6243	<i>pascuella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2010		
6244	<i>silvella</i> (Hübner, 1813)	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1958, 1963	
6245	<i>uliginosellus</i> (Zeller, 1850)	*	Büchner, 2009, 2010		
6246	<i>ericella</i> (Hübner, 1813)	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1959	
6247	<i>alienellus</i> (Germar & Kaulfuss, 1817) = <i>zinckenellus</i> Sodoffsky, 1830	+	RAPP (1936a)		
6250	<i>pratellus</i> (Linnaeus, 1758) = <i>dumetella</i> Hübner, 1813 = <i>scoticus</i> Humphreys & Westwood, 1845	*	Büchner, 2010		
6251	<i>lathoniellus</i> (Zincken, 1817) = <i>nemorellus</i> Hübner 1813, nom. praeocc. = <i>pratellus</i> auct. nec Linnaeus	*	Büchner, 2011		
6252	<i>hamellus</i> (Thunberg, 1788)	*	Büchner, 1989		
6253	<i>perrellus</i> (Scopoli, 1763) = <i>warringtoniellus</i> Stainton, 1849	*	Rommel, 2008		
6256	<b><i>Agriphila Hübner, 1825</i></b> = <i>Alisa</i> Ganev & Hacker, 1984				
6258	<i>tristella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>aequilella</i> Hübner, 1796 = <i>fuscelinellus</i> Stephens, 1834	*	Büchner, 2012		
6260	<i>inquinatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Büchner, 2012		
6266	<i>selasella</i> (Hübner, 1813)	*	Steuer, 1989	GP Nr. 3494	
6267	<i>straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>culmellus</i> auct. nec Linnaeus	*	Büchner, 2010		
6270	<i>poliellus</i> (Treitschke, 1832) = <i>amseli</i> Ganev & Hacker, 1984	+	RAPP (1936a)		
6275	<i>geniculea</i> (Haworth, 1811)	*	Büchner, 2012		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6279	<b><i>Catoptria</i> Hübner, 1825</b>				
6280	<i>permutatellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	*	Büchner, 2011		
6282	<i>myella</i> (Hübner, 1796)	+	RAPP (1936a) + Harz		
6283	<i>osthelderi</i> (Lattin, 1950)	*	STEUER (1991, 1995)	Nachweis 1986	
6301	<i>pinella</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2011		
6304	<i>margaritella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Strietzel, 2006		
6306	<i>fulgidella</i> (Hübner, 1813)	+	RAPP (1936a) PETERSEN et al. (1973)		
6314	<i>falsella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	ROMMEL (2003)		
6318	<i>verella</i> (Zincken, 1817)	*	STEUER (1998)	Nachweis 1995	
6322	<i>lythargyrella</i> (Hübner, 1796)	+	RAPP (1936a)		
6337	<b><i>Xanthocrambus</i> Bleszynski, 1957</b>				
6340	<i>saxonellus</i> (Zincken, 1821) = <i>chrysellus</i> Treitschke, 1832	+	PETERSEN et al. (1973)		
6349	<b><i>Thisanotia</i> Hübner, 1825</b>				
6350	<i>chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	*	Schöps, 2009		
6351	<b><i>Pediasia</i> Hübner, 1825</b>				
6355	<i>luteella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>exoleteella</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Strietzel, 2005		
6364	<i>contaminella</i> (Hübner, 1796)	*	PETERSEN & GAEDIKE (1987)	Nachweis 1986	
6367	<i>aridella</i> (Thunberg, 1788) = <i>salinellus</i> Tutt. 1887 = <i>nepos</i> Ostheder, 1939	+	RAPP (1936a)		A
6375	<b><i>Platytes</i> Guenée, 1845</b>				
6376	<i>cerussella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	ROMMEL (2003)		
6377	<i>alpinella</i> (Hübner, 1813)	*	ROMMEL (2003)		
6388	<b><i>Schoenobiinae</i></b>				
6369	<b><i>Schoenobius</i> Duponchel, 1836</b>				
6390	<i>gigantellus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Strietzel, 2006		
6391	<b><i>Donacaaula</i> Meyrick, 1890</b>				
6393	<i>forficella</i> (Thunberg, 1794)	*	Büchner, 1996		
6394	<i>mucronella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>acuminella</i> Hübner, 1805	+	STEUER (1966, 1995)		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6413	<b>Acentropinae</b>				
6414	<b><i>Elophila</i> Hübner, 1822</b>				
6416	<i>nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758) = <i>potamogalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	ROMMEL (2007)		
6420	<b><i>Acentria</i> Stephens, 1829</b> = <i>Acentropus</i> Curtis, 1834				
6421	<i>ephemerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>nivea</i> Oliver, 1791 = <i>phryganea</i> Hübner, 1809 = <i>nevae</i> Brown, 1863 = <i>germanicus</i> Nolcken, 1869	*	ROMMEL (2007)		
6422	<b><i>Cataclysta</i> Hübner, 1825</b>				
6423	<i>lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	*	Strietzel, 2006		
6424	<b><i>Parapoynx</i> Hübner, 1825</b>				
6425	<i>stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	+	STEUER (1966,1995)		
6430	<b><i>Nymphula</i> Schrank, 1802</b>				
6431	<i>stagnata</i> (Donovan, 1806) = <i>potamogalis</i> Hübner, 1793 = <i>nymphaealis</i> Treitschke, 1829	*	Melzer, 2006 Strietzel, 2006		
6432	<b><i>Odontiinae</i></b>				
6434	<b><i>Metaxmeste</i> Hübner, 1825</b>				
6435	<i>phrygialis</i> (Hübner, 1796)	+	GAEDIKE (1980)		
6444	<b><i>Cynaeda</i> Hübner, 1825</b>				
6446	<i>dentalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	ROMMEL (2003)		
6467	<b><i>Atralata</i> Sylvén, 1947</b>				
6468	<i>albofascialis</i> (Treitschke, 1829)	*	Büchner, 2009,10,11 Melzer, 2011		
6477	<b><i>Eurrhypis</i> Hübner, 1825</b>				
6478	<i>pollinalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	STEUER (1966,91,95)	seit 1962 keine Funde	
6482	<b><i>Evergestiinae</i></b>				
6483	<b><i>Evergestis</i> Hübner, 1825</b>				
6484	<i>sophialis</i> (Fabricius, 1787)	+	RAPP (1936a)		
6488	<i>frumentalis</i> (Linnaeus, 1761) = <i>triquetralis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Strietzel, 2006		
6497	<i>forsicalis</i> (Linnaeus, 1758)	*	Büchner, 2008		
6499	<i>extimalis</i> (Scopoli, 1763) = <i>margaritalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Strietzel, 2006		
6500	<i>limbata</i> (Linnaeus, 1767)	*	Büchner, 2011		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6501	<i>pallidata</i> (Hufnagel, 1767) = <i>straminalis</i> Hübner, 1793	*	Büchner, 2007		
	<b>Spilomelinae</b>				
6530	<b><i>Udea Guenée, 1845</i></b>				
6531	<i>ferrugalis</i> (Hübner, 1796) = <i>martialis</i> Guenée, 1854	*	Rommel, 2008		
6533	<i>fulvalis</i> (Hübner, 1809) = <i>prunoidalis</i> Staudinger, 1870	+	GAEDIKE (1980)		
6538	<i>lutealis</i> (Hübner, 1809) = <i>pascualis</i> Lienig & Zeller, 1846	*	Rommel, 2007		
6539	<i>elutalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>albidalis</i> Hübner, 1796	*	Steuer, 1981	GP Nr. 2238	
6541	<i>prunalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>nivealis</i> Fabricius, 1781	*	Büchner, 2011		
6553	<i>nebulalis</i> (Hübner, 1796) = <i>pratalis</i> Zeller, 1841	o	KNAPP (1887)		
6557	<i>olivalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>umbralis</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2009		
6559	<i>hamalis</i> (Thunberg, 1788) = <i>nyctemeralis</i> Hübner, 1809	+	RAPP (1936a)		
6666	<b><i>Pleuroptya Meyrick, 1890</i></b>				
6667	<i>ruralis</i> (Scopoli, 1763) = <i>verticalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Schöps, 2010 Büchner, 2011		
6669	<b><i>Mecyna Doubleday, 1840</i></b>				
6672	<i>flavalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Rommel, 2008		
6673	<i>lutealis</i> (Duponchel, 1833) = <i>citralis</i> Herrich-Schäffer, 1849	*	Melzer, 2006		A
6679	<b><i>Agrotera Schrank, 1802</i></b>				
6680	<i>nemoralis</i> (Scopoli, 1763) = <i>erosalis</i> Fabricius, 1794	*	Rommel, 2008		
6681	<b><i>Diasemia Hübner, 1825</i></b>				
6682	<i>reticularis</i> (Linnaeus, 1761) = <i>litterata</i> Scopoli, 1763	*	Lang, 2009		
6685	<b><i>Duponchelia Zeller, 1847</i></b>				
6686	<i>fovealis</i> Zeller, 1847	*	Büchner, 2004		A
6689	<b><i>Palpita Hübner, 1825</i></b>				
6690	<i>unionalis</i> (Hübner, 1796)	+	STEUER (1966, 1995)	Nachweis 1956, 1958	
6698	<b><i>Dolicharthria Stephens, 1834</i></b> = <i>Stenia Guenée, 1845</i>				
6700	<i>punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Strietzel, 2006		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6718	<b><i>Nomophila</i> Hübner, 1825</b>				
6719	<i>noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>hybridalis</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2012		
6528	<b>Pyraustinae</b>				
6560	<b><i>Paracorsia</i> Marion, 1959</b>				
6561	<i>repandalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	STEUER (2002)	Nachweis 1976	
6564	<b><i>Loxostege</i> Hübner, 1825</b> = <i>Leimonia</i> Hübner, 1825				
6577	<i>sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)	*	ROMMEL (2003)		
6587	<b><i>Ecpyrrhorhoe</i> Hübner, 1825</b>				
6588	<i>rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	*	Strietzel, 2006		
6593	<b><i>Pyrausta</i> Schrank, 1802</b>				
6595	<i>cingulata</i> (Linnaeus, 1758)	*	Steuer, 1984	GP Nr. 2618	
6596	<i>rectefascialis</i> Toll, 1936	*	GRAF et. al. (2007) GAEDIKE (2008)	2001 – 2005, leg. Stübner	
6599	<i>sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767) = <i>haematalis</i> Hübner, 1819	*	STEUER (1966, 1995) GAEDIKE & HEINICKE (1999)		
6601	<i>despicata</i> (Scopoli, 1763) = <i>cespitalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Büchner, 2012		
6603	<i>porphyralis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	+	RAPP (1936a)		
6604	<i>aurata</i> (Scopoli, 1763) = <i>punicealis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Melzer, 2009		
6605	<i>purpuralis</i> (Linnaeus, 1758) = <i>melanalis</i> Caradja, 1916	*	Büchner, 2007		
6606	<i>ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2008		
6609	<i>obfuscata</i> (Scopoli, 1763)	*	Melzer, 2008, 2011		
6613	<i>nigrata</i> (Scopoli, 1763) = <i>anguinalis</i> Hübner, 1796	*	Büchner, 2011		
6618	<b><i>Uresiphita</i> Hübner, 1825</b>				
6619	<i>gilvata</i> Fabricius, 1794 = <i>limbalis</i> auct. nec Linnaeus, 1767 = <i>polygonalis</i> auct. nec [Denis & Schiffermüller], 1775	*	ROMMEL (2003)		
6620	<b><i>Nascia</i> Curtis, 1835</b>				
6621	<i>cilialis</i> (Hübner, 1796) = <i>virgata</i> Reutti, 1853	*	Strietzel, 2006		

K&R	Taxon	N	Quelle	Bemerkungen	A
6622	<b><i>Sitochroa</i> Hübner, 1825</b>				
6623	<i>palealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>selenalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2008		
6624	<i>verticalis</i> (Linnaeus, 1758) = <i>cinctalis</i> Treitschke, 1829	*	Strietzel, 2006		
6654	<b><i>Anania</i> Hübner, 1825</b> = <i>Opsibotys</i> Warren, 1896 = <i>Perinephela</i> Hübner, 1825 = <i>Phlyctaenia</i> Hübner, 1825 = <i>Algedonia</i> Lederer, 1863 = <i>Ebulea</i> Doubleday, 1849 = <i>Eurrhypara</i> Hübner, 1825				
6563	<i>fuscalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	*	Melzer, 2008, 2010		
6629	<i>lancealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>glabralis</i> Fabricius, 1794	*	Melzer, Schöps, 2009		
6631	<i>coronata</i> (Hufnagel, 1767) = <i>sambucalis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	Rommel, 2008		
6632	<i>stachydalis</i> (Germar, 1821)	*	Rommel, 2008		
6633	<i>perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	*	Büchner, 2010		
6638	<i>terrealis</i> (Treitschke, 1829)	*	Melzer, 2008		
6652	<i>crocealis</i> (Hübner, 1796)	*	Melzer, 2008, 2009		
6655	<i>verbasalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) = <i>arcualis</i> Hübner, 1793 = <i>saltatricella</i> Fischer von Röslerstamm, 1841	*	Rommel, 2007		
6656	<i>funebris</i> (Ström, 1768) = <i>octomaculata</i> Linnaeus, 1771	*	Melzer, 2011		
6658	<i>hortulata</i> (Linnaeus, 1758) = <i>urticata</i> Linnaeus, 1761	*	Büchner, 2007		
6642	<b><i>Psammotis</i> Hübner, 1825</b>				
6643	<i>pulveralis</i> (Hübner, 1796)	*	Rommel, 2007		
6644	<b><i>Ostrinia</i> Hübner, 1825</b>				
6647	<i>palustralis</i> (Hübner, 1796)	*	Strietzel, 2006 GAEDIKE (2012)		
6649	<i>nubilalis</i> (Hübner, 1796) = <i>silacealis</i> Hübner, 1796 = <i>lopulinalis</i> Guenée, 1854	*	Rommel, 2008		
6659	<b><i>Paratalanta</i> Meyrick, 1890</b> = <i>Microstega</i> Meyrick, 1890				
6660	<i>pandalis</i> (Hübner, 1825)	+	STEUER (1966, 1995)		
6661	<i>hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	*	Büchner, 2011		

## Anmerkungen

- 32 **Neufund für Thüringen:** Kescherfang am 16.05.2010, „Polsambach“ südlich Langenfeld bei Bad Salzungen (TK 5227/1) leg. Büchner.
- 86 Martini fand die Minen an *Rumex acetosa*, der einzigen Futterpflanze der Raupen dieser Art, am Bahnhof bei Oberhof (MARTINI 1916: 179).
- 116 Petry fand 1920 und 1922 an der Illfelder Thalmühle die charakteristischen Minen an *Ulmus glabra* (RAPP 1936b: 42).
- 155 Minenfunde in Erfurt an *Rubus caesius* (MICHEL 1960: 103).
- 350 **Neufund für Thüringen:** Kescherfang am 11.07.2006, Kälberberg bei Lengenfeld unterm Stein (TK 4727/4), leg. Platt, Beleg in coll. Rommel, det. Gerstberger. (Datenbank Rommel).
- 403 **Neufund für Thüringen:** Puppe an Blattunterseite von Roter Johannisbeere (*Ribes rubrum*) am 27.04.2012, e.p. 03.05.2012, Jena-Göschwitz, Nordhang Jagdberg (TK 5135/2), leg., cult., det. Melzer (Zuchtbericht in Bestimmungshilfe Lepiforum).
- 728 Von Lenthe am 12.06.1892 bei Ruhla gefunden, Petry det. (RAPP 1936a: 216).
- 742 Mehrere Fundmeldungen in RAPP (1936a: 215) und bei STEUER (1984: 104). Belege von Lenthe und Petry befinden sich in der Sammlung Lenthe (Gotha).
- 1118 **Neufund für Thüringen:** Raupenfund an Hopfen (*Humulus lupulus*) am 25.09.2012, e.L. 15.10. 2012 bis 21.10.2012, Werrawiese nördlich Bad Salzungen (TK 5127/3), leg. Büchner.
- 1130 Nach BENGSSON (2010) ist *C. semifascia* der gültige Artnname. Eine ausführliche Erläuterung gibt Rennwald in der Bestimmungshilfe des Lepiforum.
- 1310a Zu dieser Art gibt es schon Fundmeldungen in RAPP (1936a: 191). RAPP: Harz (1936b: 38), STEUER (1984). Die Funde von Büchner wurden durch Genitaluntersuchung abgesichert.
- 1359 **Neufund für Thüringen:** Raupen aus Laubholzgebüsch (Esche, Heckenkirsche, Pfaffenbüchsen) am 23.05.2009 geklopft, e.L. 09.06.2009, Spitzenberg westl. Maua bei Jena (TK 5135/2), leg., det. Melzer., conf. Deutsch (Zuchtbericht in Bestimmungshilfe Lepiforum)
- 1422 Die Belegtiere zu den Meldungen in RAPP (1936a: 97) wurden von Friese nachbestimmt. Die Belege befindet sich in der Sammlung Lenthe (Gotha) und Petry/Beer (Erfurt) (Datenbank Rommel).
- 1442 **Neufund für Thüringen:** Kescherfang am 18.05.1993, Bad Salzungen Kaltenborner Str. (TK 5127/3) leg. Büchner, und Kescherfang am 02.06.2006, Langenfeld Ortslage (TK 5227/1) leg. Büchner.
- 1587 MARTINI (1916: 133) macht Fundangaben mit Hinweis zur Futterpflanze der Raupe. Perty hat diese Art ebenfalls an *Sedum acre* gezüchtet (RAPP 1936a: 93).
- 1598 Die Belegtiere von Beer und Petry zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a: 153) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.

- 1618 Minenfund an *Malus silvestris* bei Ronneburg in MICHEL (1960: 95).  
Aktueller Nachweis: „Hasenecke bis alter Sportplatz“ südl. Langenfeld bei Bad Salzungen (TK 5227/1), Mine an *Malus silvestris* am 14.09.2010, e.L. 17.03.2011, leg. Büchner.
- 1684 HEINEMANN (1870: 146) beschreibt die Bestimmungsmerkmale und gibt als Fundort auch Jena an. Weitere Fundmeldung in RAPP (1936a:132).
- 1733 STEUER (1998: 31) beschreibt eine Zucht dieser Art. Diese Fundmeldung fehlt bei GAEDIKE & HEINICKE (1999), in den Nachträgen und bei BUCHSBAUM (2000).
- 1844 BUHR (1956: 3) fand die Minen im Stadtwald bei Mühlhausen. Er macht Angaben zur Lebensweise der Raupen.
- 1901 Belegtiere von Lenthe zur Fundmeldung in RAPP (1936a:175) befinden sich in der Sammlung Lenthe/ Gotha. Sie wurden durch Steuer nachbestimmt (GU 826, 827 und 834). (Datenbank Rommel)
- 1905 Belegtiere von Petry und Beer zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a:180) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Sie wurden durch Steuer nachbestimmt (GU 1144 und 1145) (Datenbank Rommel).
- 2049 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a:152) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 2060 Funde zu dieser Art wurden schon in RAPP (1936a: 152) und von STEUER (1991: 148) bekannt gegeben.  
Aktueller Nachweis: Kescherfang am 18.05.2012, Werrawiese westl. Vacha (TK 5126/3), leg. Büchner.
- 2062 Die Belegtiere von Petry zu den Fundmeldungen in (RAPP 1936a: 151) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 2177 In SUTTER (1994) wird die Fundmeldung von Petry, in RAPP (1936a), dem Bundesland Sachsen-Anhalt zugeordnet, der Fundort „Alter Stollberg“ befindet sich aber in Thüringen.
- 2293 **Neufund für Thüringen:** Kescherfang am 23.07.2008, „Hasenecke bis alter Sportplatz“ südl. Langenfeld bei Bad Salzungen (TK 5227/1), leg. Büchner, det. Kolbeck.
- 2452 **Neufund für Thüringen:** Raupsack am 06.11.2009 an *Spirea* sp., e.L. 29.04.2010; Gespringwiese Schmalkalden (TK 5228/4), leg. Büchner.
- 2887 Das Belegtier von Petry zur Fundmeldung in RAPP (1936a:151) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 3144 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a:153) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 3170 **Neufund für Thüringen:** Lichtfang am 10.06.2004, Langenfeld (Ortslage) bei Bad Salzungen (TK 5227/1), leg. Büchner. Ein weiterer Nachweis gelang durch Kescherfang am 21.06.2012, Binnensalzstelle Werrawiese nördlich Dorndorf (TK 5126/4), leg. Büchner.

- 3269 Fundmeldungen in RAPP (1936a: 104). Aktueller Nachweis: Lichtfang am 16.06.2005, Katzenhart bei Berka vor dem Hainich (TK 4928/4), leg. Theimer (Datenbank Rommel).
- 3517 Das Belegtier von Hockemeyer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 110) befindet sich in der Sammlung Hockemeyer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 3852 Diese Art ist in KNAPP (1887: 40) mit Fundort Jena angegeben. KARSHOLT (1995: 150) macht ausführliche Angaben zu der von Schläger beschriebenen Art und dem Typenfundort Jena.
- 4188 Fundmeldungen in MARTINI (1916: 124) und RAPP (1936a: 104).  
Aktuelle Nachweise: Falter an Stämmen von Schwarzpappel (*Populus nigra*) am 24.05.2005, Oppershäuser Str. Niederdorla (TK 4828/2), leg. Platt, und Lichtfang am 27.05.2005, Netzbornholz bei Reichenbach (TK 4949/1) leg. Rommel. Belege in Sammlung Rommel (Datenbank Rommel).
- 4214 **Neufund für Thüringen:** Lichtfang am 19.06.1988, Jena (TK 5135), leg Schadewald, det. Büchner. Der Beleg befindet sich in der Sammlung Schadewald im Phyletischen Museum Jena.
- 4221 Die Belegtiere von Völker zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 51) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4237 Die Belegtiere von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 50) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4247 Die Belegtiere von Petry zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 54) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4254 Die Belegtiere von Petry zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 52) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt.  
Aktueller Nachweis: Lichtfang am 31.07.2003, Steinbruch Wendehausen (TK 4827/3), leg. Rommel (Datenbank Rommel).
- 4265 Die Belegtiere von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 49) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt. (Datenbank Rommel).
- 4286 In HEINEMANN (1863: 73) wird zum Vorkommen auch „Thüringen“ angegeben.  
Das Belegtier von Petry zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 49) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4308 Die Belegtiere von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 51) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4323 Das Belegtier von Petry zur Fundmeldung „Nordhausen, Mittelberg bei der Numburg“, Funddatum 05.06.1912, in RAPP (1936a: 47) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch (GU Nr. 256) bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4331 Die Belegtiere von Hockemeyer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 52) befinden sich in den Sammlungen Hockemeyer bzw. Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt.  
Aktueller Nachweis: Lichtfang am 05.07.2008, „Faulunger Stein“ bei Faulungen / Eichsfeld (TK 4727/4), leg. Rommel (Datenbank Rommel).

- 4336 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 52) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt. (Datenbank Rommel)
- 4358 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 48) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Karisch bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4382 Die Belegtiere von Beer zur Fundmeldung „Tannroda und Tonndorf“ in RAPP (1936a: 32) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4386 Fundmeldungen unter *Acalla logiana* Schiff. in MARTINI (1916: 120) und RAPP (1936a: 33). Aktuelle Nachweise: Raupen an Wolligem Schneeball (*Viburnum lantanum*) am 08.08.2008, e.l. 13.09.2008, Greifenstein bei Bad Blankenburg (TK 5333/2), leg. det. (GU) Büchner. Raupen 27.08.2008 in zusammengesponnenen Blättern von Schneeball (*Viburnum opulus*), e.l. 15.09.2008 bis 23.09.2008, zwischen Leutra und Maua (TK 5135/1), leg. Melzer, det. (GU) Kaiser. Weitere Zuchten 2009, 2011 (Zuchtbericht in Bestimmungshilfe Lepiforum).
- 4388 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 32) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4397 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 33) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4405 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 33) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4408 Die Belegtiere von Beer und Frank zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 34) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt. (Datenbank Rommel).
- 4413 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 33) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt. (Datenbank Rommel).
- 4525 **Neufund für Thüringen:** Lichtfang am 10.06.2008, Eisenach Ortslage (TK 5027/2), leg. Hofmann, det. Büchner (GU Nr. 185).
- 4601 In HEINEMANN (1863: 41) wird zum Vorkommen auch „Thüringen“ angegeben. MARTINI (1916: 121) bezieht sich auf Heinemann, gibt aber „Umg. Jena“ als Fundort an.
- 4692 Die Belegtiere von Beer zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 56) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4697 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 56) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt. Aktueller Nachweis. Lichtfang am 17.08.2006, Alperstedter Ried bei Alperstedt (TK 4932/1), leg., coll. Strietzel, det. Rommel (Datenbank Rommel).
- 4743 Die Belegtiere von Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936b: 12) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4748 HEINEMANN (1870: 130) beschreibt die Bestimmungsmerkmale und gibt als Fundort unter anderem auch Jena an. MARTINI (1916: 125) übernimmt diese Meldung.

- 4761 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung „Hohenfelden“ in RAPP (1936a: 59) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel). Aktueller Nachweis: Kescherfang am 13.06.2009, NSG Sachsenburg bei Dermbach/Rhön (TK 5226/4), leg. Büchner.
- 4769 Die Belegtiere von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 59) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4770 Die Belegtiere von Beer zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a: 58) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 4774 Die Belegtiere von Beer und Petry zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a: 60) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt.  
Weiterer Nachweis: Lichtfang am 31.07.1971, Schabsheide bei Burkersdorf (TK 5333/3), leg., det. Steuer (GU Nr. 4277) (Datenbank Rommel).
- 4776a GAEDIKE (2011) bezieht sich auf die Arbeit von SEGERER et. al. (2011). Hier wird „Thüringer Wald“, ohne nähere Angaben zum Fundort, angegeben.
- 4791 Die Belegtiere von Beer und Petry zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a: 64) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt. (Datenbank Rommel).
- 4806 **Neufund für Thüringen:** Lichtfalle am 01.08.2004, Am Dorfgraben (Garten), Ammern (TK 4728/4), leg. Rommel, det. Kolbeck.
- 4968 In GRAF et. al. (2002) wird der Fund von Ernst aus dem Jahr 1935 (coll. MTD) genannt. Dieser Artnachweis wurde bereits in RAPP (1936a: 69) publiziert. Die Belege von Beer wurden von Rommel überprüft (Datenbank Rommel). Der Beleg von Hockemeyer ist nicht auffindbar (Büchner).
- 4988 Die Belegtiere von Beer und Petry zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a: 66) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 5000 Der Falter von Martini wurde durch Wocke bestimmt und von Petry bestätigt, siehe RAPP (1936a: 70).
- 5007 Die Belegtiere von Beer und Lenthe zu den Fundmeldungen in RAPP (1936a: 77) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Der Beleg von Lenthe wurde von Rebel bestimmt. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 5036 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 55 als *Evetria margarotana* H.S. (Staudinger & Rebel Nr. 1853)) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 5038 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 56 als *Evetria retiferana* Wck. (Staudinger & Rebel Nr. 1854)) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).

- 5066 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 56) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt.  
Aktueller Nachweis. Lichtfang am 29.05.2003, Hanfsee bei Schlotheim (TK 4730/3), leg. Rommel (Datenbank Rommel).
- 5094 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 83) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 5097 Die Belegtiere von Beer zur Fundmeldung in RAPP (1936a: 79) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 5135 Die Belegtiere von Beer und Petry zu Fundmeldungen in RAPP (1936a: 80) befinden sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 5146 Das Belegtier von Beer zur Fundmeldung „Möbisburg“ in RAPP (1936a: 80) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch Rommel bestätigt (Datenbank Rommel).
- 5238 Das Belegtier von Petry zu Fundmeldung in RAPP (1936b: 19) befindet sich in der Sammlung Petry/Beer. Die Bestimmung wurde durch den Autor überprüft und bestätigt.
- 5278 MARTINI (1916, 132) wiederholt die Meldung von KNAPP (1887: 36).  
Aktueller Nachweis: Raupen am 29. Mai 2011 an *Inula salicina*, e.l. 10. Juni 2011, Maua bei Jena, Rand des ehemaligen TÜP Rothenstein (TK 5135/1), leg. Melzer. Weitere Zucht 2012 (Zuchtbericht in Bestimmungshilfe Lepiforum).
- 5291 Für Thüringen gibt es schon Fundmeldungen in MARTINI (1916: 156), RAPP (1936a: 144), RAPP (1936b: 30) sowie eine Meldung von Sutter (Datenbank Rommel). Aktueller Nachweis: Lichtfang am 28.05.2005, Feuchtwiese + Grenzstreifen südwestl. Horbel südl. Empertshausen/ Rhön (TK 5326/3), leg. Büchner.
- 5488 In GAEDIKE (2009) wird ROMMEL (2007) zitiert. Es ist keine aktuelle Meldung für Thüringen, weil Rommel hier die Fundmeldungen von MÖLLER (1854) angibt.
- 5521 In GAEDIKE (2009) wird ROMMEL (2007) zitiert. Es sind keine aktuellen Meldungen für Thüringen, weil Rommel hier die Fundmeldungen von Petry und Hockemeyer angibt.
- 6201 Für Thüringen gibt es schon Fundmeldungen in MARTINI (1916: 118) und RAPP (1936a: 24). Diese alten Nachweise sind auch in GAEDIKE & HEINICKE (1999) für Thüringen angegeben.  
Aktueller Nachweis: Tagfund am 18.08.1996, Erfurt Stotternheim, Luisenhall (TK 4932/1), leg. Heuer.
- 6229 Petry hat diesen Falter gesehen und bestimmt, siehe RAPP (1936: 6). In der Thüringen-Sammlung von Petry/Beer steckt ein Falter, der nicht aus Thüringen ist. Er kommt mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer Zuchtserie, die sich in der Paläarkten-Sammlung von Petry befindet.
- 6367 Petry hat diesen Falter gesehen und bestimmt, siehe RAPP (1936a: 2). Der Beleg von Martini ist nicht vorhanden.
- 4 6673 **Neufund für Thüringen:** Tagfund am 24. Juni 2006, Umgebung von Jena, NSG Leutratal, (TK 5135/1), leg. Melzer, det. Nuß (Bestimmungshilfe Lepiforum).
- 10 6686 **Neufund für Thüringen:** Falter am 16.03.2004 in einem Gewächshaus in Bad Salzungen (TK 5127/3), leg. Büchner.

## Danksagung

Der Autor bedankt sich bei den oben genannten Damen und Herren für die gemeldeten Nachweise, für die zur Bestimmung gesendeten Belege und für die dem Autor überlassenen Falter. Ein besonderer Dank geht an Ronald Bellstedt, Museum der Natur Gotha (Stiftung Schloss Friedenstein) und Matthias Hartmann, Naturkundemuseum Erfurt, für die großzügige Unterstützung bei der Literaturbeschaffung und den gewährten Zugang zu den Museumssammlungen. Herrn Reinhard Gaedike danke ich für die Durchsicht des Manuskripts mit wichtigen Hinweisen zu Arten in dieser Liste und für die Beschaffung von seltener Literatur.

## Literatur und Bibliographie der Checkliste

- AHR, H. (1966): Mitteldeutsche Blattminenfunde 1.Teil. - Entomologische Berichte **1**: 21-32.  
- (1966): Mitteldeutsche Blattminenfunde 2.Tei.l - Entomologische Berichte **2**: 77-88.
- BENTSSON, B. A. (2010): *Caloptilia jurateae* sp. n., a sibling species of *Caloptilia semifascia* (Haworth, 1828) (Lepidoptera Gracillariidae). - Entomologisk Tidskrift **131**(2): 105-112. [Sekundärzitat]
- BUCHNER, U. (2001): *Doloploca punctulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Tortricidae) neu für Thüringen. - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. **8** (2): 75.  
- (2005): Nachweis der Feuerdornmotte *Phyllonorycter leucographella* (Zeller, 1850) in Thüringen (Lepidoptera, Gracillariidae). - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. **12** (1): 2-3.
- (2006): Berichtigung zu den Arten *Doloploca punctulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Tortricidae) und *Pyllonorycter leucographella* (Zeller, 1850) (Gracillariidae) in den Beiträgen von Büchner (2001, 2005). - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. **13** (1): 6-7.
- (2008): Kommentierte Checkliste der Gracillarioidea Thüringens: Roeslerstammiidae, Douglasiidae, Bucculatricidae, Gracillariidae (Lepidoptera). - Check-Listen Thüringer Insekten **16**: 5-14.
- BUCHSBAUM, U. (1996a): Checklist der Crambinae-Arten (Lepidoptera: Pyralidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten **4**: 70-72.  
- (1996b): Checklist der Federgeistchen-Arten (Lepidoptera: Pterophoridae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer **4**: 73-75.
- (1997a): Checklist der Adelidae-Arten (Langhornmotten) (Lepidoptera: Adelidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer **5**: 49-51.
- (1997b): Checklist der Oecophoridae-Arten (Faulholzmotten) (Lepidoptera: Oecophoridae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten **5**: 52-56.
- (1997c): Checklist der Yponomeutidae-Arten (Gespinstmotten) (Lepidoptera: Yponomeutidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten **5**: 57-58.
- (2001a): Checkliste der Lepidoptera Thüringens (CLT) Addenda et Corrigenda, I. - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. **8** (1): 21-26.
- (2001b): Checkliste der Lepidoptera Thüringens (CLT) Addenda et Corrigenda, II. - Check-Listen Thüringer Insekten **9**: 59-66.
- BUCHSBAUM, U. & H. LÖBEL (Bearb.) (2000): Checkliste der Lepidoptera Thüringens (CLT). - Check-Listen Thüringer Insekten **8**: 1-176.
- BUCHSBAUM, U. & K. SCHÖNITZER (2000): *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986 in Thüringen (Lepidoptera, Gracillariidae). - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. **7** (2): 49-52.

- BUHR, H. (1956): Interessante Minen an *Myosotis* und *Pulmonaria* aus Thüringen. - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft (e.V) **46**: 1-13.
- (1960): Bemerkenswerte oder neue Gallen und Minen aus Thüringen. - Mitteilungen der Thüringischen Botanischen Gesellschaft **2** (1): 56-150.
- DAVIS, D. R. & J. DE PRINS (2011): Systematics and biology of the new genus *Macrosaccus* with descriptions of two new species (Lepidoptera, Gracillariidae). - ZooKeys **98**: 29-82
- DE PRINS, W. & J. DE PRINS (2005): World Catalogue of Insects. Vol 6 Gracillariidae (Lepidoptera). - Apollo Books Band **6**: 1-502.
- ERLACHER, S.-I., R. BELLSTEDT, E. FRIEDRICH & A. HEUER (2008): Zur Schmetterlingsfauna am Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich (Insecta: Lepidoptera). - Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha **25**: 39-56.
- FRIESE, G. (1969): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Argyresthiidae. - Beiträge zur Entomologie **19** (7/8): 693-752.
- (1973): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Ethmiidae. - Beiträge zur Entomologie **23** (5/8): 291–312.
- GAEDIKE, R. (1968): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Epermiidae. - Beiträge zur Entomologie **18** (3/4): 300-310.
- (1970): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Acrolepiidae. - Beiträge zur Entomologie **20** (3/4): 209-222.
  - (1978): Beiträge zu Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Douglasiidae. - Beiträge zur Entomologie **28** (1): 211-216.
  - (1980): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Pyraustinae. - Beiträge zur Entomologie **30** (1): 41-120.
  - (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Tortricidae (Tribus Archipini). - Beiträge zur Entomologie **40** (1): 63-111.
  - (2008): Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte **52** (1): 9-49.
  - (2009): Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte **53** (2): 75-100.
  - (2010): Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte **54** (2): 109-122.
  - (2011): Nachtrag 2010 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte **55** (4): 199-215.
  - (2012): Nachtrag 2011 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte **56** (3/4): 197-202.
- GAEDIKE, R. & W. HEINICKE (Hrsg.) (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). - Entomologische Nachrichten und Berichte Beiheft **5**: 1-216.
- GAEDIKE, R. & G. PETERSEN, G. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Phystidae (Insecta). - Faunistische Abhandlungen **13** (4): 55-107.
- GAEDIKE, R., F. GRAF, M. NUSS & A. STÜBNER (2003): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen und Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) IV. - Entomologische Nachrichten und Berichte **47** (2): 77-80.
- GERSTBERGER, M. (2003): Halotopobionte Schmetterlingsarten (Insecta: Lepidoptera) der Naturschutzgebiete „Artener Solgraben“ und „Schloßberg-Solwiesen“ bei Auleben in Thüringen. - Rüdolstädter Naturhistorische Schriften **II**: 135-140.
- GÖBEL, F. (1859): Systematisches Verzeichnis der um Sonderhausen vorkommenden Schmetterlinge. - Programm des Gymnasiums zu Sondershausen: 3-23.
- GRAF, F., H. LEUTSCH, M. NUSS & A. STÜBNER (2001): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte **45** (2): 89-96.

- GRAF, F., H. LEUTSCH, M. NUSS & A. STÜBNER (2002): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) III. - Entomologische Nachrichten und Berichte **46** (2): 99-104.
- HAASE, J. (1968): Zum Vorkommen von Rindenminen an Holzpflanzen in der DDR. - Entomologische Berichte **2**: 61-68.
- HANNEMANN, H.-J. (1997): Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera V Oecophoridae, Chimabachidae, Carcinidae, Ethmiidae, Stathmopodidae. - In: DAHL, F. (Begr.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebenweise **70**: 1-163.
- HEINEMANN, H. VON (1863): Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Die Wickler. - C.A. Schwetschke & Sohn, Braunschweig, **1** Heft I: IV + 248 + 39 S.  
 - (1865): Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Die Zünsler. - C.A. Schwetschke & Sohn, Braunschweig, **1** Heft II: IV + 214 + 27 S.  
 - (1870): Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Die Motten und Federmotten. - C.A. Schwetschke & Sohn, Braunschweig, **2** Heft I: IV + 1-388.  
 - (1877): Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Die Motten und Federmotten. - C.A. Schwetschke & Sohn, Braunschweig, **2** Heft II: IV + 389-825 + 102 S.
- HOCKEMEYER, E. (1958a): Zum Vorkommen von *Stenoptilia pneumonanthes* Schleich an *Erythraea centaurium* in Nordwest-Thüringen (Lep.). - Mitteilungsblatt für Insektenkunde **2** (1/2): 58-59.  
 - (1958b): Berichtigungen zu O. Rapp: Insektenfauna Thüringens Microlepidoptera, Erfurt 1936. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde **2** (1/2): 59-60.  
 - (1958c): Erster Nachtrag zur Insektenfauna Thüringens. Microlepidoptera von Otto Rapp, Beobachtungen nach 1936. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde **2** (4): 127-132.
- HUEMER, P. & O. KARSHOLT (2010): Gelechiidae II (Gelechiinae, Gnorimoschemini). - In: P. HUEMER, O. KARSHOLT & M. NUSS (eds): Microlepidoptera of Europe **6**: 1-586.
- KARISCH, T. (1993): *Stenodes elongana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839) (Lep., Tortricidae) wieder in Ostdeutschland gefunden (Faun. Notiz Nr. 478). - Entomologische Nachrichten und Berichte **37**(1): 66.
- KARSHOLT, O. (1995): Kommentiertes Verzeichnis der Symmocidae, Blastobasidae und Gelechiidae Ostdeutschlands (Lepidoptera). - Beiträge zur Entomologie **45** (1): 137-154.
- KEFERSTEIN, A. & A. WERNEBURG (1860): Verzeichnis der Schmetterlinge von Erfurt in einem Umfange von zwei Stunden. - Jahrbücher der Königlichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, Neue Folge **1860**: 141-159.
- KNAPP, F. (1887): Verzeichniss der Schmetterlinge Thüringens (zweite vermehrte und verbesserte Auflage). - Stettiner Entomologische Zeitschrift **48**: 363-406 [Separat 1-44].
- MARTINI, W. (1916): Verzeichnis Thüringer Falter aus den Familien Pyralidae - Micropterygidae (Lepidoptera). - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Iris) **30**: 110-144 und 153-186.
- MEY, W. (1994): Taxonomische Bearbeitung der westpaläarktischen Arten der Gattung Leucoptera Hübner, [1825] s.l. (Lepidoptera, Lyonetiinae). - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **41** (1): 173-234.
- MICHEL, J. (1960): Blattminen aus Mitteldeutschland (Teil I und II). - Mitteilungsblatt für Insektenkunde **4**: 38-52, 95-109.  
 - (Bearb.: J. Haase)(1963): Blattminen aus Mitteldeutschland Zweiter Beitrag (Teil I). - Entomologische Berichte **2**: 123-133.  
 - (Bearb.: J. Haase)(1964): Blattminen aus Mitteldeutschland Zweiter Beitrag (Teil II). - Entomologische Berichte **2**: 79-85.  
 - (Bearb.: J. Haase)(1964): Blattminen aus Mitteldeutschland Zweiter Beitrag (Teil III). - Entomologische Berichte **3**: 101-117.
- MÖLLER, L. (1854): Fauna Mulhusana. - Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften **3**: 103-124.

- NIEUKERKEN, E.J.v., W. BIESENBAUM & W. WITLAND (2010): Die Gattung *Trifurcula* Zeller, 1848 in Deutschland mit zwei Erstnachweisen für die deutsche Fauna (Lep., Nepticulidae). - *Melanargia* **22** (1): 1-26.
- NUSS, M. (2005): *Scoparia manifestella*. Pp. 134-135. - In: GOATER, B., M. NUSS & W. SPEIDEL: Pyraloidea I (Crambidae: Acentropinae, Evergestinae, Heliothelinae, Schoenobiinae, Scopariinae), *Microlepidoptera of Europe* **4**.
- NUSS, M. & A. STÜBNER (2000): Aktuelle Daten zur Fauna der Lithocolletinae in Sachsen (Lep., Gracillariidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **44** (4): 225-228.
- PATZAK, H. (1969): Beitrag zur Kenntnis der Coleophoriden Thüringens (Bemerkungen zum Verzeichnis der Thüringer Mikrolepidopteren von RAPP). - *Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha* **1969**: 77-81.
- (1974): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Coleophoridae. - *Beiträge zur Entomologie* **24** (5/8): 153-278.
  - (1978): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera Nachträge II (Coleophoridae). - *Entomologische Berichte* **3**: 111-114.
  - (1980): Ergänzungen und Berichtigungen zur Coleophoriden-Fauna der DDR, (Lep., Coleophoridae). - *Entomologische Berichte* **2**: 87-90.
  - (1983a): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera, Nachträge IV, Coleophoridae. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **27** (2): 71-73.
  - (1983b): *Coleophora expressella* KLEMENSIEWICZ, neu für die Fauna der DDR (Lep., Coleophoridae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **27** (4): 175-176.
  - (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Gracillariinae. - *Faunistische Abhandlungen* **13** (7): 123-171.
  - (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera, Nachträge V, Coleophoridae. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **30** (4): 173-174.
  - (1987): Ergänzungen und Berichtigungen zur Coleophoriden-Fauna der DDR, II (Lepidoptera, Coleophoridae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **31** (3): 123-124.
- PETERSEN, G. (1964): Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna Thüringens, des Harzes und der Umgebung von Halle/Saale (Lepidoptera, Tineidae). - *Faunistische Abhandlungen* **3**: 111-126.
- (1966): Über einige Tineiden aus Thüringen, gesammelt von Dr. H. Steuer. - *Entomologische Nachrichten* **10** (2): 33-36.
  - (1969): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Tineidae. - *Beiträge zur Entomologie* **19** (3/6): 311- 388.
  - (1973): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Galleriidae. - *Beiträge zur Entomologie* **23** (5/8): 313-324.
- PETERSEN, G. & R. GAEDIKE (1975): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera Nachträge I (Tineidae, Epermeniidae und Acrolepiidae). - *Entomologische Berichte* **2**: 75-79.
- PETERSEN, G. & R. GAEDIKE (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera, Nachträge III (Epermeniidae, Tineidae, Acrolepiidae, Crambidae, Pyralidae, Pyraustinae, Scopariinae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **27** (1): 1-8.
- PETERSEN, G. & R. GAEDIKE (1987): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera, Nachträge IV (Tineidae, Acroliidae, Crambidae, Galleriidae, Pyralidae s. str., Douglasiidae, Pyraustinae, Scopariinae, Physitinae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **31** (1): 29-36.
- PETERSEN, G., G. FRIESE & G. RINNHOFER (1973): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Crambidae. - *Beiträge zur Entomologie* **23** (1/4): 4 -55.
- PIMPL, F (1988): Beiträge zur Kenntnis der Scopariinae (Pyraustidae). Die Entwicklungsbiologie von *Scoparia ancipitella* (LA HARPE, 1855). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* **32** (6): 249-252.
- PRÖSE, H. (2001): Neue Ergebnisse zur Faunistik der „Microlepidoptera“ in Bayern, Vierter Beitrag, (Insecta, Lepidoptera). - *Nachrichtenblatt der Bayrischen Entomologen* **50** (1/2): 51-65.

- RAPP, O. (1936a): Beiträge zur Fauna Thüringens 2, Microlepidoptera, Kleinschmetterlinge. Beobachtungen von Prof. Dr. Arthur Petry in Nordhausen, Curt Beer in Erfurt, Ernst Hockemeyer in Großenehringen. - Selbstverlag: 1-240.
- (1936b): Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Harzes. Beobachtungen von Prof. Dr. Arthur Petry, Nordhausen 1932 (1. Teil, Microlepidoptera.) - Selbstverlag: 1-47.
- RETZLAFF, H., R. SELIGER, W. WITTLAND & C. FINKE (2009): Erstmeldungen und aktuelle Funde zur Schmetterlingsfauna (Microlepidoptera) von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen. - *Melanargia* **21** (2): 88-96.
- RINNHOFER, G. (1975): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Pyralidae s.str. - Beiträge zur Entomologie **25** (2): 227-238.
- (1980): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Scopariinae. - Beiträge zur Entomologie **30** (1): 121-136.
  - (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Nymphulinae, Schoenobiinae, Acentropinae. - Beiträge zur Entomologie **38** (1): 169-182.
- ROMMEL, R.-P. (2003): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Lepidoptera) 1. Beitrag: Familien Ethmiidae und Pyralidae (Unterfamilien Galleriinae, Pyralinae, Phycitinae, Odontiinae, Evergestinae, Pyraustinae). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **IX**: 187-222.
- (2005): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Lepidoptera) 2. Beitrag: Familie Tineidae (Echte Motten). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **X**: 265-283.
  - (2006): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Insecta: Lepidoptera) 3. Beitrag: Chimabachidae, Oecophoridae (Faulholzmotten) und Amphisbatidae. - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XI**: 129-144.
  - (2007): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Insecta: Lepidoptera) 4. Beitrag: Familien Depressariidae (Flachleibmotten), Alucitidae (Fächerflügler), Pterophoridae (Federmotten) und Pyralidae (Unterfamilien Scopariinae, Schoenobiinae, Acentropinae). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XII**: 165-189.
- SCHLÄGER, F. [1846]: Beiträge zur Lebensweise verschiedener Mikrolepidopteren. - Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines (Jena) über die Jahre 1844/45: 120-132.
- [1846]: Entdeckungen, Ergänzungen, Berichtigungen und sonstige Bemerkungen. - Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines (Jena) über die Jahre 1844/45: 133-148.
  - [1847]: Beiträge zur Lebensweise verschiedener Mikrolepidopteren. - Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines (Jena) über die Jahre 1846: 152-164.
  - [1847]: Entdeckungen, Ergänzungen, Berichtigungen und sonstige Bemerkungen. - Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines (Jena) über die Jahre 1846: 171-204.
  - [1848]: Revision und Fortsetzung der Beiträge zur Lebensweise verschiedener Mikrolepidopteren. - Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines (Jena) über die Jahre 1847: 208-222.
  - [1848]: Entdeckungen, Ergänzungen, Berichtigungen und sonstige Bemerkungen (I,II). - Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines (Jena) über die Jahre 1847: 223-241.
- SCHMIDT, F. (1860): Verzeichniß der bis zum Jahre 1857 bei Gera gefundenen Lepidopteren. - Dritter Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera: 52-57.
- SCHOLZ, A. (1996): Zur Identität von *Epermenia falciformis* (Haworth, 1828) (Lepidoptera: Epermiidae). - *Nota lepidoptera* **18** (3/4): 289-296.
- SCHRECK, E. (1867): Phänologische Beobachtungen der Lepidopteren-Fauna in der Umgegend Zeulenroda's, Microlepidoptera, (Pyralides, Tortricides). - Zehnter Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera: 30-33.
- (1868): Phänologische Beobachtungen der Lepidopteren-Fauna in der Umgegend Zeulenroda's, (Tineidae). - Elfster Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera: 25-28.
- SELIGER, R. (2010): Nachweise für *Acleris rufana* ([Dennis & Schiffermüller], 1775), *Exapate congelatella* (Clerck, 1759) und *Cydia indivisana* (Danilevsky, 1963) im Nationalpark Eifel (Lep. Tortricidae). - *Melanargia* **22** (2): 45-48.

- STEUER, H. (1964): Zwei seltene Wanderfalter in Thüringen. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **11**: 443.
- (1966): Die Schmetterlinge von Bad Blankenburg (Thüringer Wald), II Teil Pyraloidea. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **13**: 447-459.
  - (1970): Die Schmetterlinge von Bad Blankenburg (Thüringer Wald), III Teil Torticidae und Cochylidae. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **17**: 411-431.
  - (1984): Die Schmetterlinge von Bad Blankenburg (Thüringer Wald), IV Teil (Lepidoptera). - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **31**: 91-152.
  - (1991): Die Schmetterlinge von Bad Blankenburg, V. Teil (Nachtrag und Korrekturen) (Lepidoptera). Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **38**: 119-159.
  - (1995): Die Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen) 45 Jahre Beobachtung, Forschung Erkenntnisse. - Rudolstädter Naturhistorische Schriften Supplementband: 1-175.
  - (1998): Neue Daten zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) der Umgebung von Bad Blankenburg (Thüringen). - Rudolstädter Naturhistorische Schriften **9**: 29-34.
  - (2002): 2. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen) (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte **46** (3): 167-172.
- STÜBNER, A. (2007): Taxonomische Revision der *Coleophora frischella* - Artengruppe (Coleophoridae). - Nota lepidoptera **30** (1): 121-172.
- SUTTER, R. (1988): *Stenoptilia annadactyla* sp. n. (Insecta, Lepidoptera, Pterophoridae). - Reichenbachia Museum für Tierkunde Dresden **25** (37): 181-184.
- (1988): *Niditinea truncicolella* TENGSTRÖM (Lep., Tineidae) neu für die DDR (Faun. Notiz, Nr. 308). - Entomologische Nachrichten und Berichte **32** (1): 42.
  - (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Alucitidae. - Beiträge zur Entomologie **40** (1): 113-119.
  - (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Pterophoridae. - Beiträge zur Entomologie **49** (1): 27-121.
  - (1994): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera – Scythrididae. - Beiträge zur Entomologie **44** (2): 261-318.
  - (1997): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera – Ochsenheimeriidae. - Beiträge zur Entomologie **47** (1): 3-12.
  - (2000): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera – Eriocraniidae (Insecta). - Faunistische Abhandlungen **22** (5): 49-67.
  - (2000): *Lobesia virulenta* Bae & Komai, 1991 (Lep., Tortricidae) neu für Deutschland (Faun. Notiz, Nr. 686). - Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (3): 201.
  - (2003): Die Arten der Gattung *Oegoconia* Stainton, 1854 in Deutschland und ihre Verbreitung in Ostdeutschland (Lepidoptera: Autostichidae). - Beiträge zur Entomologie **53** (2): 437-447.
- Bestimmungshilfe Lepiforum: (<http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl>)  
Fauna Europaea 2000 – 2013: (<http://www.faunaeur.org>)

### **Anschrift des Verfassers:**

Uwe Büchner  
Hauptstraße 85  
D - 36433 Bad Salzungen  
uw-buechner@t-online.de