

Checkliste der Rüsselkäfer (Curculionoidea) Thüringens

2. Fassung, Stand: November 2018

WOLFGANG APFEL, ANDREAS KOPETZ & ANDREAS WEIGEL

Nach dem Erscheinen der Checklisten der Rüsselkäfer (Cimberidae, Nemonychidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae und Curculionidae) (BEHNE 1994), der Breitrüssler (Anthribidae) (WEIGEL 1996) und der Borkenkäfer (Scolytidae und Platypodidae) (LIEBENOW 1998) sind eine Vielzahl taxonomischer Änderungen und neuer Erkenntnisse zur Verbreitung der Arten in Thüringen bekannt geworden, die eine Neubearbeitung dieser interessanten Überfamilie notwendig macht. Sie umfasst nach derzeitigem Stand die Familien Raymondionymidae (nicht in Thüringen), Anthribidae, Scolytidae, Platypodidae, Cimberidae, Nemonychidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae, Eirrhinidae und Dryophthoridae. Neben der Überprüfung der historischen Sammlungen im Naturkundemuseum Erfurt (v. a. Rapp, Heymes) und Gera (Nicolaus, Schnappauf) sowie im Museum der Natur Gotha (Jänner, Wolfrum), wurden Rüsselkäfer-Daten aus allen verfügbaren aktuellen Sammlungen und der vorhandenen Literatur in der Datenbank Thüringer Käferarten im Naturkundemuseum Erfurt (DB NME) zusammengetragen und ausgewertet. Belege, die im Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut Müncheberg vorliegen (v. a. coll. Dieckmann und Behne), wurden durch Lutz Behne überprüft und digital zur Verfügung gestellt.

Neben den für Thüringen historisch wichtigen faunistischen Arbeiten von KELLNER (1873), RAPP (1933-35, 1953), LIEBMANN (1955) und MOHR (1963, 1966) sind die grundlegenden Arbeiten von Lothar Dieckmann (DIECKMANN 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1988) aus den 1970er und 1980er Jahren auch heute noch eine wertvolle Fundgrube sowohl für faunistische als auch biologische Angaben. Für die Arbeit mit Rüsselkäfern unumgänglich ist die aktuelle Fauna Baden-Württembergs von RHEINHEIMER & HASSLER (2010). Mit dem umfangreich illustrierten Werk können fast alle deutschen Arten bestimmt werden, zudem enthält es die wichtigsten Angaben zur Biologie, Ökologie und Verbreitung.

Obwohl alle Rüsselkäfer phytophag sind, verläuft ihre Entwicklung in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Neben den Xylophagen (u.a. Scolytinae, Cossoninae, Gattungen *Acalles*, *Magdalis* und *Hylobius* pt.) und den Wurzelfressern (z. B. *Otiorhynchus* spp., *Phyllobius* spp., *Polydrusus* spp., *Trachyphloeus* spp.), gibt es eine Vielzahl von Arten, die sich auf die Entwicklung in Früchten, Blättern, Sproßachsen oder Gallen spezialisiert haben (z. B. *Amalus scortillum*, *Anthonomus* spp., *Curculio* spp., *Drupenatus nasturii*, *Omphalapion* spp.). Frei an Pflanzen lebende Larven sind die Ausnahme (z. B. Arten der Gattungen *Cionus*, *Hypera* und *Donus*). Diese sehr hohe Spezialisierung und eine oft versteckte Lebensweise erfordern, dass nach vielen Arten sehr speziell gesucht werden muss. Die Kenntnis der Lebensweise (Pflanzenbindung, Entwicklungsort, Zeit des Vorkommens usw.) ist dazu zwingend notwendig. Einigen Entomologen gelangen in den

letzten Jahren durch diese gezielte Nachsuche eine Reihe von Wieder- und Neufunden für die vorliegende Checkliste (z. B. 2009: *Hypera pandellei folwacznyi*, 2010: *Dorytomus salicis*, 2015: *Kalcapion semivittatum*, 2016: *Sibinia subelliptica*, 2017: *Perapion oblongum*, 2018: *Nemonyx lepturoides*).

Rüsselkäfer können auch mit Fallen (Bodenfallen, Eklektoren, Malaisefallen) nachgewiesen werden, besondere Artnachweise gelangen hier aber eher zufällig, wie beispielsweise *Trypodendron laeve* (2010 mittels Eklektor) oder *Squamapion origani* (2016 in Bodenfallen). Eine Ausnahme bilden hier die Borkenkäfer (Unterfamilien Scolytinae und Platypodinae), deren Arten mittels alkoholhaltiger Fallen (vor allem Eklektoren) gezielt und oft in großer Anzahl angelockt werden können.

Für Deutschland sind nach dem aktuellen online-Katalog DKAT (BLEICH et al. 2018, Stand November 2018), mit dem diese Checkliste abgestimmt wurde, insgesamt 1117 Arten aus den neun betreffenden Familien bekannt. Gesicherte Nachweise aus Thüringen liegen für 814 Arten vor. Berücksichtigt wurden dabei nur Arten, für die überprüfte Belege vorliegen bzw. deren (ehemalige) Vorkommen als sicher oder zumindest sehr wahrscheinlich gelten. Von zwölf Arten konnten dementsprechend lediglich Literaturmeldungen aufgenommen werden. Fehleinträge für die Fauna Thüringens bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) und KÖHLER (2010, 2011a, 2011b) konnten korrigiert werden (*Bagous lutulosus*, *Bagous puncticollis*, mehrere *Ceutorhynchus* spp., *Datonychus dennerei*, *Eutrichapion melancholicum*, *Gronops inaequalis*, *Philopodon plagiatum*, *Procas armillatus*, *Pseudomylocerus canescens*, *Rhyncolus reflexus*, *Sibinia variata*, *Tychius pumilus*).

Nach aktuellem Stand (November 2018) enthält die Datenbank der Thüringer Rüsselkäfer (Curculionoidea) insgesamt 47.390 Datensätze zu allen in der Checkliste aufgeführten Arten. Dabei wird ein Zeitraum von 1843 (RAPP 1934) bis heute abgedeckt. In der unten aufgeführten Gesamtübersicht der differenzierten vier Zeiträume wird dies grob deutlich. Es verwundert nicht, dass im Zeitraum von 1950 bis 1999 nicht nur eine große Zahl von Rüsselkäferarten nachgewiesen werden konnte, sondern auch zahlreiche Arten in dieser Zeit letztmalig in Thüringen gefunden wurden, wie beispielsweise *Anthonomus pyri* (1970), *Ceutorhynchus scrobicollis* (1961) oder *Trichosirocalus rufulus* (1955) im Kyffhäusergebiet in Nordthüringen. Dies liegt nicht zuletzt an den umfangreichen Aktivitäten des überregional bekannten Spezialisten der Familie Lothar Dieckmann (†), der regelmäßig ausgedehnte Exkursionen in verschiedenen Landschaften Thüringens unternommen hat. Ein Großteil dieser Ergebnisse ist in seine oben genannten Publikationen zur DDR-Fauna eingeflossen.

Vor allem bei den Unterfamilien Bagoinae, Nanophyinae und Lixinae sowie der Gattung *Ceutorhynchus* ist der Anteil aktuell nicht belegter Arten mit 30-64% besonders hoch. Von insgesamt 82,5% des Thüringer Artenbestandes liegen aktuelle Funde, also ab dem Jahr 2000, vor. Von 45 Arten (5,3%) sind Nachweise lediglich aus der Zeit vor 1950 und von 27 (3,3%) der Arten nur aus der Zeit vor 1900 bekannt. Das aktuelle Fehlen dieser Arten liegt teilweise an Untersuchungsdefiziten, dürfte aber in vielen Fällen mit Lebensraumveränderungen und -zerstörungen (insbesondere bei Arten, die Feuchtgebiete besiedeln) in Zusammenhang stehen. Einige Landschaften oder Naturräume Thüringens waren und sind auch heute noch für Rüsselkäferinteressierte und -experten interessant. Zu erwähnen sind

hier beispielsweise das Kyffhäusergebiet, das Leutratl bei Jena, die Kalk-Trockengebiete bei Arnstadt und Ohrdruf, das Plothener Teichgebiet in Ostthüringen und die Thüringer Rhön mit ihren traditionellen Hutungsflächen.

Die Nomenklatur und Systematik der vorliegenden Checkliste richtet sich nach dem aktuellen Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands (BLEICH et al. 2018), der im Wesentlichen auf dem aktuellen Paläarktis-Katalog (LÖBL & SMETANA 2011, 2013) beruht. Diese Checkliste dient auch als Grundlage für eine neue Roten Liste der Rüsselkäfer Thüringens, um eine bereits längere Zeit zurückliegende und in vielen Punkten veraltete Liste (BEHNE 2001) dringend zu ersetzen.

Gesamtübersicht der bearbeiteten Familien

Familie	Arten gesamt	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000
Anthribidae	15	14	13	14	14
Apionidae	106	85	91	96	93
Attelabidae	2	2	2	2	2
Curculionidae (Platypodinae-Scolytinae)	89	65	64	73	82
Curculionidae s.str.	553	446	462	457	439
Dryophthoridae	6	5	4	3	4
Eirihinidae	10	8	9	9	9
Nanophyidae	6	4	5	1	3
Nemonychidae	3	3	3	3	3
Rhynchitidae	24	22	23	23	23
Gesamt	814	654	676	681	672

Artenliste

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
	NEMONYCHIDAE					
	Cimberidinae					
1	Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
2	Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807)	x	x	x	x	
	Nemonychinae					
3	Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801)	x	x	x	x	1
	ANTHRIBIDAE					
	Anthribinae					
4	Allandrus undulatus (Panzer, 1795)	x	x	x	x	
5	Anthribus fasciatus (Forster, 1771)	x	x	x		l. N. 1951 Gotha
6	Anthribus nebulosus (Forster, 1771)	x	x	x	x	
7	Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)	x	x	x	x	
8	Phaeochrotes pudens (Gyllenhal, 1833)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
9	Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
10	Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
11	Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
12	Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
13	Tropideres albirostris (Herbst, 1783)	x	x	x	x	
	Choraginae					
14	Choragus horni Wolfrum, 1930				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
15	Choragus sheppardi Kirby, 1818	x		x	x	
	Urodontinae					
16	Bruchela conformis Suffrian, 1845	x	x	x	x	
17	Bruchela rufipes (Olivier, 1790)	x	x	x	x	
18	Bruchela suturalis (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
	RHYNCHITIDAE					
19	Auletobius sanguisorbae (Schrank, 1798)	x				l. N. 1893 Alperstedt
20	Temnocerus coeruleus (Fabricius, 1798)	x	x	x	x	
21	Temnocerus longiceps (Thomson, 1888)		x	x	x	
22	Temnocerus nanus (Paykull, 1792)		x	x	x	
23	Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833)	x	x	x	x	
24	Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833)	x	x	x	x	
25	Lasiorhynchites sericeus (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
26	Lasiorhynchites caeruleocephalus (Schaller, 1783)	x	x	x	x	
27	Caenorhinus mannerheimii (Hummel, 1823)	x	x	x	x	
28	Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
29	Neocoenorrhinus interpunctatus (Stephens, 1831)	x	x	x	x	
30	Neocoenorrhinus minutus (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
31	Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824)	x	x	x	x	
32	Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)	x	x	x	x	
33	Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
34	Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
35	Involvulus caeruleus (Degeer, 1775)	x	x	x	x	
36	Involvulus cupreus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
37	Involvulus pubescens (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
38	Mecorhis aethiops (Bach, 1854)	x	x	x	x	
39	Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
40	Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
41	Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
42	Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
	ATTELABIDAE					
43	Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
44	Attelabus nitens (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
	APIONIDAE					
45	Omphalapion buddebergi (Bedel, 1885)		x	x		l. N. 1965 Jena
46	Omphalapion dispar (Germar, 1817)	x	x	x		l. N. 1973 Friedrichroda
47	Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
48	Omphalapion laevigatum (Paykull, 1792)	x				l. N. 1890 Sättelstedt
49	Ceratapion armatum (Gerstäcker, 1854)	x	x	x	x	
50	Ceratapion austriacum (Wagner, 1904)			x		2
51	Ceratapion basicorne (Illiger, 1807)	x				l. N. < 1880 Erfurt
52	Ceratapion carduorum (Kirby, 1808)	x	x	x	x	KOPETZ et al. (2004)
53	Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
54	Ceratapion onopordi (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
55	Ceratapion penetrans (Germar, 1817)	x	x	x	x	
56	Diplapion confluens (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
57	Diplapion stolidum (Germar, 1817)	x	x	x	x	
58	Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797)	x				l. N. < 1880 Erfurt
59	Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
60	Aspidapion radiolus (Marshall, 1802)	x	x	x	x	
61	Aspidapion validum (Germar, 1817)	L			x	3
62	Melanapion minimum (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
63	Squamapion atomarium (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
64	Squamapion cineraceum (Wencker, 1864)	x	x	x	x	
65	Squamapion elongatum (Germar, 1817)	x	x	x	x	
66	Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833)		x	x	x	
67	Squamapion oblivium (Schilsky, 1902)			x	x	
68	Squamapion origani (Planet, 1917)				x	4
69	Squamapion serpyllicola (Wencker, 1864)			x		l. N. 1974 Kal- tennordheim
70	Squamapion vicinum (Kirby, 1808)	x	x	x		l. N. 1973 Dittersdorf
71	Kalcapion pallipes (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
72	Kalcapion semivittatum (Gyllenhal, 1833)				x	5
73	Taeniapion urticarium (Herbst, 1784)	x	x	x	x	
74	Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
75	Malvapion malvae (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	

lfd.	Familie / Unterfamilie	vor	bis	bis	ab	Bemerkung
Nr.	Arten	1900	1949	1999	2000	
76	Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
77	Exapion compactum (Desbrochers, 1888)	L			x	6
78	Exapion corniculatum (Germar, 1817)		x	x	x	
79	Exapion difficile (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
80	Exapion formaneki (Wagner, 1929)	x	x	x	x	
81	Exapion fuscirostre (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
82	Pseudoprotapion astragali (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
83	Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818)	x	x	x	x	
84	Protapion apricans (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
85	Protapion assimile Kirby, 1808	x	x	x	x	
86	Protapion dissimile (Germar, 1817)		x	x		l. N. 1951 Arnstadt
87	Protapion filirostre (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
88	Protapion fulvipes (Fourcroy, 1785)	x	x	x	x	
89	Protapion gracilipes (Dietrich, 1857)		x	x	x	
90	Protapion interjectum (Desbrochers, 1895)			x	x	
91	Protapion nigrितarse (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
92	Protapion ononidis (Gyllenhal, 1827)	x	x	x	x	
93	Protapion ruficrus (Germar, 1817)	x	x	x		l. N. 1983 Bad Blankenburg
94	Protapion trifolii (Linnaeus, 1768)	x	x	x	x	
95	Protapion varipes (Germar, 1817)	x	x	x	x	
96	Phrissotrichum rugicolle (Germar, 1817)		x	x	x	
97	Helianthemapion aciculare (Germar, 1817)	x	x	x	x	
98	Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
99	Pseudostenapion simum (Germar, 1817)	x	x	x	x	
100	Aizobius sedi (Germar, 1818)	x	x	x	x	
101	Perapion affine (Kirby, 1808)		x	x		l. N. 1953 Ohrdruf
102	Perapion curtirostre (Germar, 1817)	x	x	x	x	
103	Perapion marchicum (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
104	Perapion oblongum (Gyllenhal, 1839)				x	7
105	Perapion violaceum (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
106	Apion cruentatum Walton, 1844	x	x	x	x	
107	Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
108	Apion haematodes Kirby, 1808	x	x	x	x	
109	Apion rubens Stephens, 1839	x	x	x	x	
110	Apion rubiginosum Grill, 1893	x	x	x	x	
111	Catapion koestlini (Dieckmann, 1989)	x	x	x	x	
112	Catapion meieri (Desbrochers, 1901)		x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
113	Catapion pubescens (Kirby, 1811)	x	x	x	x	
114	Catapion seniculus (Kirby, 1808)		x	x	x	
115	Betulapion simile (Kirby, 1811)	x	x	x	x	
116	Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875)	x	x	x	x	
117	Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
118	Stenopterapion tenue (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
119	Ischnopterapion loti (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
120	Ischnopterapion modestum (Germar, 1817)			x	x	
121	Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
122	Protopirapion atratulum (Germar, 1817)	x	x	x	x	
123	Synapion ebeninum (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
124	Holotrichapion aethiops (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
125	Holotrichapion gracilicolle (Gyllenhal, 1839)	x	x	x		l. N. 1990 Kyffhäuser
126	Holotrichapion ononis (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
127	Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801)	x	x	x	x	
128	Hemitrichapion lanigerum (Gemminger, 1871)		x	x	x	
129	Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817)	x	x	x	x	
130	Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 1833)	x	x	x	x	
131	Hemitrichapion waltoni (Stephens, 1839)	x	x	x	x	
132	Pirapion immune (Kirby, 1808)	x		x	x	
133	Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839)		x			l. N. 1922 Wandersleben
134	Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833)		x	x	x	
135	Cyanapion columbinum (Germar, 1817)	x	x	x	x	
136	Cyanapion platalea (Germar, 1817)	x	x	x	x	
137	Cyanapion spencii (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
138	Cyanapion gyllenhalii Kirby, 1808	x	x	x	x	
139	Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854)	x	x	x	x	
140	Oxystoma craccae (Linnaeus, 1767)	x	x	x	x	
141	Oxystoma ochropus (Germar, 1818)	x	x	x	x	
142	Oxystoma opeticum (Bach, 1854)	x	x	x	x	
143	Oxystoma pomonae (Fabricius, 1798)	x	x	x	x	
144	Oxystoma subulatum (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
145	Oryxolaemus flavifemoratus (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
146	Eutrichapion ervi (Kirby, 1808)	x	x	x	x	
147	Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839)	x	x	x	x	
148	Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
149	Eutrichapion viciae (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
150	Eutrichapion vorax (Herbst, 1797)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
	NANOPHYIDAE					
	Nanophyinae					
151	Nanophyes brevis Boheman, 1845				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
152	Nanophyes globulus (Germar, 1821)	x	x			I. N. 1928 Georgenthal
153	Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
154	Nanomimus circumscriptus (Aubé, 1864)		x			I. N. 1930 Stotternheim
155	Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807)	x	x			I. N. 1916 Alperstedt
156	Microon sahlbergi (Sahlberg, 1835)	x	x		x	WEIGEL (2016)
	DRYOPHTHORIDAE					
	Dryophthorinae					
157	Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)	x	x		x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
	Rhynchophorinae					
158	Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787)	L				RAPP (1934)
159	Sphenophorus piceus (Pallas, 1776)	L				KELLNER (1873)
160	Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
161	Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)	x	x	x	x	
162	Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855		x	x	x	
	ERIRHINIDAE					
163	Tanysphyrus ater Blatchley, 1928			x	x	
164	Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
165	Tournotaris bimaculatus (Fabricius, 1787)		x			I. N. 1902 Apfelstädt
166	Notaris acridulus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
167	Notaris scirpi (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
168	Thryogenes festucae (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
169	Thryogenes nereis (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
170	Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
171	Grypus brunnirostris (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
172	Grypus equiseti (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
	CURCULIONIDAE					
	Platypodinae					
173	Platypus cylindrus (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
	Scolytinae					
174	Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837)	x		x	x	
175	Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
176	Scolytus laevis Chapuis, 1873			x	x	
177	Scolytus mali (Bechstein, 1805)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
178	<i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
179	<i>Scolytus pygmaeus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
180	<i>Scolytus ratzeburgi</i> Janson, 1856	x	x	x	x	
181	<i>Scolytus rugulosus</i> (Müller, 1818)	x	x	x	x	
182	<i>Scolytus scolytus</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
183	<i>Phloeotribus rhododactylus</i> (Marsham, 1802)	x		x	x	
184	<i>Phloeotribus spinulosus</i> (Rey, 1883)	x		x	x	
185	<i>Hylastes angustatus</i> (Herbst, 1793)	x	x	x	x	
186	<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
187	<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836	x	x	x	x	
188	<i>Hylastes brunneus</i> Erichson, 1836	x	x	x		l. N. 1996 Erfurt, Gotha
189	<i>Hylastes cunicularius</i> Erichson, 1836	x	x	x	x	
190	<i>Hylastes linearis</i> Erichson, 1836	x	x	x	x	
191	<i>Hylastes opacus</i> Erichson, 1836	x	x	x	x	
192	<i>Hylurgops glabratus</i> (Zetterstedt, 1828)	x				l. N. 1899 Gehlberg
193	<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
194	<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)	x	x	x	x	
195	<i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
196	<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
197	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann, 1794)	x	x		x	KOPETZ & WEIGEL (2006)
198	<i>Polygraphus grandiclava</i> Thomson, 1886			x	x	
199	<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
200	<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
201	<i>Hylesinus toranio</i> (Danthoine, 1788) (= <i>oleiperda</i> Fabricius, 1792)		x	x	x	
202	<i>Hylesinus varius</i> (Fabricius, 1775) (= <i>L. fraxini</i> (Panzer, 1792))	x	x	x	x	
203	<i>Hylesinus wachtli orni</i> Fuchs, 1906		x	x	x	
204	<i>Hylastinus fankhauseri</i> Reitter, 1905		x			l. N. 1921 Fahner Höhe
205	<i>Hylastinus obscurus</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
206	<i>Pteleobius vittatus</i> (Fabricius, 1787)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
207	<i>Kissophagus vicinus</i> (Comolli, 1837)	x			x	8
208	<i>Xylechinus pilosus</i> (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
209	<i>Phloeosinus aubei</i> (Perris, 1855)				x	RENNER (2009)
210	<i>Phloeosinus thujae</i> (Perris, 1855)		x	x	x	

lfd.	Familie / Unterfamilie	vor	bis	bis	ab	Bemerkung
Nr.	Arten	1900	1949	1999	2000	
211	Liparthrum bartschi Mühl, 1891			x		KOPETZ & WEIGEL (2015)
212	Crypturgus cinereus (Herbst, 1793)	x	x	x	x	
213	Crypturgus hispidulus Thomson, 1870			x	x	
214	Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
215	Lymantor coryli (Perris, 1855)	x	x	x	x	
216	Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825)	x	x	x	x	
217	Dryocoetes alni (Georg, 1856)	x	x	x	x	
218	Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
219	Dryocoetes hectographus Reitter, 1913			x	x	
220	Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
221	Coccotrypes dactyliperda (Fabricius, 1801)	i	i	i		KOPETZ et al. (2004)
222	Trypophloeus binodulus Ratzenburg, 1837	x	x	x	x	
223	Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813) (= <i>abietis</i> (Ratzeburg, 1837))	x	x	x	x	
224	Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
225	Ernoporichus caucasicus Lindemann, 1876			x	x	
226	Ernoporichus fagi (Fabricius, 1778)	x	x	x	x	
227	Ernoporichus tiliae (Panzer, 1793)	x	x	x	x	
228	Pityophthorus exculptus (Ratzeburg, 1837)			x	x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
229	Pityophthorus glabratus (Eichhoff, 1879)		x	x	x	
230	Pityophthorus lichtensteini (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
231	Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758)	x	x		x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
232	Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837)			x	x	
233	Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802)				x	KOPETZ & WEIGEL (2008)
234	Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1855)				x	WEIGEL (2008)
235	Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793)	x	x	x	x	
236	Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783)	x	x	x	x	
237	Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1879)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
238	Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	
	<i>Pityogenes irkutensis</i> Eggers, 1910					9 (/)
239	Pityogenes quadridens (Hartig, 1834)	x	x	x	x	
240	Pityogenes trepanatus (Nördlinger, 1848)			x	x	
241	Pityokteines curvidens (Germar, 1824)	L	L			RAPP (1934)
242	Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
243	Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867)	x	x			
244	Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
245	<i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827)	x		x	x	
246	<i>Ips amitus</i> (Eichhoff, 1871)	x	x	x	x	
247	<i>Ips cembrae</i> (Heer, 1836)			x	x	
248	<i>Ips sexdentatus</i> (Boerner, 1776)	x	x	x	x	
249	<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
250	<i>Xyleborus cryptographus</i> (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
251	<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
252	<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)	x	x		x	KOPETZ & WEIGEL (2006)
253	<i>Cyclorhipidion bodoanus</i> (Reitter 1913) (= <i>Xyleborus peregrinus</i>)				x	WEIGEL (2008)
254	<i>Anisandrus dispar</i> (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
255	<i>Xyleborinus attenuatus</i> (Blandford, 1894) (= <i>alni</i> Nijima 1909)			x	x	
256	<i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)	x	x	x	x	
257	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)				x	KOPETZ et al. (2004), WEIGEL (2008)
258	<i>Trypodendron domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
259	<i>Trypodendron laeve</i> Eggers, 1939				x	10
260	<i>Trypodendron lineatus</i> (Olivier, 1795)	x	x	x	x	
261	<i>Trypodendron signatus</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
	Baridinae					
262	<i>Baris artemisiae</i> (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
263	<i>Melanobaris laticollis</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
264	<i>Melanobaris morio</i> (Boheman, 1844)	x	x	x		l. N. 1983 Esperstedt
265	<i>Aulacobaris chlorizans</i> (Germar, 1824)		x		x	11
266	<i>Aulacobaris coerulescens</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
267	<i>Aulacobaris lepidii</i> (Germar, 1824)	x	x	x	x	
268	<i>Aulacobaris picicornis</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
269	<i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
270	<i>Limnobaris t-album</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
	Curculioninae					
271	<i>Dorytomus dejeani</i> Faust, 1882	x	x	x	x	
272	<i>Dorytomus dorsalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			l. N. 1910 Ilfeld
273	<i>Dorytomus filirostris</i> (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
274	<i>Dorytomus hirtipennis</i> Bedel, 1884	x	x	x	x	
275	<i>Dorytomus ictor</i> (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
276	<i>Dorytomus longimanus</i> (Forster, 1771)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
277	Dorytomus majalis (Paykull, 1792)	x	x		x	APFEL et al. (2013)
278	Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
279	Dorytomus nebulosus (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
280	Dorytomus occalescens (Gyllenhal, 1836)		x			12
281	Dorytomus rubrirostris (Gravenhorst, 1807)	x	x	x	x	
282	Dorytomus rufatus (Bedel, 1888)	x	x	x	x	
283	Dorytomus salicinus (Gyllenhal, 1827)	x	x			l. N. 1920 Eisenach
284	Dorytomus salicis Walton, 1851	L			x	13
285	Dorytomus suratus (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
286	Dorytomus taeniatus (Faust, 1781)	x	x	x	x	
287	Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	
288	Dorytomus tremulae (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
289	Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
290	Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807)	x				l. N. < 1880 Thüringen
291	Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
292	Orthochaetes setiger (Beck, 1817)	x	x	x	x	
293	Smicronyx coecus (Reich, 1797)	x		x	x	
294	Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797)	x	x	x	x	
295	Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1836)			x	x	14
296	Smicronyx smreczynskii F. Solari, 1952	x		x	x	
297	Smicronyx swertiae Voss, 1953			x		l. N. 1994 Roßdorf
298	Acalyptus carpini (Fabricius, 1792)	x	x		x	15
299	Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1836				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
300	Ellescus bipunctatus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
301	Ellescus infirmus (Herbst, 1795)	x		x	x	
302	Ellescus scanicus (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
303	Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)			x	x	
304	Sibinia pellucens (Scopoli, 1772)	x	x	x	x	
305	Sibinia phalerata Gyllenhal, 1836	x	x	x	x	
306	Sibinia pyrrhodactyla (Marsham, 1802)	x	x	x		l. N. 1951 Ohrdruf, Sülzenbrücken
307	Sibinia signata (Panzer, 1809)		x	x		l. N. 1974 Jena
308	Sibinia sodalis Germar, 1824	L				RAPP (1934)
309	Sibinia subelliptica (Desbrochers, 1873)		x		x	16
310	Sibinia unicolor (Fahraeus, 1843)		x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
311	<i>Sibinia viscaria</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	
312	<i>Tychius aureolus</i> Kiesenwetter, 1851	x	x	x	x	
313	<i>Tychius brevisculus</i> Desbrochers, 1873			x	x	
314	<i>Tychius crassirostris</i> Kirsch, 1871	x	x	x	x	
315	<i>Tychius junceus</i> (Reich, 1797)	x	x	x	x	
316	<i>Tychius lineatulus</i> Stephens, 1831	x	x	x	x	
317	<i>Tychius medicaginis</i> Brisout, 1862	x	x	x	x	
318	<i>Tychius meliloti</i> Stephens, 1831	x	x	x	x	
319	<i>Tychius parallelus</i> (Panzer, 1794)	x	x	x	x	
320	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
321	<i>Tychius polylineatus</i> (Germar, 1824)	x	x	x		I. N. 1996 Bottendorf
322	<i>Tychius pusillus</i> Germar, 1842			x	x	
323	<i>Tychius quinquepunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
324	<i>Tychius schneideri</i> (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
325	<i>Tychius sharpi</i> Tournier, 1873		x	x		I. N. 1950 Kyffhäuser (MOHR 1963)
326	<i>Tychius squamulatus</i> Gyllenhal, 1836	L	L	x	x	
327	<i>Tychius stephensi</i> Schönherr, 1836	x	x	x	x	
328	<i>Tychius trivialis</i> Boheman, 1843			x	x	
329	<i>Anthonomus bituberculatus</i> Thomson, 1868	x		x	x	
330	<i>Anthonomus chevrolati</i> Desbrochers, 1868				x	KOPETZ & WEIGEL (2008)
331	<i>Anthonomus conspersus</i> Desbrochers, 1868			x	x	
332	<i>Anthonomus germanicus</i> Dieckmann, 1968	x	x	x	x	
333	<i>Anthonomus humeralis</i> (Panzer, 1794)	x	x	x	x	
334	<i>Anthonomus kirschi</i> Desbrochers, 1868	x		x	x	
335	<i>Anthonomus pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
336	<i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
337	<i>Anthonomus pinivorax</i> Silfverberg, 1977	x	x			I. N. 1923 Erfurt
338	<i>Anthonomus pomorum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
339	<i>Anthonomus pyri</i> Gyllenhal, 1835	x	x	x		I. N. 1972 Kyffhäuser
340	<i>Anthonomus rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
341	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
342	<i>Anthonomus rufus</i> Gyllenhal, 1836	x	x	x	x	
343	<i>Anthonomus ulmi</i> (Degeer, 1775)	x				I. N. 1880 Erfurt
344	<i>Anthonomus undulatus</i> Gyllenhal, 1836		x			I. N. 1920 Rein- hardsbrunn
345	<i>Brachonyx pineti</i> (Paykull, 1792)	x	x	x	x	

lfd.	Familie / Unterfamilie	vor	bis	bis	ab	Bemerkung
Nr.	Arten	1900	1949	1999	2000	
346	Bradybatus creutzeri Germar, 1824				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
347	Bradybatus fallax Gerstaecker, 1860	x	x	x	x	
348	Bradybatus kellneri Bach, 1854	x	x	x	x	
349	Curculio betulae (Stephens, 1831)	x	x	x	x	
350	Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)	L				RAPP (1934)
351	Curculio glandium Marsham, 1802	x	x	x	x	
352	Curculio nucum Linnaeus, 1758	x	x	x	x	
353	Curculio pellitus (Boheman, 1843)	x	x	x	x	
354	Curculio rubidus (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
355	Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)	x	x	x	x	
356	Curculio villosus Fabricius, 1781	x	x	x	x	
357	Archarius crux (Fabricius, 1776)	x	x	x	x	
358	Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
359	Archarius salicivorus (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
360	Mecinus collaris Germar, 1821	x	x	x	x	
361	Mecinus heydeni Wencker, 1866		x			I.N.1909 Dornburg / Saale
362	Mecinus janthinus (Germar, 1817)	x	x	x	x	
363	Mecinus labilis (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
364	Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
365	Mecinus plantaginis (Eppelsheim, 1875)			x	x	
366	Mecinus pyraeter (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
367	Gymnetron beccabungae (Linnaeus, 1761)	x	x	x	x	
368	Gymnetron melanarium (Germar, 1821)	x	x	x	x	
369	Gymnetron rostellum (Herbst, 1795)	x			x	17
370	Gymnetron stimulosum (Germar, 1821)		x			I. N. 1920 Sachsenburg
371	Gymnetron veronicae (Germar, 1821)	x	x	x	x	
372	Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838	x	x	x	x	
373	Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
374	Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)	x	x		x	KOPETZ et al. (2004)
375	Rhinusa bipustulata (Rossi, 1792)	x			x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
376	Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813)		x	x	x	
377	Rhinusa linariae (Panzer, 1792)	x	x	x	x	
378	Rhinusa melas (Boheman, 1838)		x	x	x	
379	Rhinusa neta (Germar, 1821)	x		x	x	
380	Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)		x	x	x	
381	Miarus ajugae (Herbst, 1795)		x	x	x	
382	Miarus campanulae (Linnaeus, 1767)		x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
383	Miarus monticola Petri, 1912			x	x	
384	Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
385	Cleopomiarus micros (Germar, 1821)	x	x	x	x	
386	Cionus alauda (Herbst, 1784)	x	x	x	x	
387	Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785)	x	x	x	x	
388	Cionus longicollis montanus Wingelmüller, 1914	x	x	x		l. N. 1959 Jena
389	Cionus nigratarsis Reitter, 1904	x	x	x		l. N. 1953 Jena
390	Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
391	Cionus tuberculatus (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
392	Cleopus pulchellus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
393	Cleopus solani (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
394	Stereonychus fraxini (Degeer, 1775)	x	x	x	x	
395	Anoplus plantaris (Naezen, 1794)	x	x	x	x	
396	Anoplus roboris Suffrian, 1840	x	x	x	x	
397	Anoplus setulosus Kirsch, 1870		(x)			l. N. 1949 Pö- ritzsch / Saale (Beleg ?, det. Dieckmann)
398	Pseudorchestes ermischii (Dieckmann, 1958)		x	x	x	
399	Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821)	x	x	x	x	
400	Tachyerges decoratus (Germar, 1821)	x	x	x	x	
401	Tachyerges pseudostigma (Tempère, 1982)			x	x	
402	Tachyerges rufitarsis (Germar, 1821)	x	x	x	x	
403	Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
404	Tachyerges stigma (Germar, 1821)	x	x	x	x	
405	Isochnus angustifrons (West, 1917)	x	x	x	x	
406	Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)	x	x	x	x	
407	Orchestes alni (Linnaeus, 1758)	L		x		l. N. 1962 Kyffhäuser
408	Orchestes betuleti (Panzer, 1795)	x	x	x	x	
409	Orchestes erythropus (Germar, 1821)	x	x			l. N. 1902 Saalfeld
410	Orchestes fagi (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
411	Orchestes hortorum (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
412	Orchestes jota (Fabricius, 1787)	x	x	x		l. N. 1978 Teich- wolframsdorf
413	Orchestes pilosus (Fabricius, 1781)	x	x	x	x	
414	Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
415	Orchestes rusci (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
416	Orchestes testaceus (Müller, 1776)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
417	Rhynchaenus xylostei Clairville, 1798	x	x	x	x	
418	Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
419	Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
420	Rhamphus subaeneus Illiger, 1807	x	x	x		l. N. 1998 Steinhaleben
	Bagoinae					
421	Bagous alismatis (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
422	Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836	x				l. N. 1896 Stotternheim
	<i>Bagous binodulus</i> (Herbst, 1795)					18 (/)
423	Bagous brevis Gyllenhal, 1836	x				l. N. 1899 Stotternheim
424	Bagous claudicans Boheman, 1845			x		l. N. 1995 Wandersleben
425	Bagous collignensis (Herbst, 1797)				x	19
426	Bagous diglyptus Boheman, 1845	x				l. N. 1882 Eisenberg
427	Bagous frit (Herbst, 1795)	x				l. N. < 1880 Neudietendorf
428	Bagous frivaldszkyi Tournier, 1874	x				l. N. < 1880 Erfurt
429	Bagous glabrirostris (Herbst, 1795)	x				l. N. 1878 Haselbach
430	Bagous limosus (Gyllenhal, 1827)			x		20 (l. N. 1991 Meuselwitz)
431	Bagous longitarsis Thomson, 1868		x		x	APFEL et al. (2013)
432	Bagous lutosus (Gyllenhal, 1813)	x	x			l. N. 1903 Erfurt
433	Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813)	x	x	x		l. N. 1953 Ohrdruf
434	Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836	L				KELLNER (1873)
435	Bagous robustus Brisout, 1863			x		21
436	Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836		x		x	22
437	Bagous tempestivus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
438	Bagous tubulus Caldara & O'Brien, 1994	x	x	x	x	
	Ceutorhynchinae					
439	Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)	x	x	x	x	
440	Eubrychius velutus (Beck, 1817)	x	x		x	APFEL et al. (2013)
441	Phytobius leucogaster (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
442	Pelenomus canaliculatus (Fåhræus, 1843)	x	x	x	x	
443	Pelenomus commari (Panzer, 1794)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
444	Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 1986)	x	x	x	x	
445	Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
446	Pelenomus velaris (Gyllenhal, 1827)	x	x			l. N. 1903 Stotternheim
447	Pelenomus waltoni (Boheman, 1843)	x	x	x	x	
448	Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
449	Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837	x			x	WEIGEL (2016)
450	Rhinoncus bosnicus Schultze, 1900			x	x	
451	Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784)	x	x	x	x	
452	Rhinoncus castor (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
453	Rhinoncus henningsi (Wagner, 1936)		x	x	x	
454	Rhinoncus inconspicuous (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
455	Rhinoncus pericarpus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
456	Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797)	x	x	x	x	
457	Marmaropus besserii Gyllenhal, 1837				x	23
458	Aphytobius sphaerion (Boheman, 1845)	L	L			l. N. 1920 Weimar (RAPP 1934, DIECK- MANN 1972)
459	Auleutes epilobii (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
460	Rutidosoma graminosus (Gistel, 1857)	x	x	x	x	
461	Scleropteridius fallax (Otto, 1897)		x	x	x	
462	Amalus scortillum (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
463	Drupenatus nasturtii (Germar, 1824)	x	x	x	x	
464	Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776)	x	x	x	x	
465	Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794)	x	x	x	x	
466	Coeliodes rana (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
467	Coeliodes ruber (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
468	Coeliodes transversalbofasciatus (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
469	Coeliodes trifasciatus Bach, 1854	x	x	x	x	
470	Coeliodinus nigratarsis (Hartmann, 1895)			x	x	
471	Coeliodinus rubicundus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
472	Thamiocolus pubicollis (Gyllenhal, 1837)	x	x			l. N. 1920 Frauenwald
473	Thamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837)	x	x	x	x	
474	Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
475	Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
476	Zacladus exiguus (Olivier, 1807)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
477	<i>Zacladus geranii</i> (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
478	<i>Phrydiuchus topiarius</i> (Germar, 1824)		x	x	x	
479	<i>Ceutorhynchus aeneicollis</i> Germar, 1824		x			l. N. 1917 Nordhausen
480	<i>Ceutorhynchus alliariae</i> Brisout, 1860		x	x	x	
481	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
482	<i>Ceutorhynchus atomus</i> Boheman, 1845	x	x	x	x	
483	<i>Ceutorhynchus carinatus</i> Gyllenhal, 1837	x	x	x	x	
484	<i>Ceutorhynchus chalybaeus</i> Germar, 1824	x	x	x		l. N. 1956 Bad Berka
485	<i>Ceutorhynchus chlorophanus</i> Rouget, 1857	x	x	x		l. N. 1986 Holzhausen
486	<i>Ceutorhynchus cochleariae</i> (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
487	<i>Ceutorhynchus coerulescens</i> Gyllenhal, 1837			x	x	
488	<i>Ceutorhynchus constrictus</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
489	<i>Ceutorhynchus contractus</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
490	<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
491	<i>Ceutorhynchus gallorhenanus</i> F. Solari, 1949			x		l. N. 1970 Kyffhäuser
492	<i>Ceutorhynchus granulicollis</i> Thomson, 1865	x	x	x	x	
493	<i>Ceutorhynchus griseus</i> Brisout, 1869	x	x			l. N. < 1930 Arnstadt, Suhl
494	<i>Ceutorhynchus hirtulus</i> Germar, 1824	x	x	x		l. N. 1983 Breitenbach
495	<i>Ceutorhynchus ignitus</i> Germar, 1824	x	x	x		l. N. 1970 Jena
496	<i>Ceutorhynchus inaffectatus</i> Gyllenhal, 1837	x	x	x	x	
497	<i>Ceutorhynchus leprieuri</i> Brisout, 1881	x	x	x		l. N. 1950 Jena
498	<i>Ceutorhynchus nanus</i> Gyllenhal, 1837	x	x	x		l. N. 1998 Schlechtsart
499	<i>Ceutorhynchus napi</i> Gyllenhal, 1837	x	x	x	x	
500	<i>Ceutorhynchus nigrutilus</i> Schultze, 1896		x	x	x	
501	<i>Ceutorhynchus obstructus</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
502	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
503	<i>Ceutorhynchus parvulus</i> Brisout, 1869		x	x	x	
504	<i>Ceutorhynchus pectoralis</i> Weise, 1895	x	x	x		l. N. 1960 Saalburg
505	<i>Ceutorhynchus pervicax</i> Weise, 1883				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
506	<i>Ceutorhynchus picitarsis</i> Gyllenhal, 1837	x	x	x	x	
507	<i>Ceutorhynchus posthumus</i> Germar, 1824	x	x	x		l. N. 1959 Kyffhäuser
508	<i>Ceutorhynchus pulvinatus</i> (Gyllenhal, 1837)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
509	Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
510	Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837	x	x	x	x	
511	Ceutorhynchus resedae (Marsham, 1802)			x	x	
512	Ceutorhynchus rhenanus (Schultze, 1895)		x	x		l. N. 1966 Kyffhäuser
513	Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837	x	x	x	x	
514	Ceutorhynchus scapularis Gyllenhal, 1837		x			l.N.1911 Erfurt
515	Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924			x		l. N. 1961 Kyffhäuser
516	Ceutorhynchus sisymbrii (Dieckmann, 1966)		x	x	x	
517	Ceutorhynchus sophiae Gyllenhal, 1837	L				KELLNER(1873)
518	Ceutorhynchus striatellus Schultze, 1900			x	x	
519	Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800)	x	x	x	x	
520	Ceutorhynchus syrites Germar, 1824	x	x	x		l. N. 1954 Arnstadt, Sachsenburg
	<i>Ceutorhynchus thlaspi</i> (Brisout, 1869)					24 (/)
521	Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903		x	x	x	
522	Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
523	Ceutorhynchus unguicularis Thomson, 1871		x	x	x	
524	Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837)		x			l. N. 1947 Arnstadt
525	Oprohynchus consputus (Germar, 1824)	x	x			l.N.1928 Erfurt
526	Oprohynchus suturalis (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
527	Ethelcus denticulatus (Schränk, 1781)	x	x			l. N. 1925 Buchfart
528	Parethelcus pollinarius (Forster, 1771)	x	x	x	x	
529	Neoglocianus maculialba (Herbst, 1795)	x	x	x		l. N. 1963 Kyffhäuser
530	Glocianus distinctus (Brisout, 1870)	x	x	x	x	
531	Glocianus moelleri (Thomson, 1868)		x	x	x	
532	Glocianus punctiger (Sahlberg, 1835)	x	x	x	x	
533	Datonychus angulosus (Boheman, 1845)	x	x	x	x	
534	Datonychus arquatus (Herbst, 1795)	x	x			l. N. 1921 Sachsenburg
535	Datonychus melanostictus (Marsham, 1802)	x	x	x	x	
536	Datonychus paszlavskyi (Kuthy, 1890)		x	x		l. N. 1991 Kyffhäuser
537	Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837)	x	x	x	x	
538	Microplontus melanostigma (Marsham, 1802)	x	x	x	x	25
539	Microplontus millefolii (Schultze, 1897)			x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
540	Microplontus rugulosus (Herbst, 1795)	x	x		x	25
541	Microplontus triangulum (Boheman, 1845)			x		l. N. 1987 Breitenbach
542	Hadroplontus litura (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
543	Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
544	Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
545	Mogulones albosignatus (Gyllenhal, 1837)	x	x	x		l. N. 1954 Kyffhäuser
546	Mogulones andreae (Germar, 1824)	x	x			l.N.1915 Neudietendorf
547	Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
548	Mogulones borraginis (Fabricius, 1792)	x	x	x		l. N. 1953 Kyffhäuser (MOHR 1963)
549	Mogulones crucifer (Pallas, 1771)	x	x	x	x	
550	Mogulones euphorbiae (Brisout, 1866)		x	x		l.N.1954 Gera
551	Mogulones geographicus (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
552	Mogulones javetii (Gerhardt, 1867)	x				l. N. 1976 Gumperda
553	Mogulones larvatus (Schultze, 1897)	x	x			l. N. 1921 Fahner Höhe
554	Mogulones pallidicornis (Gougelet & Brisout, 1860)	x	x		x	26
555	Mogulones raphani (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
556	Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
557	Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
558	Calosirus terminatus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
559	Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1866)	x	x	x	x	
560	Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801)	x	x	x	x	
561	Trichosirocalus rufulus (Dufour, 1851)		x	x		l. N. 1955 Kyffhäuser
562	Trichosirocalus spurnyi (Schultze, 1901)			x	x	
563	Trichosirocalus thalhammeri (Schultze, 1906)		x	x		l.N.1986 Nöda
564	Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
565	Stenocarus cardui (Herbst, 1784)	x	x			l. N.1906 Erfurt
566	Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)	x	x	x	x	
567	Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
568	Coeliastes lamii (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
	Conoderinae					
569	Coryssomerus capucinus (Beck, 1817)	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
	Cossoninae					
570	Cotaster cuneipennis (Aubé, 1850)		L			RAPP (1934)
571	Pselactus spadix (Herbst, 1795)	L				KELLNER(1873)
572	Cossonus cylindricus C. R. Sahlberg, 1835	x	x	x	x	
573	Cossonus linearis (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
574	Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
575	Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
576	Rhyncolus sculpturatus Waltl, 1839	x				l. N.1893 Erfurt
577	Phloeophagus lignarius (Marshall, 1802)	x	x	x	x	
578	Phloeophagus thomsoni (Grill, 1896)		x			l. N. 1934 Schwarzburg
579	Brachytemnus porcatus (Germar, 1824)	x				l. N.1896 Erfurt
580	Stereocorynes truncorum (Germar, 1824)	x	x	x	x	
581	Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838)	x				l. N.1893 Erfurt
	Cryptorhynchinae					
582	Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
583	Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
584	Acalles camelus (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
585	Acalles echinatus (Germar, 1824)	x		x	x	
586	Acalles fallax Boheman, 1844			x	x	
587	Kyklioacalles navieres (Boheman, 1837)		x	x	x	
588	Kyklioacalles pyrenaeus (Boheman, 1844)				x	KOPETZ et al. (2004)
589	Kyklioacalles roboris (Curtis, 1834)	x	x	x	x	
590	Echinodera hypocrita (Boheman, 1837)	x	x	x	x	
591	Acallocrates colonnellii Bahr, 2003	x				27
	Cyclominae					
592	Gronops lunatus (Fabricius, 1775)	x	x	x		l. N. 1981 Kyffhäuser
	Entiminae					
593	Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792)				x	28
594	Otiorhynchus carinatopunctatus (Retzius, 1783) (= scaber (L., 1758)	x	x	x	x	
595	Otiorhynchus chrysostictus Gyllenhal, 1834 (= conspersus (Herbst, 1795))		x		x	
596	Otiorhynchus coecus Germar, 1824 (= niger (F., 1775))	x	x	x	x	
597	Otiorhynchus crataegi Germar, 1824				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
598	Otiorhynchus desertus Rosenhauer, 1847		x			l. N. 1916 Tabarz

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
599	Otiorhynchus fullo (Schränk, 1781)	x	x	x	x	
600	Otiorhynchus indefinitus Reitter, 1912 (= <i>dieckmanni</i> Magnano, 1979)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
601	Otiorhynchus lepidopterus (Fabricius, 1794)	x	x	x		l. N. 1998 Ilfeld
602	Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
603	Otiorhynchus lirus Schoenherr, 1834	x	x	x	x	
604	Otiorhynchus morio (Fabricius, 1781)	x	x			l. N. 1934 Tabarz
605	Otiorhynchus nodosus (Müller, 1764)	x	x	x	x	
606	Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
607	Otiorhynchus pinastri (Herbst, 1795)		x	x	x	
608	Otiorhynchus porcatus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
609	Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777)	x	x	x	x	
610	Otiorhynchus rotundus (Marseul, 1872) (= <i>rotundatus</i> Siebold, 1837)				x	29
611	Otiorhynchus rugifrons (Gyllenhal, 1813)		x			l. N. 1909 Nordhausen
612	Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
613	Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)	x	x	x	x	
614	Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968			x	x	
615	Otiorhynchus subdentatus Bach, 1854	x	x	x	x	30
616	Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
617	Otiorhynchus tenebriosus (Herbst, 1783)	x	x	x	x	31
618	Otiorhynchus uncinatus Germar, 1824	x	x	x	x	
619	Otiorhynchus velutinus Germar, 1824	x	x	x	x	
620	Otiorhynchus veterator Uyttenboogart, 1932				x	ESSER (2012)
621	Simo hirticornis (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
622	Simo variegatus (Boheman, 1843)		x	x	x	
623	Peritelus sphaeroides Germar, 1824	x				l. N. 1890 Erfurt
624	Centricnemus leucogrammus (Germar, 1824)	x		x	x	
625	Phyllobius arborator (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
626	Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
627	Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharffenberg, 1805)	x	x	x	x	
628	Phyllobius brevis Gyllenhal, 1834	L	L			RAPP (1934), KELLNER (1873)
629	Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
630	Phyllobius maculicornis Germar, 1824	x	x	x	x	
631	Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
632	Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834	x	x	x	x	
633	Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	32
634	Phyllobius roboretanus Gredler, 1882	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
635	Phyllobius vespertinus (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	32
636	Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781)	x	x	x	x	
637	Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
638	Pseudomylocerus sinuatus (Fabricius, 1801)	x	x	x	x	
639	Argoptochus quadrisignatus (Bach, 1856)	x	x	x	x	
640	Omius puberulus Boheman, 1834	x	x	x	x	
641	Omius seminulum (Fabricius, 1792)	x	x			l. N. 1920 Arnstadt
642	Omiomima mollina (Boheman, 1834)	x	x	x	x	
643	Rhinomias forticornis (Boheman, 1843)	x	x	x	x	
644	Trachyploeus alternans Gyllenhal, 1834	x	x	x	x	
645	Trachyploeus heymesii Hubenthal, 1934		x	x	x	
646	Trachyploeus parallelus Seidlitz, 1868	x	x	x	x	
647	Trachyploeus rectus Thomson, 1865	x			x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
648	Trachyploeus scabriculus (Linnaeus, 1771)	x	x	x	x	
649	Trachyploeus spinimanus Germar, 1824	x	x	x	x	
650	Romualdus angustisetulus (Hansen, 1915)		x	x	x	
651	Romualdus scaber (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
652	Archeophloeus inermis (Boheman, 1843)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
653	Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827)	x	x	x	x	
654	Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
655	Polydrusus aeratus Gravenhorst, 1807 (= <i>atomarius</i> (Olivier, 1807))	x	x	x	x	
656	Polydrusus amoenus (Germar, 1824)	x	x	x		l. N. 1997 Ilfeld
657	Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
658	Polydrusus confluens Stephens, 1831	x	x	x	x	
659	Polydrusus corruscus Germar, 1824	x	x	x		l. N. 1960 Maua
660	Polydrusus flavipes (Degeer, 1775)	x	x		x	33
661	Polydrusus formosus (Mayer, 1779) (= <i>sericeus</i> (Schaller, 1783))	x	x	x	x	
662	Polydrusus impar (Des Gozis, 1882)	x	x	x	x	
663	Polydrusus impressifrons Gyllenhal, 1834	x	x	x	x	
664	Polydrusus marginatus Stephens, 1831	x	x	x	x	
665	Polydrusus mollis (Strøem, 1768)	x	x	x	x	
666	Polydrusus picus (Fabricius, 1792)	x	x	x		l. N. 1964 Rothenstein
667	Polydrusus pilosus Gredler, 1866	x	x	x	x	
668	Polydrusus pterygomalis Boheman, 1840	x	x	x	x	
669	Polydrusus tereticollis (Degeer, 1775)	x	x	x	x	
670	Pachyrhinus lethierryi (Desbrochers, 1875)				x	34

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
671	Pachyrhinus squamulosus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
672	Liophloeus tessulatus (O. F. Müller, 1776)	x	x	x	x	
673	Sciaphobus scitulus (Germar, 1824)	x	x	x	x	
674	Eusomus ovulum Germar, 1824	x	x	x	x	
675	Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)	x	x	x	x	
676	Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)	x	x	x	x	
677	Brachysomus hirtus (Boheman, 1845)	x	x	x		I. N. 1951 Mühlberg
678	Brachysomus setiger (Gyllenahl, 1840)	x	x	x	x	
679	Foucارتيا ptochoides (Bach, 1856)	x	x	x	x	
680	Foucارتيا squamulata (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
681	Exomias araneiformis (Schrank, 1781)	x	x	x	x	
682	Exomias mollicomus (Ahrens, 1812)	x	x	x	x	
683	Exomias pellucidus (Boheman, 1843)	x	x	x	x	
684	Exomias trichopterus (Gautier, 1863)	x	x	x	x	
685	Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
686	Strophosoma capitatum (Degeer, 1775)	x	x	x	x	
687	Strophosoma faber (Herbst, 1784)	x	x	x	x	
688	Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771)	x	x	x	x	
689	Barynotus moerens (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
690	Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
691	Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834	x	x	x	x	
692	Sitona cylindricollis (Fåhræus 1840)	x	x	x	x	
693	Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)	x	x	x	x	
694	Sitona humeralis Stephens, 1831	x	x	x	x	
695	Sitona inops Schoenherr, 1832	x	x	x	x	
696	Sitona languidus Gyllenhal, 1834		x	x	x	
697	Sitona lateralis Gyllenhal, 1834			x	x	
698	Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
699	Sitona longulus Gyllenhal, 1834	x				I.N.1896 Gotha
700	Sitona macularius (Marshall, 1802)	x	x	x	x	
701	Sitona obsoletus (Gmelin, 1790)	x	x	x	x	
702	Sitona puncticollis Stephens, 1831	x	x	x	x	
703	Sitona striatellus Gyllenhal, 1834	x	x	x	x	
	Sitona sulcifrons argutulus Gyllenhal, 1834	?	x	x	x	35
704	Sitona sulcifrons sulcifrons (Thunberg, 1798)	?	x	x	x	35
705	Sitona suturalis Stephens, 1831	x	x	x	x	
706	Sitona waterhousei Walton, 1846	x	x	x	x	
707	Charagmus gressorius (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
708	Charagmus griseus (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
709	Charagmus intermedius Küster, 1847	x	x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
710	Coelositona cambricus Stephens, 1831	x	x	x	x	
711	Andrion regensteinense (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
712	Cycloderes pilosulus (Herbst, 1796)	x	x	x	x	
713	Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)	x	x	x	x	
714	Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
715	Tropiphorus elevatus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
716	Tropiphorus terricola (Newman, 1838)	x	x	x	x	
717	Graptus triguttatus (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
	Hyperinae					
718	Donus ovalis (Boheman, 1842)	x	x	x	x	
	<i>Donus oxalidis</i> (Herbst, 1795)					36 (/)
719	Donus palumbarius (Germar, 1821)				x	37
720	Donus tessellatus (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
721	Brachypera dauci (Olivier, 1807)	x	x			I. N. 1916 Erfurt
722	Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
723	Hypera arator (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
724	Hypera arundinis (Paykull, 1792)	x		L		I. N. 1955 Esperstedt
725	Hypera conmaculata (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
726	Hypera contaminata (Herbst, 1795)	x	x	x	x	
727	Hypera diversipunctata (Schränk, 1798)			x	x	
728	Hypera melancholica (Fabricius, 1793)	x	x	x		I. N. 1974 Kyffhäuser
729	Hypera meles (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
730	Hypera miles (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
731	Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
732	Hypera ononidis (Chevrolat, 1863)	x	x	x	x	
733	Hypera pandellei folwacznyi Dieckmann, 1975			x	x	38
734	Hypera plantaginis (Degeer, 1775)	x	x	x	x	
735	Hypera postica (Gyllenhal, 1813)	x	x	x	x	
736	Hypera rumicis (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
737	Hypera venusta (Fabricius, 1781)	x	x	x	x	
738	Hypera viciae (Gyllenhal, 1813)	x		x	x	
739	Limobius borealis (Paykull, 1792)	x	x	x	x	
	Lixinae					
740	Lixus albomarginatus Boheman, 1843	x	x	x	x	
741	Lixus bardanae (Fabricius, 1787)	x	x		x	39
742	Lixus filiformis (Fabricius, 1781)			x	x	
743	Lixus iridis Olivier, 1807		x			

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
744	<i>Lixus myagri</i> Olivier, 1807			x		l. N. 1954 Ohrdruf
745	<i>Lixus ochraceus</i> Boheman, 1843			x		l. N. 1995 Schillingstedt
746	<i>Lixus paraplecticus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		l. N. 1960 Plothen
747	<i>Lixus pulverulentus</i> (Scopoli 1763)	x	x	x	x	
748	<i>Lixus punctiventris</i> Boheman, 1836	x	x	x	x	
749	<i>Lixus rubicundus</i> Zoubkoff, 1833			x	x	
750	<i>Larinus iaceae</i> (Fabricius, 1775) (= <i>jaceae</i> (F., 1775))	x	x	x	x	
751	<i>Larinus planus</i> (Fabricius, 1792)	x	x	x	x	
752	<i>Larinus pollinis</i> (Laicharting, 1781) (= <i>brevis</i> (Herbst, 1795))	x	x	x	x	
753	<i>Larinus sturnus</i> (Schaller, 1783)	x	x	x	x	
754	<i>Larinus turbinatus</i> Gyllenhal, 1836	x	x	x	x	
755	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)	x	x	x	x	
756	<i>Coniocleonus cicatricosus</i> (Hoppe, 1795)	x	x			l. N. 1920 Sachsenburg
757	<i>Coniocleonus hollbergii</i> Fåhræus, 1842	x	x	x		l. N. 1997 Sondershausen
758	<i>Coniocleonus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	L		l. N. 1954 Kyffhäuser
759	<i>Asproparthenis punctiventris</i> (Germar, 1824)	x	x	x	x	
760	<i>Leucophyes pedestris</i> (Poda, 1761)	x	x	x	x	
761	<i>Bothynoderes affinis</i> (Schränk, 1781)	x	x	x		l. N. 1959 Kyffhäuser
762	<i>Mecaspis alternans</i> (Herbst, 1795)	L	L			RAPP (1934), DIECKMANN (1983)
763	<i>Pseudocleonus cinereus</i> (Schränk, 1781)	x	x	x	x	
764	<i>Pseudocleonus grammicus</i> (Panzer, 1789)	x	x	x	x	
765	<i>Cyphocleonus dealbatus</i> (Gmelin, 1790)	x	x	x	x	
766	<i>Cyphocleonus trisulcatus</i> (Herbst, 1795)	x	x		x	KOPETZ & WEIGEL (2006)
767	<i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	
	Mesoptiliinae					
768	<i>Magdalis armigera</i> (Geoffroy, 1785)	x	x	x	x	
769	<i>Magdalis barbicornis</i> (Latreille, 1804)	x	x	x	x	
770	<i>Magdalis carbonaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
771	<i>Magdalis caucasica</i> (Tournier, 1872)			x	x	
772	<i>Magdalis cerasi</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	x	

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
773	Magdalis duplicata Germar, 1819	x	x	x	x	
774	Magdalis exarata (Brisout, 1862)	x	x	x	x	
775	Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836)	x	x	x	x	
776	Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827)	x	x	x	x	
777	Magdalis fuscicornis Desbrochers, 1870			x	x	KOPETZ & WEIGEL (2008)
778	Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827)	x	x	x	x	
779	Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)	x	x	x	x	
780	Magdalis nitida (Gyllenhal, 1827)	x	x	x	x	
781	Magdalis nitidipennis (Boheman, 1843)	x	x	x	x	
782	Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797)	x	x	x	x	
783	Magdalis punctulata (Mulsant & Rey, 1859)		(x)			l. N. 1939 Pö- ritzsch / Saale (Beleg ?, det. Dieckmann)
784	Magdalis rufa Germar, 1824			x	x	
785	Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
786	Magdalis violacea (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
	Molytinae					
787	Pissodes castaneus (Degeer, 1775)	x	x	x	x	
788	Pissodes harcyniae (Herbst, 1795)	x	x	x		l. N. 1999 Paska
789	Pissodes piceae (Illiger, 1807)	x	x	x		l. N. 1950 Vesser
790	Pissodes pini (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
791	Pissodes piniphilus (Herbst, 1795)	x	x	x		l. N. 1994 Eschdorf
792	Pissodes scabricollis Miller, 1859	x	x	x		l. N. 1996 Titschendorf
793	Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834)	x	x	x	x	
794	Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
795	Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)	x	x		x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
796	Lepyrus capucinus (Schaller, 1783)	x	x	x	x	
797	Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
798	Hylobius excavatus (Laicharting, 1781)				x	KOPETZ & WEIGEL (2015)
799	Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)	x	x	x		l. N. 1998 Kyffhäuser
800	Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777)		x	x	x	
801	Liparus coronatus (Goeze, 1777)	x	x	x	x	
802	Liparus dirus (Herbst, 1795)	x	x	x		l. N. 1957 Tautenburg

lfd. Nr.	Familie / Unterfamilie Arten	vor 1900	bis 1949	bis 1999	ab 2000	Bemerkung
803	<i>Liparus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	
804	<i>Liparus glabirostris</i> Küster, 1849	x	x	x	x	
805	<i>Leiosoma cribrum</i> (Gyllenhal, 1834)	x	x	x	x	
806	<i>Leiosoma deflexum</i> (Panzer, 1795)	x	x	x	x	
807	<i>Plinthus findeli</i> Boheman, 1842			x	x	
808	<i>Plinthus sturmii</i> Germar, 1824	x	x	x	x	
809	<i>Plinthus tischeri</i> Germar, 1824	x	x			l. N. 1949 Pöritzsch / Saale
810	<i>Mitoplinthus caliginosus</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x	x	
811	<i>Adexius scrobipennis</i> Gyllenhal, 1834	x	x	x	x	
812	<i>Minyops costalis</i> Gyllenhal, 1834					40
813	<i>Minyops variolosus</i> (Fabricius, 1775)		x			41 (l. N. 1920 Jena)
	Orbitidinae					
814	<i>Orobitis cyanea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	

Abkürzungen

/	(korrigierte) Falschmeldung
DB	Datenbank
Ex.	Exemplar(e)
L	Literaturmeldung (KELLNER, 1873, RAPP 1934, 1953)
l. N.	letzter Nachweis mit Jahresangabe und Fundort
N	Neufund
NME	Naturkundemuseum Erfurt
SDEI	Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Münchenberg
TH	Thüringen
W	Wiederfund
x	mindestens ein belegter Nachweis aus dem Zeitraum ist vorhanden, der auch in der Datenbank Thüringer Käfer im Naturkundemuseum Erfurt (DB NME) gespeichert ist
(x)	Bestimmung/Nachweis unsicher (Beleg noch nicht geprüft oder nicht auffindbar)

Bemerkungen

- 1: W: Steinhaleben, Falkenburg und Ochsenburg (beide 4632/1), 03.06.2018 (8 Ex.), leg. A. Kopetz, gekeschert.
- 2: Ein Nachweis: Bad Frankenhausen, Lückenhügel (4632/2), 10.06.1998, leg. J. Weipert, in Bodenfälle.
- 3: W: Wernburg, Am Schloßgarten (5335/2), 11.07.2013, leg. A. Weigel, an Malve und Stockrose; weitere Nachweise aus Jena (2016, 2017) und Lehma (2017).
- 4: N: Jena, Leutratl (5135/1), Leutratlprojekt (<http://www.lanu.uni-jena.de/Projekte/LEUTRA.html>) der FSU Jena, 17.05.2016, in Bodenfalle (coll. E. Anton).
- 5: N: Nennsdorf, Südhang Gleißberg (5135/1), 26.09.2015, leg. D. Reum, Kescherfang an *Mercurialis*;
- 6: Erster gesicherter Nachweis: Schmerfeld (5231/1), 25.05.2017, leg. A. Kopetz, von Ginster geklopft.
- 7: N: Wechmar, Hammermühle (5130/2), 07.08./23.08.2017 (mehrere Ex.), leg. W. Apfel, geklopft.

- 8: W: Seehausen, Nordstraße (4632/4), 10.07.2016, leg. H. Grimm, in Eklektor.
- 9: Die Art ist für Thüringen zu streichen, bei dem in KOPETZ et al. (2008) gemeldeten Exemplar von *Pityogenes irkutensis* ssp. *monacensis* Fuchs, 1911 handelt es sich um ein Weibchen von *P. bistridentatus* (det. H. Gebhardt).
- 10: N: NP „Hainich“, Mülverstedter Holz (4828/4), 27.-29.03.2010, Biodiversitäts-Exploratorien (<https://www.biodiversity-exploratories.de/startseite>), in Pheromonfalle.
- 11: W: Erfurt, Marbach (5031/2), 21.04.2015, leg. et coll. F.-P. Roick, auf Kohlfeld.
- 12: Im NME befindet sich ein Exemplar ohne Datum (det. Dieckmann) mit der Angabe: „Thüringen, leg. E. Reitter“.
- 13: W: Ruhla, Storchwiese (5128/1), 03.05.2010, leg. W. Apfel, geklopft.
- 14: W: Seehausen, Nacken (4632/4), 03.06.2018, leg. A. Kopetz, gekeschert.
- 15: W: Siebleben (5030/3), 04.05.2012, leg. D. Mattern, an Avocado; weitere Nachweise aus Wandersleben (2013 und 2014) und Wechmar (2014 und 2016).
- 16: W: Steinhaleben, Kippenberg (4632/1), 17.06.2016, leg. D. Reum, von *Dianthus* geklopft.
- 17: W: Ranis, Heroldshof (5335/1), 08.05.2018, 12.6.2018 (2 Ex.), leg. Q. Schorpp; Wernburg, Im Loßnitz (5335/2), 14.06.2017, leg. P. Sprick, alle auf Kamillefeld gekeschert.
- 18: Die Art ist für Thüringen zu streichen, bei dem einzigen Beleg (det. Dieckmann) ohne Datum „Altenburg, leg. P. Heymes“ im NME ist der Fundort als unglaublich unwahrscheinlich einzustufen.
- 19: N: Großenlupnitz, Silbersee (4928/4), 27.07.2005, leg. W. Apfel, Kescherfang.
- 20: Einziger Nachweis in TH: Meuselwitz, Phönix Ost (4940/1), 12.06.1991, leg. U. Poller, in großer Anzahl an Laichkraut (det. W. Apfel).
- 21: Einziger Nachweis: Friemar, Stausee (5030/2), 18.06.1982, leg. R. Bellstedt (det. Dieckmann).
- 22: W: Esperstedt, Esperstedter Ried (4633/3), 26.05.2001, leg. J. Willers.
- 23: N: mehrere Nachweise 2016 und 2017, Schwabhausen, Tambach-Dietharz, Wechmar.
- 24: Bei der Meldung von LIEBMANN (1955) handelt es sich um eine Fehlbestimmung (DIECKMANN 1972).
- 25: Die Taxonomie der beiden Arten ist etwas verwirrend, bei BLEICH et al. (2018) wird *M. melanostigma* als *M. rugulosus* (Herbst, 1795) und *M. rugulosus* als *M. figuratus* Gyllenhal, 1837 (s. a. RHEINHEIMER & HASSLER 2010) bezeichnet, wir folgen hier FREUDE et al. (1981).
- 26: W: Ballstädt, Ballstädter Holz (4930/3), 11.04.2016, leg. D. Reum, von *Pulmonaria* geklopft.
- 27: Ein altes Exemplar im NME (*A. denticollis* Germar, 1824 det. Dieckmann) hat F. Strübing um 1870 in Erfurt gesammelt, nach BÄHR (2003) gehören die mitteleuropäischen Exemplare zu *A. colonnellii* was durch Behne bestätigt werden konnte, nach STÜBEN (2018) kommen in Deutschland allerdings keine Vertreter der Gattung *Acallocrates* vor.
- 28: N: Unterbreizbach (5125/4), 12.2013, leg. M. Hofmann, Totfund im Garten; Erfurt, Marbach (5031/2), 12.04./06.06.2015, leg. J. Müller, im Garten.
- 29: N: Erfurt, Marbach (5031/2), 20.05.2007, 16.05.2008; Wallichen, Kirchberg (4932/4), 05.05.2008, alle leg. Sparmberg, det. P. Bialooki.
- 30: Nach COLONNELLI (2003) ist die polymorphe Art *O. pupillatus* Gyllenhal, 1834 ein valides Taxon, dem auch Behne (in litt.) folgt, das gesamte Material aus TH sollte diesbezüglich überprüft werden, in der Checklist folgen wir vorerst GERMANN (2013), nachdem die beiden Arten *O. subdentatus* und *O. pupillatus* in Mitteleuropa nicht zu trennen sind.
- 31: Bei BLEICH et al. (2018) wird *Otiorynchus lugdunensis* Boheman, 1842 als eigenständige Art betrachtet (s.a. ALONSO-ZARAZAGA et al. 2017), bei den Thüringer Nachweisen erfolgte bisher keine Abtrennung, in Thüringen kommt *tenebricosus* f. *fuscipes* Olivier, 1807 vor.
- 32: Nach LÖBL & SMETANA (2013) sind *P. vespertinus* und *P. pyri* konspezifisch, dem folgen wir vorerst nicht, wie auch in BLEICH et al. (2018).
- 33: W: Jena-Winzerla (5135/1), 06.2002 (2 Ex.), leg. E. Anton, Handfang.
- 34: N: Ölknitz/Rothenstein (5135/4), 21.05.2011, leg. D. Krebs, im Garten; weitere Nachweise aus Erfurt (2015-18), Seehausen (2016), Treben (2017) und Eisenach (2017).

- 35: In TH kommen beide Unterarten vor (DB BEHNE), das Sammlungsmaterial (u.a. < 1900) wurde noch nicht vollständig auf dessen Zugehörigkeit geprüft.
- 36: Die Meldung von *D. oxalidis* (Herbst, 1795) bei LIEBMANN (1955) gehört zu *D. ovalis* (DB Behne).
- 37: N: Oberweid, Wiesen N Thüringer Rhönhaus (5426/1), 27.06.2018, leg. W. Apfel, geklopft.
- 38: W: Oberweid, Rhönwald (5426/1), 05.07.2009, leg. W. Apfel, im Bodenstreu-Gesiebe, weitere Nachweise an gleicher Lokalität vom 27.06.-16.07.2018.
- 39: W: Seibis/Lobenstein, Thüringer Muschwitz (5635/2), 18.08.2005, leg. F. Fritzlar, weitere Nachweise von Roßdorf, Beckengrund (5327/1), 01.09.2016, leg. D. Reum und Kieselbach, Eichkopf (5126/4), 05.07.2018 (2 Ex.), leg. W. Apfel.
- 40: 2 Ex. (♂, ♀) aus Arnstadt (SDEI), ohne weitere Angaben, sind in OSELLA & BELLÒ (2010) erwähnt.
- 41: Das einzige Ex. aus TH (Jena, 1920, leg. Janssen, NME) war durch Dieckmann als *M. carinatus* (L., 1767) bestimmt, eine erneute Überprüfung nach OSELLA & BELLÒ (2010) durch Behne ergab *M. variolosus*.

Hinweise: wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei den faunistischen Daten jeweils um den Nachweis eines Exemplars und die Angabe in Klammern hinter dem Fundort ist der Meßtischblatt-Quadrant

Danksagung

Die Autoren bedanken sich bei allen fleißigen Sammlern, die ihre Rüsselkäferdaten zur Digitalisierung in der Datenbank des Naturkundemuseums Erfurt zur Verfügung gestellt haben, die hier nicht alle im Einzelnen aufgeführt werden können. Ein besonderer Dank gilt den beiden Rüsselkäferspezialisten Lutz Behne (SDEI) und Dr. Peter Sprick (Hannover) für kritische Hinweise zur Liste und für die Überprüfung von Arten. Ersterem auch für die Einsicht in seine Datenbank zu Rüsselkäferarten von Thüringen. Weiterhin gilt unser Dank den Herren Dr. Heiko Gebhardt (Tübingen), Klaus Liebenow (Brandenburg) und Andreas Link (Haid/Österreich) für die Bestimmung und Überprüfung zahlreicher Borken- und Rüsselkäfer aus Thüringen.

Literatur

- ALONSO-ZARAZAGA, M. A. et al. (2017): Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. - Monografías electrónicas S.E.A. **8**: 729 S.
- APFEL, W.; A. WEIGEL & A. KOPETZ (2013): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2006 bis 2012 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XVIII**: 105-124.
- BAHR, F. (2003) : Revision des Genus *Acallocrates* Reitter, 1913. - Snudebiller **4**: 14 S.
- BEHNE, L. (1994): Checklist der Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionoidea) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten **2**: 28-45.
- (2001): Rote Liste der Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionoidea) Thüringens. - Naturschutzreport **18**: 179-191.
- BLEICH, O.; S. GÜRLICH & F. KÖHLER (2018): Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands. - World Wide Web electronic publication www.coleokat.de [25.11.2018].
- COLONNELLI, E. (2003): A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). - Zootaxa **337**: 142 S.
- DIECKMANN, L. (1972): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera (Curculionidae: Ceutorhynchinae). - Beiträge zur Entomologie **22** (1/2): 3-128.

- (1974): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Rhinomacerinae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae). - Beiträge zur Entomologie **24** (1/4): 5-54.
 - (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Apioninae). - Beiträge zur Entomologie **27**: 7-143.
 - (1980): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Brachycerinae, Otorhynchinae, Brachyderinae). - Beiträge zur Entomologie **30**: 145-310.
 - (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). - Beiträge zur Entomologie **33** (2): 257-381.
 - (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Eirrhinae). - Beiträge zur Entomologie **36** (1): 119-181.
 - (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Curculioninae, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). - Beiträge zur Entomologie **38** (2): 365-468.
- FREUDE, H.; K. W. HARDE & G. A. LOHSE (1981): Die Käfer Mitteleuropas. Band 11. - Goecke & Evers. Krefeld, 342 S.
- GERMANN, C. (2013): Erster Nachtrag zur Checkliste der Rüsselkäfer der Schweiz (Coleoptera, Curculionoidea). - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft **86** (3/4): 151-164.
- KELLNER, A. (1873): Verzeichnis der Käfer Thüringens, mit Angabe der nützlichen und der für die Forst-, Land- und Gartenwirtschaft schädlichen Arten. - Gotha: 186 S.
- KÖHLER, F. (2000): 1. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (1): 60-84.
- (2011a): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Teil 1. - Entomologische Nachrichten und Berichte **55** (2-3): 109-174.
 - (2011b): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Teil 2. - Entomologische Nachrichten und Berichte **55** (4): 247-254.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (HRSG.) (1998): Entomofauna Germanica - Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 185 S.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2000): Neue Käferarten (Col.) für die Fauna Thüringens. - Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (4): 241-251.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2006): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2004 bis 2006 mit Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XI**: 97-122.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2015): Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Thüringen IV. - Entomologische Nachrichten und Berichte **59** (2): 97-106.
- KOPETZ, A.; A. WEIGEL & W. APFEL (2004): Neufunde von Käferarten (Col.) für die Fauna von Thüringen II. - Entomologische Nachrichten und Berichte **48** (3-4): 231-240.
- KOPETZ, A.; A. WEIGEL & W. APFEL (2008): Neufunde von Käferarten (Col.) für die Fauna von Thüringen III. - Entomologische Nachrichten und Berichte **52** (2): 99-104.
- LIEBENOW, K. (1998): Checkliste der Borkenkäfer Thüringens (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). - Check-Listen Thüringer Insekten **6**: 37-40.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt: 165 S.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (ed.) (2011): Catalogue of the Palaearctic Coleoptera. Volume 7: Curculionoidea I. Apollo Books. Stenstrup: 373 S.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (ed.) (2013): Catalogue of the Palaearctic Coleoptera. Volume 8: Curculionoidea II. - Brill. Leiden-Boston: 700 S.
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalles. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle, Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe **7** (7): 513-566.
- (1966): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalles. II. Nachträge und Berichtigungen. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle, Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe **15** (5): 925-931.

- OSELLA, G. & C. BELLÒ (2010): Revisione de *Minyops* Schoenherr, 1823e *Paraminyops* gen. nov. (Coleoptera, Curculioindae, Molytinae). - Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. **2** (19): 3-133.
- RAPP, O. (1933-1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. **Bd. I - III**. - Erfurt, Selbstverlag, 766, 790, 332 S.
- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. 1. Nachtrag (unveröff. Manuskript). – Erfurt, 176 S.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. - verlag regionalkultur. Heidelberg-Ubstadt-Neustadt-Basel: 944 S.
- STÜBEN, P. E. (2018): The Cryptorhynchinae of the Western Palearctic (Coleoptera: Curculionidae). - Curculio Institute. Mönchengladbach: 518 S.
- WEIGEL, A. (1996): Checklist der Breitrüßler (Coleoptera: Anthribidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten **4**: 54-55.
- (2008): Invasive Borkenkäferarten in Thüringen (Coleoptera: Scolytidae). - Thüringer Faunistische Abhandlungen **XIII**: 97-107.
- (2016): Bericht zur Gemeinschaftsekursion des Thüringer Entomologenverbandes (TEV) vom 03.-05.06.2016 in das „Plöthener Teichgebiet“ in Ostthüringen. - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes **23** (2): 73-115.

Anschriften der Autoren

Wolfgang Apfel
Hellwigstr. 6
D-99817 Eisenach

W.Apfel@t-online.de

Andreas Kopetz
Im Semmichbach 14
OT Eischleben
D-99334 Amt Wachsenburg
andreas.kopetz@t-online.de

Andreas Weigel
Am Schloßgarten 6
D-07381 Wernburg

rosalia-aw@online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang, Kopetz Andreas, Weigel Andreas

Artikel/Article: [Checkliste der Rüsselkäfer \(Curculionoidea\) Thüringens 9-40](#)