

Checklist der Weichkäfer (Coleoptera, Cantharoidea) Thüringens

Stand: 01.09.1994

ANDREAS KOPETZ, Erfurt

Die vorliegende Liste der Weichkäferarten i.w.S. Thüringens umfaßt die Familien Lycidae (Rotdeckenkäfer), Omalisidae, Lampyridae (Leuchtkäfer), Cantharidae (Weichkäfer) und Drilidae (Schneckenhauskäfer). Die Systematik basiert auf dem Werk von FREUDE et al. (1979) sowie dessen Nachtragsband.

Viele Weichkäfer i.w.S. zählen zu den auffälligen Käfern. Trotz dieser Tatsache weist ihre faunistische Bearbeitung noch einige Lücken auf. Gründe dafür sind zum Beispiel die zum Teil schwierige Determination einzelner Gruppen. Außerdem ist der Nachweis einiger Arten durch ihre Seltenheit bzw. die relativ kurze Aktivitätsphase der Imagines erschwert.

Als Ausgangsbasis für die Erforschung der thüringischen Fauna sind die Werke von RAPP (1934), LIEBMANN (1955) und HORION (1953) brauchbar. Allerdings sind ältere Angaben oft nur bedingt verwertbar, da mehrere Arten verkannt wurden und Unklarheiten über die tatsächliche Verbreitung entstanden.

Alle älteren Angaben, die bisher nicht vom Autor überprüft werden konnten (entweder keine Belege oder nur unsicher zu determinierende Weibchen), wurden deshalb mit "?" gekennzeichnet. Abgesehen von *Malthodes trifurcatus* (Fehlbestimmung ?) und *Cantharis tristis* (Fundortverwechslung ?) kann bei diesen Arten vom Vorkommen in Thüringen ausgegangen werden.

Da die Erforschung der thüringischen Weichkäfer i.w.S. erst seit kurzer Zeit verstärkt betrieben wird, ist damit zu rechnen, daß einige bisher nur in früheren Zeiten nachgewiesene Arten auch heute noch bei entsprechender Suche zu finden sind.

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	Lycidae		
1	<i>Dictyoptera aurora</i> (HERBST, 1784)	x	x
2	<i>Pyropterus nigroruber</i> (DEGEER, 1774) (= <i>affinis</i> PAYK.)	x	x
3	<i>Platycis minutus</i> (F., 1787)	x	x
4	<i>Platycis cosnardi</i> (CHEVROLAT, 1829)	x	x
5	<i>Lygisterus sanguineus</i> (L., 1758)	x	x
	Omalisidae		
6	<i>Omalisus fontisbellaquaei</i> FOURCROY, 1785 (= <i>Homalisus fontisbellaquaei</i> GEOFF.)	x	x
	Lampyridae		
7	<i>Lampyris noctiluca</i> (L., 1758)	x	x
8	<i>Lamprohiza splendidula</i> (L., 1767) (= <i>Phausis</i> , <i>Lamprorhiza</i>)	x	x
9	<i>Phosphaenus hemipterus</i> (GOEZE, 1777)	x	x

	Cantharidae		
10	<i>Podabrus alpinus</i> (PAYKULL, 1798)	x	x
11	<i>Ancistronycha abdominalis</i> (F., 1798) (= <i>Cantharis</i> ab.)	x	x
12	<i>Ancistronycha cyanipennis</i> (FALDERMANN, 1835) (= <i>Cantharis violacea</i> PAYK.)	x	x
13	<i>Ancistronycha erichsoni</i> (BACH, 1852) (= <i>Cantharis</i> er.)	x	x
14	<i>Cantharis fusca</i> L., 1758	x	x
15	<i>Cantharis annularis</i> MÈNÉTRIES, 1836	x ?	
16	<i>Cantharis rustica</i> FALLÉN, 1807	x	x
17	<i>Cantharis pellucida</i> F., 1792	x	x
18	<i>Cantharis fulvicollis</i> F., 1792	x	x
19	<i>Cantharis thoracica</i> (OLIVIER, 1790) (= <i>bicolor</i> HBST.)	x	x
20	<i>Cantharis paludosa</i> FALLÉN, 1807	x	x
21	<i>Cantharis tristis</i> F., 1798	x*	
22	<i>Cantharis pulicaria</i> F., 1781	x ?	
23	<i>Cantharis obscura</i> L., 1758	x	x
24	<i>Cantharis paradoxa</i> HICKER, 1960		x
25	<i>Cantharis lateralis</i> L., 1758	x	x
26	<i>Cantharis nigricans</i> (MÜLLER, 1776)	x	x
27	<i>Cantharis pagana</i> ROSENHAUER, 1847 (= <i>fibulata</i> MÄRK., <i>albomarginata</i> MÄRK)	x	x
28	<i>Cantharis sudetica</i> LETZNER, 1847	x	x
29	<i>Cantharis quadripunctata</i> (MÜLLER, 1776) (= <i>assimilis</i> PAYK.)	x	x
30	<i>Cantharis decipiens</i> BAUDI, 1871	x	x
31	<i>Cantharis livida</i> L., 1758	x	x
32	<i>Cantharis rufa</i> L., 1758	x	x
33	<i>Cantharis cryptica</i> ASHE, 1947	x	x
34	<i>Cantharis pallida</i> GOEZE, 1777	x	x
35	<i>Cantharis figurata</i> MANNERHEIM, 1843	x	x
36	<i>Metacantharis discoidea</i> (AHRENS, 1812) (= <i>Cantharis</i> d.)	x	x
37	<i>Metacantharis clypeata</i> (ILLIGER, 1798) (= <i>Cantharis haemorrhoidalis</i> F.)	x	x
38	<i>Absidia rufotestacea</i> (LETZNER, 1845) (= <i>Podistra</i> r.)	x	x
39	<i>Absidia schoenherri</i> (DEJEAN, 1837) (= <i>Podistra pilosa</i> PAYK.)	x	x
40	<i>Rhagonycha lutea</i> (MÜLLER, 1764)	x	x
41	<i>Rhagonycha fulva</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x
42	<i>Rhagonycha translucida</i> (KRYNICKI, 1832)	x	x
43	<i>Rhagonycha testacea</i> (L., 1758)	x	x
44	<i>Rhagonycha limbata</i> THOMSON, 1864	x	x
45	<i>Rhagonycha lignosa</i> (MÜLLER, 1764)	x	x
46	<i>Rhagonycha elongata</i> (FALLÉN, 1807)	x	
47	<i>Rhagonycha atra</i> (L., 1767)	x	x
48	<i>Rhagonycha gallica</i> PIC, 1923 (= <i>redtenbacheri</i> KASZAB)	x	x
49	<i>Cratosilis denticollis</i> (SCHUMMEL, 1844)	x	x

50	<i>Silis nitidula</i> (F., 1792)	x ?	
51	<i>Silis ruficollis</i> (F., 1775)	x	x
52	<i>Malthinus punctatus</i> (FOURCROY, 1785) (= <i>flaveolus</i> HBST.)	x	x
53	<i>Malthinus seriepunctatus</i> KIESENWETTER, 1851	x	x
54	<i>Malthinus fasciatus</i> (OLIVIER, 1790)	x	x
55	<i>Malthinus balteatus</i> SUFFRIAN, 1851	x	x
56	<i>Malthinus fascialis</i> THOMSON, 1864	x	x
57	<i>Malthinus glabellus</i> KIESENWETTER, 1852	x	x
58	<i>Malthinus biguttatus</i> (L., 1758) (= <i>biguttulus</i> PAYK.)	x	x
59	<i>Malthinus frontalis</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
60	<i>Malthodes debilis</i> KIESENWETTER, 1852	x ?	
61	<i>Malthodes flavoguttatus</i> KIESENWETTER, 1852	x	
62	<i>Malthodes dispar</i> (GERMAR, 1824)	x	x
63	<i>Malthodes fibulatus</i> KIESENWETTER, 1852	x	
64	<i>Malthodes maurus</i> (CASTELNAU, 1840)	x	x
65	<i>Malthodes misellus</i> KIESENWETTER, 1852	x ?	
66	<i>Malthodes fuscus</i> (WALTL, 1838)	x	x
67	<i>Malthodes minimus</i> (L., 1758)	x	x
68	<i>Malthodes guttifer</i> KIESENWETTER, 1852	x	x
69	<i>Malthodes marginatus</i> (LATREILLE, 1806)	x	x
70	<i>Malthodes mysticus</i> KIESENWETTER, 1852	x	x
71	<i>Malthodes trifurcatus</i> KIESENWETTER, 1852	x ?	
72	<i>Malthodes hexacanthus</i> KIESENWETTER, 1852	x	x
73	<i>Malthodes pumilus</i> (BRÉBISSON, 1835) (= <i>atomus</i> THOMS.)	x	x
74	<i>Malthodes spathifer</i> KIESENWETTER, 1852	x	x
75	<i>Malthodes crassicornis</i> (MAERKLIN, 1846)	x ?	
76	<i>Malthodes dimidiaticollis</i> (ROSENHAUER, 1847)	x ?	
77	<i>Malthodes brevicollis</i> (PAYKULL, 1798)	x	x
78	<i>Malthodes lobatus</i> KIESENWETTER, 1852	x	
	Drilidae		
79	<i>Drilus flavescens</i> OLIVIER, 1790	x	
80	<i>Drilus concolor</i> AHRENS, 1812	x	x

? Belege noch nicht gesehen, * Fundortverwechslung wahrscheinlich

Literatur:

- FREUDE, H.; HARDE, K.W.; LOHSE, G.A.(1979): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 6 Diversicornia. - Krefeld:
 HORION, A.(1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. III: Malacodermata. - München
 LIEBMANN, W.(1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.
 RAPP, O.(1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen
 Geographie. - Band II. - Erfurt: Selbstverlag.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Lehrer Andreas Kopetz, Julius-Leber-Ring 72,
 D - 99087 Erfurt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kopetz Andreas

Artikel/Article: [Checklist der Weichkäfer \(Coleoptera, Cantharoidea\) Thüringens 7-9](#)