

# Checklist der Weichkäfer (Coleoptera, Cantharoidea) Thüringens

Stand: 01.09.1994

ANDREAS KOPETZ, Erfurt

Die vorliegende Liste der Weichkäferarten i.w.S. Thüringens umfaßt die Familien Lycidae (Rotdeckenkäfer), Omalisidae, Lampyridae (Leuchtkäfer), Cantharidae (Weichkäfer) und Drilidae (Schneckenhauskäfer). Die Systematik basiert auf dem Werk von FREUDE et al.(1979) sowie dessen Nachtragsband.

Viele Weichkäfer i.w.S. zählen zu den auffälligen Käfern. Trotz dieser Tatsache weist ihre faunistische Bearbeitung noch einige Lücken auf. Gründe dafür sind zum Beispiel die zum Teil schwierige Determination einzelner Gruppen. Außerdem ist der Nachweis einiger Arten durch ihre Seltenheit bzw. die relativ kurze Aktivitätsphase der Imagines erschwert. Als Ausgangsbasis für die Erforschung der thüringischen Fauna sind die Werke von RAPP (1934), LIEBMANN (1955) und HORION (1953) brauchbar. Allerdings sind ältere Angaben oft nur bedingt verwertbar, da mehrere Arten verkannt wurden und Unklarheiten über die tatsächliche Verbreitung entstanden.

Alle älteren Angaben, die bisher nicht vom Autor überprüft werden konnten (entweder keine Belege oder nur unsicher zu determinierende Weibchen), wurden deshalb mit "?" gekennzeichnet. Abgesehen von *Malthodes trifurcatus* (Fehlbestimmung ?) und *Cantharis tristis* (Fundortverwechslung ?) kann bei diesen Arten vom Vorkommen in Thüringen ausgegangen werden.

Da die Erforschung der thüringischen Weichkäfer i.w.S. erst seit kurzer Zeit verstärkt betrieben wird, ist damit zu rechnen, daß einige bisher nur in früheren Zeiten nachgewiesene Arten auch heute noch bei entsprechender Suche zu finden sind.

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	<b>Lycidae</b>		
1	<i>Dictyoptera aurora</i> (HERBST, 1784)	x	x
2	<i>Pyropterus nigroruber</i> (DEGEER, 1774) (= affinis PAYK.)	x	x
3	<i>Platycis minutus</i> (F., 1787)	x	x
4	<i>Platycis cosnardi</i> (CHEVROLAT, 1829)	x	x
5	<i>Lygistopterus sanguineus</i> (L., 1758)	x	x
	<b>Omalisidae</b>		
6	<i>Omalisus fontisbellaquaei</i> FOURCROY, 1785 (= <i>Homalisus fontisbellaquei</i> GEOFF.)	x	x
	<b>Lampyridae</b>		
7	<i>Lampyris noctiluca</i> (L., 1758)	x	x
8	<i>Lamprohiza splendidula</i> (L., 1767) (= <i>Phausis</i> , <i>Lamprorrhiza</i> )	x	x
9	<i>Phosphaenus hemipterus</i> (GOEZE, 1777)	x	x

	<b>Cantharidae</b>		
10	<i>Podabrus alpinus</i> (PAYKULL, 1798)	x	x
11	<i>Ancistronycha abdominalis</i> (F., 1798) (= <i>Cantharis ab.</i> )	x	x
12	<i>Ancistronycha cyanipennis</i> (FALDERMANN, 1835) (= <i>Cantharis violacea</i> PAYK.)	x	x
13	<i>Ancistronycha erichsoni</i> (BACH, 1852) (= <i>Cantharis er.</i> )	x	x
14	<i>Cantharis fusca</i> L., 1758	x	x
15	<i>Cantharis annularis</i> MÉNÉTRIES, 1836	x ?	
16	<i>Cantharis rustica</i> FALLEÑ, 1807	x	x
17	<i>Cantharis pellucida</i> F., 1792	x	x
18	<i>Cantharis fulvicollis</i> F., 1792	x	x
19	<i>Cantharis thoracica</i> (OLIVIER, 1790) (= <i>bicolor</i> HBST.)	x	x
20	<i>Cantharis paludosa</i> FALLEÑ, 1807	x	x
21	<i>Cantharis tristis</i> F., 1798	x*	
22	<i>Cantharis pulicaria</i> F., 1781	x ?	
23	<i>Cantharis obscura</i> L., 1758	x	x
24	<i>Cantharis paradoxa</i> HICKER, 1960		x
25	<i>Cantharis lateralis</i> L., 1758	x	x
26	<i>Cantharis nigricans</i> (MÜLLER, 1776)	x	x
27	<i>Cantharis pagana</i> ROSENHAUER, 1847 (= <i>fibulata</i> MÄRK., <i>albomarginata</i> MÄRK)	x	x
28	<i>Cantharis sudetica</i> LETZNER, 1847	x	x
29	<i>Cantharis quadripunctata</i> (MÜLLER, 1776) (= <i>assimilis</i> PAYK.)	x	x
30	<i>Cantharis decipiens</i> BAUDI, 1871	x	x
31	<i>Cantharis livida</i> L., 1758	x	x
32	<i>Cantharis rufa</i> L., 1758	x	x
33	<i>Cantharis cryptica</i> ASHE, 1947	x	x
34	<i>Cantharis pallida</i> GOEZE, 1777	x	x
35	<i>Cantharis figurata</i> MANNERHEIM, 1843	x	x
36	<i>Metacantharis discoidea</i> (AHRENS, 1812) (= <i>Cantharis d.</i> )	x	x
37	<i>Metacantharis clypeata</i> (ILLIGER, 1798) (= <i>Cantharis haemorrhoidalis</i> F.)	x	x
38	<i>Absidia rufotestacea</i> (LETZNER, 1845) (= <i>Podistra r.</i> )	x	x
39	<i>Absidia schoenherri</i> (DEJEAN, 1837) (= <i>Podistra pilosa</i> PAYK.)	x	x
40	<i>Rhagonycha lutea</i> (MÜLLER, 1764)	x	x
41	<i>Rhagonycha fulva</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x
42	<i>Rhagonycha translucida</i> (KRYNICKI, 1832)	x	x
43	<i>Rhagonycha testacea</i> (L., 1758)	x	x
44	<i>Rhagonycha limbata</i> THOMSON, 1864	x	x
45	<i>Rhagonycha lignosa</i> (MÜLLER, 1764)	x	x
46	<i>Rhagonycha elongata</i> (FALLEÑ, 1807)	x	
47	<i>Rhagonycha atra</i> (L., 1767)	x	x
48	<i>Rhagonycha gallica</i> PIC, 1923 (= <i>redtenbacheri</i> KASZAB)	x	x
49	<i>Cratosilis denticollis</i> (SCHUMMEL, 1844)	x	x

50	Silis nitidula (F., 1792)	x ?	
51	Silis ruficollis (F., 1775)	x	x
52	Malthinus punctatus (FOURCROY, 1785) (= flaveolus HBST.)	x	x
53	Malthinus seriepunctatus KIESENWETTER, 1851	x	x
54	Malthinus fasciatus (OLIVIER, 1790)	x	x
55	Malthinus balteatus SUFFRIAN, 1851	x	x
56	Malthinus fascialis THOMSON, 1864	x	x
57	Malthinus glabellus KIESENWETTER, 1852	x	x
58	Malthinus biguttatus (L., 1758) (= biguttulus PAYK.)	x	x
59	Malthinus frontalis (MARSHAM, 1802)	x	x
60	Malthodes debilis KIESENWETTER, 1852	x ?	
61	Malthodes flavoguttatus KIESENWETTER, 1852	x	
62	Malthodes dispar (GERMAR, 1824)	x	x
63	Malthodes fibulatus KIESENWETTER, 1852	x	
64	Malthodes maurus (CASTELNAU, 1840)	x	x
65	Malthodes misellus KIESENWETTER, 1852	x ?	
66	Malthodes fuscus (WALTL, 1838)	x	x
67	Malthodes minimus (L., 1758)	x	x
68	Malthodes guttifer KIESENWETTER, 1852	x	x
69	Malthodes marginatus (LATREILLE, 1806)	x	x
70	Malthodes mysticus KIESENWETTER, 1852	x	x
71	Malthodes trifurcatus KIESENWETTER, 1852	x ?	
72	Malthodes hexacanthus KIESENWETTER, 1852	x	x
73	Malthodes pumilus (BRÉBISON, 1835) (= atomus THOMS.)	x	x
74	Malthodes spathifer KIESENWETTER, 1852	x	x
75	Malthodes crassicornis (MAERKLIN, 1846)	x ?	
76	Malthodes dimidiaticollis (ROSENHAUER, 1847)	x ?	
77	Malthodes brevicollis (PAYKULL, 1798)	x	x
78	Malthodes lobatus KIESENWETTER, 1852	x	
	<b>Drilidae</b>		
79	Drilus flavesiensis OLIVIER, 1790	x	
80	Drilus concolor AHRENS, 1812	x	x

? Belege noch nicht gesehen, \* Fundortverwechslung wahrscheinlich

#### Literatur:

- FREUDE, H.; HARDE, K.W.; LOHSE, G.A.(1979): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 6 Diversicornia. - Krefeld:  
 HORION, A.(1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. III: Malacodermata. - München  
 LIEBMANN, W.(1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.  
 RAPP, O.(1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen  
 Geographie. - Band II. - Erfurt: Selbstverlag.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Lehrer Andreas Kopetz, Julius-Leber-Ring 72,  
 D - 99087 Erfurt

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kopetz Andreas

Artikel/Article: [Checklist der Weichkäfer \(Coleoptera, Cantharoidea\)  
Thüringens 7-9](#)