

Checklist der Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) Thüringens

Stand 01.06.1994

FRANK FRITZLAR & JÖRG PERNER, Jena

Die vorliegende Liste basiert auf einer kritischen Durchsicht der Literatur, unseren eigenen Aufsammlungen, der Durchsicht der uns in der letzten Zeit zur Bestimmung übergebenen Belege Thüringer Blattkäfer sowie einer Umfrage an die Naturkundlichen Museen Thüringens und die unten genannten Entomologen. Eine Revision der vorhandenen Museumssammlungen erfolgte nur in Einzelfällen, hinsichtlich der in ihrem Status völlig unklaren Arten.

In der vorliegenden Liste sind ausschließlich Arten aufgeführt, deren Vorkommen in Thüringen sicher belegt oder von ausgewiesenen Kennern der Gruppe publiziert ist.

Die folgenden Arten sind in der Literatur angeführt oder in unpublizierten Aufzeichnungen enthalten, es lagen uns jedoch bisher keine Belege vor, so daß Ihr Vorkommen vorerst nicht gesichert und aus Sicht der bekannten Verbreitung der Arten auch nicht wahrscheinlich ist: *Sclerophaedon carniolicus* (u. a. von HORION (1951) für Thüringen aufgeführt), *Chrysolina rossia* und *Chaetocnema obesa* (UHLMANN 1940).

Für die Mitteilung von Funddaten, die Überlassung von Bestimmungsmaterial oder die Durchsicht des Entwurfs der Liste danken wir:

R. Beenen (Nieuwegein), R. Bellstedt (Gotha), F. Burger (Casel), R. Conrad (Gera), F. Creutzburg (Gera), M. Döberl (Abensberg), J.A. Fischer (Meiningen), K. Graser (Magdeburg), M. Hartmann (Erfurt), U. Heinig (Berlin), H. Kippenberg (Herzogenaurach), A. Kopetz (Erfurt), D. Krebs (Jena), R. Miksch (Greiz), E. Naumann (Altenburg), H. Platt (Mühlhausen), G. Rößler (Wunsiedel), A. Skale (Hof), H. Sparmberg (Erfurt), F. W. Sander (Jena), A. Schwarz (Berlin), W. Steinhausen (München) und A. Weigel (Pößneck).

Nomenklatur und Taxonomie richten sich nach KIPPENBERG & DÖBERL (1994). Die gegenüber dem Standard-Bestimmungswerk von MOHR(1966) notwendig gewordenen Änderungen der Artnamen sind in der Checkliste vermerkt.

Die Änderungen der Gattungsbezeichnungen sind in Tab. 1 zusammengefaßt.

Tab.1: Blattkäfer-Gattungsnamen, bei denen sich gegenüber dem Standard-Bestimmungswerk von MOHR(1966) Änderungen ergeben haben und aktuell gültige, in der Checkliste verwendete Namen nach KIPPENBERG und DÖBERL (1994).

MOHR (1966)	KIPPENBERG & DÖBERL (1994)
Lema F.	Lema F. Oulema Gozis
Gynandrophthalma Lacordaire	Smaragdina Chevrolat
Chilotoma Redtenbacher	Cheilotoma Redtenbacher
Pachybrachys Suffrian	Pachybrachis Chevrolat
Lamprosoma auct. nec Kirby	Omorphus Curtis

Adoxus Kirby	Bromius Chevrolat
Crysochus Chevrolat	Eumolpus Illiger
Chrysomela auct. nec L. Dlochrysa Motschulsky	Chrysolina Motschulsky
Chrysochloa Hope	Oreina Chevrolat
Colaphellus Weise	Colaphus Dahl
Gastroidea Hope	Gastrophysa Chevrolat
Melasoma Stephens	Chrysomela L. Linaeidea Motschulsky
Phytodecta Kirby	Gonioctena Chevrolat
Phyllodecta Kirby	Phratora Chevrolat
Galerucella Crotch	Galerucella Crotch Xanthogaleruca Lab.
Luperus Geoffroy	Luperus Geoffroy Calomicrus Dillwyn
Haltica auct.	Altica Müller
Crepidodera auct. nec Chevrolat	Asiorestia Jacobson
Chalcoides Foudr.	Crepidodera Chevrolat
Epithrix auct.	Epitrix Foudr.
Hispella Chap.	Hispa L.

Tab.: 2 Liste der Chrysomelidae Thüringens, Bezugszeitraum RAPP (1934)

Nr.	Art	RAPP	Neu
	Unterfamilie Donaciinae		
1	Donacia clavipes FABRICIUS, 1793	+	+
2	Donacia crassipes FABRICIUS, 1775	+	+
3	Donacia dentata HOPPE, 1795	+	+
4	Donacia versicolore (BRAHM, 1790)	+	+
5	Donacia semicuprea PANZER, 1796	+	+
6	Donacia sparganii AHRENS, 1810	+	
7	Donacia aquatica (LINNAEUS, 1758)	+	+
8	Donacia impressa PAYKULL, 1799	+	+
9	Donacia brevicornis AHRENS, 1810	+	+
10	Donacia marginata HOPPE, 1795	+	+
11	Donacia bicolora ZSCHACH, 1788	+	+
12	Donacia obscura GYLLENHAL, 1813	+	
13	Donacia brevitarsis THOMSON, 1884 (= antiqua KUNZE auct.)	+	
14	Donacia thalassina GERMAR, 1811	+	+
15	Donacia vulgaris ZSCHACH, 1788	+	+
16	Donacia simplex FABRICIUS, 1775	+	+
17	Donacia tomentosa AHRENS, 1810	+	+
18	Donacia cinerea HERBST, 1784	+	+

19	<i>Plateumaris sericea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
20	<i>Plateumaris braccata</i> (SCOPOLI, 1772)	+	+
21	<i>Plateumaris consimilis</i> (SCHRANK, 1781)	+	+
22	<i>Plateumaris rustica</i> (KUNZE, 1818)	+	+
	Unterfamilie Orsodacninae		
23	<i>Orsodacne cerasi</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
24	<i>Orsodacne lineola</i> (PANZER, 1896)	+	
	Unterfamilie Zeugophorinae		
25	<i>Zeugophora scutellaris</i> SUFFRIAN, 1840	+	+
26	<i>Zeugophora frontalis</i> SUFFRIAN, 1840	+	
27	<i>Zeugophora subspinosa</i> (FABRICIUS, 1781)	+	+
28	<i>Zeugophora turneri</i> POWER, 1863	+	
29	<i>Zeugophora flavicollis</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
	Unterfamilie Criocerinae		
30	<i>Lema cyanella</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
31	<i>Oulema erichsonii</i> (SUFFRIAN, 1841)	+	+
32	<i>Oulema septentrionis</i> (WEISE, 1880)	+	
33	<i>Oulema gallaeciana</i> (HEYDEN, 1870)	+	+
34	<i>Oulema melanopus</i> (LINNAEUS, 1758) (= <i>melanopa</i> auct. pt.)	+	+
35	<i>Oulema duftschmidi</i> (REDTENBACHER, 1874) (= <i>melanopa</i> auct. pt.)		+
36	<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
37	<i>Crioceris asparagi</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
38	<i>Lilioceris lili</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
39	<i>Lilioceris merdigera</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
	Unterfamilie Clytrinae		
40	<i>Labidostomis tridentata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
41	<i>Labidostomis humeralis</i> (SCHNEIDER, 1792)	+	+
42	<i>Labidostomis lucida</i> (GERMAR, 1823)	+	+
43	<i>Labidostomis longimana</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
44	<i>Lachnaia sexpunctata</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
45	<i>Clytra quadripunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
46	<i>Clytra laeviuscula</i> RATZEBURG, 1837	+	+
47	<i>Smaragdina salicina</i> (SCOPOLI, 1763) (= <i>cyanea</i> FABRICIUS)	+	+
48	<i>Smaragdina flavicollis</i> (CHARPENTIER, 1825)	+	+
49	<i>Smaragdina aurita</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
50	<i>Smaragdina affinis</i> (ILLIGER, 1794)	+	+
51	<i>Cheilotoma musciformis</i> (GOEZE, 1777)	+	+
52	<i>Coptocephala unifasciata</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
53	<i>Coptocephala rubicunda</i> (LAICHARTING, 1781)	+	+

	Unterfamilie Cryptocephalinae		
54	<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (LAICHARTING, 1781)	+	+
55	<i>Pachybrachis sinuatus</i> MULSANT, 1859	+	+
56	<i>Pachybrachis tessellatus</i> (OLIVIER, 1791)	+	+
57	<i>Pachybrachis picus</i> WEISE, 1882	+	+
58	<i>Pachybrachis fimbriolatus</i> SUFFRIAN, 1848	+	+
59	<i>Cryptocephalus coryli</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
60	<i>Cryptocephalus cordiger</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
61	<i>Cryptocephalus octopunctatus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
62	<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
63	<i>Cryptocephalus quinquepunctatus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
64	<i>Cryptocephalus variegatus</i> FABRICIUS, 1781	+	
65	<i>Cryptocephalus distinguendus</i> SCHNEIDER, 1792	+	
66	<i>Cryptocephalus primarius</i> HAROLD, 1872	+	
67	<i>Cryptocephalus imperialis</i> LAICHARTING, 1781	+	
68	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
69	<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
70	<i>Cryptocephalus laetus</i> FABRICIUS, 1792	+	
71	<i>Cryptocephalus schaefferi</i> SCHRANK, 1789	+	+
72	<i>Cryptocephalus aureolus</i> SUFFRIAN, 1847)	+	+
73	<i>Cryptocephalus sericeus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
74	<i>Cryptocephalus hypochoeridis</i> (LINNAEUS, 1758) (= <i>hypochoeridis</i> auct.)	+	+
75	<i>Cryptocephalus violaceus</i> LAICHARTING, 1781	+	+
76	<i>Cryptocephalus nitidus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
77	<i>Cryptocephalus nitidulus</i> FABRICIUS, 1787	+	+
78	<i>Cryptocephalus punctiger</i> PAYKULL, 1799	+	
79	<i>Cryptocephalus parvulus</i> MÜLLER, 1776	+	+
80	<i>Cryptocephalus caerulescens</i> SAHLBERG, 1839 (= <i>coerulescens</i> auct.)	+	+
81	<i>Cryptocephalus marginatus</i> FABRICIUS, 1781	+	+
82	<i>Cryptocephalus octomaculatus</i> ROSSI, 1790	+	+
83	<i>Cryptocephalus pini</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
84	<i>Cryptocephalus frenatus</i> LAICHARTING, 1781	+	
85	<i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
86	<i>Cryptocephalus moraei</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
87	<i>Cryptocephalus octacosmus</i> BEDEL, 1891	+	
88	<i>Cryptocephalus quadripustulatus</i> OLIVIER, 1791	+	+
89	<i>Cryptocephalus flavipes</i> FABRICIUS, 1781	+	+
90	<i>Cryptocephalus signatifrons</i> SUFFRIAN, 1847	+	+
91	<i>Cryptocephalus vittatus</i> FABRICIUS, 1775	+	+
92	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
93	<i>Cryptocephalus elegantulus</i> GRAVENHORST, 1807	+	+
94	<i>Cryptocephalus chrysopus</i> GMELIN, 1788	+	+

95	<i>Cryptocephalus frontalis</i> MARSHAM, 1802	+	+
96	<i>Cryptocephalus saliceti</i> ZEBE, 1855	+	+
97	<i>Cryptocephalus ocellatus</i> DRAPIEZ, 1819	+	+
98	<i>Cryptocephalus querceti</i> SUFFRIAN, 1848		+
99	<i>Cryptocephalus labiatus</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
100	<i>Cryptocephalus exiguus</i> SCHNEIDER, 1792	+	
101	<i>Cryptocephalus pygmaeus</i> FABRICIUS, 1792	+	+
102	<i>Cryptocephalus fulvus</i> (GOEZE, 1777)	+	+
103	<i>Cryptocephalus macellus</i> SUFFRIAN, 1860		+
104	<i>Cryptocephalus populi</i> SUFFRIAN, 1848	+	+
105	<i>Cryptocephalus pusillus</i> FABRICIUS, 1777	+	+
106	<i>Cryptocephalus rufipes</i> (GOEZE, 1777)	+	+
	Unterfamilie Lamprosomatinae		
107	<i>Oomorphus concolor</i> (STURM, 1807)	+	+
	Unterfamilie Eumolpinae		
108	<i>Bromius obscurus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
109	<i>Pachnephorus pilosus</i> (ROSSI, 1790)	+	+
110	<i>Eumolpus asclepiadeus</i> (PALLAS, 1776)	+	+
	Unterfamilie Chrysomelinae		
111	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (SAY, 1824)		+
112	<i>Chrysolina herbacea</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
113	<i>Chrysolina coerulans</i> (SCRIBA, 1791)	+	+
114	<i>Chrysolina graminis</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
115	<i>Chrysolina fastuosa</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
116	<i>Chrysolina polita</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
117	<i>Chrysolina staphylaea</i> (LINNAEUS, 1758) (= <i>staphylea</i> auct.)	+	+
118	<i>Chrysolina cerealis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
119	<i>Chrysolina rufa</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
120	<i>Chrysolina hemisphaerica</i> (GERMAR, 1817)	+	+
121	<i>Chrysolina oricalcia</i> (MÜLLER, 1776)	+	+
122	<i>Chrysolina rufoaenea</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	
123	<i>Chrysolina haemoptera</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
124	<i>Chrysolina fuliginosa</i> (OLIVIER, 1807)	+	+
125	<i>Chrysolina sturmi</i> (WESTHOFF, 1882) (= <i>diversipes</i> BEDEL)	+	+
126	<i>Chrysolina reitteri</i> (WEISE, 1884) (= <i>lurida</i> LINNAEUS)	+	+
127	<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
128	<i>Chrysolina gypsophilae</i> (KÜSTER, 1945)	+	+
129	<i>Chrysolina kuesteri</i> (HELLIESEN, 1912)		+
130	<i>Chrysolina aurichalcea</i> (MANNERHEIM, 1825)	+	+
131	<i>Chrysolina varians</i> (SCHALLER, 1783)	+	+
132	<i>Chrysolina hyperici</i> (FORSTER, 1771)	+	+

133	<i>Chrysolina brunsvicensis</i> (GRAVENHORST, 1807)	+	+
134	<i>Chrysolina geminata</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
135	<i>Chrysolina quadrigemina</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	
136	<i>Chrysolina carnifex</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
137	<i>Chrysolina analis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	
138	<i>Chrysolina marginata</i> (LINNAEUS, 1858)	+	+
139	<i>Chrysolina limbata</i> (FABRICIUS, 1775)	+	
140	<i>Oreina alpestris</i> (SCHUMMEL, 1843)	+	+
141	<i>Oreina speciosissima</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
142	<i>Colaphus sophiae</i> (SCHALLER, 1783)	+	+
143	<i>Gastrophysa polygoni</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
144	<i>Gastrophysa viridula</i> (DEGEER, 1775)	+	+
145	<i>Phaedon cochleariae</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
146	<i>Phaedon armoraciae</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
147	<i>Phaedon concinnus</i> STEPHENS, 1831	+	
148	<i>Phaedon pyritus</i> (ROSSI, 1792)	+	
149	<i>Sclerophaedon orbicularis</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	+
150	<i>Hydrothassa glabra</i> (HERBST, 1783)	+	+
151	<i>Hydrothassa marginella</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
152	<i>Hydrothassa hannoverana</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
153	<i>Prasocuris junci</i> (BRAHM, 1790)	+	+
154	<i>Prasocuris phellandrii</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
155	<i>Plagioderia versicolora</i> (LAICHARTING, 1781)	+	+
156	<i>Linaeidea aenea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
157	<i>Chrysomela cuprea</i> FABRICIUS, 1775	+	+
158	<i>Chrysomela lapponica</i> LINNAEUS, 1758	+	+
159	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
160	<i>Chrysomela collaris</i> LINNAEUS, 1758	+	
161	<i>Chrysomela populi</i> LINNAEUS, 1758	+	+
162	<i>Chrysomela tremulae</i> FABRICIUS, 1783	+	+
163	<i>Chrysomela saliceti</i> (WEISE, 1884)	+	+
164	<i>Gonioctena flavicornis</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	+
165	<i>Gonioctena viminalis</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
166	<i>Gonioctena decemnotata</i> (MARSHAM, 1802) (= <i>rufipes</i> DEGEER)	+	+
167	<i>Gonioctena linnaeana</i> (SCHRANK, 1781)	+	+
168	<i>Gonioctena olivacea</i> (FORSTER, 1771)	+	+
169	<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (FABRICIUS, 1787)	+	+
170	<i>Gonioctena pallida</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
171	<i>Phratora vulgatissima</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
172	<i>Phratora tibialis</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	+
173	<i>Phratora laticollis</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	+
174	<i>Phratora vitellinae</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
175	<i>Phratora atrovirens</i> (CORNELIUS, 1857)	+	

176	<i>Timarcha tenebricosa</i> (FABRICIUS, 1775)	+	
177	<i>Timarcha goettingensis</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
178	<i>Timarcha metallica</i> (LAICHARTING, 1781)	+	+
179	<i>Entomoscelis adonidis</i> (PALLAS, 1771)	+	+
	Unterfamilie Galerucinae		
180	<i>Galerucella nymphaeae</i> (LINNAEUS, 1758) (in Revision)	+	+
181	<i>Galerucella grisescens</i> (JOANNIS, 1865)	+	+
182	<i>Galerucella lineola</i> (FABRICIUS, 1781)	+	+
183	<i>Galerucella calmariensis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
184	<i>Galerucella pusilla</i> (DUFTSCHMID, 1825)		+
185	<i>Galerucella tenella</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
186	<i>Xanthogaleruca luteola</i> (MÜLLER, 1766)	+	+
187	<i>Pyrrhalta viburni</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
188	<i>Galeruca tanacetii</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
189	<i>Galeruca interrupta</i> ILLIGER 1802	+	+
190	<i>Galeruca pomonae</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
191	<i>Galeruca laticollis</i> (SAHLBERG, 1837)	+	
192	<i>Lochmaea caprea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
193	<i>Lochmaea suturalis</i> (THOMSON, 1866)	+	+
194	<i>Lochmaea crataegi</i> (FORSTER, 1771)	+	+
195	<i>Phyllotreta quadrimaculata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
196	<i>Calomicrus circumfusus</i> (MARSHAM, 1802)		+
197	<i>Calomicrus piniculus</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
198	<i>Luperus xanthopoda</i> (SCHRANK, 1781)	+	
199	<i>Luperus longicornis</i> (FABRICIUS, 1781)	+	+
200	<i>Luperus luperus</i> (SULZER, 1776) (= <i>lyperus</i> auct.)	+	+
201	<i>Luperus flavipes</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
202	<i>Agelastica alni</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
203	<i>Sermylassa halensis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
	Unterfamilie Alticinae		
204	<i>Phyllotreta atra</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
205	<i>Phyllotreta vittula</i> (REDTENBACHER, 1849)	+	+
206	<i>Phyllotreta armoraciae</i> (KOCH, 1803)	+	+
207	<i>Phyllotreta nemorum</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
208	<i>Phyllotreta undulata</i> KUTSCHERA, 1860	+	+
209	<i>Phyllotreta christinae</i> HEIKERTINGER, 1941		+
210	<i>Phyllotreta tetrastigma</i> (COMOLLI, 1837)	+	+
211	<i>Phyllotreta dilatata</i> THOMSON, 1866		+
212	<i>Phyllotreta flexuosa</i> (ILLIGER, 1794)	+	+
213	<i>Phyllotreta striolata</i> (FABRICIUS, 1803) (= <i>vittata</i> auct. nec FABRICIUS)	+	+
214	<i>Phyllotreta ochripes</i> (CURTIS, 1837)	+	+

215	<i>Phyllotreta exclamationis</i> (THUNBERG, 1784)	+	+
216	<i>Phyllotreta cruciferae</i> (GOEZE, 1777)	+	+
217	<i>Phyllotreta astrachanica</i> LOPATIN, 1977	+	+
218	<i>Phyllotreta aerea</i> ALLARD, 1859	+	+
219	<i>Phyllotreta austriaca</i> HEIKERTINGER, 1909	+	
220	<i>Phyllotreta nigripes</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
221	<i>Phyllotreta procera</i> (REDTENBACHER, 1849)	+	
222	<i>Phyllotreta nodicornis</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
223	<i>Aphthona cyparissiae</i> (KOCH, 1801)	+	+
224	<i>Aphthona abdominalis</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	
225	<i>Aphthona pallida</i> (BACH, 1856)	+	+
226	<i>Aphthona lutescens</i> (GYLLENHAL, 1808)	+	+
227	<i>Aphthona violacea</i> (KOCH, 1803)	+	
228	<i>Aphthona pygmaea</i> KUTSCHERA, 1861	+	+
229	<i>Aphthona cyanella</i> (REDTENBACHER, 1849)	+	+
230	<i>Aphthona venustula</i> KUTSCHERA, 1861	+	+
231	<i>Aphthona euphorbiae</i> (SCHRANK, 1781)	+	+
232	<i>Aphthona coerulea</i> (GEOFFROY, 1785)	+	+
233	<i>Aphthona erichsoni</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	+	
234	<i>Aphthona herbigrada</i> (CURTIS, 1837)	+	+
235	<i>Aphthona atrovirens</i> (FÖRSTER, 1849)	+	+
236	<i>Longitarsus pellucidus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
237	<i>Longitarsus ochroleucus</i> (MARSHAM, 1802)	+	
238	<i>Longitarsus jacobaeae</i> WATERHOUSE, 1858		+
239	<i>Longitarsus symphyti</i> HEIKERTINGER, 1912	+	+
240	<i>Longitarsus succineus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
241	<i>Longitarsus noricus</i> LEONARDI, 1976		+
242	<i>Longitarsus rubiginosus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
243	<i>Longitarsus tabidis</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
244	<i>Longitarsus foudrasi</i> WEISE, 1893		+
245	<i>Longitarsus nigrofasciatus</i> (GOEZE, 1777)	+	+
246	<i>Longitarsus lycopi</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
247	<i>Longitarsus juncicola</i> (FOUDRAS, 1859)	+	
248	<i>Longitarsus ferrugineus</i> (FOUDRAS, 1860) (= <i>waterhousei</i> KUTSCHERA)		+
249	<i>Longitarsus membranaceus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
250	<i>Longitarsus nanus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
251	<i>Longitarsus melanocephalus</i> (DEGEER 1775)	+	+
252	<i>Longitarsus kutscherae</i> (REY, 1872)		+
253	<i>Longitarsus curtus</i> (ALLARD, 1860)	+	+
254	<i>Longitarsus exoletus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
255	<i>Longitarsus pulmonariae</i> WEISE 1893	+	+
256	<i>Longitarsus longipennis</i> KUTSCHERA 1863	+	
257	<i>Longitarsus lewisii</i> (BALY, 1874) (= <i>scutellaris</i> auct. nec REY)		+

258	<i>Longitarsus pratensis</i> (PANZER, 1794)	+	+
259	<i>Longitarsus scutellaris</i> (REY, 1873)		+
260	<i>Longitarsus reichei</i> (ALLARD, 1860)		+
261	<i>Longitarsus minimus</i> KUTSCHERA, 1864		+
262	<i>Longitarsus ballotae</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
263	<i>Longitarsus celticus</i> LEONARDI, 1975		+
264	<i>Longitarsus gracilis</i> KUTSCHERA, 1864	+	
265	<i>Longitarsus ganglbaueri</i> HEIKERTINGER, 1912	+	+
266	<i>Longitarsus aeneicollis</i> (FALDERMANN, 1837) (= <i>suturalis</i> MARSHAM)	+	
267	<i>Longitarsus atricillus</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
268	<i>Longitarsus suturellus</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
269	<i>Longitarsus nasturtii</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
270	<i>Longitarsus quadriguttatus</i> (PONTOPPIDAN, 1765)	+	+
271	<i>Longitarsus apicalis</i> (BECK, 1817)	+	
272	<i>Longitarsus holsaticus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	
273	<i>Longitarsus luridus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
274	<i>Longitarsus brunneus</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
275	<i>Longitarsus languidus</i> KUTSCHERA, 1863	+	
276	<i>Longitarsus minusculus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
277	<i>Longitarsus echii</i> (KOCH, 1803)	+	+
278	<i>Longitarsus weisei</i> GUILLEBEAU, 1895	+	+
279	<i>Longitarsus niger</i> (KOCH, 1803)	+	+
280	<i>Longitarsus parvulus</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
281	<i>Longitarsus anchusae</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
282	<i>Longitarsus pinguis</i> WEISE, 1888		+
283	<i>Longitarsus absynthii</i> KUTSCHERA, 1862	+	+
284	<i>Longitarsus obliteratus</i> (ROSENHAUER, 1847)	+	+
285	<i>Longitarsus salviae</i> GRUEV, 1975		+
286	<i>Longitarsus obliteratoides</i> GRUEV, 1973		+
287	<i>Altica ampelophaga</i> (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1858)	+	
288	<i>Altica lythri</i> AUBÉ, 1843	+	+
289	<i>Altica brevicollis</i> FOUDRAS, 1860	+	+
290	<i>Altica quercetorum</i> FOUDRAS, 1860	+	+
291	<i>Altica tamaricis</i> SCHRANK, 1785	+	
292	<i>Altica oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
293	<i>Altica palustris</i> (WEISE, 1888)	+	
294	<i>Altica pusilla</i> DUFTSCHMID, 1825	+	+
295	<i>Altica longicollis</i> (ALLARD, 1860)	+	+
296	<i>Hermaeophaga mercurialis</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
297	<i>Batophila rubi</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
298	<i>Lythraria salicariae</i> (PAYKULL, 1800)	+	+
299	<i>Ochrosis ventralis</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
300	<i>Asiorestia transversa</i> (MARSHAM, 1802)	+	+

301	<i>Asiorestia motschulskii</i> KONSTANTINOV, 1991 (= <i>sublaevis</i> auct. nec MOTSCHULSKY)		+
302	<i>Asiorestia ferruginea</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
303	<i>Asiorestia femorata</i> (GYLLENHAL, 1813)	+	+
304	<i>Asiorestia nigrifula</i> (GYLLENHAL, 1813)	+	
305	<i>Derocrepis rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
306	<i>Hippuriphila modeeri</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
307	<i>Crepidodera aurea</i> (GEOFFROY, 1785)	+	+
308	<i>Crepidodera fulvicornis</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
309	<i>Crepidodera aurata</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
310	<i>Crepidodera plutus</i> (LATREILLE, 1804)		+
311	<i>Crepidodera lamina</i> (BEDEL, 1901)	+	+
312	<i>Crepidodera nitidula</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
313	<i>Epitrix atropae</i> FOU DRAS, 1860	+	+
314	<i>Epitrix pubescens</i> (KOCH, 1803)	+	+
315	<i>Minota obesa</i> (WALTL, 1839)	+	+
316	<i>Podagrica fuscicornis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
317	<i>Podagrica malvae</i> (ILLIGER, 1807)	+	
318	<i>Podagrica fuscipes</i> (FABRICIUS, 1775)	+	
319	<i>Mantura chrysanthemi</i> (KOCH, 1803)	+	+
320	<i>Mantura obtusata</i> (GYLLENHAL, 1813)	+	+
321	<i>Mantura rustica</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
322	<i>Mantura matthewsi</i> (STEPHENS, 1832)	+	
323	<i>Chaetocnema semicoerulea</i> (KOCH, 1803)	+	
324	<i>Chaetocnema concinna</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
325	<i>Chaetocnema laevicollis</i> (THOMSON, 1866) (= <i>heikertingeri</i> LJUBITSCHJEFF)	+	+
326	<i>Chaetocnema aridula</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	+
327	<i>Chaetocnema confusa</i> (BOHEMAN, 1851)	+	
328	<i>Chaetocnema mannerheimi</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	+
329	<i>Chaetocnema arida</i> FOU DRAS, 1860	+	
330	<i>Chaetocnema subcoerulea</i> (KUTSCHERA, 1864)	+	
331	<i>Chaetocnema hortensis</i> (GEOFFROY, 1785)	+	+
332	<i>Chaetocnema sahlbergi</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	+
333	<i>Chaetocnema compressa</i> (LETZNER, 1846)		+
334	<i>Sphaeroderma testaceum</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
335	<i>Sphaeroderma rubidum</i> (GRAËLLS, 1858)	+	+
336	<i>Argopus ahrensi</i> (GERMAR, 1817)	+	
337	<i>Apteropoda splendida</i> ALLARD 1860	+	
338	<i>Apteropoda globosa</i> (ILLIGER, 1794)	+	
339	<i>Apteropoda orbiculata</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
340	<i>Mniophila muscorum</i> (KOCH, 1803)	+	+
341	<i>Dibolia schillingi</i> (LETZNER, 1847)	+	+
342	<i>Dibolia femoralis</i> REDTENBACHER, 1849	+	+

343	<i>Dibolia foersteri</i> BACH, 1859	+	
344	<i>Dibolia depressiuscula</i> LETZNER, 1847	+	+
345	<i>Dibolia rugulosa</i> REDTENBACHER, 1849	+	+
346	<i>Dibolia cynoglossi</i> (KOCH, 1803)	+	+
347	<i>Dibolia occultans</i> (KOCH, 1803)	+	
348	<i>Dibolia timida</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
349	<i>Dibolia cryptocephala</i> (KOCH, 1803)	+	
350	<i>Psylliodes affinis</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
351	<i>Psylliodes luteola</i> (MÜLLER, 1776)	+	+
352	<i>Psylliodes picina</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
353	<i>Psylliodes attenuata</i> (KOCH, 1803)	+	
354	<i>Psylliodes chrysocephala</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
355	<i>Psylliodes weberi</i> LOHSE, 1956		+
356	<i>Psylliodes sophiae</i> HEIKERTINGER, 1914	+	+
357	<i>Psylliodes napi</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
358	<i>Psylliodes thlaspi</i> FOUDRAS, 1860	+	
359	<i>Psylliodes cuprea</i> (KOCH, 1803)		+
360	<i>Psylliodes isatidis</i> HEIKERTINGER, 1912	+	+
361	<i>Psylliodes cupreata</i> (DUFTSCHMID 1825)	+	+
362	<i>Psylliodes pyritosa</i> KUTSCHERA, 1864	+	
363	<i>Psylliodes instabilis</i> FOUDRAS, 1860	+	+
364	<i>Psylliodes vindobonensis</i> HEIKERTINGER, 1914	+	+
365	<i>Psylliodes hyoscyami</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
366	<i>Psylliodes chalcomera</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
367	<i>Psylliodes dulcamara</i> (KOCH, 1803)	+	+
368	<i>Psylliodes cucullata</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
	Unterfamilie Hispinae		
369	<i>Hispia atra</i> LINNAEUS, 1767	+	+
	Unterfamilie Cassidinae		
370	<i>Cassida fastuosa</i> SCHALLER, 1783	+	
371	<i>Cassida subferruginea</i> (SCHRANK, 1776)	+	+
372	<i>Cassida viridis</i> LINNAEUS, 1758	+	+
373	<i>Cassida hemisphaerica</i> HERBST, 1799	+	+
374	<i>Cassida canaliculata</i> LAICHARTING, 1781	+	+
375	<i>Cassida murraea</i> LINNAEUS, 1767	+	+
376	<i>Cassida nebulosa</i> LINNAEUS, 1858	+	+
377	<i>Cassida flaveola</i> THUNBERG, 1794	+	+
378	<i>Cassida berolinensis</i> SUFFRIAN, 1844	+	
379	<i>Cassida atrata</i> FABRICIUS, 1787	+	
380	<i>Cassida vibex</i> LINNAEUS, 1767	+	+
381	<i>Cassida pannonica</i> SUFFRIAN, 1844		+
382	<i>Cassida panzeri</i> WEISE, 1907	+	+

383	<i>Cassida ferruginea</i> GOEZE, 1777	+	
384	<i>Cassida rubiginosa</i> MÜLLER, 1776	+	+
385	<i>Cassida stigmatica</i> SUFFRIAN, 1844	+	+
386	<i>Cassida sanguinosa</i> SUFFRIAN, 1844	+	+
387	<i>Cassida rufovirens</i> SUFFRIAN, 1844	+	+
388	<i>Cassida denticollis</i> SUFFRIAN, 1844	+	+
389	<i>Cassida sanguinolenta</i> MÜLLER, 1776	+	+
390	<i>Cassida prasina</i> ILLIGER, 1798	+	+
391	<i>Cassida subreticulata</i> SUFFRIAN, 1844	+	+
392	<i>Cassida margaritacea</i> SCHALLER, 1783	+	+
393	<i>Cassida nobilis</i> LINNAEUS, 1758	+	+
394	<i>Cassida vittata</i> VILLIERS, 1789	+	+

Literatur (nur zusammenfassende Arbeiten):

- HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. - Stuttgart.
- KIPPENBERG, H. & M. DÖBERL: Crysomelidae. In: LOHSE, G. A. & W. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, 3. Supplementband. - Krefeld, S. 17-142.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa, einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalls. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math. Nat. R., **XII/7**: S. 513-566.
- (1966): Chrysomelidae. In: FREUDE, H., K. W. HARDE, G. A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 9. - Krefeld, S. 96-298.
 - (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Crysomelidae: Cryptocephalinae. - Beitr. Entomol., **27**, S. 197-231.
 - (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Crysomelidae: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clytrinae. - Beitr. Entomol., **35**, S. 219-262.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Bd. II. - Erfurt.
- UHLMANN, E.: (1940): Die Tierwelt der Jenaer Landschaft. - Jena.

Anschrift der Autoren:

Dr. Frank Fritzlar
Kernbergstraße 73
07749 Jena

Jörg Perner
Am Burggarten 2
07749 Jena

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Fritzlar Frank, Perner Jörg

Artikel/Article: [Checklist der Blattkäfer \(Coleoptera, Chrysomelidae\) Thüringens 16-27](#)