

Checklist der Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionioidea)

Thüringens

Stand: 01.06.1994

LUTZ BEHNE, Eberswalde

Die vorliegende Liste enthält 715 Rüsselkäferarten, die für Thüringen nachgewiesen sind, bzw. deren Nachweis (bei 5 Arten) wahrscheinlich ist. Alle als sicher aufgeführten Arten wurden von L. DIECKMANN und/oder dem Autor überprüft. Die überwiegende Anzahl von Artbelegen befindet sich in der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts (Eberswalde) oder in der Thüringen Sammlung von O. RAPP (z.Zt. Museum der Natur Gotha). Die Datensammlung erfolgte in Eberswalde. Angaben zu Häufigkeit und Tendenz werden auf dieser Grundlage gegeben.

Aufgrund der andersgearteten Bearbeitung kann kein Vergleich zur Fauna von RAPP (1935) gegeben werden. Es war jedoch möglich, anhand vorliegender Daten Verbreitungsangaben zu den einzelnen Thüringer Regionen zu geben. Die Region Süd (S) umfaßt dabei den ehemaligen DDR-Bezirk Suhl, die Region Ost (E) den Bezirk Gera zuzüglich der Kreise Altenburg und Schmölnn und die Region Nord (N) den Bezirk Erfurt einschließlich des Landkreises Artern (Kyffhäuser).

Die erheblichen taxonomischen und systematischen Änderungen dieser Familie (seit dem Bd. 10 und 11 des FREUDE-HARDE-LOHSE) machten es erforderlich, eine etwas vom Stil der anderen Check-listen abweichende Form zu wählen. Synonyme können aus Platzgründen nicht mit aufgeführt werden. Die Systematik folgt LOHSE & LUCHT (1994).

Nr.	Taxon	N	E	S	H	T
	Familie Cimberidae					
1	<i>Cimberis attelaboides</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	v	+-
2	<i>Doydirhynchus austriacus</i> (OLIVIER, 1807)	x	x	x	z	+-
	Familie Nemonychidae					
3	<i>Nemonyx lepturoides</i> (FABRICIUS, 1801)	x		x	s	-
	Familie Rhynchitidae					
4	<i>Auletobius sanguisorbae</i> (SCHRANK, 1798)	x			ss	--
5	<i>Pselaphorhynchites nanus</i> (PAYKULL, 1792)	x	x		h	+-
6	<i>Pselaphorhynchites tomentosus</i> (GYLLENHAL, 1839)	x	x	x	h	+-
7	<i>Pselaphorhynchites longiceps</i> (THOMSON, 1888)	x	x		h	+-
8	<i>Lasiorhynchites sericeus</i> (HERBST, 1797)	x	x	x	z	-
9	<i>Lasiorhynchites cavifrons</i> (GYLLENHAL, 1833)	x	x	x	v	+-
10	<i>Lasiorhynchites olivaceus</i> (GYLLENHAL, 1833)	x	x	x	ss	--
11	<i>Lasiorhynchites coeruleocephalus</i> (SCHALLER, 1783)	x	x	x	h	+-

12	Caenorhinus germanicus (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
13	Caenorhinus aeneovirens (MARSHAM, 1802)	x	x	x	z	-
14	Caenorhinus interpunctatus (STEPHENS, 1831)	x	x	x	v	+-
15	Caenorhinus pauxillus (GERMAR, 1824)	x	x	x	h	+-
16	Caenorhinus aequatus (LINNÉ, 1767)	x	x	x	h	+-
17	Rhynchites pubescens (FABRICIUS, 1775)	x	x		s	-
18	Rhynchites caeruleus (DEGEER, 1775)	x	x	x	v	+-
19	Rhynchites cupreus (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	-
20	Rhynchites aethiops BACH, 1854	x	x	x	z	-
21	Rhynchites auratus (SCOPOLI, 1763)	x	x	x	v	+-
22	Rhynchites bacchus (LINNÉ, 1758)	x	x	x	z	+-
23	Byctiscus betulae (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
24	Byctiscus populi (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
25	Deporaus tristis (FABRICIUS, 1794)	x	x		z	-
26	Deporaus mannerheimii (HUMMEL, 1823)	x	x	x	s	+-
27	Deporaus betulae (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
	Familie Attelabidae					
28	Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)	x	x	x	h	+-
29	Apoderus coryli (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
	Familie Apionidae					
30	Omphalapion laevigatum (PAYKULL, 1792)	x	x	x	s	-
31	Omphalapion buddebergi (BEDEL, 1885)	x	x		ss	--
32	Omphalapion dispar (GERMAR, 1817)	x	x	x	z	+-
33	Omphalapion hookeri (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
34	Acanephodus onopordi (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
35	Ceratapion penetrans (GERMAR, 1817)	x			z	-
36	Ceratapion basicorne (ILLIGER, 1807)	x			s	+-
37	Ceratapion gibbistrostre (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	h	+-
38	Ceratapion armatum (GERSTÄCKER, 1854)	x			ss	?
39	Diplapion confluens (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
40	Diplapion stolidum (GERMAR, 1817)	x	x	x	v	+-
41	Diplapion detritum (MULSANT & REY, 1858)	x			s	-
42	Taphrotopium sulcifrons (HERBST, 1797)	x	x		z	?
43	Aspidapion radiolus (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+-
44	Aspidapion validum (GERMAR, 1817)	x	x		s	?
45	Aspidapion aeneum (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-
46	Melanapion minimum (HERBST, 1797)	x	x	x	v	+-
47	Squamapion elongatum (GERMAR, 1817)	x	x	x	v	+-
48	Squamapion cineraceum (WENCKER, 1864)	x	x		z	-
49	Squamapion flavimanum (GYLLENHAL, 1833)	x			z	-
50	Squamapion vicinum (KIRBY, 1808)	x	x	x	v	+-
51	Squamapion atomarium (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-

52	Squamapion oblivium (SCHILSKY, 1902)	x			s	-
53	Squamapion hoffmanni (WAGNER, 1930)	x	x		z	?
54	Kalcapion pallipes (KIRBY, 1808)	x	x	x	v	+-
55	Taeniapion urticarium (HERBST, 1784)	x		x	h	+-
56	Taeniapion rufulum (WENCKER, 1864)	x			s	-
57	Pseudapion rufirostre (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-
58	Malvapion malvae (FABRICIUS, 1775)	x		x	s	?
59	Exapion compactum (DESBROCHERS, 1888)	x			s	-
60	Exapion formaneki (WAGNER, 1929)	x	x	x	z	-
61	Exapion difficile (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
62	Exapion corniculatum (GERMAR, 1817)	x	x		s	?
63	Exapion fuscirostre (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-
64	Pseudoprotapion elegantulum (GERMAR, 1818)	x	x	x	v	+-
65	Pseudoprotapion astragali (PAYKULL, 1800)	x	x	x	h	+-
66	Protapion gracilipes (DIETRICH, 1857)	x	x	x	v	+-
67	Protapion fulvipes (FOURCROY, 1785)	x	x	x	h	+-
68	Protapion nigrirarse (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
69	Protapion filirostre (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
70	Protapion trifolii (LINNÉ, 1768)	x	x	x	h	+-
71	Protapion ruficrus (GERMAR, 1817)	x	x		z	?
72	Protapion interjectum (DESBROCHERS, 1895)	x	x	x	z	-
73	Protapion apicans (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
74	Protapion varipes (GERMAR, 1817)	x	x	x	z	?
75	Protapion assimile (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
76	Protapion ononidis (GYLLENHAL, 1827)	x		x	h	+-
77	Protapion dissimile (GERMAR, 1817)	x	x		v	+-
78	Phrissotrichum rugicolle (GERMAR, 1817)	x			s	-
79	Helianthemapion aciculare (GERMAR, 1817)	x			s	-
80	Pseudoperapion brevirostre (HERBST, 1797)	x	x		h	+-
81	Pseudostenapion simum (GERMAR, 1817)	x	x	x	h	+-
82	Aizobius sedi (GERMAR, 1818)	x	x	x	v	-
83	Perapion violaceum (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
84	Perapion marchicum (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
85	Perapion affine (KIRBY, 1808)	x	x	x	z	+-
86	Perapion curtirostre (GERMAR, 1817)	x	x	x	h	+-
87	Perapion oblongum (GYLLENHAL, 1839)	x			z	?
88	Apion frumentarium (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
89	Apion haematodes KIRBY, 1808	x	x	x	h	+-
90	Apion cruentatum WALTON, 1844	x	x	x	h	+-
91	Apion rubiginosum GRILL, 1893	x	x	x	h	+-
92	Apion rubens WALTON, 1844	x	x	x	v	+-
93	Catapion seniculus (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
94	Catapion koestlini (DIECKMANN, 1989)		x		s	+-
95	Catapion meieri (DESBROCHERS, 1901)	x			v	?

96	Catapion pubescens (KIRBY, 1811)	x	x	x	v	+-
97	Trichapion simile (KIRBY, 1811)	x	x	x	h	+-
98	Stenopterapion intermedium (EPPELSHEIM, 1875)	x	x	x	v	+-
99	Stenopterapion tenue (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
100	Stenopterapion meliloti (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
101	Ischnopterapion loti (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
102	Ischnopterapion modestum (GERMAR, 1894)	x	x	x	v	+-
103	Ischnopterapion virens (HERBST, 1797)	x	x		h	+-
104	Protopirapion atratulum (GERMAR, 1817)	x		x	s	?
105	Synapion ebeninum (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
106	Holotrichapion ononis (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
107	Holotrichapion pisi (FABRICIUS, 1801)	x	x	x	h	+-
108	Holotrichapion aestimatum (FAUST, 1891)	x	x	x	v	+-
109	Holotrichapion aethiops (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
110	Holotrichapion gracilicollis (GYLLENHAL, 1839)	x			ss	?
111	Hemitrichapion reflexum (GYLLENHAL, 1833)	x	x	x	h	+-
112	Hemitrichapion waltoni (STEPHENS, 1839)	x	x	x	v	-
113	Hemitrichapion lanigerum (GEMMINGER, 1871)	x	x	x	s	-
114	Hemitrichapion pavidum (GERMAR, 1817)	x	x	x	h	+-
115	Pirapion immune (KIRBY, 1808)			x	z	?
116	Mesotrichapion punctirostre (GYLLENHAL, 1839)	x			s	-
117	Cyanapion columbinum (GERMAR, 1817)	x	x	x	h	+-
118	Cyanapion spencii (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
119	Cyanapion platalea (GERMAR, 1817)	x	x	x	v	+-
120	Cyanapion afer (GYLLENHAL, 1833)	x	x	x	v	+-
121	Cyanapion gyllenhalii (KIRBY, 1808)	x	x	x	v	+-
122	Oxystoma subulatum (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
123	Oxystoma opeticum (BACH, 1854)	x	x	x	s	?
124	Oxystoma cracca (LINNÉ, 1767)	x	x	x	h	+-
125	Oxystoma cerdo (GERSTÄCKER, 1854)	x	x	x	h	+-
126	Oxystoma pomonae (FABRICIUS, 1798)	x	x	x	z	-
127	Oxystoma ochropus (GERMAR, 1818)	x	x	x	v	+-
128	Oryxolaemus flavifemoratus (HERBST, 1797)	x	x	x	v	-
129	Eutrichapion viciae (PAYKULL, 1800)	x	x	x	h	+-
130	Eutrichapion ervi (KIRBY, 1808)	x	x	x	h	+-
131	Eutrichapion melancholicum (WENCKER, 1864)	x			s	+-
132	Eutrichapion vorax (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
133	Eutrichapion punctigerum (PAYKULL, 1792)	x	x	x	s	-
134	Eutrichapion facetum (GYLLENHAL, 1839)	x	x	x	v	-
135	Nanophyes marmoratus (GOEZE, 1777)	x	x	x	h	+-
136	Nanophyes globulus (GERMAR, 1821)	x	x		s	ß
137	Nanomimus hemisphaericus (OLIVIER, 1807)	x			s	?
138	Microon sahlbergi (SAHLBERG, 1835)	x			z	-

	Familie Curculionidae					
139	Otiorhynchus conspersus (HERBST, 1795)	x			ss	--
140	Otiorhynchus tristis (SCOPOLI, 1763)	x			z	+-
141	Otiorhynchus ligustici (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
142	Otiorhynchus niger (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-
143	Otiorhynchus fuscipes (OLIVIER, 1807)	x	x	x	h	+-
144	Otiorhynchus lugdunensis BOHEMAN, 1843		x		z	+
145	Otiorhynchus laevigatus (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	+-
146	Otiorhynchus morio (FABRICIUS, 1781)	x		x	v	+-
147	Otiorhynchus raucus (FABRICIUS, 1777)	x	x	x	h	+-
148	Otiorhynchus nodosus (O.F.MÜLLER, 1764)	x		x	v	+-
149	Otiorhynchus rugosotriatus (GOEZE, 1777)	x	x	x	h	+-
150	Otiorhynchus porcatus (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
151	Otiorhynchus scaber (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
152	Otiorhynchus uncinatus GERMAR, 1824	x	x	x	v	+-
153	Otiorhynchus singularis (LINNÉ, 1767)	x	x	x	h	+-
154	Otiorhynchus subdentatus BACH, 1854	x	x	x	v	+-
155	Otiorhynchus lepidopterus (FABRICIUS, 1794)	x	x	x	v	+-
156	Otiorhynchus sulcatus (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-
157	Otiorhynchus rugifrons (GYLLENHAL, 1813)	x			ss	?
158	Otiorhynchus pinastri (HERBST, 1795)		x		ss	?
159	Otiorhynchus smreczynskii CMOLUCH, 1968	x	x		v	+-
160	Otiorhynchus ovatus (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
161	Otiorhynchus desertus ROSENHAUER, 1847	x			ss	?
162	Otiorhynchus fullo (SCHRANK, 1781)	x	x	x	v	-
163	Simo hirticornis (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
164	Peritelus leucogrammus GERMAR, 1824	x			v	+-
165	Peritelus sphaeroides GERMAR, 1824	x			ss	?
166	Phyllobius cinerascens (FABRICIUS, 1792)	x			s	-
167	Phyllobius sinuatus (FABRICIUS, 1801)	x	x	x	v	+-
168	Phyllobius viridicollis (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	h	+-
169	Phyllobius brevis GYLLENHAL, 1834	?			?	?
170	Phyllobius dispar REDTENBACHER, 1849	?			?	?
171	Phyllobius virideaeis (LAICHARTING, 1781)	x	x	x	h	+-
172	Phyllobius roboretanus GREDLER, 1882	x	x	x	h	+-
173	Phyllobius oblongus (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
174	Phyllobius arborator (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
175	Phyllobius pomaceus GYLLENHAL, 1834	x	x	x	h	+-
176	Phyllobius calcaratus (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	h	+-
177	Phyllobius maculicornis GERMAR, 1824	x	x	x	h	+-
178	Phyllobius argentatus (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
179	Phyllobius pyri (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
180	Phyllobius vespertinus (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	h	+-

181	<i>Phyllobius betulinus</i> (BECHSTEIN & SCHARF., 1805)	x	x	x	v	+-
182	<i>Argoptochus quadrisignatus</i> (BACH, 1856)	x	x		z	-
183	<i>Omius seminulum</i> (FABRICIUS, 1792)	x			v	+-
184	<i>Omius rotundatus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	+-
185	<i>Omiomima mollina</i> (BOHEMAN, 1834)	x	x		v	+-
186	<i>Rhinomias forticornis</i> (BOHEMAN, 1843)	x	x	x	v	+-
187	<i>Trachyphloeus alternans</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	h	+-
188	<i>Trachyphloeus scabriculus</i> (LINNÉ, 1771)	x	x	x	v	+-
189	<i>Trachyphloeus spinimanus</i> GERMAR, 1824	x	x	x	h	+-
190	<i>Trachyphloeus parallelus</i> SEIDLINNÉ, 1868	x			s	+-
191	<i>Trachyphloeus heymesii</i> HUBENTHAL, 1934	x			s	+-
192	<i>Trachyphloeus rectus</i> THOMSON, 1865	x			s	-
193	<i>Trachyphloeus angustisetulus</i> HANSEN, 1915	x	x	x	v	+-
194	<i>Trachyphloeus bifoveolatus</i> (BECK, 1817)	x	x	x	h	+-
195	<i>Trachyphloeus aristatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x	x	h	+-
196	<i>Trachyphloeus olivieri</i> BEDEL, 1883	x	x	x	z	+-
197	<i>Polydrusus impar</i> GOZIS, 1882	x	x	x	h	+-
198	<i>Polydrusus marginatus</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	h	+-
199	<i>Polydrusus pallidus</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	h	+-
200	<i>Polydrusus corruscus</i> GERMAR, 1824	x	x	x	z	+-
201	<i>Polydrusus pterygomalis</i> BOHEMAN, 1840	x	x	x	v	+-
202	<i>Polydrusus flavipes</i> (DEGEER, 1775)	x			s	-
203	<i>Polydrusus impressifrons</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	v	+-
204	<i>Polydrusus cervinus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
205	<i>Polydrusus pilosus</i> GREDLER, 1866	x	x	x	v	+-
206	<i>Polydrusus confluens</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	v	+-
207	<i>Polydrusus undatus</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x	x	h	+-
208	<i>Polydrusus picus</i> (FABRICIUS, 1792)	x			z	?
209	<i>Polydrusus amoenus</i> (GERMAR, 1824)	x		x	v	+-
210	<i>Polydrusus sericeus</i> (SCHALLER, 1783)	x	x	x	h	+-
211	<i>Polydrusus mollis</i> (STRÖM, 1768)	x	x	x	h	+-
212	<i>Scythropus mustela</i> (HERBST, 1797)	x	x	x	v	+-
213	<i>Liophloeus tessulatus</i> (MÜLLER, 1776)	x	x	x	v	+-
214	<i>Sciaphobus scitulus</i> (GERMAR, 1824)	x	x	x	s	-
215	<i>Eusomus ovulum</i> GERMAR, 1824	x	x	x	h	+-
216	<i>Sciaphilus asperatus</i> (BONSDORF, 1785)	x	x	x	h	+-
217	<i>Brachysomus setiger</i> (GYLLENHAL, 1840)	x			v	-
218	<i>Brachysomus hirtus</i> (BOHEMAN, 1845)	x	x		ss	?
219	<i>Brachysomus echinatus</i> (BONSDORF, 1785)	x	x	x	h	+-
220	<i>Foucattia squamulata</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
221	<i>Foucattia ptochoides</i> (BACH, 1856)	x			z	-
222	<i>Barypeithes araneiformis</i> (SCHRANK, 1781)	x			z	+-
223	<i>Barypeithes chevrolati</i> (BOHEMAN, 1843)	x			ss	?

224	<i>Barypeithes pellucidus pellucidus</i> (BOHEMAN, 1843)	x	x	x	h	+-
225	<i>Barypeithes trichopterus</i> (GAUTIER, 1863)	x	x	x	z	+-
226	<i>Barypeithes mollicomus</i> (AHRENS, 1812)	x	x		h	+-
227	<i>Barypeithes maritimus</i> FORMANEK, 1904	x			ss	?
228	<i>Brachyderes incanus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
229	<i>Strophosoma melanogrammum</i> (FORSTER, 1771)	x	x	x	h	+-
230	<i>Strophosoma capitatum</i> (DEGEER, 1775)	x	x	x	h	+-
231	<i>Strophosoma faber</i> (HERBST, 1785)	x	x	x	v	+-
232	<i>Philopodon plagiatu</i> s (SCHALLER, 1783)	x	x	x	v	+-
233	<i>Barynotus obscurus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	v	+-
234	<i>Barynotus moerens</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	z	+-
235	<i>Sitona gressorius</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x		h	+-
236	<i>Sitona intermedius</i> KÜSTER, 1847	x	x		s	+-
237	<i>Sitona griseus</i> (FABRICIUS, 1775)	x			h	+-
238	<i>Sitona cambricus</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	3	-
239	<i>Sitona regensteinensis</i> (HERBST, 1797)	x	x	x	h	+-
240	<i>Sitona striatellus</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	h	+-
241	<i>Sitona ambiguus</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	h	+-
242	<i>Sitona languidus</i> GYLLENHAL, 1834	x	x		z	-
243	<i>Sitona lineatus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
244	<i>Sitona suturalis</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	h	+-
245	<i>Sitona ononidis</i> SHARPENTIER, 1866	x	x	x	h	+-
246	<i>Sitona sulcifrons argutulus</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	v	+-
247	<i>Sitona puncticollis</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	v	+-
248	<i>Sitona longulus</i> GYLLENHAL, 1834	x			s	?
249	<i>Sitona lepidus</i> GYLLENHAL, 1834	x	x	x	h	+-
250	<i>Sitona macularius</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+-
251	<i>Sitona waterhousei</i> WALTON, 1846	x	x		z	+-
252	<i>Sitona hispidulus</i> (FABRICIUS, 1777)	x	x	x	h	+-
253	<i>Sitona cylindricollis</i> (FAHRAEUS, 1840)	x	x	x	h	+-
254	<i>Sitona humeralis</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	h	+-
255	<i>Sitona inops</i> GYLLENHAL, 1832	x	x	x	z	-
256	<i>Cycloderes pilosus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x		v	+-
257	<i>Tanymecus palliatus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	h	+-
258	<i>Chlorophanus viridis</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	-
259	<i>Tropiphorus terricola</i> (NEWMAN, 1838)	x	x	x	v	+-
260	<i>Tropiphorus elevatus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
261	<i>Lixus paraplecticus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	s	+-
262	<i>Lixus iridis</i> OLIVIER, 1807	x		x	s	+-
263	<i>Lixus albomarginatus</i> BOHEMAN, 1843	x			z	?
264	<i>Lixus ochraceus</i> BOHEMAN, 1843	x			z	?
265	<i>Lixus myagri</i> OLIVIER, 1807	x			s	-
266	<i>Lixus angustatus</i> (FABRICIUS, 1775)	x			ss	?
267	<i>Lixus rubicundus</i> ZOUBKOV, 1833	x			z	?

268	<i>Lixus punctiventris</i> BOHEMAN, 1836	x	x	x	s	+-
269	<i>Lixus bardanae</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	z	+-
270	<i>Lixus filiformis</i> (FABRICIUS, 1781)	x			v	+-
271	<i>Larinus brevis</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	-
272	<i>Larinus jaceae</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	v	+-
273	<i>Larinus sturnus</i> (SCHALLER, 1783)	x			z	+-
274	<i>Larinus turbinatus</i> GYLLENHAL, 1836	x	x	x	v	+-
275	<i>Larinus planus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	h	+-
276	<i>Larinus obtusus</i> GYLLENHAL, 1836	?	?	?	?	?
277	<i>Rhinocyllus conicus</i> (FRÖLICH, 1792)	x	x	x	h	+-
278	<i>Coniocleonus hollbergi</i> (FAHRAEUS, 1842)	x	x	x	v	+-
279	<i>Coniocleonus nebulosus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x		z	-
280	<i>Coniocleonus cicatricosus</i> (HOPPE, 1795)	x			ss	?
281	<i>Coniocleonus nigrosuturatus</i> (GOEZE, 1777)	x			s	-
282	<i>Bothynoderes punctiventris</i> (GERMAR, 1824)	x	x		ss	?
283	<i>Leucosomus pedestris</i> (PODA, 1761)	x			ss	?
284	<i>Chromoderus affinis</i> (SCHRANK, 1781)	x	x	x	v	+-
285	<i>Mecaspis alternans</i> (HERBST, 1795)	x		x	z	-
286	<i>Pseudocleonus grammicus</i> (PANZER, 1789)	x	x		s	-
287	<i>Pseudocleonus cinereus</i> (SCHRANK, 1781)	x	x	x	v	-
288	<i>Pachycerus cordiger</i> (GERMAR, 1819)	x			ss	?
289	<i>Cyphocleonus dealbatus</i> (GMELIN, 1790)	x	x	x	v	+-
290	<i>Cyphocleonus trisulcatus</i> (HERBST, 1795)	x	x		s	?
291	<i>Cleonis pigra</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x	x	h	+-
292	<i>Dryophthorus corticalis</i> (PAYKULL, 1792)	x	x		v	+-
293	<i>Cotaster unicipes</i> (BOHEMAN, 1838)			x	s	?
294	<i>Cossonus cylindricus</i> SAHLBERG, 1835	x	x	x	v	+-
295	<i>Cossonus parallelepipedus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	s	+-
296	<i>Cossonus linearis</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-
297	<i>Rhyncolus reflexus</i> BOHEMAN, 1838	x			v	+-
298	<i>Rhyncolus elongatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x			v	+-
299	<i>Rhyncolus sculpturatus</i> WALT, 1839	x	x		s	+-
300	<i>Rhyncolus ater</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
301	<i>Rhyncolus punctatulus</i> BOHEMAN, 1838	x			s	+-
302	<i>Phloeophagus lignarius</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+-
303	<i>Phloeophagus thomsoni</i> (GRILL, 1896)	x	x		z	+-
304	<i>Brachytemnus porcatus</i> (GERMAR, 1824)	x			s	+-
305	<i>Stereocorynes truncorum</i> (GERMAR, 1824)	x	x	x	h	+-
306	<i>Hexarthrum exiguum</i> (BOHEMAN, 1838)	x			ss	?
307	<i>Bagous frivaldszkyi</i> TOURNIER, 1874	x			ss	?
308	<i>Bagous angustus</i> SILFVERBERG, 1977	x	x	x	v	-
309	<i>Bagous binodulus</i> (HERBST, 1795)	x			s	?
310	<i>Bagous nodulosus</i> GYLLENHAL, 1836	x			s	?
311	<i>Bagous argillaceus</i> GYLLENHAL, 1836	x			ss	?

312	<i>Bagous limosus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x			s	?
313	<i>Bagous subcarinatus</i> GYLLENHAL, 1836	x			v	+ -
314	<i>Bagous longitarsis</i> THOMSON, 1868	x			z	+ -
315	<i>Bagous collignensis</i> (HERBST, 1797)	x			s	+ -
316	<i>Bagous frit</i> (HERBST, 1795)	x			ss	?
317	<i>Bagous lutulosus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x			s	+ -
318	<i>Bagous brevis</i> GYLLENHAL, 1836	x			s	?
319	<i>Bagous diglyptus</i> BOHEMAN, 1845	x	x		ss	?
320	<i>Bagous tempestivus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+ -
321	<i>Bagous lutosus</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x		z	+ -
322	<i>Bagous puncticollis</i> BOHEMAN, 1845	x			z	+ -
323	<i>Bagous lutulentus</i> (GYLLENHAL, 1813)	x			z	+ -
324	<i>Bagous robustus</i> CH.BRISOUT, 1863	x			s	+ -
325	<i>Bagous glabrirostris</i> (HERBST, 1795)	x		x	v	+ -
326	<i>Hydronomus alismatis</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+ -
327	<i>Tanysphyrus lemnae lemnae</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	h	+ -
328	<i>Tanysphyrus ater</i> BLATCHLEY, 1928	x	x		z	+
329	<i>Dorytomus longimanus</i> (FORSTER, 1771)	x	x	x	h	+ -
330	<i>Dorytomus filirostris</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x	x	h	+ -
331	<i>Dorytomus tremulae</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	h	+ -
332	<i>Dorytomus tortrix</i> (LINNÉ, 1761)	x	x	x	h	+ -
333	<i>Dorytomus nordenskioldi</i> FAUST, 1882	x			z	+
334	<i>Dorytomus dejeani</i> FAUST, 1882	x	x	x	h	+ -
335	<i>Dorytomus taeniatus</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x	x	h	+ -
336	<i>Dorytomus affinis</i> (PAYKULL, 1800)	x	x	x	v	+ -
337	<i>Dorytomus hirtipennis</i> (BEDEL, 1884)	x		x	v	+ -
338	<i>Dorytomus suratus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x		s	?
339	<i>Dorytomus ictor</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+ -
340	<i>Dorytomus occalescens</i> (GYLLENHAL, 1836)		x	x	s	?
341	<i>Dorytomus salicis</i> WALTON, 1851	x	x		s	?
342	<i>Dorytomus nebulosus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x		v	+ -
343	<i>Dorytomus salicinus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x			s	?
344	<i>Dorytomus melanophthalmus</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	h	+ -
345	<i>Dorytomus rufatus</i> (BEDEL, 1888)	x	x	x	h	+ -
346	<i>Dorytomus villosulus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x		x	s	+ -
347	<i>Dorytomus dorsalis</i> (LINNÉ, 1758)	x	x		s	-
348	<i>Procas armillatus</i> (FABRICIUS, 1801)	x			ss	?
349	<i>Notaris bimaculatus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x		z	+ -
350	<i>Notaris scirpi</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	+ -
351	<i>Notaris acridulus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+ -
352	<i>Notaris maerkeli</i> (BOHEMAN, 1843)				ss	?
353	<i>Thryogenes nereis</i> (PAYKULL, 1800)	x	x	x	v	-
354	<i>Thryogenes festucae</i> (HERBST, 1795)	x		x	v	-
355	<i>Thryogenes scirrhosus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x		v	-

356	<i>Grypus equiseti</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	v	+-
357	<i>Grypus brunnirostris</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	z	+-
358	<i>Pachytychius haematocephalus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x		s	+-
359	<i>Pachytychius sparsutus</i> (OLIVIER, 1807)	x			ss	?
360	<i>Pseudostyphlus pillumus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x	x	v	+-
361	<i>Comasinus setiger</i> (BECK, 1817)	x	x	x	z	+-
362	<i>Smicronyx reichi</i> (GYLLENHAL, 1836)	x			s	+-
363	<i>Smicronyx swertiae</i> VOSS, 1953	x			s	+-
364	<i>Smicronyx jungermanniae</i> (REICH, 1797)	x	x	x	h	+-
365	<i>Smicronyx smreczynskii</i> SOLARI, 1952	x	x	x	v	+-
366	<i>Smicronyx coecus</i> (REICH, 1797)	x			v	+-
367	<i>Acalyptus carpini</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x		v	+-
368	<i>Ellescus scanicus</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	h	+-
369	<i>Ellescus bipunctatus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
370	<i>Ellescus infirmus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	s	-
371	<i>Lignyodes enucleator</i> (PANZER, 1798)	x	x		s	-
372	<i>Tychius quinquepunctatus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
373	<i>Tychius schneideri</i> (HERBST, 1795)	x	x		v	+-
374	<i>Tychius parallelus</i> (PANZER, 1794)	x		x	v	+-
375	<i>Tychius trivialis</i> BOHEMAN, 1843	x			s	-
376	<i>Tychius squamulatus</i> GYLLENHAL, 1836	x			h	+-
377	<i>Tychius junceus</i> (REICH, 1797)	x	x	x	v	+-
378	<i>Tychius aureolus</i> KIESENWETTER, 1851	x	x	x	v	+-
379	<i>Tychius medicaginis</i> CH.BRISOUT, 1862	x	x	x	h	+-
380	<i>Tychius brevisculus</i> DESBROCHERS, 1873	x	x	x	h	+-
381	<i>Tychius crassirostris</i> KIRSCH, 1871	x	x	x	v	+-
382	<i>Tychius picirostris</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	h	+-
383	<i>Tychius stephensi</i> SCHÖNHERR, 1836	x	x	x	h	+-
384	<i>Tychius sharpi</i> TOURNIER, 1873	x			s	+-
385	<i>Tychius pumilus</i> CH.BRISOUT, 1862	x			s	-
386	<i>Tychius meliloti</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	h	+-
387	<i>Tychius pusillus</i> GERMAR, 1842	x			s	?
388	<i>Tychius lineatulus</i> STEPHENS, 1831	x	x	x	z	+-
389	<i>Sibinia sodalis</i> GERMAR, 1824	x			z	+-
390	<i>Sibinia phalerata</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x	x	z	+-
391	<i>Sibinia primita</i> (HERBST, 1795)	x	x		z	?
392	<i>Sibinia variata</i> (GYLLENHAL, 1836)	x			s	?
393	<i>Sibinia unicolor</i> (FAHRAEUS, 1843)	x			s	+-
394	<i>Sibinia pyrrhodactyla</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	z	+-
395	<i>Sibinia pellucens</i> (SCOPOLI, 1772)	x	x	x	h	+-
396	<i>Sibinia viscariae</i> (LINNÉ, 1761)	x	x	x	z	+-
397	<i>Sibinia tibialis</i> GYLLENHAL, 1836	x			s	-
398	<i>Sibinia subelliptica</i> (DESBROCHERS, 1873)	x	x		z	-
399	<i>Anthonomus pomorum</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-

400	<i>Anthonomus humeralis</i> (PANZER, 1795)	x	x	x	z	+-
401	<i>Anthonomus kirschi</i> DESBROCHERS, 1868	x	x		s	+-
402	<i>Anthonomus piri</i> KOLLAR, 1837	x	x	x	z	+-
403	<i>Anthonomus ulmi</i> (DEGEER, 1775)	x		x	v	+-
404	<i>Anthonomus bituberculatus</i> THOMSON, 1868	x			s	?
405	<i>Anthonomus undulatus</i> GYLLENHAL, 1836	x			s	?
406	<i>Anthonomus pedicularius</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
407	<i>Anthonomus conspersus</i> DESBROCHERS, 1868	x	x	x	z	+-
408	<i>Anthonomus rufus</i> GYLLENHAL, 1836	x			s	+-
409	<i>Anthonomus rubi</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
410	<i>Anthonomus phyllocola</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
411	<i>Anthonomus pinivorax</i> SILFVERBERG, 1977	x	x	x	v	+-
412	<i>Anthonomus germanicus</i> DIECKMANN, 1968	x			s	-
413	<i>Furcipes rectirostris</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
414	<i>Brachonyx pineti</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	v	+-
415	<i>Bradybatus kellneri</i> BACH, 1854	x	x	x	v	+-
416	<i>Bradybatus fallax</i> GERSTÄCKER, 1860	x	x	x	z	+-
417	<i>Curculio elephas</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x		s	+
418	<i>Curculio venosus</i> (GRAVENHORST, 1807)	x	x	x	h	+-
419	<i>Curculio pellitus</i> (BOHEMAN, 1843)	x	x	x	v	+-
420	<i>Curculio villosus</i> FABRICIUS, 1781	x	x	x	v	+-
421	<i>Curculio nucum</i> LINNÉ, 1758	x	x	x	h	+-
422	<i>Curculio glandium</i> MARSHAM, 1802	x	x	x	h	+-
423	<i>Curculio betulae</i> (STEPHENS, 1831)	x		x	z	+-
424	<i>Curculio rubidus</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x	x	z	+-
425	<i>Curculio crux</i> FABRICIUS, 1776	x	x	x	h	+-
426	<i>Curculio salicivorus</i> PAYKULL, 1792	x	x	x	h	+-
427	<i>Curculio pyrrhoceras</i> MARSHAM, 1802	x	x	x	h	+-
428	<i>Pissodes piceae</i> (ILLIGER, 1807)	x	x	x	z	+-
429	<i>Pissodes castaneus</i> (DEGEER, 1775)	x	x	x	h	+-
430	<i>Pissodes validirostris</i> (SAHLBERG, 1834)	x	x	x	z	+-
431	<i>Pissodes scabricollis</i> MILLER, 1859	x	x	x	z	+-
432	<i>Pissodes pini</i> (LINNÉ, 1758)	x	x		h	+-
433	<i>Pissodes harcyniae</i> (HERBST, 1795)		x	x	s	?
434	<i>Pissodes piniphilus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
435	<i>Magdalis nitidipennis</i> (BOHEMAN, 1843)	x	x		v	+-
436	<i>Magdalis ruficornis</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
437	<i>Magdalis barbicornis</i> (LATREILLE, 1804)	x	x	x	z	+-
438	<i>Magdalis flavicornis</i> (GYLLENHAL, 1836)	x	x		v	+-
439	<i>Magdalis cerasi</i> (LINNÉ, 1758)	x		x	v	+-
440	<i>Magdalis exarata</i> (CH. BRISOUT, 1862)	x			v	+-
441	<i>Magdalis armigera</i> (FOURCROY, 1785)	x	x	x	h	+-
442	<i>Magdalis carbonaria</i> (LINNÉ, 1758)	x	x		z	+-
443	<i>Magdalis caucasica</i> TOURNIER, 1872	x			s	?

444	<i>Magdalis phlegmatica</i> (HERBST, 1797)	x	x		z	+-
445	<i>Magdalis nitida</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x	x	z	+-
446	<i>Magdalis memnonia</i> (GYLLENHAL, 1837)	x	x	x	v	+-
447	<i>Magdalis linearis</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x		z	+-
448	<i>Magdalis frontalis</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x		h	+-
449	<i>Magdalis violacea</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
450	<i>Magdalis duplicata</i> GERMAR, 1819	x	x	x	h	+-
451	<i>Trachodes hispidus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
452	<i>Lepyrus palustris</i> (SCOPOLI, 1763)	x			s	?
453	<i>Lepyrus capucinus</i> (SCHALLER, 1783)	x	x		v	+-
454	<i>Hylobius abietis</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
455	<i>Hylobius pinastri</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	z	-
456	<i>Hylobius transversovittatus</i> (GOEZE, 1777)	x	x		z	+-
457	<i>Liparus dirus</i> (HERBST, 1795)	x	x		s	-
458	<i>Liparus glabrirostris</i> KÜSTER, 1849	x	x	x	h	+-
459	<i>Liparus germanus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
460	<i>Liparus coronatus</i> (GOEZE, 1777)	x	x		v	+-
461	<i>Leiosoma deflexum</i> (PANZER, 1795)	x	x	x	v	+-
462	<i>Leiosoma cribrum</i> (GYLLENHAL, 1834)	x	x	x	z	+-
463	<i>Plinthus findeli</i> BOHEMAN, 1842	x		x	s	?
464	<i>Plinthus sturmi</i> GERMAR, 1824		x		ss	?
465	<i>Mitoplinthus caliginosus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	v	+-
466	<i>Adexius scrobipennis</i> GYLLENHAL, 1834		x		s	+-
467	<i>Minyops carinatus</i> (LINNÉ, 1767)	x	?		ss	?
468	<i>Alophus triguttatus</i> triguttatus (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	v	+-
469	<i>Donus ovalis</i> (BOHEMAN, 1842)	x		x	z	+-
470	<i>Donus tessellatus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
471	<i>Hypera zoilus</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x	x	h	+-
472	<i>Hypera dauci</i> (OLIVIER, 1807)	x			z	+-
473	<i>Hypera adspersa</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	h	+-
474	<i>Hypera rumicis</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
475	<i>Hypera arundinis</i> (PAYKULL, 1792)	x			s	-
476	<i>Hypera contaminata</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
477	<i>Hypera meles</i> (FABRICIUS, 1792)		x		z	+-
478	<i>Hypera arator</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
479	<i>Hypera folwacznyi</i> DIECKMANN, 1975			x	s	+-
480	<i>Hypera suspiciosa</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
481	<i>Hypera diversipunctata</i> (SCHRANK, 1798)	x	x	x	h	+-
482	<i>Hypera plantaginis</i> (DEGEER, 1775)	x	x	x	h	+-
483	<i>Hypera fuscocinerea</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+-
484	<i>Hypera postica postica</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	h	+-
485	<i>Hypera viciae</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	v	+-
496	<i>Hypera ononidis</i> (CHEVROLAT, 1863)	x	x		s	+-
487	<i>Hypera nigrirostris</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	h	+-

488	<i>Hypera venusta</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x	x	v	+-
489	<i>Limobius borealis</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	v	+-
490	<i>Gronops lunatus</i> (FABRICIUS, 1775)	x			z	+-
491	<i>Gronops inaequalis</i> BOHEMAN, 1842	x			z	+
492	<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (GOEZE, 1777)	x	x		ss	?
493	<i>Sitophilus granarius</i> (LINNÉ, 1758)	x	x		h	+-
494	<i>Sitophilus oryzae</i> (LINNÉ, 1763)	x	x		h	+-
495	<i>Sitophilus zeamais</i> MOTSCHULSKY, 1855	x			z	+-
496	<i>Gasterocercus depressirostris</i> (FABRICIUS, 1792)	x			ss	?
497	<i>Cryptorhynchus lapathi</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
498	<i>Acalles roboris</i> CURTIS, 1834	x	x	x	v	+-
499	<i>Acalles camelus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	+-
500	<i>Acalles echinatus</i> (GERMAR, 1824)	x	x	x	s	?
501	<i>Acalles commutatus</i> DIECKMANN, 1982	x	x		z	?
502	<i>Acalles hypocrita</i> BOHEMAN, 1837	x	x		v	+-
503	<i>Acallocrates denticollis</i> (GERMAR, 1824)	x			ss	?
504	<i>Baris artemisiae</i> (HERBST, 1795)	x			h	+-
505	<i>Baris laticollis</i> (MARSHAM, 1802)	x			v	+-
506	<i>Baris morio</i> (BOHEMAN, 1844)	x			z	+-
507	<i>Baris lepidii</i> GERMAR, 1824	x	x		z	+-
508	<i>Baris coerulescens</i> (SCOPOLI, 1763)	x			v	+-
509	<i>Baris cuprirostris</i> (FABRICIUS, 1787)	x			ss	?
510	<i>Baris picicornis</i> (MARSHAM, 1802)	x	x		v	+-
511	<i>Baris chlorizans</i> GERMAR, 1824	x			z	+-
512	<i>Limnobaris t-album atriplicis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	+-
513	<i>Limnobaris dolorosa</i> (GOEZE, 1777)	x	x	x	v	+-
514	<i>Corysomerus capucinus</i> (BECK, 1817)	x	x	x	v	+-
515	<i>Mononychus punctumalbum</i> (HERBST, 1784)	x	x	x	z	+-
516	<i>Eubrychius velutus</i> (BECK, 1817)	x	x		z	+-
517	<i>Phytobius leucogaster</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	z	+-
518	<i>Pelenomus comari</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
519	<i>Pelenomus waltoni</i> (BOHEMAN, 1843)	x	x		z	+-
520	<i>Pelenomus canaliculatus</i> (FAHRAEUS, 1843)	x	x		z	+-
521	<i>Pelenomus velaris</i> (GYLLENHAL, 1827)	x			s	?
522	<i>Pelenomus quadrituberculatus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	h	+-
523	<i>Pelenomus quadricorniger</i> (COLONNELLI, 1986)	x	x	x	z	+-
524	<i>Neophytobius muricatus</i> (CH.BRISOUT, 1867)	x			s	?
525	<i>Neophytobius quadrinodosus</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	z	+-
526	<i>Rhinoncus albicinctus</i> GYLLENHAL, 1837	x			s	?
527	<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (REICH, 1797)	x	x	x	h	+-
528	<i>Rhinoncus inconspectus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
529	<i>Rhinoncus pericarpus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
530	<i>Rhinoncus henningi</i> WAGNER, 1936	x	x	x	v	+-
531	<i>Rhinoncus bruchoides</i> (HERBST, 1784)	x	x	x	h	+-

532	Rhinoncus bosnicus SCHULTZE, 1900	x			z	+-
533	Rhinoncus castor (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	h	+-
534	Marmaropus besserii GYLLENHAL, 1837	x			s	?
535	Auleutes epilobii (PAYKULL, 1800)	x	x	x	z	+-
536	Rutidosoma globulus (HERBST, 1795)	x		x	z	+-
537	Rutidosoma fallax (OTTO, 1897)	x	x	x	v	+-
538	Amalus scortillum (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
539	Amalorrhynchus melanarius (STEPHENS, 1831)	x	x	x	z	+-
540	Drupenatus nasturtii (GERMAR, 1824)	x			s	?
541	Poophagus sisymbrii (FABRICIUS, 1777)	x			h	+-
542	Poophagus hopffgarteni TOURNIER, 1874	x			ss	?
543	Tapinotus sellatus (FABRICIUS, 1794)	x	x	x	v	+-
544	Coeliodes rubicundus (HERBST, 1795)	x	x	x	v	+-
545	Coeliodes nigritarsis HARTMANN, 1895		x		s	+-
546	Coeliodes dryados (GMELIN, 1790)	x	x	x	h	+-
547	Coeliodes trifasciatus BACH, 1854	x		x	z	+-
548	Coeliodes ruber (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+-
549	Coeliodes erythroleucos (GMELIN, 1790)	x	x	x	h	+-
550	Thamioecolus viduatus (GYLLENHAL, 1813)	x			z	+-
551	Thamioecolus pubicollis (GYLLENHAL, 1837)	x			s	?
552	Thamioecolus signatus (GYLLENHAL, 1837)	x			z	+-
553	Micrelus ericae (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	h	+-
554	Zacladus geranii (PAYKULL, 1800)	x	x	x	h	+-
555	Phrydiuchus topiarius (GERMAR, 1824)	x	x		z	+-
556	Ceutorhynchus scapularis GYLLENHAL, 1837	x		x	z	+-
557	Ceutorhynchus contractus (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+-
558	Ceutorhynchus erysimi (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	h	+-
559	Ceutorhynchus chlorophanus ROUGET, 1857	x	x		s	?
560	Ceutorhynchus ignitus GERMAR, 1824	x	x		z	+-
561	Ceutorhynchus barbareae SUFFRIAN, 1847	x			s	?
562	Ceutorhynchus carinatus GYLLENHAL, 1837	x			z	+-
563	Ceutorhynchus aeneicollis GERMAR, 1824	x			z	+-
564	Ceutorhynchus leprieuri CH.BRISOUT, 1881	x	x		z	+-
565	Ceutorhynchus chalybaeus GERMAR, 1824	x	x		z	+-
566	Ceutorhynchus pectoralis WEISE, 1895	x		x	v	+-
567	Ceutorhynchus hirtulus GERMAR, 1824	x	x		v	+-
568	Ceutorhynchus sulcicollis (PAYKULL, 1800)	x	x	x	v	+-
569	Ceutorhynchus picitarsis GYLLENHAL, 1837	x	x	x	h	+-
570	Ceutorhynchus pallidactylus (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+-
571	Ceutorhynchus atomus BOHEMAN, 1845	x	x	x	z	+-
572	Ceutorhynchus cochleariae (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	h	+-
573	Ceutorhynchus constrictus (MARSHAM, 1802)	x	x		h	+-
574	Ceutorhynchus plumbeus CH.BRISOUT, 1869	x			z	+-
575	Ceutorhynchus unguicularis THOMSON, 1871	x			z	+-

576	<i>Ceutorhynchus nigrutilus</i> SCHULTZE, 1896	x			s	?
577	<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+ -
578	<i>Ceutorhynchus sophiae</i> (STEVENS, 1829)	x	x		z	+ -
579	<i>Ceutorhynchus roberti</i> GYLLENHAL, 1837		x	x	z	+ -
580	<i>Ceutorhynchus alliariae</i> CH.BRISOUT, 1860	x	x	x	v	+ -
581	<i>Ceutorhynchus puncticollis</i> BOHEMAN, 1845	x			s	+ -
582	<i>Ceutorhynchus scrobicollis</i> NERESHEIMER & WAGNER, 1924	x			z	+ -
583	<i>Ceutorhynchus napi</i> GYLLENHAL, 1837	x	x	x	h	+ -
584	<i>Ceutorhynchus rapae</i> GYLLENHAL, 1837	x		x	z	+ -
585	<i>Ceutorhynchus obstructus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	h	+ -
586	<i>Ceutorhynchus gallorhenanus</i> SOLARI, 1949	x	x		s	+ -
587	<i>Ceutorhynchus griseus</i> CH.BRISOUT, 1869	x		x	ss	?
588	<i>Ceutorhynchus nanus</i> GYLLENHAL, 1837	x		x	s	+ -
589	<i>Ceutorhynchus angustus</i> DIECKMANN & SMRECZYNSKI, 1972	x			s	+ -
590	<i>Ceutorhynchus turbatus</i> SCHULTZE, 1903	x	x		h	+ -
591	<i>Ceutorhynchus parvulus</i> CH.BRISOUT, 1869	x	x	x	v	+ -
592	<i>Ceutorhynchus inaffectatus</i> GYLLENHAL, 1837	x	x	x	z	+ -
593	<i>Ceutorhynchus syrites</i> GERMAR, 1824	x	x	x	v	+ -
594	<i>Ceutorhynchus gerhardt</i> SCHULTZE, 1899	x	x	x	v	+ -
595	<i>Ceutorhynchus resedae</i> (MARSHAM, 1802)	x			z	+ -
596	<i>Ceutorhynchus floralis</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	h	+ -
597	<i>Ceutorhynchus posthumus</i> GERMAR, 1824	x	x		z	+ -
598	<i>Ceutorhynchus pumilio</i> (GYLLENHAL, 1827)	x			z	+ -
599	<i>Ceutorhynchus pulvinatus</i> GYLLENHAL, 1837	x	x	x	h	+ -
600	<i>Ceutorhynchus rhenanus</i> SCHULTZE, 1895	x			s	+ -
601	<i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+ -
602	<i>Ceutorhynchus sisymbrii</i> (DIECKMANN, 1966)	x			s	?
603	<i>Ceutorhynchus hampei</i> CH.BRISOUT, 1869	x			z	+ -
604	<i>Ranunculiphilus obsoletus</i> (GERMAR, 1824)	x			z	+ -
605	<i>Ranunculiphilus faeculentus</i> (GYLLENHAL, 1837)	x			z	+ -
606	<i>Oprohinus consputus</i> (GERMAR, 1824)	x			v	+ -
607	<i>Oprohinus suturalis</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x		v	+ -
608	<i>Ethelcus denticulatus</i> (SCHRANK, 1781)	x		x	s	?
609	<i>Parethelcus pollinarius</i> (FORSTER, 1771)	x	x	x	h	+ -
610	<i>Neoglocianus maculaalba</i> (HERBST, 1795)	x		x	z	+ -
611	<i>Glocianus distinctus</i> (CH.BRISOUT, 1870)	x	x	x	v	+ -
612	<i>Glocianus moelleri</i> (THOMSON, 1868)	x	x	x	z	+ -
613	<i>Glocianus punctiger</i> (GYLLENHAL, 1837)	x	x	x	h	+ -
614	<i>Datonychus arquatus</i> (HERBST, 1795)	x		x	z	+ -
615	<i>Datonychus angulosus</i> (BOHEMAN, 1845)	x	x	x	v	+ -
616	<i>Datonychus melanostictus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+ -
617	<i>Datonychus paszlavszkyi</i> (KUTHY, 1890)	x	x		s	-

618	<i>Datonychus magnini</i> (HOFFMANN, 1939)	x			s	-
619	<i>Microplontus rugulosus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
620	<i>Microplontus figuratus</i> (GYLLENHAL, 1837)	x	x		z	+-
621	<i>Microplontus triangulum</i> (BOHEMAN, 1845)		x		s	+-
622	<i>Microplontus millefolii</i> (SCHULTZE, 1897)	x			z	+-
623	<i>Microplontus campestris</i> (GYLLENHAL, 1837)	x	x	x	v	+-
624	<i>Hadroplontus trimaculatus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	v	+-
625	<i>Hadroplontus litura</i> (FABRICIUS, 1775)	x		x	v	+-
626	<i>Mogulones euphorbiae</i> (CH.BRISOUT, 1866)		x		s	+-
627	<i>Mogulones venedicus</i> (WEISE, 1879)	?			?	?
628	<i>Mogulones abbreviatulus</i> (FABRICIUS, 1792)	x		x	z	+-
629	<i>Mogulones borraginis</i> (FABRICIUS, 1792)	x		x	z	+-
630	<i>Mogulones pallidicornis</i> (CH.BRISOUT, 1860)	x			s	?
631	<i>Mogulones albosignatus</i> (GYLLENHAL, 1837)	x	x	x	s	?
632	<i>Mogulones asperifoliarum</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	h	+-
633	<i>Mogulones cruciger</i> (HERBST, 1784)	x	x	x	h	+-
634	<i>Mogulones javeti</i> (CH.BRISOUT, 1869)	x	x		s	?
635	<i>Mogulones ornatus</i> (GYLLENHAL, 1837)	x	x		ss	?
636	<i>Mogulones larvatus</i> (SCHULTZE, 1896)	x	x		s	?
637	<i>Mogulones symphyti</i> (BEDEL, 1885)	x			v	+-
638	<i>Mogulones geographicus</i> (GOEZE, 1777)	x	x	x	v	+-
639	<i>Sirocalodes nigrinus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+-
640	<i>Sirocalodes quercicola</i> (PAYKULL, 1792)	x	x	x	v	+-
641	<i>Calosirus terminatus</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	z	+-
642	<i>Calosirus apicalis</i> (GYLLENHAL, 1827)	?			?	?
643	<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	h	+-
644	<i>Trichosirocalus hassicus</i> (SCHULTZE, 1903)	x			ss	?
645	<i>Trichosirocalus barnevillei</i> (GRENIER, 1866)	x	x	x	v	+-
646	<i>Trichosirocalus rufulus</i> (DUFOUR., 1851)	x			ss	?
647	<i>Trichosirocalus thalhammeri</i> (SCHULTZE, 1906)	x			s	?
648	<i>Trichosirocalus horridus</i> (PANZER, 1801)	x		x	v	+-
649	<i>Stenocarus ruficornis</i> (STEPHENS, 1831)	x	x	x	h	+-
650	<i>Stenocarus cardui</i> (HERBST, 1784)	x	x		ss	?
651	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
652	<i>Coeliasites lamii</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	+-
653	<i>Orobitis cyaneus</i> (LINNÉ, 1758)	x	x	x	v	+-
654	<i>Mecinus collaris</i> GERMAR, 1821	x			v	+-
655	<i>Mecinus janthinus</i> (GERMAR, 1817)	x			v	+-
656	<i>Mecinus heydeni</i> WENCKER, 1866	x	x		z	+-
657	<i>Mecinus pyraister</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
658	<i>Gymnetron labile</i> (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
659	<i>Gymnetron pascuorum</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	h	+-
660	<i>Gymnetron rostellum</i> (HERBST, 1795)	x	x		z	+-
661	<i>Gymnetron stimulosum</i> (GERMAR, 1821)	x			s	+-

662	Gymnetron melanarium (GERMAR, 1821)	x	x	x	s	+-
663	Gymnetron villosulum GYLLENHAL, 1838	x		x	z	+-
664	Gymnetron beccabungae (LINNÉ, 1761)	x			s	?
665	Gymnetron veronicae (GERMAR, 1821)	x	x	x	v	+-
666	Gymnetron plantaginis EPPELSHEIM, 1875			x	s	+-
667	Gymnetron tetrum (FABRICIUS, 1792)	x	x		h	+-
668	Gymnetron antirrhini (PAYKULL, 1800)	x	x	x	h	+-
669	Gymnetron melas BOHEMAN, 1838	x	x		z	+-
670	Gymnetron netum (GERMAR, 1821)	x		x	v	+-
671	Gymnetron collinum (GYLLENHAL, 1813)	x			v	+-
672	Gymnetron bipustulatum (ROSSI, 1792)	x			s	+-
673	Gymnetron linariae (PANZER, 1792)	x	x	x	v	+-
674	Miarus micros (GERMAR, 1821)	x			s	?
675	Miarus graminis (GYLLENHAL, 1813)	x	x	x	z	+-
676	Miarus ajugae (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
677	Miarus campanulae (LINNÉ, 1767)	x		x	v	+-
678	Miarus monticola PETRI, 1912		x	x	v	+-
679	Cionus alauda (HERBST, 1784)	x	x	x	h	+-
680	Cionus tuberculosus (SCOPOLI, 1763)	x	x	x	h	+-
681	Cionus scrophulariae (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
682	Cionus hortulanus (FOURCROY, 1785)	x	x	x	h	+-
683	Cionus montanus WINGELMÜLLER, 1914	x	x	x	s	?
684	Cionus ganglbaueri WINGELMÜLLER, 1914	x			s	+-
685	Cionus thapsus (FABRICIUS, 1792)	x			v	+-
686	Cionus nigratarsis REITTER, 1904	x	x	x	h	+-
687	Cionus leonhardi WINGELMÜLLER, 1914	x			s	+-
688	Cleopus solani (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	v	-
689	Cleopus pulchellus (HERBST, 1795)	x	x		v	+-
690	Stereonychus fraxini (DEGEER, 1775)	x	x	x	h	+-
691	Anoplus plantaris (NAEZEN, 1794)	x	x		h	+-
692	Anoplus roboris SUFFRIAN, 1840	x	x		v	+-
693	Rhynchaenus rufus (SCHRANK, 1781)	x			z	+-
694	Rhynchaenus alni (LINNÉ, 1758)	x			z	+-
695	Rhynchaenus pilosus (FABRICIUS, 1781)	x	x		v	+-
696	Rhynchaenus quercus (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
697	Rhynchaenus erythropus (GERMAR, 1821)		x		v	+-
698	Rhynchaenus signifer (CREUTZER, 1799)	x	x		v	+-
699	Rhynchaenus jota (FABRICIUS, 1787)	x	x		z	+-
700	Rhynchaenus loniceriae (HERBST, 1795)	x	x		v	+-
701	Rhynchaenus fagi (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
702	Rhynchaenus testaceus (MÜLLER., 1776)	x	x		z	+-
703	Rhynchaenus rusci (HERBST, 1795)	x	x		v	+-
704	Rhynchaenus pratensis (GERMAR, 1821)	x	x		s	?
705	Rhynchaenus ermischii DIECKMANN, 1958	x	x	x	v	+-

706	Rhynchaenus stigma (GERMAR, 1821)	x	x	x	v	+-
707	Rhynchaenus pseudostigma TEMPÈRE, 1982	x		x	z	+-
708	Rhynchaenus decoratus (GERMAR, 1821)	x	x	x	v	+-
709	Rhynchaenus salicis (LINNÉ, 1758)	x	x	x	h	+-
710	Rhynchaenus rufitarsis (GERMAR, 1821)	x	x		s	?
711	Rhynchaenus populicola SILFVERBERG, 1977	x	x	x	h	+-
712	Rhynchaenus angustifrons (WEST, 1917)	x			z	+-
713	Rhamphus pulicarius (HERBST, 1795)	x	x	x	h	+-
714	Rhamphus oxyacanthae (MARSHAM, 1802)	x	x	x	v	+-
715	Rhamphus subaeneus ILLIGER, 1807	x	x		s	+-

Literatur:

- FREUDE, H.; HARDE, K.W. & LOHSE, G.A. (1981): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 10.- Goecke & Evers, Krefeld.
- (1983): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 11.- Goecke & Evers, Krefeld.
LOHSE, G.A. & LUCHT, W.H. (1994): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 14, 3. Suppl.bd.- Goecke & Evers, Krefeld.
RAIP, O. (1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, Bd. II.- Erfurt, Selbstverlag.

Anschrift des Verfassers: Lutz Behne, Projektgruppe Entomologie in der Fachhochschule Eberswalde
(Deutsches Entomologisches Institut), Postfach 100238, D-16202 Eberswalde

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Behne Lutz

Artikel/Article: [Checklist der Rüsselkäfer \(Coleoptera, Curculionioidea\) Thüringens 28-45](#)