

Checklist der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) Thüringens

Stand: 01.06.1994

PAUL - WALTER LÖHR, Mücke-Merlau

Zur Erstellung dieser Checkliste wurden vom Autor die wichtigsten Sammlungen in Thüringen überprüft. Dabei handelt es sich um die

- Sammlung Thüringer Dipteren, Sammlung JÄNNER, Sammlung GERBING; alle am Museum der Natur Gotha und determiniert vom Verfasser
- Sammlung R.BELLSTEDT, Museum der Natur Gotha, determiniert von S.TOTH und H.PELLMANN
- Sammlung H.UTHLEB, Erfurt (det. H. Uthleb)
- Sammlung W.SCHORCHT, Walldorf/Werra (det. W.Schorcht)

An vielen Tieren der Sammlung GERBING befindet sich kein Fundortetikett. Nach Aussagen von Herrn R.Bellstedt muß aber davon ausgegangen werden, daß alle Tiere aus Schnepfenthal und Umgebung stammen. Gerbing hat weder an anderen Orten gesammelt noch getauscht.

Aus der Sammlung JÄNNER wurden nur die Fliegen berücksichtigt, deren Fundort eindeutig in Thüringen liegen.

Bei der Nachbestimmung und Bestimmung einer ganzen Reihe schwieriger Arten half Herr Claus CLAUBEN, Flensburg. Ich danke ihm an dieser Stelle für seine Hilfe.

Die vorliegende Liste enthält 275 Arten. Mit dem Auftreten weiterer Arten ist zu rechnen, da es sich hier nur um einen ersten Überblick handelt. Ebenso wurde die weiterführende faunistische Literatur noch nicht ausgewertet.

Angaben zur Häufigkeit und Tendenz können nicht gegeben werden und sind einem späteren Zeitpunkt, mit besserem Kenntnisstand der Schwebfliegenfauna, vorbehalten.

SYRPHINAE

Paragini

1. *Paragus bicolor* (FABRICIUS, 1794)
2. *Paragus finitimus* GOELDLIN, 1971
3. *Paragus flammeus* GOELDLIN, 1971
4. *Paragus haemorrhous* MEIGEN, 1822
5. *Paragus majoranae* RONDANI, 1857

Bachini

6. *Baccha elongata* (FABRICIUS, 1775)
7. *Baccha obscuripennis* MEIGEN, 1822

Melanostomatini

8. *Xanthandrus comtus* (HARRIS, 1780)
9. *Melanostoma mellinum* (LINNAEUS, 1758)
10. *Melanostoma scalare* (FABRICIUS, 1794)
11. *Pachysphyria ambigua* (FALLEN, 1817)
12. *Platycheirus albimanus* (FABRICIUS, 1781)
13. *Platycheirus angustatus* (ZETTERSTEDT, 1843)
14. *Platycheirus clypeatus* (MEIGEN, 1822)
15. *Platycheirus discimanus* LOEW, 1871
16. *Platycheirus europaeus* GOELDLIN, MAIBACH et SPEIGHT 1990
17. *Platycheirus fulviventris* (MACQUART, 1829)
18. *Platycheirus immarginatus* (STAEGER, 1849)
19. *Platycheirus manicatus* (MEIGEN, 1822)
20. *Platycheirus occultus* GOELDLIN, MAIBACH et SPEIGHT 1990
21. *Platycheirus parmatus* RONDANI, 1857 (= *Platycheirus ovalis* BECKER, 1921)
22. *Platycheirus peltatus* (MEIGEN, 1822)
23. *Platycheirus perpallidus* VERRALL, 1901
24. *Platycheirus podagratus* (ZETTERSTEDT, 1838)
25. *Platycheirus scambus* (STAEGER, 1843)
26. *Platycheirus scutatus* (MEIGEN, 1822)
27. *Platycheirus tarsalis* (SCHUMMEL, 1836)
28. *Pyrophæna granditarsa* (FORSTER, 1771)
29. *Pyrophæna rosarum* (FABRICIUS, 1787)

Chrysotoxini

30. *Chrysotoxum arcuatum* (LINNAEUS, 1758)
(= *Chr. festivum* auct.nec.LINNAEUS, 1758)
31. *Chrysotoxum bicinctum* (LINNAEUS, 1758)
32. *Chrysotoxum cautum* (HARRIS, 1776)
33. *Chrysotoxum elegans* LOEW, 1841
34. *Chrysotoxum fasciatum* (MÜLLER, 1764)
(= *Chr. arcuatum* auct.nec. LINNAEUS, 1758)
35. *Chrysotoxum fasciolatum* (DEGEER, 1776)
36. *Chrysotoxum intermedium* MEIGEN, 1822
37. *Chrysotoxum octomaculatum* CURTIS, 1837
38. *Chrysotoxum vernale* LOEW, 1841
39. *Chrysotoxum verralli* COLLIN, 1940

Syrphini

40. *Syrphus nitidifrons* BECKER, 1921
41. *Syrphus ribesii* (LINNAEUS, 1758)
42. *Syrphus torvus* OSTEN-SACKEN, 1875
43. *Syrphus vitripennis* MEIGEN, 1822

44. *Epistrophella euchroma* (KOWARZ, 1885)
45. *Epistrophe diaphana* (ZETTERSTEDT, 1843)
46. *Epistrophe eligans* (HARRIS, 1780)
47. *Epistrophe grossularie* (MEIGEN, 1822)
48. *Epistrophe melanostoma* (ZETTERSTEDT, 1843)
49. *Epistrophe melanostomoides* (STROBL, 1880) sensu GOOT 1981
50. *Epistrophe nitidicollis* (MEIGEN, 1822)
51. *Epistrophe ochrostoma* (ZETTERSTEDT, 1849)
52. *Metasyrphus corollae* (FABRICIUS, 1794)
53. *Metasyrphus latifasciatus* (MACQUART, 1829)
54. *Metasyrphus latilunulatus* (COLLIN, 1931)
55. *Metasyrphus luniger* (MEIGEN, 1822)
56. *Metasyrphus nitens* (ZETTERSTEDT, 1843)
57. *Lapposyrphus lapponicus* (ZETTERSTEDT, 1838)
58. *Scaeva pyrastris* (LINNAEUS, 1758)
59. *Scaeva selenitica* (MEIGEN, 1822)
60. *Dasysyrphus albostriatus* (FALLEN, 1817)
61. *Dasysyrphus friuliensis* (VAN DER GOOT, 1960)
62. *Dasysyrphus hilaris* (ZETTERSTEDT, 1843)
63. *Dasysyrphus pinastri* (DEGEER, 1776) (= *D. lunulatus* auct.nec. MEIGEN, 1822)
64. *Dasysyrphus tricinctus* (FALLEN, 1817)
65. *Dasysyrphus venustus* (MEIGEN, 1822)
66. *Leucozona lucorum* (LINNAEUS, 1758)
67. *Ischyrosyrphus glaucius* (LINNAEUS, 1758)
68. *Ischyrosyrphus laternarius* (MÜLLER, 1776)
69. *Melangyna barbifrons* (FALLEN, 1817)
70. *Melangyna labiatarum* (VERRALL, 1901)
71. *Melangyna lasiophthalma* (ZETTERSTEDT, 1843)
72. *Melangyna quadrimaculata* (VERRALL, 1873)
73. *Melanyna umbellatarum* (FABRICIUS, 1794)
74. *Fagisyrphus cinctus* (FALLEN, 1817)
75. *Meligramma triangulifera* (ZETTERSTEDT, 1843)
76. *Parasyrphus annulatus* (ZETTERSTEDT, 1838)
77. *Parasyrphus lineolus* (ZETTERSTEDT, 1843)
78. *Parasyrphus macularis* (ZETTERSTEDT, 1843)
79. *Parasyrphus punctulatus* (VERRALL, 1873)
80. *Parasyrphus vittiger* (ZETTERSTEDT, 1843)
81. *Xanthogramma dives* (RONDANI, 1857)
82. *Xanthogramma festivum* (LINNAEUS, 1758)(= *X. citrofasciatum* (DEGEER, 1776))
83. *Xanthogramma pedissequum* (HARRIS, 1776)
84. *Olbiosyrphus laetus* (FABRICIUS, 1794)
85. *Doros profuges* (HARRIS, 1780) (= *Doros conopseus* (FABRICIUS, 1775)
86. *Didea alneti* (FALLEN, 1817)
87. *Didea fasciata* MACQUART, 1834
88. *Didea intermedia* LOEW, 1854
89. *Eriozona syrphoides* (FALLEN, 1817)

90. *Megasyrphus erraticus* (LINNAEUS, 1758) (= *M. annulipes* ZETTERSTEDT, 1838)
91. *Meliscaeva auricollis* (MEIGEN, 1822)
92. *Meliscaeva cinctella* (ZETTERSTEDT, 1843)
93. *Episyrphus balteatus* (DEGEER, 1776)
94. *Sphaerophoria bankowskiae* GOELDLIN, 1989
95. *Sphaerophoria batava* GOELDLIN, 1974
96. *Sphaerophoria loewi* ZETTERSTEDT, 1843
97. *Sphaerophoria menthastri* (LINNAEUS, 1758)
98. *Sphaerophoria philantha* (MEIGEN, 1822)
99. *Sphaerophoria rueppelli* (Wiedemann, 1830)
100. *Sphaerophoria scripta* (LINNAEUS, 1758)
101. *Sphaerophoria shirchan* VIOLOVITSH, 1957)
102. *Sphaerophoria taeniata* (MEIGEN, 1822)
103. *Sphaerophoria virgata* GOELDLIN, 1974

MICRODONTINAE

Microdontini

104. *Microdon devius* (LINNAEUS, 1761)
105. *Microdon eggeri* MIK, 1897
106. *Microdon mutabilis* (LINNAEUS, 1758)

ERISTALINAE

Pipizini

107. *Pipiza austriaca* MEIGEN, 1822
108. *Pipiza bimaculata* MEIGEN, 1822
109. *Pipiza festiva* MEIGEN, 1822
110. *Pipiza lugubris* (FABRICIUS, 1775)
111. *Pipiza luteitarsis* ZETTERSTEDT, 1843
112. *Pipiza noctiluca* (LINNAEUS, 1758)
113. *Pipiza quadrimaculata* (PANZER, 1804)
114. *Triglyphus primus* LOEW, 1840
115. *Heringia heringi* (ZETTERSTEDT, 1843)
116. *Heringia senilis* SACK, 1938
117. *Trichopsomyia carbonaria* (MEIGEN, 1822) sensu GOOT 1981
118. *Trichopsomyia flavitarsis* (MEIGEN, 1822)
119. *Pipizella annulata* (MACQUART, 1829)
120. *Pipizella divicoi* (GOELDLIN, 1974)
121. *Pipizella viduata* (LINNAEUS, 1758) (= *Pipizella varipes* [MEIGEN, 1822])
122. *Pipizella virens* (FABRICIUS, 1805)
123. *Neocnemodon fulvimanus* (ZETTERSTEDT, 1843)
124. *Neocnemodon pubescens* (DELUCCHI & PSCHORN-WALCHER, 1955)
125. *Neocnemodon vitripennis* (MEIGEN, 1822)

Cheilosini

126. *Portevinia maculata* (FALLEN, 1817)

Gruppe A

127. *Cheilosia antiqua* (MEIGEN, 1822)
128. *Cheilosia derasa* LOEW, 1857
129. *Cheilosia impudens* BECKER, 1894
130. *Cheilosia longula* (ZETTERSTEDT, 1838)
131. *Cheilosia nasutula* BECKER, 1894
132. *Cheilosia nigripes* (MEIGEN, 1822)
133. *Cheilosia pagana* (MEIGEN, 1822)
134. *Cheilosia personata* LOEW, 1857
135. *Cheilosia pubera* (ZETTERSTEDT, 1836)
136. *Cheilosia scutellata* (FALLEN, 1817)
137. *Cheilosia soror* (ZETTERSTEDT, 1843)

Gruppe B

138. *Cheilosia barbata* LOEW, 1857
139. *Cheilosia frontalis* LOEW, 1857
140. *Cheilosia latifrons* (ZETTERSTEDT, 1843) (= *Cheilosia intonsa* LOEW, 1857)
141. *Cheilosia illustrata* (HARRIS, 1780)
142. *Cheilosia lasiopa* (KOWARZ, 1885)
(= *Cheilosia honesta* auct. nec RONDANI, 1868)
143. *Cheilosia variabilis* (PANZER, 1798)
144. *Cheilosia vulpina* (MEIGEN, 1822)

Gruppe C

145. *Cheilosia albipila* MEIGEN, 1838
146. *Cheilosia canicularis* (PANZER, 1801)
147. *Cheilosia chloris* (MEIGEN, 1822)
148. *Cheilosia chrysocoma* (MEIGEN, 1822)
149. *Cheilosia flavipes* (PANZER, 1798)
150. *Cheilosia grossa* (FALLEN, 1817)

Gruppe D

151. *Cheilosia albitarsis* (MEIGEN, 1822)
152. *Cheilosia bergenstammi* BECKER, 1894
153. *Cheilosia carbonaria* EGGER, 1860
154. *Cheilosia cynocephala* LOEW, 1840
155. *Cheilosia fasciata* SCHINER et EGGER, 1853

156. *Cheilosia fraterna* (MEIGEN, 1830)
157. *Cheilosia impressa* LOEW, 1840
158. *Cheilosia lenis* BECKER, 1894
159. *Cheilosia melanura* BECKER, 1894
160. *Cheilosia morio* (ZETTERSTEDT, 1838)
161. *Cheilosia mutabilis* (FALLEN, 1817)
162. *Cheilosia praecox* (ZETTERSTEDT, 1843)
163. *Cheilosia proxima* (ZETTERSTEDT, 1843)
164. *Cheilosia psilophthalma* BECKER, 1894.
165. *Cheilosia ruficollis* BECKER, 1894
166. *Cheilosia semifasciata* (BECKER, 1894)
167. *Cheilosia velutina* LOEW, 1840
168. *Cheilosia vernalis* (FALLEN, 1817)
169. *Cheilosia zetterstedti* BECKER, 1894
170. *Ferdinandea cuprea* (SCOPOLI, 1763)
171. *Ferdinandea ruficornis* (FABRICIUS, 1775)
172. *Rhingia campestris* MEIGEN, 1822
173. *Rhingia rostrata* (LINNAEUS, 1758)
174. *Psarus abdominalis* (FABRICIUS, 1794)
175. *Callicera rufa* SCHUMMEL, 1842
176. *Chamaesyrrhus scaevoides* (FALLEN, 1817)

Volucellini

177. *Volucella bombylans* (LINNAEUS, 1758)
178. *Volucella inanis* (LINNAEUS, 1758)
179. *Volucella pellucens* (LINNAEUS, 1758)
180. *Volucella zonaria* (PODA, 1761)

Sericomyini

181. *Sericomyia lappona* (LINNAEUS, 1758)
182. *Sericomyia silentis* (HARRIS, 1776)
183. *Arctophila bombiformis* (FALLEN, 1810)
184. *Arctophila superbiens* (MÜLLER, 1776)
(= *Arctophila mussitans* (FABRICIUS, 1776))

Brachyopini

185. *Neoascia annexa* (MÜLLER, 1776) (= *Neoascia floralis* [MEIGEN, 1822])
186. *Neoascia interrupta* (MEIGEN, 1822)
187. *Neoascia meticulosa* (SCOPOLI, 1763) (= *Neoascia aenea* [MEIGEN, 1822])
188. *Neoascia obliqua* COE, 1940
189. *Neoascia podagrica* (FABRICIUS, 1775)
190. *Neoascia tenur* (HARRIS, 1780) (= *Neoascia dispar* [MEIGEN, 1822])
191. *Sphegina clunipes* (FALLEN, 1816)

192. *Sphegina elegans* SCHUMMEL, 1843 (= *Sphegina kimakowiczi* [STROBL, 1897])
193. *Sphegina verecunda* COLLIN, 1937
194. *Brachyopa bicolor* (FALLEN, 1817)
195. *Brachyopa dorsata* ZETTERSTEDT, 1837
196. *Brachyopa insensilis* COLLIN, 1939
197. *Brachyopa panzeri* GOFFE, 1945
198. *Brachyopa pilosa* COLLIN, 1939
199. *Brachyopa scutellaris* ROBINEAU - DESVOIDY, 1844
200. *Brachyopa testacea* (FALLEN, 1817)
201. *Hammerschmidtia ferruginea* (FALLEN, 1817)
202. *Orhonevra nobilis* (FALLEN, 1817)
203. *Chrysogaster basalis* LOEW, 1857
204. *Chrysogaster cemiteriorum* (LINNAEUS, 1758) (= *Chr. chalybeata* MEIGEN, 1822)
205. *Chrysogaster hirtella* LOEW, 1843
206. *Chrysogaster lucida* (SCOPOLI, 1763) (= *Chr. viduata* auct.nec LINNAEUS, 1758)
207. *Chrysogaster marquarti* LOEW, 1843
208. *Chrysogaster solstitialis* (FALLEN, 1817)
209. *Chrysogaster virescens* LOEW, 1854
210. *Lejogaster metallina* (FABRICIUS, 1777)
211. *Myolepta dubia* (FABRICIUS, 1805) (= *Mylepta luteola* (GMELIN, 1790))
212. *Myolepta vara* (PANZER, 1798)

Merodontini

213. *Eumerus flavitarsis* ZETTERSTEDT, 1843
214. *Eumerus longicornis* LOEW, 1855
215. *Eumerus ornatus* MEIGEN, 1822
216. *Eumerus sogdianus* STACKELBERG, 1952
217. *Eumerus strigatus* (FALLEN, 1817)
218. *Eumerus tarsalis* LOEW, 1848
219. *Eumerus tricolor* (FABRICIUS, 1798)
220. *Eumerus tuberculatus* RONDANI, 1857
221. *Merodon aeneus* MEIGEN, 1822
222. *Merodon cinereus* (FABRICIUS, 1794)
223. *Merodon constans* (ROSSI, 1794)
224. *Merodon equestris* (FABRICIUS, 1794)
225. *Merodon nigratarsis* RONDANI, 1845
226. *Merodon rufus* MEIGEN, 1838

Cerioidini

227. *Ceriana conopsoides* (LINNAEUS, 1758)
228. *Sphiximorpha subsessilis* (ILLIGER, 1807)

Eristalini

- 229. *Helophilus interpunctatus* (HARRIS, 1776)
- 230. *Helophilus pendulus* (LINNAEUS, 1758)
- 231. *Helophilus trivittatus* (FABRICIUS, 1805)
- 232. *Parhelophilus frutetorum* (FABRICIUS, 1775)
- 233. *Parhelophilus versicolor* (FABRICIUS, 1794)
- 234. *Eurimyia lineata* (FABRICIUS, 1787)
- 235. *Anasimyia contracta* CLAUSSEN et TORP, 1980
- 236. *Anasimyia interpuncta* (HARRIS, 1776)
- 237. *Anasimyia transfuga* (LINNAEUS, 1758)
- 238. *Myathropa florea* (LINNAEUS, 1758)
- 239. *Mallota fuciformis* (FABRICIUS, 1794)
- 240. *Eristalis tenax* (LINNAEUS, 1758)
- 241. *Eoseristalis abusivus* COLLIN, 1931
- 242. *Eoseristalis alpinus* (PANZER, 1789)
- 243. *Eoseristalis arbustorum* (LINNAEUS, 1758)
- 244. *Eoseristalis cryptarum* (FABRICIUS, 1794)
- 245. *Eoseristalis horticola* (DEGEER, 1776)
- 246. *Eoseristalis interrupta* (PODA, 1761) (= *Eoseristalis nemorum* [LINNAEUS, 1758])
- 247. *Eoseristalis intricarius* (LINNAEUS, 1758)
- 248. *Eoseristalis jugorum* (EGGER, 1858)
- 249. *Eoseristalis pertinax* (SCOPOLI, 1763)
- 250. *Eoseristalis piceus* (FALLEN, 1817)
- 251. *Eoseristalis pratorum* (MEIGEN, 1822)
- 252. *Eoseristalis rupium* (FABRICIUS, 1805)
- 253. *Eristalinus sepulchralis* (LINNAEUS, 1758)
- 254. *Lathyrophthalmus aeneus* (SCOPOLI, 1763)

Milesini

- 255. *Criorhina asilica* (FALLEN, 1816)
- 256. *Criorhina berberina* (FABRICIUS, 1805)
- 257. *Criorhina ranunculi* (PANZER, 1804)
- 258. *Caliprobola speciosa* (ROSSI, 1790)
- 259. *Blera fallax* (LINNAEUS, 1758)
- 260. *Temnostoma bombylans* (FABRICIUS, 1805)
- 261. *Temnostoma vespiforme* (LINNAEUS, 1758)
- 262. *Tropidia scita* (HARRIS, 1780)
- 263. *Syrirta pipiens* (LINNAEUS, 1758)
- 264. *Xylota coeruleiventris* ZETTERSTEDT, 1838
- 265. *Xylota florum* (FABRICIUS, 1805)
- 266. *Xylota ignava* (PANZER, 1798)
- 267. *Xylota segnis* (LINNAEUS, 1758)
- 268. *Xylota sylvarum* (LINNAEUS, 1758)

- 269. *Xylota tarda* MEIGEN, 1822
- 270. *Xylota xanthocnema* COLLIN, 1939
- 271. *Chalcosyrphus eunotus* (LOEW, 1873)
- 272. *Chalcosyrphus nemorum* (FABRICIUS, 1805)
- 273. *Chalcosyrphus valgus* (GMELIN, 1790)
(= *Ch. femoratus* auct. nec LINNAEUS, 1758)
- 274. *Brachypalpus lentus* (MEIGEN, 1822)
- 275. *Brachypalpus chrysites* EGGER, 1859
- 276. *Brachypalpus laphriformis* (FALLEN, 1816)
- 277. *Brachypalpus valgus* (PANZER, 1798)
- 278. *Pocota personata* (HARRIS, 1780)

Anschrift des Verfassers: Paul - Walter Löhr, Burgwaldstr. 15, D - 35325 Mücke-Merlau

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Löhr Paul-Walter

Artikel/Article: [Checklist der Schwebfliegen \(Diptera, Syrphidae\) Thüringens 80-88](#)