

# **Checklist der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens**

Stand: 01.09.1995

**WOLFGANG APFEL, Eisenach**

Die vorliegende Liste enthält 1004 für Thüringen nachgewiesene Arten und Unterarten. Eine Anzahl der von RAPP (1933) aufgeführten Meldungen konnten jedoch nicht verwendet werden.

Zum einen liegen die alten Fundorte nicht in Thüringen und zum anderen handelt es sich um Meldungen von Arten, deren Vorkommen in Thüringen als zweifelhaft anzusehen ist. Neufunde dieser meist alpinen Arten könnten diese Zweifel ausräumen. Eine Überprüfung der fraglichen Belege wurde durch den Autor noch nicht durchgeführt. Sicherheitshalber wurden diese Arten nicht in der Checkliste aufgeführt. Die Belege alter Funde befinden sich hauptsächlich in den Sammlungen RAPP und KELLNER im Museum der Natur Gotha. Die Nachweise der Arten nach 1960 stammen aus zuverlässigen Quellen, die Belege befinden sich in den Sammlungen der Staphyliniden-Bearbeiter: Dr. L. Zerche (Deutsches Entomologisches Institut Eberswalde), J. Vogel (Görlitz), H. Klima (Sonneberg), Dr. K. Renner (Bielefeld), im Naturkundemuseum Erfurt und in der Sammlung des Autors. Als Bezugszeitraum wurde das Jahr 1960 gewählt, da die letzte größere Zusammenstellung aus dem Jahre 1953 vorliegt (RAPP 1953), lediglich LIEBMANN (1955) nennt noch eine Anzahl von Funden.

Die Systematik der aufgeführten Arten folgt im wesentlichen den Bänden 4 und 5 des FREUDE-HARDE-LOHSE (1964, 1974), einschließlich des Ergänzungsbandes (LOHSE & LUCHT 1989).

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Herrn Dr. Lothar Zerche (Eberswalde), Herrn Dr. Klaus Renner (Bielefeld) und Herrn Dipl.-Biol. Helmuth Klima (Sonneberg) für die vielen Hinweise und Anregungen.

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	<b>STAPHYLINIDAE</b>		
	<b>Micropeplinae</b>		
1	<i>Micropeplus fulvus</i> ERICHSON, 1840	x	x
2	<i>Micropeplus marietti</i> DUVAL, 1857	x	x
3	<i>Micropeplus longipennis</i> KRAATZ, 1859	x	x
4	<i>Micropeplus porcatus</i> (FABRICIUS, 1798)	x	x
	<b>Piestinae</b>		
5	<i>Siagonium quadricorne</i> KIRBY, 1815	x	x
	<b>Pseudopsinae</b>		
6	<i>Pseudopsis sulcata</i> NEWMAN, 1834	x	
	<b>Phloechariniae</b>		
7	<i>Phloeocharis subtilissima</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
	<b>Metopsiinae</b>		
8	<i>Metopsia clypeata</i> (MÜLLER, 1821)	x	x
	<b>Proteininae</b>		
9	<i>Megarthrus depressus</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
10	<i>Megarthrus sinuaticollis</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
11	<i>Megarthrus affinis</i> (MILLER, 1852)	x	x
12	<i>Megarthrus denticollis</i> (BECK, 1817)	x	x
13	<i>Megarthrus nitidulus</i> KRAATZ, 1858	x	x
14	<i>Megarthrus hemipterus</i> (ILLIGER, 1794)	x	x
15	<i>Proteinus ovalis</i> STEPHENS, 1834	x	x
16	<i>Proteinus crenulatus</i> PANDELLE, 1867		x
17	<i>Proteinus brachypterus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
18	<i>Proteinus atomarius</i> ERICHSON, 1840	x	x
19	<i>Proteinus macropterus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
	<b>Omaliinae</b>		
20	<i>Eusphalerum alpinum</i> (HEER, 1838)	x	x
21	<i>Eusphalerum anale</i> (ERICHSON, 1840)	x	
22	<i>Eusphalerum longipenne</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
23	<i>Eusphalerum stramineum</i> (KRAATZ, 1857)	x	x
24	<i>Eusphalerum primulae</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
25	<i>Eusphalerum minutum</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
26	<i>Eusphalerum abdominale</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
27	<i>Eusphalerum luteum</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
28	<i>Eusphalerum marshami</i> (FAUVEL, 1868)	x	x
29	<i>Eusphalerum signatum</i> (MÄRKEL, 1857)	x	x
30	<i>Eusphalerum limbatum</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
31	<i>Eusphalerum pseudaucupariae</i> (STRAND, 1917)	x	x
32	<i>Eusphalerum rectangulum</i> (FAUVEL, 1869)	x	x
33	<i>Eusphalerum sorbi</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
34	<i>Eusphalerum torquatum</i> (MARSHAM, 1802)	x	
35	<i>Eusphalerum atrum</i> (HEER, 1838)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
36	<i>Eusphalerum florale</i> (PANZER, 1793)	x	
37	<i>Acrulia inflata</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	x
38	<i>Elonium minuta</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
39	<i>Elonium amabilis</i> (HEER, 1838)	x	
40	<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
41	<i>Phyllodrepa salicis</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	
42	<i>Phyllodrepa nigra</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
43	<i>Phyllodrepa floralis</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
44	<i>Phyllodrepa melis</i> HANSEN, 1940	x	x
45	<i>Phyllodrepa ioptera</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
46	<i>Phyllodrepa vilis</i> (ERICHSON, 1840)	x	
47	<i>Hapalaraea pygmaea</i> (PAYKULL, 1800)	x	
48	<i>Omalium rivulare</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
49	<i>Omalium septentrionis</i> THOMSON, 1856	x	
50	<i>Omalium oxyacanthae</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
51	<i>Omalium laticolle</i> KRAATZ, 1857	x	
52	<i>Omalium exiguum</i> GYLLENHAL, 1810	x	
53	<i>Omalium caesum</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
54	<i>Omalium rugatum</i> MULSANT & REY, 1880	x	
55	<i>Omalium excavatum</i> STEPHENS, 1834	x	x
56	<i>Phloeonomus monilicornis</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
57	<i>Phloeonomus planus</i> (PAYKULL, 1792)	x	x
58	<i>Phloeonomus lapponicus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	x	
59	<i>Phloeonomus pusillus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
60	<i>Phloeonomus punctipennis</i> THOMSON, 1867	x	x
61	<i>Phloeonomus minimus</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
62	<i>Xylodromus depressus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
63	<i>Xylodromus affinis</i> GERHARD, 1877	x	
64	<i>Xylodromus concinnus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
65	<i>Xylodromus testaceus</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
66	<i>Philorinum sordidum</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
67	<i>Orochares angustatus</i> (ERICHSON, 1840)	x	
68	<i>Deliphrum tectum</i> (PAYKULL, 1789)	x	
69	<i>Deliphrum algidum</i> ERICHSON, 1840	x	
70	<i>Lathrimaeum melanocephalum</i> (ILLIGER, 1794)	x	x
71	<i>Lathrimaeum atrocephalum</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x
72	<i>Lathrimaeum unicolor</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
73	<i>Olophrum piceum</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
74	<i>Olophrum fuscum</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
75	<i>Olophrum assimile</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
76	<i>Arpedium quadrum</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
77	<i>Acidota crenata</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
78	<i>Acidota cruentata</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
79	<i>Amphichroum canaliculatum</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
80	<i>Lesteva punctata</i> ERICHSON, 1839	x	x
81	<i>Lesteva longolytrata</i> (GOEZE, 1777)	x	x
82	<i>Lesteva nivicola</i> FAUVEL, 1872		x
83	<i>Lesteva monticola</i> KIESENWETTER, 1847	x	x
84	<i>Lesteva hansenii</i> LOHSE, 1953		x
85	<i>Lesteva pubescens</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
86	<i>Geodromicus nigrita</i> (MÜLLER, 1821)	x	x
87	<i>Anthophagus praeustus</i> MÜLLER, 1821	x	x
88	<i>Anthophagus caraboides</i> (LINNE, 1758)	x	x
89	<i>Anthophagus bicornis</i> (BLOCK, 1799)	x	x
90	<i>Anthophagus angusticollis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
91	<i>Eudectus giraudi</i> REDTENBACHER, 1856	x	
92	<i>Coryphium angusticolle</i> STEPHENS, 1834	x	x
<b>Oxytelinae</b>			
93	<i>Syntomium aeneum</i> (MÜLLER, 1821)	x	x
94	<i>Deleaster dichrous</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
95	<i>Coprophilus striatulus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
96	<i>Coprophilus piceus</i> (SOLSKY, 1867)	x	
97	<i>Manda mandibularis</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	
98	<i>Planeustomus palpalis</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
99	<i>Ochthephilus omalinus</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
100	<i>Ochthephilus longipennis</i> (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856)	x	x
101	<i>Thinodromus dilatatus</i> ERICHSON, 1839	x	
102	<i>Thinodromus arcuatus</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
103	<i>Carpelimus bilineatus</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
104	<i>Carpelimus rivularis</i> MOTSCHULSKY, 1860	x	x
105	<i>Carpelimus obesus</i> KIESENWETTER, 1844	x	x
106	<i>Carpelimus fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
107	<i>Carpelimus nitidus</i> BAUDI, 1848	x	
108	<i>Carpelimus lindrothi</i> PALM, 1942		x
109	<i>Carpelimus impressus</i> BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
110	<i>Carpelimus corticinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
111	<i>Carpelimus subtilicornis</i> (ROUBAL, 1946)		x
112	<i>Carpelimus punctatellus</i> ERICHSON, 1840	x	x
113	<i>Carpelimus foveolatus</i> (SAHLBERG, 1832)	x	x
114	<i>Carpelimus despectus</i> BAUDI, 1869		x
115	<i>Carpelimus halophilus</i> (KIESENWETTER, 1844)	x	x
116	<i>Carpelimus exiguum</i> ERICHSON, 1839	x	
117	<i>Carpelimus pusillus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
118	<i>Carpelimus gracilis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
119	<i>Carpelimus subtilis</i> ERICHSON, 1839	x	x
120	<i>Carpelimus elongatulus</i> ERICHSON, 1839	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
121	<i>Aploderus caelatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
122	<i>Aploderus caesus</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
123	<i>Oxytelus sculptus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
124	<i>Oxytelus migrator</i> FAUVEL, 1904		x
125	<i>Oxytelus fulvipes</i> ERICHSON, 1839	x	
126	<i>Oxytelus piceus</i> (LINNE, 1767)	x	
127	<i>Oxytelus laqueatus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
128	<i>Anotylus insecatus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
129	<i>Anotylus rugifrons</i> HOCHHUTH, 1849	x	x
130	<i>Anotylus rugosus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x
131	<i>Anotylus inustus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
132	<i>Anotylus sculpturatus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
133	<i>Anotylus mutator</i> LOHSE, 1963		x
134	<i>Anotylus nitidulus</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
135	<i>Anotylus complanatus</i> ERICHSON, 1839	x	x
136	<i>Anotylus clypeonitens</i> PANDELLE, 1867	x	
137	<i>Anotylus hamatus</i> FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	x	
138	<i>Anotylus bernhaueri</i> (GANGLBAUER, 1898)	x	x
139	<i>Anotylus saulcyi</i> PANDELLE, 1867	x	
140	<i>Anotylus tetracarinatus</i> (BLOCK, 1799)	x	x
141	<i>Platystethus arenarius</i> (FOURCROY, 1785)	x	x
142	<i>Platystethus cornutus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
143	<i>Platystethus alutaceus</i> THOMSON, 1861	x	x
144	<i>Platystethus capito</i> HEER, 1839	x	x
145	<i>Platystethus nodifrons</i> MANNERHEIM, 1831	x	
146	<i>Platystethus nitens</i> (SAHLBERG, 1832)	x	x
147	<i>Bledius furcatus</i> (OLIVIER, 1811)	x	
148	<i>Bledius bicornis</i> (GERMAR, 1822)	x	
149	<i>Bledius spectabilis</i> KRAATZ, 1857	x	
150	<i>Bledius limnicola</i> TOTTENHAM, 1940	x	x
151	<i>Bledius tricornis</i> (HERBST, 1784)	x	x
152	<i>Bledius unicornis</i> (GERMAR, 1825)	x	
153	<i>Bledius pallipes</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
154	<i>Bledius filipes</i> SHARP, 1911		x
155	<i>Bledius longulus</i> ERICHSON, 1839	x	x
156	<i>Bledius denticollis</i> FAUVEL, 1870	x	
157	<i>Bledius opacus</i> (BLOCK, 1799)	x	x
158	<i>Bledius gallicus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
159	<i>Bledius procerulus</i> ERICHSON, 1840	x	x
160	<i>Bledius dissimilis</i> ERICHSON, 1840	x	
161	<i>Bledius crassicollis</i> BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	
162	<i>Bledius occidentalis</i> BONDROIT, 1907	x	x
163	<i>Bledius cribricollis</i> HEER, 1839	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
164	<i>Bledius atricapillus</i> (GERMAR, 1825)	x	
165	<i>Bledius nanus</i> ERICHSON, 1840	x	x
166	<i>Bledius agricultor</i> HEER, 1839	x	x
167	<i>Bledius erraticus</i> ERICHSON, 1839	x	x
168	<i>Bledius talpa</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	
169	<i>Bledius subterraneus</i> ERICHSON, 1839	x	x
170	<i>Thinobius brunneipennis</i> KRAATZ, 1858	x	
171	<i>Thinobius longipennis</i> (HEER, 1841)	x	
172	<i>Thinobius brevipennis</i> KIESENWETTER, 1850	x	
<b>Oxyporinae</b>			
173	<i>Oxyporus rufus</i> (LINNE, 1758)	x	x
174	<i>Oxyporus maxillosus</i> FABRICIUS, 1792	x	x
<b>Steninae</b>			
175	<i>Stenus biguttatus</i> (LINNE, 1758)	x	x
176	<i>Stenus comma</i> LECONTE, 1863	x	x
177	<i>Stenus guttula</i> MÜLLER, 1821	x	x
178	<i>Stenus fossulatus</i> ERICHSON, 1840	x	x
179	<i>Stenus aterrimus</i> ERICHSON, 1839	x	
180	<i>Stenus juno</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
181	<i>Stenus ater</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
182	<i>Stenus longitarsis</i> THOMSON, 1851	x	x
183	<i>Stenus gallicus</i> FAUVEL, 1872	x	
184	<i>Stenus lustrator</i> ERICHSON, 1839	x	x
185	<i>Stenus proditor</i> ERICHSON, 1839	x	
186	<i>Stenus sylvester</i> ERICHSON, 1839	x	
187	<i>Stenus stigmula</i> ERICHSON, 1840	x	
188	<i>Stenus clavicornis</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x
189	<i>Stenus providus</i> ERICHSON, 1839	x	x
190	<i>Stenus scrutator</i> ERICHSON, 1839	x	x
191	<i>Stenus bimaculatus</i> GYLLENHAL, 1810	x	x
192	<i>Stenus palposus</i> ZETTERSTEDT, 1838	x	
193	<i>Stenus ruralis</i> ERICHSON, 1840	x	
194	<i>Stenus boops</i> LJUNGH, 1804	x	x
195	<i>Stenus incrassatus</i> ERICHSON, 1839	x	x
196	<i>Stenus melanarius</i> STEPHENS, 1833	x	x
197	<i>Stenus morio</i> GRAVENHORST, 1806	x	
198	<i>Stenus atratulus</i> ERICHSON, 1839	x	x
199	<i>Stenus melanopus</i> (MARSHAM, 1802)	x	
200	<i>Stenus canaliculatus</i> GYLLENHAL, 1927	x	x
201	<i>Stenus nitens</i> STEPHENS, 1833		x
202	<i>Stenus fuscipes</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
203	<i>Stenus argus</i> GRAVENHORST, 1806	x	
204	<i>Stenus europaeus</i> PUTHZ, 1966	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
205	<i>Stenus incanus</i> ERICHSON, 1839	x	
206	<i>Stenus pusillus</i> STEPHENS, 1833	x	x
207	<i>Stenus nanus</i> STEPHENS, 1833	x	x
208	<i>Stenus circularis</i> GRAVENHORST, 1802	x	
209	<i>Stenus pumilio</i> ERICHSON, 1839	x	
210	<i>Stenus humilis</i> ERICHSON; 1839	x	x
211	<i>Stenus carbonarius</i> GYLLENHAL, 1827	x	
212	<i>Stenus opticus</i> GRAVENHORST, 1806	x	
213	<i>Stenus formicetorum</i> MANNERHEIM, 1846	x	
214	<i>Stenus crassus</i> STEPHENS, 1833	x	x
215	<i>Stenus brunnipes</i> STEPHENS, 1833	x	x
216	<i>Stenus nigritulus</i> GYLLENHAL, 1827	x	
217	<i>Stenus latifrons</i> ERICHSON, 1839	x	x
218	<i>Stenus fulvicornis</i> STEPHENS, 1833	x	x
219	<i>Stenus tarsalis</i> LJUNGH, 1804	x	x
220	<i>Stenus oscillator</i> REY, 1870		x
221	<i>Stenus bohemicus</i> MACHULKA, 1947		x
222	<i>Stenus similis</i> (HERBST, 1784)	x	x
223	<i>Stenus solutus</i> ERICHSON, 1840		x
224	<i>Stenus cicindeloides</i> (SCHALLER, 1783)	x	x
225	<i>Stenus fornicateus</i> STEPHENS, 1833	x	x
226	<i>Stenus pallitarsis</i> STEPHENS, 1833	x	
227	<i>Stenus niveus</i> FAUVEL, 1865	x	
228	<i>Stenus binotatus</i> LJUNGH, 1804	x	x
229	<i>Stenus pubescens</i> STEPHENS, 1833	x	x
230	<i>Stenus flavipes</i> STEPHENS, 1833	x	x
231	<i>Stenus nitidiusculus</i> STEPHENS, 1833	x	x
232	<i>Stenus picipennis</i> ERICHSON, 1840	x	x
233	<i>Stenus bifoveolatus</i> GYLLENHAL, 1827	x	x
234	<i>Stenus picipes</i> STEPHENS, 1833	x	x
235	<i>Stenus brevipennis</i> THOMSON, 1851	x	
236	<i>Stenus impressus</i> GERMAR, 1824	x	x
237	<i>Stenus ludyi</i> FAUVEL, 1885		x
238	<i>Stenus ochropus</i> KIESENWETTER, 1858	x	x
239	<i>Stenus fuscicornis</i> ERICHSON, 1840	x	x
240	<i>Stenus subaeneus</i> ERICHSON, 1840	x	x
241	<i>Stenus palustris</i> ERICHSON, 1839	x	
242	<i>Stenus flavipalpis</i> THOMSON, 1860	x	x
243	<i>Stenus geniculatus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
244	<i>Stenus montivagus</i> HEER, 1839	x	x
245	<i>Stenus pallipes</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
246	<i>Dianous coerulescens</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	<b>Euaesthetinae</b>		
247	<i>Euaesthetus bipunctatus</i> (LJUNGH, 1804)	x	x
248	<i>Euaesthetus superlatus</i> PEYERIMHOFF, 1937		x
249	<i>Euaesthetus ruficapillus</i> BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
250	<i>Euaesthetus laeviusculus</i> MANNERHEIM, 1844	x	x
	<b>Paederinae</b>		
251	<i>Paederidus ruficollis</i> FABRICIUS, 1781	x	
252	<i>Paederidus rubrothoracicus</i> (GOEZE, 1777)	x	x
253	<i>Paederus caligatus</i> ERICHSON, 1840	x	
254	<i>Paederus limnophilus</i> ERICHSON, 1840	x	
255	<i>Paederus brevipennis</i> BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
256	<i>Paederus fuscipes</i> CURTIS, 1835	x	x
257	<i>Paederus riparius</i> (LINNÉ, 1758)	x	x
258	<i>Paederus littoralis</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
259	<i>Astenus procerus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
260	<i>Astenus pulchellus</i> (HEER, 1839)	x	x
261	<i>Astenus immaculatus</i> STEPHENS, 1833	x	
262	<i>Astenus gracilis</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
263	<i>Rugilus angustatus</i> (FOURCROY, 1785)	x	x
264	<i>Rugilus subtilis</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
265	<i>Rugilus rufipes</i> GERMAR, 1836	x	x
266	<i>Rugilus similis</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
267	<i>Rugilus geniculatus</i> (ERICHSON, 1839)	x	
268	<i>Rugilus orbiculatus</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
269	<i>Rugilus erichsoni</i> (FAUVEL, 1867)	x	x
270	<i>Medon castaneus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
271	<i>Medon piceus</i> (KRAATZ, 1858)	x	
272	<i>Medon brunneus</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
273	<i>Medon fusculus</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
274	<i>Medon ripicola</i> (KRAATZ, 1858)	x	
275	<i>Medon apicalis</i> (KRAATZ, 1857)	x	
276	<i>Sunius bicolor</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
277	<i>Sunius melanocephalus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
278	<i>Pseudomedon obscurellus</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
279	<i>Pseudomedon obsoletus</i> (NORDMANN, 1837)	x	
280	<i>Lithocharis ochraceus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
281	<i>Lithocharis nigriceps</i> (KRAATZ, 1859)		x
282	<i>Scopaeus laevigatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x
283	<i>Scopaeus sulcicollis</i> STEPHENS, 1833	x	x
284	<i>Scopaeus minutus</i> ERICHSON, 1840	x	x
285	<i>Scopaeus pusillus</i> KIESENWETTER, 1843		x
286	<i>Scopaeus minimus</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
287	<i>Scopaeus gracilis</i> (SPERK, 1835)	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
288	<i>Domene scabricollis</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
289	<i>Lathrobium multipunctum</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
290	<i>Lathrobium sphagnetorum</i> MUONA, 1977	x	
291	<i>Lathrobium terminatum</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
292	<i>Lathrobium fennicum</i> RENKONEN, 1938	x	x
293	<i>Lathrobium quadratum</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
294	<i>Lathrobium rufipenne</i> GYLLENHAL, 1813	x	
295	<i>Lathrobium elongatum</i> (LINNE, 1767)	x	x
296	<i>Lathrobium volgense</i> HOCHHUTH, 1851	x	x
297	<i>Lathrobium pallidipenne</i> HOCHHUTH, 1851	x	x
298	<i>Lathrobium laevipenne</i> HEER, 1839	x	x
299	<i>Lathrobium castaneipenne</i> KOLENATI, 1846	x	x
300	<i>Lathrobium fulvipenne</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
301	<i>Lathrobium brunnipes</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
302	<i>Lathrobium fovulum</i> STEPHENS, 1833	x	x
303	<i>Lathrobium impressum</i> HEER, 1841	x	x
304	<i>Lathrobium longulum</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
305	<i>Lathrobium pallidum</i> NORDMANN, 1837	x	x
306	<i>Lathrobium dilutum</i> ERICHSON, 1839	x	x
307	<i>Achenium humile</i> (NICOLAI, 1822)	x	x
308	<i>Cryptobium fracticorne</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
<b>Xantholininae</b>			
309	<i>Leptacinus formicetorum</i> MÄRKEL, 1841	x	x
310	<i>Leptacinus intermedius</i> DÖNISTHORPE, 1936		x
311	<i>Leptacinus othoides</i> BAUDI, 1869		x
312	<i>Leptacinus batychrus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	
313	<i>Leptacinus pusillus</i> STEPHENS, 1833	x	x
314	<i>Phacophallus parumpunctatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	x
315	<i>Gauropterus fulgidus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
316	<i>Nudobius lents</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
317	<i>Gyrohypnus liebei</i> SCHEERPELTZ, 1926	x	x
318	<i>Gyrohypnus fracticornis</i> (MÜLLER, 1776)		x
319	<i>Gyrohypnus atratus</i> (HEER, 1839)	x	x
320	<i>Gyrohypnus scoticus</i> JOY, 1913	x	x
321	<i>Gyrohypnus angustatus</i> STEPHENS, 1833	x	x
322	<i>Hypnogyra glaber</i> (NORDMANN, 1837)	x	x
323	<i>Xantholinus glabratus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
324	<i>Xantholinus tricolor</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
325	<i>Xantholinus meridionalis</i> NORDMANN, 1837	x	x
326	<i>Xantholinus laevigatus</i> JACOBSON, 1847	x	x
327	<i>Xantholinus linearis</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
328	<i>Xantholinus longiventris</i> HEER, 1839	x	x
329	<i>Xantholinus roubali</i> COIFFAIT, 1956		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
330	<i>Atrecus affinis</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
331	<i>Othius punctulatus</i> (GOEZE, 1777)	x	x
332	<i>Othius lapidicola</i> KIESENWETTER, 1884	x	
333	<i>Othius melanocephalus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
334	<i>Othius myrmecophilus</i> KIESENWETTER, 1843	x	x
	<b>Staphylininae</b>		
335	<i>Neobisnius villosulus</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
336	<i>Neobisnius procerulus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
337	<i>Neobisnius lathroboides</i> (BAUDI, 1848)		x
338	<i>Neobisnius prolixus</i> (ERICHSON, 1840)	x	
339	<i>Erichsonius signaticornis</i> (MULSANT & REY, 1863)	x	x
340	<i>Erichsonius cinerascens</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
341	<i>Erichsonius subopacus</i> (HOCHHUTH, 1851)		x
342	<i>Hesperus rufipennis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
343	<i>Philonthus laevicollis</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
344	<i>Philonthus nigrita</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
345	<i>Philonthus fumarius</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
346	<i>Philonthus subuliformis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
347	<i>Philonthus umbratilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
348	<i>Philonthus immundus</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
349	<i>Philonthus debilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
350	<i>Philonthus atratus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
351	<i>Philonthus albipes</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
352	<i>Philonthus alpinus</i> EPPELSHEIM, 1875		x
353	<i>Philonthus concinnus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
354	<i>Philonthus coruscus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
355	<i>Philonthus caucasicus</i> NÖRDLMANN, 1837	x	x
356	<i>Philonthus ebeninus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
357	<i>Philonthus intermedius</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
358	<i>Philonthus laminatus</i> (CREUTZER, 1799)	x	x
359	<i>Philonthus tenuicornis</i> MULSANT & REY, 1857	x	x
360	<i>Philonthus cognatus</i> STEPHENS, 1832	x	x
361	<i>Philonthus mannerheimi</i> FAUVEL, 1869	x	
362	<i>Philonthus politus</i> (LINNE, 1758)	x	x
363	<i>Philonthus succicola</i> THOMSON, 1860	x	x
364	<i>Philonthus addendus</i> SHARP, 1867	x	x
365	<i>Philonthus temporalis</i> MULSANT & REY, 1853	x	x
366	<i>Philonthus decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
367	<i>Philonthus nitidus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
368	<i>Philonthus spinipes</i> SHARP, 1874		x
369	<i>Philonthus cyanipennis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
370	<i>Philonthus coerulescens</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	
371	<i>Philonthus rotundicollis</i> (MENETRIES, 1832)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
372	<i>Philonthus cephalotes</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
373	<i>Philonthus sordidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
374	<i>Philonthus spermophili</i> GANGLBAUER, 1897	x	x
375	<i>Philonthus scribai</i> FAUVEL, 1867	x	x
376	<i>Philonthus carbonarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
377	<i>Philonthus nitidicollis</i> LACORDAIRE, 1835	x	
378	<i>Philonthus cruentatus</i> (GMELIN, 1789)	x	x
379	<i>Philonthus pseudovarians</i> STRAND, 1961		x
380	<i>Philonthus jurgans</i> TOTTENHAM, 1937		x
381	<i>Philonthus varians</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
382	<i>Philonthus splendens</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
383	<i>Philonthus fimetarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
384	<i>Philonthus puella</i> NORDMANN, 1837	x	x
385	<i>Philonthus punctus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
386	<i>Philonthus ventralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
387	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
388	<i>Philonthus rufimanus</i> ERICHSON, 1840	x	
389	<i>Philonthus corvinus</i> ERICHSON, 1839	x	x
390	<i>Philonthus sanguinolentus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
391	<i>Philonthus salinus</i> KIESENWETTER, 1844	x	
392	<i>Philonthus rectangulus</i> SHARP, 1874	x	x
393	<i>Philonthus discoideus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
394	<i>Philonthus nitidulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
395	<i>Philonthus lepidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
396	<i>Philonthus longicornis</i> STEPHENS, 1832	x	x
397	<i>Philonthus agilis</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	
398	<i>Philonthus micans</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
399	<i>Philonthus rubripennis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
400	<i>Philonthus marginatus</i> (STRÖM, 1768)	x	x
401	<i>Rabigus tenuis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
402	<i>Gabronthus thermarum</i> (AUBE, 1850)		x
403	<i>Gabrius osseticus</i> KOLENATI, 1846	x	x
404	<i>Gabrius femoralis</i> (HOCHHUTH, 1851)	x	x
405	<i>Gabrius exiguus</i> (NORDMANN, 1837)	x	
406	<i>Gabrius astutus</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
407	<i>Gabrius lividipes</i> (BAUDI, 1848)	x	
408	<i>Gabrius splendidulus</i> (GRAVENHORST, 1807)	x	x
409	<i>Gabrius trossulus</i> (NORDMANN, 1837)	x	x
410	<i>Gabrius keysianus</i> SHARP, 1910		x
411	<i>Gabrius dieckmanni</i> SMETANA, 1957		x
412	<i>Gabrius nigritulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
413	<i>Gabrius bishopi</i> SHARP, 1910		x
414	<i>Gabrius pennatus</i> SHARP, 1910	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
415	<i>Gabrius subnigritulus</i> (REITTER, 1909)	x	x
416	<i>Creophilus maxillosus</i> (LINNE, 1758)	x	x
417	<i>Ontholestes tessellatus</i> (FOURCROY, 1785)	x	x
418	<i>Ontholestes murinus</i> (LINNE, 1758)	x	x
419	<i>Emus hirtus</i> (LINNE, 1758)	x	x
420	<i>Platydracus fulvipes</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x
421	<i>Platydracus latebricola</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
422	<i>Platydracus chalcocephalus</i> (FABRICIUS, 1810)	x	
423	<i>Platydracus stercorarius</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
424	<i>Dinothenarius pubescens</i> (DEGEER, 1774)	x	x
425	<i>Staphylinus erythropterus</i> LINNE, 1758	x	x
426	<i>Staphylinus caesareus</i> CEDERHJELM, 1798	x	x
427	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> GEMMINGER, 1851	x	x
428	<i>Staphylinus fossor</i> (SCOPOLI, 1774)	x	x
429	<i>Ocypus olens</i> (MÜLLER, 1768)	x	x
430	<i>Ocypus tenebricosus</i> (GRAVENHORST, 1846)	x	x
431	<i>Ocypus ophthalmicus</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x
432	<i>Ocypus macrocephalus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
433	<i>Ocypus nero</i> FALDERMANN, 1835	x	x
434	<i>Ocypus brunneipes</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x
435	<i>Ocypus fuscatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
436	<i>Ocypus picipennis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
437	<i>Ocypus fulvipennis</i> ERICHSON, 1840	x	x
438	<i>Ocypus aeneocephalus</i> (DEGEER, 1774)	x	x
439	<i>Ocypus pedator</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
440	<i>Ocypus ater</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
441	<i>Ocypus compressus</i> (MARSHAM, 1802)	x	
442	<i>Ocypus winkleri</i> (BERNHAUER, 1906)	x	x
443	<i>Ocypus melanarius</i> (HEER, 1839)	x	x
444	<i>Ocypus globulifer</i> (FOURCROY, 1785)	x	
445	<i>Heterothops praevius</i> ERICHSON, 1839	x	x
446	<i>Heterothops niger</i> KRAATZ, 1868	x	x
447	<i>Heterothops stiglundi</i> ISRAELSON, 1979		x
448	<i>Heterothops quadripunctulus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
449	<i>Heterothops dissimilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
450	<i>Heterothops minutus</i> WOLLASTON, 1860		x
451	<i>Eurychorus picipes</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
452	<i>Velleius dilatatus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	
453	<i>Quedius brevis</i> ERICHSON, 1840	x	x
454	<i>Quedius truncicola</i> FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	x	x
455	<i>Quedius infuscatus</i> ERICHSON, 1840	x	x
456	<i>Quedius microps</i> GRAVENHORST, 1847	x	
457	<i>Quedius lateralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
458	<i>Quedius longicornis</i> KRAATZ, 1857	x	x
459	<i>Quedius ochripennis</i> (MENETRIES, 1832)	x	x
460	<i>Quedius nigrocoeruleus</i> FAUVEL, 1874	x	x
461	<i>Quedius puncticollis</i> THOMSON, 1867	x	x
462	<i>Quedius invreae</i> GRIDELLI, 1924		x
463	<i>Quedius assimilis</i> NORDMANN, 1837	x	x
464	<i>Quedius cruentus</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
465	<i>Quedius brevicornis</i> THOMSON, 1860	x	x
466	<i>Quedius vexans</i> EPPELSHEIM, 1881	x	x
467	<i>Quedius mesomelinus mesomelinus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
468	<i>Quedius mesomelinus skoraszewskyi</i> KORGE, 1961		x
469	<i>Quedius maurus</i> (SAHLBERG, 1830)	x	x
470	<i>Quedius xanthopus</i> ERICHSON, 1839	x	x
471	<i>Quedius scitus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
472	<i>Quedius cinctus</i> (PAYKULL, 1790)	x	x
473	<i>Quedius plagiatus</i> MANNERHEIM, 1843	x	x
474	<i>Quedius fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
475	<i>Quedius curtipennis</i> BERNHAUER, 1908		x
476	<i>Quedius tristis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
477	<i>Quedius subunicolor</i> KORGE, 1961	x	
478	<i>Quedius balticus</i> KORGE, 1960		x
479	<i>Quedius molochinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
480	<i>Quedius picipes</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
481	<i>Quedius umbrinus</i> ERICHSON, 1839	x	x
482	<i>Quedius nigriceps</i> KRAATZ, 1857	x	
483	<i>Quedius suturalis</i> KIESENWETTER, 1847	x	x
484	<i>Quedius limbatus</i> (HEER, 1834)	x	x
485	<i>Quedius maurorufus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
486	<i>Quedius nemoralis</i> BAUDI, 1848	x	x
487	<i>Quedius fumatus</i> (STEPHENS, 1833)	x	x
488	<i>Quedius scintillans</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
489	<i>Quedius lucidulus</i> ERICHSON, 1839	x	x
490	<i>Quedius riparius</i> KELLNER, 1843	x	x
491	<i>Quedius paradisianus</i> (HEER, 1839)	x	x
492	<i>Quedius nitipennis</i> (STEPHENS, 1833)	x	x
493	<i>Quedius aridulus</i> JANSSEN, 1939		x
494	<i>Quedius fulvicollis</i> (STEPHENS, 1833)	x	x
495	<i>Quedius boopoides</i> MUNSTER 1923		x
496	<i>Quedius boops</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
497	<i>Acylophorus glaberimus</i> (HERBST, 1784)	x	
498	<i>Atanygnathus terminalis</i> (ERICHSON, 1839)	x	
	<b>Habrocerinae</b>		
499	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	<b>Trichophyinae</b>		
500	<i>Trichophyra pilicornis</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
	<b>Tachyporinae</b>		
501	<i>Mycetoporus mulsanti</i> GANGLBAUER, 1895	x	x
502	<i>Mycetoporus erichsonanus</i> FAGEL, 1965	x	x
503	<i>Mycetoporus baudueri</i> MULSANT & REY, 1875	x	x
504	<i>Mycetoporus lepidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
505	<i>Mycetoporus longulus</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
506	<i>Mycetoporus bimaculatus</i> BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
507	<i>Mycetoporus despectus</i> STRAND, 1969	x	
508	<i>Mycetoporus nigricollis</i> STEPHENS, 1835	x	x
509	<i>Mycetoporus forticornis</i> FAUVEL, 1872	x	x
510	<i>Mycetoporus ambiguus</i> LUZE, 1901	x	x
511	<i>Mycetoporus clavicornis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
512	<i>Mycetoporus solidicornis</i> reichei PANDELLE, 1869	x	x
513	<i>Mycetoporus niger</i> FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	x	
514	<i>Mycetoporus angularis</i> MÄRKEL, 1853	x	
515	<i>Mycetoporus corpulentus</i> LUZE, 1901	x	x
516	<i>Mycetoporus maerkeli</i> KRAATZ, 1857	x	
517	<i>Mycetoporus rufescens</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
518	<i>Mycetoporus eppelsheimianus</i> FAGEL, 1965	x	
519	<i>Mycetoporus brucki</i> (PANDELLE, 1869)	x	
520	<i>Mycetoporus punctus</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
521	<i>Ischnosoma longicornis</i> MÄRKEL, 1847	x	x
522	<i>Ischnosoma splendidus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
523	<i>Bryoporus cernuus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
524	<i>Bryoporus rufus</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
525	<i>Bryoporus crassicornis</i> (MÄKLIN, 1847)		x
526	<i>Carphacis striatus</i> (OLIVIER, 1794)	x	
527	<i>Lordithon bicolor</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	
528	<i>Lordithon thoracicus</i> (FABRICIUS, 1777)	x	x
529	<i>Lordithon exoletus</i> ERICHSON, 1839	x	x
530	<i>Lordithon trinotatus</i> ERICHSON, 1839	x	x
531	<i>Lordithon lunulatus</i> (LINNE, 1761)	x	x
532	<i>Lordithon pulchellus</i> MANNERHEIM, 1831	x	
533	<i>Bolitobius cingulata</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
534	<i>Bolitobius castaneus</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
535	<i>Bolitobius inclinans</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
536	<i>Bolitobius formosus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
537	<i>Sepedophilus littoreus</i> (LINNE, 1758)	x	x
538	<i>Sepedophilus testaceus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
539	<i>Sepedophilus constans</i> (FOWLER, 1888)		x
540	<i>Sepedophilus marshami</i> (STEPHENS, 1832)		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
541	<i>Sepedophilus immaculatus</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
542	<i>Sepedophilus pedicularius</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
543	<i>Sepedophilus obtusus</i> (LUZE, 1902)		x
544	<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
545	<i>Tachyporus nitidulus</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x
546	<i>Tachyporus obtusus</i> (LINNE, 1767)	x	x
547	<i>Tachyporus abdominalis</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x
548	<i>Tachyporus formosus</i> MATTHEWS, 1838	x	x
549	<i>Tachyporus solitus</i> ERICHSON, 1839	x	x
550	<i>Tachyporus hypnorum</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x
551	<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (LINNE, 1758)	x	x
552	<i>Tachyporus dispar</i> (PAYKULL, 1802)		x
553	<i>Tachyporus tersus</i> ERICHSON, 1839	x	x
554	<i>Tachyporus atriceps</i> STEPHENS, 1832	x	x
555	<i>Tachyporus quadriscopulatus</i> PANDELLE, 1869		x
556	<i>Tachyporus ruficollis</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
557	<i>Tachyporus transversalis</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
558	<i>Tachyporus pusillus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
559	<i>Tachyporus scitulus</i> ERICHSON, 1839	x	x
560	<i>Tachyporus corpulentus</i> SAHLBERG, 1876	x	
561	<i>Lamprinodes saginatus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
562	<i>Lamprinodes haematopterus</i> (Kraatz, 1857)	x	
563	<i>Lamprinus erythropterus</i> (PANZER, 1796)	x	
564	<i>Tachinus lignorum</i> (LINNE, 1758)	x	x
565	<i>Tachinus humeralis</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
566	<i>Tachinus proximus</i> KRAATZ, 1855	x	x
567	<i>Tachinus subterraneus</i> (LINNE, 1758)	x	x
568	<i>Tachinus bipustulatus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
569	<i>Tachinus scapularis</i> STEPHENS, 1832	x	x
570	<i>Tachinus pallipes</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
571	<i>Tachinus fimetarius</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
572	<i>Tachinus signatus</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
573	<i>Tachinus laticollis</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
574	<i>Tachinus marginellus</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x
575	<i>Tachinus corticinus</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
576	<i>Tachinus rufipennis</i> GYLLENHAL, 1810	x	x
577	<i>Tachinus elongatus</i> GYLLENHAL, 1810	x	x
578	<i>Cilea silphoides</i> ( LINNE, 1767)	x	x
	<b>Aleocharinae</b>		
579	<i>Deinopsis erosa</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
580	<i>Gymnusa brevicollis</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
581	<i>Gymnusa variegata</i> KIESENWETTER, 1845	x	x
582	<i>Myllaena dubia</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x

Nr.	Art	vor	nach
		1960	1960
583	<i>Myllaena intermedia</i> ERICHSON, 1837	x	x
584	<i>Myllaena kraatzi</i> SHARP, 1841	x	x
585	<i>Myllaena elongata</i> (MATTHEWS, 1838)		x
586	<i>Myllaena gracilicornis</i> FAIRMAIRE & BRISOUT, 1859	x	
587	<i>Myllaena brevicornis</i> (MATTHEWS, 1838)	x	x
588	<i>Myllaena gracilis</i> (MATTHEWS, 1838)	x	x
589	<i>Myllaena minuta</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
590	<i>Myllaena infuscata</i> KRAATZ, 1853	x	
591	<i>Pronomaea rostrata</i> ERICHSON, 1837	x	
592	<i>Oligota granaria</i> ERICHSON, 1837	x	x
593	<i>Oligota parva</i> KRAATZ, 1862	x	
594	<i>Oligota inflata</i> MANNERHEIM, 1838	x	x
595	<i>Oligota pusillima</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
596	<i>Oligota pumilio</i> KIESENWETTER, 1858		x
597	<i>Holobus flavicornis</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
598	<i>Holobus apicata</i> ERICHSON, 1837	x	
599	<i>Cypha longicornis</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
600	<i>Cypha laeviuscula</i> MANNERHEIM, 1831		x
601	<i>Cypha ovulum</i> HEER, 1839	x	
602	<i>Cypha discoidea</i> ERICHSON, 1839	x	x
603	<i>Cypha seminulum</i> ERICHSON, 1839	x	
604	<i>Cypha pulicaria</i> (ERICHSON, 1839)		x
605	<i>Cypha hansenii</i> PALM, 1949	x	x
606	<i>Hygronoma dimidiata</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
607	<i>Brachida exigua</i> (HEER, 1839)	x	x
608	<i>Encephalus complicans</i> STEPHENS, 1832	x	x
609	<i>Gyrophaena pulchella</i> HEER, 1839	x	x
610	<i>Gyrophaena affinis</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
611	<i>Gyrophaena nana</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
612	<i>Gyrophaena gentilis</i> ERICHSON, 1839	x	
613	<i>Gyrophaena minima</i> ERICHSON, 1837	x	x
614	<i>Gyrophaena congrua</i> ERICHSON, 1837	x	
615	<i>Gyrophaena fasciata</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
616	<i>Gyrophaena bihamata</i> THOMSON, 1867	x	x
617	<i>Gyrophaena lucidula</i> ERICHSON, 1837	x	x
618	<i>Gyrophaena joyi</i> WENDELER, 1924		x
619	<i>Gyrophaena joyoides</i> WÜSTHOFF, 1937		x
620	<i>Gyrophaena angustata</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
621	<i>Gyrophaena strictula</i> ERICHSON, 1839	x	x
622	<i>Gyrophaena polita</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
623	<i>Gyrophaena boleti</i> (LINNE, 1758)	x	x
624	<i>Agaricochara latissima</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
625	<i>Cyphaea curtula</i> (ERICHSON, 1837)		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
626	<i>Placusa complanata</i> ERICHSON, 1839	x	
627	<i>Placusa depressa</i> ERICHSON, 1845	x	x
628	<i>Placusa tachyporoides</i> (WALTL, 1838)	x	x
629	<i>Placusa atrata</i> (SAHLBERG, 1831)	x	x
630	<i>Placusa pumilio</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
631	<i>Placusa adscita</i> ERICHSON, 1829	x	
632	<i>Homalota plana</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
633	<i>Anomognathus cuspidatus</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
634	<i>Silusa rubiginosa</i> ERICHSON, 1837	x	x
635	<i>Silusa rubra</i> ERICHSON, 1839	x	
636	<i>Rhopalocerina clavigera</i> (SCRIBA, 1859)	x	
637	<i>Megaloscapa punctipennis</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
638	<i>Leptusa pulchella</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
639	<i>Leptusa fumida</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
640	<i>Leptusa ruficollis</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
641	<i>Leptusa simoni</i> EPPELSHEIM, 1878	x	x
642	<i>Euryusa castanoptera</i> KRAATZ, 1856	x	
643	<i>Euryusa optabilis</i> HEER, 1839	x	x
644	<i>Euryusa sinuata</i> ERICHSON, 1837	x	
645	<i>Euryusa coarctata</i> MÄRKEL, 1844	x	
646	<i>Tachyusida gracilis</i> (ERICHSON, 1837)	x	
647	<i>Bolitochara obliqua</i> ERICHSON, 1837	x	x
648	<i>Bolitochara bella</i> MÄRKEL, 1844	x	x
649	<i>Bolitochara mulsanti</i> SHARP, 1875	x	x
650	<i>Bolitochara pulchra</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
651	<i>Bolitochara lucida</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
652	<i>Autalia impressa</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
653	<i>Autalia longicornis</i> SCHEERPELTZ, 1947		x
654	<i>Autalia rivularis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
655	<i>Cordalia obscura</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
656	<i>Falagria sulcatula</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
657	<i>Falagria caesa</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
658	<i>Falagria concinna</i> ERICHSON, 1839		x
659	<i>Falagria thoracica</i> STEPHENS, 1832	x	x
660	<i>Falagria nigra</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
661	<i>Ischnopoda constricta</i> ERICHSON, 1837	x	x
662	<i>Ischnopoda coarctata</i> ERICHSON, 1837	x	x
663	<i>Ischnopoda balteata</i> ERICHSON, 1839	x	x
664	<i>Ischnopoda atra</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
665	<i>Ischnopoda leucopus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
666	<i>Ischnopoda umbratica</i> ERICHSON, 1837	x	x
667	<i>Ischnopoda scitula</i> ERICHSON, 1837	x	
668	<i>Dasygnypeta velata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
669	<i>Gnypeta ripicola</i> (KIESENWETTER, 1844)	x	x
670	<i>Gnypeta carbonaria</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
671	<i>Gnypeta rubricor</i> TOTTENHAM, 1939		x
672	<i>Brachyusa concolor</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
673	<i>Dacryla fallax</i> (KRAATZ, 1856)	x	
674	<i>Callicerus obscurus</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
675	<i>Schistoglossa viduata</i> (ERICHSON, 1837)	x	
676	<i>Schistoglossa gemina</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
677	<i>Schistoglossa aubei</i> (BRISOUT, 1860)	x	
678	<i>Hydrosmecta fluviatilis</i> (KRAATZ, 1854)	x	
679	<i>Hydrosmecta fragilicornis</i> (KRAATZ, 1856)	x	
680	<i>Hydrosmecta fragilis</i> (KRAATZ, 1854)	x	
681	<i>Hydrosmecta longula</i> HEER, 1839	x	x
682	<i>Hydrosmecta delicatula</i> (SHARP, 1869)	x	
683	<i>Hydrosmecta subtilissima</i> (KRAATZ, 1854)	x	
684	<i>Aloconota debilicornis</i> (ERICHSON, 1839)	x	
685	<i>Aloconota eichhoffi</i> (SCRIBA, 1867)	x	
686	<i>Aloconota planifrons</i> (WATERHOUSE, 1864)		x
687	<i>Aloconota appulsa</i> (SCRIBA, 1867)	x	
688	<i>Aloconota cambrica</i> (WOLLASTON, 1855)	x	x
689	<i>Aloconota currax</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
690	<i>Aloconota mihoki</i> BERNHAUER, 1913		x
691	<i>Aloconota sulcifrons</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
692	<i>Aloconota insecta</i> (THOMSON, 1856)	x	x
693	<i>Aloconota subgrandis</i> (BRUNDIN, 1954)		x
694	<i>Aloconota gregaria</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
695	<i>Aloconota languida</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
696	<i>Aloconota longicollis</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	x
697	<i>Enalodroma hepatica</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
698	<i>Pycnota paradoxa</i> (MULSANT & REY, 1861)	x	x
699	<i>Amischa analis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
700	<i>Amischa cavifrons</i> (SHARP, 1869)	x	x
701	<i>Amischa soror</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
702	<i>Amischa decipiens</i> (SHARP, 1869)		x
703	<i>Amischa forcipata</i> MULSANT & REY; 1873		x
704	<i>Amidobia talpa</i> (HEER, 1841)	x	
705	<i>Lypoglossa lateralis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	
706	<i>Nehemitropia lividipennis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
707	<i>Notothecta confusa</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
708	<i>Lyprocorre anceps</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
709	<i>Neohilara subterranea</i> (MULSANT & REY, 1853)	x	x
710	<i>Alaobia scapularis</i> (SAHLBERG, 1831)	x	x
711	<i>Brundinia meridionalis</i> (MULSANT & REY, 1853)		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
712	<i>Brundinia marina</i> (MULSANT & REY, 1853)	x	
713	<i>Dochmonota clancula</i> (ERICHSON, 1839)	x	
714	<i>Tomoglossa luteicornis</i> (ERICHSON, 1837)	x	
715	<i>Ousipalia caesula</i> (ERICHSON, 1839)	x	
716	<i>Geostiba circellaris</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
717	<i>Taxicera sericophila</i> (BAUDI, 1869)	x	
718	<i>Taxicera deplanata</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
719	<i>Dinaraea angustula</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
720	<i>Dinaraea aequata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
721	<i>Dinaraea linearis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
722	<i>Dinaraea arcana</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
723	<i>Dadobia immersa</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
724	<i>Plataraea nigrifrons</i> (ERICHSON, 1839)	x	
725	<i>Plataraea brunnea</i> (FABRICIUS, 1798)	x	x
726	<i>Liogluta pagana</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
727	<i>Liogluta granigera</i> (KIESENWETTER, 1859)	x	x
728	<i>Liogluta micans</i> MULSANT & REY, 1852		x
729	<i>Liogluta longiuscula</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
730	<i>Liogluta wuesthoffi</i> (BENICK, 1938)	x	x
731	<i>Liogluta microptera</i> (THOMSON, 1867)	x	x
732	<i>Liogluta oblongiuscula</i> (SHARP, 1869)	x	
733	<i>Liogluta alpestris nitidula</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
734	<i>Atheta arctica</i> (THOMSON, 1856)	x	
735	<i>Atheta elongatula</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
736	<i>Atheta hygrotopora</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
737	<i>Atheta luridipennis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
738	<i>Atheta terminalis</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
739	<i>Atheta gyllenhali</i> (THOMSON, 1856)	x	
740	<i>Atheta melanocera</i> (THOMSON, 1856)	x	x
741	<i>Atheta malleus</i> JOY, 1913		x
742	<i>Atheta volans</i> (SCRIBA, 1859)		x
743	<i>Atheta obtusangula</i> JOY, 1913		x
744	<i>Atheta sequanica</i> (BRISOUT, 1856)	x	
745	<i>Atheta palustris</i> (KIESENWETTER, 1844)	x	x
746	<i>Atheta debilis</i> (ERICHSON, 1837)	x	
747	<i>Atheta parce</i> (MULSANT & REY, 1873)		x
748	<i>Atheta deformis</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
749	<i>Atheta ripicola</i> HANSEN, 1932		x
750	<i>Atheta rhenana</i> BENICK, 1965		x
751	<i>Atheta luteipes</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
752	<i>Atheta laticeps</i> (THOMSON, 1856)	x	x
753	<i>Atheta occulta</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
754	<i>Atheta fungivora</i> (THOMSON, 1867)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
755	Atheta monticola (THOMSON, 1852)	x	x
756	Atheta excellens (KRAATZ, 1856)	x	
757	Atheta euryptera (STEPHENS, 1832)	x	x
758	Atheta divisa (MARKEL, 1844)	x	x
759	Atheta nigricornis (THOMSON, 1852)	x	x
760	Atheta harwoodi WILLIAMS, 1930	x	x
761	Atheta nigritula (GRAVENHORST, 1802)	x	x
762	Atheta corvina (THOMSON, 1856)	x	x
763	Atheta puberula SHARP, 1869	x	x
764	Atheta foveicollis (KRAATZ, 1856)	x	x
765	Atheta palleola (ERICHSON, 1837)	x	
766	Atheta benickiella BRUNDIN, 1948	x	
767	Atheta amicula (STEPHENS, 1832)	x	x
768	Atheta pitionii SCHEERPELTZ, 1950		x
769	Atheta inquinula (GRAVENHORST, 1802)	x	x
770	Atheta subtilis (SCRIBA, 1866)	x	x
771	Atheta aegra (HEER, 1841)	x	
772	Atheta atomaria (KRAATZ, 1856)	x	
773	Atheta minuscula (BRISOUT, 1859)		x
774	Atheta indubia (SHARP, 1869)	x	x
775	Atheta liliputana BRISOUT, 1860	x	x
776	Atheta cibrata (KRAATZ, 1856)	x	x
777	Atheta mortuorum THOMSON, 1867	x	
778	Atheta testaceipes HEER, 1841	x	x
779	Atheta pervagata BENICK, 1974		x
780	Atheta dilaticornis (KRAATZ, 1856)	x	
781	Atheta sodalis (ERICHSON, 1837)	x	x
782	Atheta gagatina (BAUDI, 1848)	x	x
783	Atheta pallidicornis (THOMSON, 1856)	x	x
784	Atheta hybrida (SHARP, 1869)	x	
785	Atheta trinotata (KRAATZ, 1856)	x	x
786	Atheta cadaverina (BRISOUT, 1860)		x
787	Atheta subglabra (SHARP, 1869)		x
788	Atheta picipes (THOMSON, 1856)	x	x
789	Atheta melanaria (MANNERHEIM, 1831)	x	
790	Atheta clientula (ERICHSON, 1839)	x	
791	Atheta orphana (ERICHSON, 1837)	x	
792	Atheta orbata (ERICHSON, 1837)	x	x
793	Atheta fungi (GRAVENHORST, 1806)	x	x
794	Atheta negligens (MULSANT & REY, 1873)		x
795	Atheta amplicollis (MULSANT & REY, 1873)		x
796	Atheta subsinuata (ERICHSON, 1839)	x	
797	Atheta zosterae (THOMSON, 1856)	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
798	<i>Atheta nigra</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
799	<i>Atheta dadopora</i> (THOMSON, 1867)	x	x
800	<i>Atheta sordidula</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
801	<i>Atheta celata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
802	<i>Atheta hypnorum</i> (KIESENWETTER, 1850)	x	x
803	<i>Atheta castanoptera</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
804	<i>Atheta ermischi</i> BENICK, 1934		x
805	<i>Atheta triangulum</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
806	<i>Atheta xanthopus</i> (THOMSON, 1856)	x	x
807	<i>Atheta graminicola</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
808	<i>Atheta ebenina</i> (MULSANT & REY, 1874)	x	x
809	<i>Atheta contristata</i> (KRAATZ, 1856)	x	
810	<i>Atheta heymesi</i> HUBENTHAL, 1913	x	
811	<i>Atheta aquatalis</i> (THOMSON, 1867)		x
812	<i>Atheta incognita</i> (SHARP, 1869)	x	x
813	<i>Atheta aquatica</i> (THOMSON, 1852)	x	
814	<i>Atheta aeneicollis</i> SHARP, 1869	x	x
815	<i>Atheta laticollis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
816	<i>Atheta fimorum</i> (BRISOUT, 1860)	x	
817	<i>Atheta coriaria</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
818	<i>Atheta intermedia</i> (THOMSON, 1852)	x	
819	<i>Atheta ravilla</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
820	<i>Atheta procera</i> (KRAATZ, 1856)	x	
821	<i>Atheta basicornis</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	
822	<i>Atheta myrmecobia</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
823	<i>Atheta nidicola</i> (JOHANSEN, 1914)	x	
824	<i>Atheta oblita</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
825	<i>Atheta boletophila</i> (THOMSON, 1856)	x	
826	<i>Atheta autumnalis</i> (ERICHSON, 1839)	x	
827	<i>Atheta pilicornis</i> (THOMSON, 1852)	x	x
828	<i>Atheta fungicola</i> (THOMSON, 1852)	x	x
829	<i>Atheta britanniae</i> BERNHAUER, 1926		x
830	<i>Atheta crassicornis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
831	<i>Atheta paracrassicornis</i> BRUNDIN, 1954		x
832	<i>Atheta macrocera</i> (THOMSON, 1856)	x	
833	<i>Atheta ischnocera</i> (THOMSON, 1837)		x
834	<i>Atheta cauta</i> (ERICHSON, 1837)		x
835	<i>Atheta leavana</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	x
836	<i>Atheta nigripes</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
837	<i>Atheta subrugosa</i> (KIESENWETTER, 1848)	x	
838	<i>Atheta atramentaria</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
839	<i>Atheta marcida</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
840	<i>Atheta putrida</i> (KRAATZ, 1856)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
841	<i>Atheta europaea</i> LIKOVSKY, 1984	x	x
842	<i>Atheta cinnamoptera</i> (THOMSON, 1856)		x
843	<i>Atheta episcopalis</i> BERNHAUER, 1910	x	x
844	<i>Atheta aeneipennis</i> THOMSON, 1856	x	x
845	<i>Atheta longicornis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
846	<i>Acrotona exigua</i> ERICHSON, 1837	x	
847	<i>Acrotona sylvicola</i> KRAATZ, 1856	x	
848	<i>Acrotona pygmaea</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
849	<i>Acrotona obfuscata</i> (GRAVENHORST, 1802)		x
850	<i>Acrotona consanguinea</i> (EPPELSHEIM, 1875)		x
851	<i>Acrotona parens</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	x
852	<i>Acrotona muscorum</i> (BRISOUT, 1860)	x	
853	<i>Acrotona aterrima</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
854	<i>Acrotona pusilla</i> BRUNDIN, 1952		x
855	<i>Acrotona parvula</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
856	<i>Alevonota rufotestacea</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
857	<i>Alevonota gracilenta</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
858	<i>Alevonota egregia</i> (RYE, 1875)	x	x
859	<i>Alianta incana</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
860	<i>Pachnida nigella</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
861	<i>Trichiusa immigrata</i> LOHSE, 1984		x
862	<i>Thamiraea cinnamomea</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
863	<i>Thamiraea hospita</i> (MÄRKEL, 1844)	x	x
864	<i>Drusilla canaliculata</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
865	<i>Zyras collaris</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
866	<i>Zyras fulgidus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
867	<i>Zyras haworthi</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
868	<i>Zyras limbatus</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
869	<i>Zyras funestus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
870	<i>Zyras humeralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
871	<i>Zyras similis</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
872	<i>Zyras cognatus</i> (MÄRKEL, 1842)	x	
873	<i>Zyras lugens</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
874	<i>Zyras laticollis</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
875	<i>Myrmecia plicata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
876	<i>Myrmecia confragosa</i> (HOCHHUTH, 1849)		x
877	<i>Lochechusoides strumosus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
878	<i>Lomechusa emarginata</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
879	<i>Lomechusa paradoxa</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
880	<i>Lomechusa pubicollis</i> (BRISOUT, 1860)	x	x
881	<i>Dinarda dentata</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
882	<i>Dinarda maerkelii</i> KIESENWETTER, 1843	x	x
883	<i>Dinarda hagensii</i> WASMANN, 1889	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
884	<i>Dinarda pygmaea</i> WASMANN, 1894	x	
885	<i>Phloeopora teres</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
886	<i>Phloeopora testacea</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
887	<i>Phloeopora corticalis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
888	<i>Phloeopora scribae</i> (EPPELSHEIM, 1884)	x	x
889	<i>Phloeopora bernhaueri</i> LOHSE, 1984	x	x
890	<i>Rhopalotella validiuscula</i> (KRAATZ, 1856)	x	
891	<i>Ilybates subopacus</i> PALM, 1935		x
892	<i>Ilybates nigricollis</i> (PAYKULL, 1800)	x	
893	<i>Ilybates propinquus</i> (AUBE, 1850)	x	x
894	<i>Calodera nigrita</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
895	<i>Calodera riparia</i> ERICHSON, 1837	x	x
896	<i>Calodera uliginosa</i> ERICHSON, 1837	x	
897	<i>Calodera aethiops</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
898	<i>Calodera protensa</i> MANNERHEIM, 1831	x	
899	<i>Parocyusa rubicunda</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
900	<i>Parocyusa longitarsis</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
901	<i>Itycara rubens</i> (ERICHSON, 1837)	x	
902	<i>Amarochara umbrosa</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
903	<i>Amarochara forticornis</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
904	<i>Ocalea badia</i> ERICHSON, 1837	x	x
905	<i>Ocalea picata</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
906	<i>Ocalea concolor</i> KIESENWETTER, 1847	x	x
907	<i>Ocalea rivularis</i> MILLER, 1851	x	x
908	<i>Apimela mulsanti</i> GANGLBAUER, 1895	x	
909	<i>Meotica pallens</i> (REDTENBACHER, 1849)	x	x
910	<i>Meotica exilis</i> (ERICHSON, 1837)	x	
911	<i>Meotica marchica</i> BENICK, 1954		x
912	<i>Meotica capitalis</i> MULSANT & REY, 1879	x	x
913	<i>Deubelia picina</i> (AUBE, 1850)		x
914	<i>Ocyusa maura</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
915	<i>Zoosetha procidua</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
916	<i>Mniusa incrassata</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	x
917	<i>Hygropora cunctans</i> (ERICHSON, 1837)	x	
918	<i>Oxypoda elongatula</i> AUBE, 1850	x	x
919	<i>Oxypoda procerula</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
920	<i>Oxypoda opaca</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
921	<i>Oxypoda longipes</i> MULSANT & REY, 1861	x	x
922	<i>Oxypoda vittata</i> MÄRKEL, 1842	x	x
923	<i>Oxypoda acuminata</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
924	<i>Oxypoda spectabilis</i> MÄRKEL, 1844	x	x
925	<i>Oxypoda funebris</i> KRAATZ, 1856	x	x
926	<i>Oxypoda induta</i> MULSANT & REY, 1861	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
927	<i>Oxypoda skalitzkyi</i> BERNHAUER, 1902	x	x
928	<i>Oxypoda brevicornis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
929	<i>Oxypoda doderoi</i> BERNHAUER, 1902	x	x
930	<i>Oxypoda carbonaria</i> (HEER, 1841)	x	x
931	<i>Oxypoda vicina</i> KRAATZ, 1858	x	x
932	<i>Oxypoda abdominalis</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
933	<i>Oxypoda rufa</i> KRAATZ, 1856	x	x
934	<i>Oxypoda togata</i> ERICHSON, 1837	x	x
935	<i>Oxypoda exoleta</i> ERICHSON, 1839	x	x
936	<i>Oxypoda formosa</i> KRAATZ, 1856	x	x
937	<i>Oxypoda arborea</i> ZERCHE, 1994	x	
938	<i>Oxypoda alternans</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
939	<i>Oxypoda caucasica</i> BERNHAUER, 1902	x	
940	<i>Oxypoda praecox</i> ERICHSON, 1839	x	x
941	<i>Oxypoda mutata</i> SHARP, 1871		x
942	<i>Oxypoda testacea</i> ERICHSON, 1837		x
943	<i>Oxypoda miranda</i> ROUBAL, 1929		x
944	<i>Oxypoda brachyptera</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
945	<i>Oxypoda tarda</i> SHARP, 1871		x
946	<i>Oxypoda annularis</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
947	<i>Oxypoda flavicornis</i> KRAATZ, 1856	x	x
948	<i>Oxypoda filiformis</i> REDTENBACHER, 1849	x	
949	<i>Oxypoda ferruginea</i> ERICHSON, 1840	x	
950	<i>Oxypoda soror</i> THOMSON, 1855	x	x
951	<i>Oxypoda formicetica</i> MÄRKEL, 1841	x	x
952	<i>Oxypoda pratensis</i> LOHSE, 1967		x
953	<i>Oxypoda recondita</i> KRAATZ, 1856	x	
954	<i>Oxypoda bicolor</i> MULSANT & REY, 1853	x	
955	<i>Oxypoda haemorrhoa</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
956	<i>Devia prospera</i> (ERICHSON, 1839)	x	
957	<i>Stichoglossa semirufa</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
958	<i>Ischnoglossa prolixa</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
959	<i>Dexiogya corticina</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
960	<i>Homoeusa acuminata</i> (MÄRKEL, 1842)	x	x
961	<i>Thiasophila angulata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
962	<i>Thiasophila canaliculata</i> MULSANT & REY, 1874	x	
963	<i>Thiasophila wockii</i> (SCHNEIDER, 1862)		x
964	<i>Thiasophila inquilina</i> (MÄRKEL, 1842)	x	
965	<i>Crataraea suturalis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
966	<i>Haploglossa gentilis</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
967	<i>Haploglossa villosula</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
968	<i>Haploglossa nidicola</i> (FAIRMAIRE, 1852)	x	x
969	<i>Haploglossa marginalis</i> (GRAVENHOERST, 1806)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
970	<i>Haploglossa picipennis</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	
971	<i>Tinotus morion</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
972	<i>Aleochara curtula</i> (GOEZE, 1777)	x	x
973	<i>Aleochara lata</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
974	<i>Aleochara laticornis</i> KRAATZ, 1856	x	
975	<i>Aleochara haematodes ripicola</i> MULSANT & REY, 1874	x	x
976	<i>Aleochara spissicornis</i> ERICHSON, 1839	x	
977	<i>Aleochara brevipennis</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
978	<i>Aleochara puberula</i> KLUG, 1833	x	x
979	<i>Aleochara intricata</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
980	<i>Aleochara tristis</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
981	<i>Aleochara moesta</i> GRAVENHORST, 1802	x	
982	<i>Aleochara inconspicua</i> AUBE, 1850	x	x
983	<i>Aleochara sparsa</i> HEER, 1839	x	x
984	<i>Aleochara kamila</i> LIKOVSKY, 1984	x	
985	<i>Aleochara albovillosa</i> BERNHAUER, 1901		x
986	<i>Aleochara lanuginosa</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
987	<i>Aleochara lygaea</i> KRAATZ, 1862	x	x
988	<i>Aleochara heeri</i> LIKOVSKY, 1982	x	
989	<i>Aleochara villosa</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
990	<i>Aleochara sanguinea</i> (LINNE, 1758)	x	x
991	<i>Aleochara fumata</i> GRAVENHORST, 1802	x	
992	<i>Aleochara moerens</i> GYLLENHAL, 1827	x	
993	<i>Aleochara maculata</i> BRISOUT, 1863	x	
994	<i>Aleochara laevigata</i> GYLLENHAL, 1810	x	x
995	<i>Aleochara haemoptera</i> KRAATZ, 1846	x	
996	<i>Aleochara cuniculorum</i> KRAATZ, 1858	x	x
997	<i>Aleochara peusi</i> WAGNER, 1949		x
998	<i>Aleochara ruficornis</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
999	<i>Aleochara major</i> FAIRMAIRE, 1857		x
1000	<i>Aleochara erythroptera</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
1001	<i>Aleochara bilineata</i> GYLLENHAL, 1810	x	x
1002	<i>Aleochara bipustulata</i> (LINNE, 1761)	x	x
1003	<i>Aleochara binotata</i> KRAATZ, 1856	x	x
1004	<i>Rheochara spadicea</i> (ERICHSON, 1832)	x	x

## **Literatur:**

- FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. (1964): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 4. - Goecke & Evers, Krefeld.  
- (1974): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 5. - Goecke & Evers, Krefeld.
- HORION, A. (1963): Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Bd. 9.- Überlingen.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa, einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.
- LOHSE, G.A. & LUCHT, W.H. (1989): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 12. - Goecke & Evers, Krefeld.
- RAPP, O. (1933): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch - oekologischen Geographie, Bd. 1.- Erfurt.- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch - oekologischen Geographie. Nachtrag 1.- Erfurt, unver. Manuskript.

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Apfel  
Hellwigstraße 6  
D - 99817 Eisenach

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang

Artikel/Article: [Checklist der Kurzflügelkäfer \(Coleoptera, Staphylinidae\)  
Thüringens 14-39](#)