

Checklist der Malachidae, Melyridae, Phloiophilidae, Cleridae, Trogo- sitidae, Derodontidae und Lymexylonidae Thüringens (Coleoptera)

Stand: 01.09.1995

ANDREAS KOPETZ, Erfurt

Die in der vorliegenden Liste bearbeiteten Käferfamilien stellen phylogenetisch keine einheitliche Gruppe dar. Vielmehr wurden sie in der Vergangenheit zusammen mit den Cantharoidea wegen ihrer meist schwach chitinierten Deckflügel als „Malacodermata“ bezeichnet.

Die hier verwendete Systematik basiert auf dem Werk von FREUDE et al. (1979) sowie dessen Nachtragsbänden. Als Ausgangsbasis für die Erstellung der Checklist dienen die Werke von RAPP (1934), HORION (1953) und LIEBMANN (1955). Einige Angaben konnten bei der Überprüfung der Sammlungen nicht bestätigt werden, da keine Belege aus Thüringen enthalten waren bzw. die Etiketten nicht mehr identifiziert werden konnten. Diese Arten wurden in der Liste mit „?“ gekennzeichnet. Der Nachweis von *Dasytes nigrocyaneus* ist zweifelhaft. Von *Clanoptilus strangulatus* liegen alte Nachweise vor, die Art wurde aber als *Malachius spinosus* fehdeterminiert.

In der Checklist enthalten sind auch die aus Madagaskar importierte Art *Lophocateres pusillus*, welche in Altenburg nachgewiesen wurde, sowie *Clerus mutillarius*, bei der ein Import nicht ausgeschlossen werden kann.

Da erst in der letzten Zeit wieder verstärkt Daten zu den bearbeiteten Familien gesammelt werden, ist damit zu rechnen, daß einige bisher nur aus alten Sammlungen bekannte Arten auch heute noch in Thüringen nachgewiesen werden können.

Für die Mitteilung von Funddaten danke ich W. Apfel (Eisenach), U. Buchsbaum (Kranichfeld), R. Conrad (Gera), F. Creutzburg (Gera), F. Fritzlar (Jena), K. Graser (Magdeburg), M. Hartmann (Erfurt), D. Krebs (Jena), J. Perner (Jena), H. Platt (Mühlhausen), Dr. F. Sander (Jena), A. Skale (Hof), H. Sparmberg (Erfurt), A. Weigel (Pößneck) und R. Zickler (Steinbach).

Für die Durchsicht des Malachidenteiles des Manuskriptes sowie die Überprüfung einiger kritischer Arten der Malachidae danke ich Herrn Dr. h.c. Alfons M.J. Evers (Krefeld) herzlichst.

Nr.	Art	vor	nach
		1960	1960
	Malachidae		
1	Troglops albicans (L., 1767)	x	x
2	Hypebaeus flavipes (F., 1787)	x	x
3	Charopus flavipes (PAYKULL, 1798)	x	x
4	Cordyleperus viridis (F., 1787) (früher Malachius viridis F.)	x	x
5	Malachius scutellaris ERICHSON, 1840	x	x
6	Malachius aeneus (L., 1758)	x	x
7	Malachius bipustulatus (L., 1758)	x	x
8	Malachius rubidus ERICHSON, 1840	x	x
9	Clanoptilus marginellus (OLIVIER, 1790) (früher Malachius marginellus OL.)	x	
10	Clanoptilus elegans (OLIVIER, 1790) (früher Malachius elegans OL.)	x	x
11	Clanoptilus geniculatus (GERMAR, 1824) (früher Malachius geniculatus GER.)		x
12	Clanoptilus strangulatus (ABEILLE, 1885) (früher Malachius vulneratus AB.)	x	x
13	Anthocomus coccineus (SCHALLER, 1783)	x	x
14	Anthocomus fasciatus (L., 1758)	x	x
15	Anthocomus bipunctatus (HARRER, 1784)	x	x
16	Cerapheles terminatus (MÉNÉTRIES, 1832)		x
17	Attalus analis (PANZER, 1796)	x	x
18	Ebaeus thoracicus (FOURCROY, 1785)	x	x
19	Ebaeus pedicularis (F., 1777)	x	
20	Ebaeus appendiculatus ERICHSON, 1840 (= E. mediterraneus AB.)	x?	
21	Ebaeus flavicornis ERICHSON, 1840	x?	
22	Axinotarsus ruficollis (OLIVIER, 1790)	x	
23	Axinotarsus pulicarius (F., 1775)	x	x
24	Axinotarsus marginalis (CASTELNAU, 1840)	x	x
	Melyridae		
25	Aplocnemus impressus (MARSHAM, 1802) (= Haplocnemus pini REDT.)	x	x
26	Aplocnemus nigricornis (F., 1792) (früher Haplocnemus nigricornis F.)	x	x
27	Aplocnemus tarsalis (SAHLBERG, 1822) (= Haplocnemus küsteri SCHILSKY)	x	x
28	Trichocelebe floralis (OLIVIER, 1790)	x?	x
29	Dasytes niger (L., 1761)	x	x
30	Dasytes obscurus GYLLENHAL, 1813	x	x
31	Dasytes caeruleus (DEGEER, 1774)	x	x
32	Dasytes nigrocyaneus MULSANT & REY, 1868	x?	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
33	<i>Dasytes flavipes</i> (OLIVIER, 1790)	x	x
34	<i>Dasytes plumbeus</i> (MÜLLER, 1776)	x	x
35	<i>Dasytes aerosus</i> KIESENWETTER, 1887	x	x
36	<i>Dasytes subaeneus</i> SCHÖNHERR, 1817	x	x
37	<i>Dasytes fuscus</i> (ILLIGER, 1801)	x	x
38	<i>Dolichosoma lineare</i> (ROSSI, 1794)	x	x
39	<i>Danacea pallipes</i> (PANZER, 1793)	x	x
40	<i>Danacea nigritarsis</i> (KÜSTER, 1850)	x	x
	Phloiophilidae		
41	<i>Phloiophilus edwardsi</i> STEPHENS, 1830	x	
	Cleridae		
42	<i>Tillus elongatus</i> (L., 1758)	x	x
43	<i>Tilloidea unifasciata</i> (F., 1787)	x?	
44	<i>Allonyx quadrimaculatus</i> (SCHALLER, 1783)	x	x
45	<i>Opilio pallidus</i> (OLIVIER, 1795)		x
46	<i>Opilio mollis</i> (L., 1758)	x	x
47	<i>Opilio domesticus</i> (STURM, 1837) (= <i>O. germanus</i> CHEVR.)	x	
48	<i>Thanasimus formicarius</i> (L., 1758)	x	x
49	<i>Thanasimus rufipes</i> (BRAHM, 1797)	x	x
50	<i>Thanasimus pectoralis</i> (FUSS, 1863) (= <i>T. rufipes</i> var. <i>femoralis</i> (ZETT.))	x?	
51	<i>Clerus mutillarius</i> F., 1775 (früher <i>Pseudoclerops mutillarius</i> F.)	Import?	x?
52	<i>Trichodes apiarius</i> (L., 1758)	x	x
53	<i>Trichodes alvearius</i> (F., 1792)	x	x
54	<i>Korynetes coeruleus</i> (DEGEER, 1775) (= <i>Corynetes meridionalis</i> OB.)	x	x
55	<i>Necrobia ruficollis</i> (F., 1775)	x	
56	<i>Necrobia violacea</i> (L., 1758)	x	x
57	<i>Necrobia rufipes</i> (DEGEER, 1775)	x	x
	Trogositidae		
58	<i>Nemosoma elongatum</i> (L., 1761)	x	x
59	<i>Tenebroides mauritanicus</i> (L., 1758) (früher <i>Tenebrioides</i> , <i>Trogosita</i>)	x	
60	<i>Tenebroides fuscus</i> (GOEZE, 1777)		x
61	<i>Ostoma ferruginea</i> (L., 1758) (früher <i>Peltis ferrugineum</i> L.)	x	
62	<i>Grynocharis oblonga</i> (L., 1758) (früher <i>Peltis oblongum</i> L.)	x	x

Nr.	Art	vor	nach
		1960	1960
63	<i>Thymalus limbatus</i> (F., 1787)	x	
64	<i>Lophocateres pusillus</i> (KLUG, 1832) Import	(x)	
	Derodontidae		
65	<i>Laricobius erichsoni</i> ROSENHAUER, 1846	x	x

Literatur:

- FREUDE, H.; HARDE, K.W. & LOHSE, G. A. (1979): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 6 Diversicornia.- Krefeld.
- HORION, A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. III: Malacodermata.- München.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen.- Arnstadt.
- NÜSSLER, H. (1993): *Thanasimus pectoralis* (FUSS, 1863) eine für Sachsen neue Buntkäfer-Art (Col., Cleridae).- Ent. Nachr.Ber., **37**, S. 68.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Bd.II.- Erfurt, Selbstverlag.

Anschrift des Verfassers: Dipl. - Lehrer Andreas Kopetz
Julius-Leber-Ring 72
D - 99087 Erfurt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Kopetz Andreas

Artikel/Article: [Checklist der Malachidae, Melyridae, Phloiophilidae, Cleridae, Trogositidae, Derodontidae und Lymexylonidae Thüringens \(Coleoptera\) 40-43](#)