

Checklist der Breitrüßler (Coleoptera: Anthribidae) Thüringens

Stand: 01.05.1996

ANDREAS WEIGEL, Pößneck

Die Familie Anthribidae (Breitrüßler) ist in Deutschland nach FREUDE, HARDE & LOHSE (1981) mit 16 Arten vertreten. Aus Thüringen wurden bisher 11 Arten bekannt, wobei jedoch von zwei Arten keine aktuellen Nachweise vorliegen.

Als Datengrundlage der Checkliste dienten die Sammlungen der Thüringer Museen, die Sammlungen zahlreicher Coleopterologen, die eigene Sammlung sowie Literaturangaben aus RAPP (1933-35, 1953), LIEBMANN (1955) und NÜSSLER (1988). Anthribiden finden sich in den Sammlungen, mit Ausnahme der beiden häufigsten Arten *Anthribus albinus* und *Brachytarsus nebulosus*, nur selten. Der Autor ist deshalb an allen Fundmeldungen aus Thüringen, insbesondere der seltenen Arten, interessiert. Allen Entomologen und Museums-Mitarbeitern, die ihre Daten zur Verfügung stellten, gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank.

Die Arten der Familie Anthribidae entwickeln sich meistens in morschen, oftmals verpilzten Ästen, Stämmen und Stubben verschiedener Nadel- und Laubbäume. Einige Arten sind carnivor (*Brachytarsus*), die anderen gehören zu den xylomycetophagen Coleopteren. Als stenotope und anspruchsvolle Holzkäfer besitzen mehrere Arten eine wichtige Indikatorfunktion für die Bewertung von Gehölzbiotopen (z.B. *Phaeochrotes cinctus*).

Verwendete Abkürzungen:

H	=	Häufigkeit (siehe Einband)
l.N.	=	letzte Nachweise aus Thüringen
W	=	Wiederfund Thüringen
cK	=	coll. Kopetz (Erfurt)
cR	=	coll. Rapp im Museum der Natur Gotha
cW	=	coll. Weigel (Pößneck)

Taxon	<1953 RAPP	nach 1953	H	Bemerkung
1. <i>Platyrrhinus resinosus</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x	v	cW
2. <i>Tropideres albirostris</i> (HERBST, 1783)	x	x	z	cW
3. <i>Allandrus undulatus</i> (PANZER, 1795)	x	x	z	cK, cW
4. <i>Phaeochrotes cinctus</i> (PAYKULL, 1800)	x	x	ss	W, 1995, Arnstadt, cW
5. <i>Enebreutes sepicola</i> (F., 1792)	x	x	z	cW
6. <i>Rhaphitropis marchicus</i> (HERBST, 1797)	x	x	z	cW
7. <i>Dissoleucus niveirostris</i> (F., 1898)	x	x	z	cW
8. <i>Anthrribus albinus</i> (L., 1758)	x	x	h	cW
9. <i>Brachytarsus fasciatus</i> (FORSTER, 1771)	x		ss	l.N. 1900, Arnstadt, cR
10. <i>Brachytarsus nebulosus</i> (FORSTER, 1771)	x	x	h	cW
11. <i>Choragus sheppardi</i> KIRBY, 1818	x		ss	l.N. RAPP (1953), Weimar, cR

Literatur

- FREUDE, H.; HARDE, K.W. & G.A. LOHSE (1981): Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 10 - Krefeld.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.
- NÜSSLER, H. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Anthribidae. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden **14** (15), S. 155- 165.
- RAPP, O. (1933-35): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. - Erfurt, Selbstverlag.
- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. 1. Nachtrag. - Unveröff. Manuskript, Erfurt.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Physiker Andreas Weigel
 Am Friedhof 3
 D - 07381 Pöbneck

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Weigel Andreas

Artikel/Article: [Checklist der Breitrüßler \(Coleoptera: Anthribidae\) Thüringens 54-55](#)