

Checklist der Federgeistchen-Arten (Lepidoptera: Pterophoridae) Thüringens

Stand: 01. 05. 1996

ULF BUCHSBAUM, Kranichfeld

Die Pterophoridae sind neben den Crambinae, ebenfalls als eine gut durchforschte Gruppe anzusehen und mit ihren 56 Arten vom Gebiet der ehemaligen DDR (SUTTER 1991) überschaubar. In Thüringen kommen davon 46 Arten vor, dies sind 82,1 % der in Ostdeutschland nachgewiesenen Arten.

Die vorliegende Checklist entstand in Anlehnung an die Arbeit von SUTTER (1991) und STEUER (1995), sowie eigenen Beobachtungen und Nachweisen, die jedoch in fraglichen Fällen u.a. von SUTTER bestätigt wurden.

Die nachfolgende Aufstellung der Arten der Pterophoridae folgt der Systematik von LERAUT (1980) und SUTTER (1991).

Da bei einigen Arten nur wenig über die tatsächliche Verbreitung und ebensowenig zur Lebensweise, Biologie und Ökologie bekannt ist, wird auf zusätzliche Angaben zur Häufigkeit und Tendenz weitgehend verzichtet.

| Nr. | Taxon | Lit.-Na. | Nachweis | Bemerkung |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| 01 | <i>Agdistis adactyla</i> (HÜBNER, [1819]) | x | - | |
| 02 | <i>Platyptilia gonodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | cB | |
| 03 | <i>Platyptilia calodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | - | |
| 04 | <i>Platyptilia nemoralis</i> (ZELLER, 1841) | x | cB | |
| 05 | <i>Platyptilia tesseradactyla</i> (LINNAEUS, 1761) | x | - | |
| 06 | <i>Platyptilia capnodactyla</i> (ZELLER, 1841) | x | - | |
| 07 | <i>Platyptilia ochrodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | - | |
| 08 | <i>Platyptilia pallidactyla</i> (HAWORTH, 1811) | x | - | |
| 09 | <i>Amblyptilia acanthodactyla</i> (HÜBNER, [1813]) | x | - | |

| Nr. | Taxon | Lit.-Na. | Nachweis | Bemerkung |
|-----|--|----------|----------|-------------------|
| 10 | <i>Amblyptilia punctidactyla</i> (HAWORTH, 1811) | x | - | |
| 11 | <i>Stenoptilia pterodactyla</i> (LINNAEUS, 1761) | x | - | |
| 12 | <i>Stenoptilia bipunctidactyla</i> (SCOPOLI, 1763) | x | - | |
| 13 | <i>Stenoptilia annadactyla</i> (SUTTER, 1988) | x | cB | |
| 14 | <i>Stenoptilia coprodactyla</i> (STAINTON, 1851) | x | - | |
| 15 | <i>Stenoptilia pneumonanthes</i> (BÜTTNER, 1880) | x | - | |
| 16 | <i>Stenoptilia pelidnodactyla</i> (STEIN, 1837) | x | - | |
| 17 | <i>Stenoptilia stigmatodactyla</i> (ZELLER, 1852) | x | - | |
| 18 | <i>Stenoptilia zophodactyla</i> (DUPONCHEL, 1838) | x | - | |
| 19 | <i>Cnaemidophorus rhododactylus</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | cB | |
| 20 | <i>Marasmarcha lunaedactyla</i> (HAWORTH, 1811) | x | cB | |
| 21 | <i>Capperia britannioidactyla</i> (GREGSON, 1869) | x | - | |
| 22 | <i>Capperia celeusi</i> (SCHMID, 1887) | x | - | |
| 23 | <i>Capperia lorana</i> (FUCHS, 1895) | x | - | |
| 24 | <i>Oxyptilus pilosellae</i> (ZELLER, 1841) | x | cB | |
| 25 | <i>Oxyptilus chrysodactylus</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | - | |
| 26 | <i>Oxyptilus ericetorum</i> (STAINTON, 1851) | x | - | |
| 27 | <i>Oxyptilus parvidactylus</i> (HAWORTH, 1811) | x | - | |
| 28 | <i>Crombrugghia distans</i> (ZELLER, 1847) | x | - | |
| 29 | <i>Leioptilus tephrodactyla</i> (HÜBNER, [1813]) | x | - | |
| 30 | <i>Leioptilus scraodactylus</i> (HÜBNER, [1813]) | x | - | |
| 31 | <i>Leioptilus distinctus</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) | x | - | |
| 32 | <i>Leioptilus carphodactylus</i> (HÜBNER, [1813]) | x | cB | |
| 33 | <i>Leioptilus osteodactylus</i> (ZELLER, 1841) | x | - | |
| 34 | <i>Leioptilus chrysocomae</i> RAGONOT, 1875 | x | - | |
| 35 | <i>Adaina microdactyla</i> (HÜBNER, [1813]) | x | - | |
| 36 | <i>Emmelia monodactyla</i> (LINNAEUS, 1758) | x | cB | häufigste Art |
| 37 | <i>Oidaematophorus lithodactylus</i> (TREITSCHKE, 1833) | x | - | |
| 38 | <i>Oidaematophorus constanti</i> RAGONOT, 1875) | x? | - | ist zu überprüfen |
| 39 | <i>Pselnophorus heterodactylus</i> (MÜLLER, 1764) | x | - | |
| 40 | <i>Pterophorus pentadactylus</i> (LINNAEUS, 1758) | x | cB | |
| 41 | <i>Pterophorus galactodactylus</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | - | |
| 42 | <i>Pterophorus spilodactylus</i> CURTIS, 1827 | x | - | |
| 43 | <i>Pterophorus baliodactylus</i> ZELLER, 1841 | x | - | |
| 44 | <i>Pterophorus leucodactylus</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | x | cB | |
| 45 | <i>Pterophorus tridactylus</i> (LINNAEUS, 1758) | x | - | |
| 46 | <i>Pterophorus xerodactylus</i> ZELLER, 1841 | x | - | |

Erläuterungen der Abkürzungen und Zeichen

| | |
|----------|--|
| Lit.-Na. | = Literaturnachweis |
| x? | = Nachweis unsicher |
| cB | = Beleg in coll. Buchsbaum (Kranichfeld) |

Literatur

- LERAUT, P. (1980): Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas.- Suppl. Alexanor, Bull.soc. ent. France., Paris.
- SUTTER, R. (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Pterophoridae.- Beitr. Ent. Berlin. **41** (1), S. 27 - 121.
- STEUER, H. (1995): Die Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen). 45 Jahre Beobachtung, Forschung - Erkenntnisse. - Suppl. Rudolst. Naturhist. Schriften.

Anschrift des Verfassers: Ulf Buchsbaum
Schloßgasse 8
D - 99448 Kranichfeld

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Buchsbaum Ulf

Artikel/Article: [Checklist der Federgeistchen-Arten \(Lepidoptera: Pterophoridae\) Thüringens 73-75](#)