# Checkliste der Scheinbockkäfer (Coleoptera, Oedemeridae) Thüringens

Stand: 01.10.1998

MATTHIAS HARTMANN, Erfurt

In nachstehender Liste sind 21 Arten der Familie Oedemeridae für Thüringen aufgeführt. Die Nomenklatur folgt KÖHLER & KLAUSNITZER (1998). Für 19 Arten liegen aktuelle Funde vor. In den höheren Lagen Thüringens (Rhön, Thüringer Wald, Südharz) ist mit einer weiteren Art zu rechnen: *Oedemera monticola* SVIHLA, 1978. Diese Art wurde erst vor wenigen Jahren erkannt und kommt im benachbarten Sachsen-Anhalt und in Hessen vor. Alle bisher überprüften Exemplare von *O. viridescens* und *O. lurida* brachten jedoch keine Funde der zu erwartenden Art. Eine Nachsuche in der Rhön und im Südharz wird hier eventuell die genauere Klärung bringen.

Oedemeridae werden von den meisten Koleopterologen als Beifänge mit gesammelt, jedoch selten deren Daten weitergegeben. Aus diesem Grund wird auch auf die Einschätzung von Häufigkeitskriterien verzichtet.

Die aufgelisteten Arten sind Resultat der Bearbeitung der Sammlungen in den Museen Erfurt und Gotha, sowie der Meldungen einiger Käfersammler Thüringens. Besonders bedanken möchte sich der Autor bei den Herren Andreas Kopetz (Erfurt) und Andreas Weigel (Pößneck) für die tatkräftige Unterstützung bei der Determination und der Datensammlung. Herrn Klaus Liebenow (Brandenburg) sei für die wertvollen Angaben zum aktuellen Vorkommen einiger Arten gedankt.

Abkürzungen: NKE - Sammlung des Naturkundemueums Erfurt
R - zitiert bei RAPP (1934, 1953), Belege in der Thüringensammlung des Naturkundemuseums Erfurt (Leihgabe an das Museum der Natur Gotha)
cL - coll. K. Liebenow (Brandenburg)
cS - coll. Seidel (Liebenow i.litt.)
cW - coll. A. Weigel (Pößneck)

## Literatur

KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomol. Nachr. u. Ber., Beiheft 4, 185 S.

RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, Band II. - Erfurt, Selbstverlag.

- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, Nachtrag I. - Manuskript, unveröff.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Biol. Matthias Hartmann
Naturkundemuseum Erfurt
Große Arche 14
D - 99084 Erfurt

| Nr. | Taxon | vor 1960 | nach 1960 | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calopus serraticornis (L., 1758) | | x | cW |
| 2 | Nacerdes melanura (L., 1758)<br>(früher Nacerda) | | x | cL |
| 3 | Anogcodes ferruginea (SCHRANK, 1776)<br>(früher Nacerda) | | x | cS |
| 4 | Anogcodes ustulata (F., 1787)<br>(früher Nacerda) | x | x | cW |
| 5 | Anogcodes fulvicollis (SCOPOLI, 1763)<br>(früher Nacerda) | | x | cW |
| 6 | Ditylus laevis (F., 1787) | x | | R |
| 7 | Chrysanthia viridissima (L., 1758) | x | x | NKE |
| 8 | Chrysanthia nigricornis WESTH., 1882 | x | x | NKE |
| 9 | Ischnomera sanguinicollis (F., 1787) | x | x | cW |
| 10 | Ischnomera caerulea (L., 1758) | x | x | NKE |
| 11 | Ischnomera cyanea (F., 1792) | | x | cW |
| 12 | Ischnomera cinerascens (PANDELLE, 1867) | | x | cW |
| 13 | Oedemera flavipes (F. 1792) | x | x | NKE |
| 14 | Oedemera podagrariae (L., 1767) | x | x | NKE |
| 15 | Oedemera femorata (SCOPOLI, 1763) | x | x | NKE |
| 16 | Oedemera subulata OLIVIER, 1794 | x | x | cW |
| 17 | Oedemera tristis SCHM., 1846 | x | | R |
| 18 | Oedemera nobilis (SCOPOLI, 1763) | x | x | NKE |
| 19 | Oedemera virescens (L., 1767) | x | x | NKE |
| 20 | Oedemera lurida (MARSHAM, 1802) | x | x | NKE |
| 21 | Oedemera femoralis (OLIVIER, 1803)<br>(= Oncomera femorata (F., 1793) | x | x | cW |

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Checklisten der Thüringer Insekten

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Hartmann Matthias

Artikel/Article: Checkliste der Scheinbockkäfer (Coleoptera, Oedemeridae) Thüringens 31-32