

Aktualisierte Checkliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae)

Thüringens

Stand: 01.11.1999

MATTHIAS HARTMANN, Erfurt

Die neue Checkliste der Laufkäfer wurde notwendig, da seit dem Erscheinen der ersten Fassung (HARTMANN 1993) neben zahlreichen taxonomischen Änderungen auch eine große Anzahl von Wiederfinden und einige Neufunde für Thüringen zu verzeichnen waren. Außerdem wuchs durch die Unterstützung zahlreicher Sammler der Kenntnisstand in dieser Käferfamilie so stark an, daß eine weitere Aufgliederung des Bundeslandes Thüringen in drei Nachweis-Regionen möglich wurde. Dies ist vor allem dazu gedacht, regionalen Sammlern eine bessere Möglichkeit zur Interpretation ihrer Funde zu geben. Außerdem soll sie zu verstärkten Aktivitäten anregen, um die eine oder andere fehlende Art in der jeweiligen Region nachzuweisen. Bei der Einteilung der Regionen wurden die aktuellen administrativen Grenzen der Landkreise (incl. der kreisfreien Städte) mit den Ausnahmen Wartburgkreis (Altkreise Eisenach und Bad Salzungen) und Ilmkreis (Altkreise Ilmenau und Arnstadt) verwendet.

Es ergeben sich somit folgende Regionen mit den Landkreisen:

- Nord-/Mittelthüringen - Nordhausen, Eichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Sömmerda, Weimarer Land, Weimar, Erfurt, Gotha, Altkreis Eisenach, Altkreis Arnstadt
- Südthüringen - Altkreis Bad Salzungen, Schmalkalden-Meiningen, Suhl, Hildburghausen, Altkreise Ilmenau, Sonneberg
- Ostthüringen - Jena, Saale-Holzland-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Gera, Greiz, Altenburger Land.

Nomenklatorische Basis dieser Liste sind die Arbeiten von TRAUTNER & MÜLLER-MOTZFELD (1995) und TRAUTNER; MÜLLER-MOTZFELD & BRÄUNICKE (1997) einschließlich aller notwendigen Änderungen, die sich mit Erscheinen des Bandes 15 der "Käfer Mitteleuropas" (LUCHT & KLAUSNITZER 1998) ergaben. Damit diese z. T. erheblichen Änderungen nicht den Rahmen der Arbeit sprengen, sind hier nur die wichtigsten Synonymien angegeben. Einfache Änderungen der Schreibweisen können den Originalwerken entnommen werden.

Derzeit sind aus Thüringen 406 Laufkäferarten bekannt. Davon sind 364 aktuell belegbar. Weitere 42 Arten sind seit 1950 nicht mehr nachgewiesen, bzw. verschollen und nur bei RAPP (1933) oder LIEBMANN (1955) aufgeführt. Bei einigen Arten ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sie in Thüringen ausgestorben sind (z. B. *Calosoma reticulatum* F.), andere wurden zwar bis 1955 beobachtet, besitzen aber seit der Zerstörung ihrer Lebensräume keine Überlebenschance mehr (so *Agonum munsteri* Hellén).

Die aktuellen Nachweise basieren sämtlich auf überprüfte Belege. Einige in der Literatur genannte Arten wurden nicht berücksichtigt, da sich die Nennung zweifelsfrei als Fehlbestimmung deuten ließ (z. B. *Dyschirius lafertei* Putzeys bei PESCHEL 1997 ist der im Kyffhäusergebiet häufige *D. bonellii* Putzeys).

Alle aktuellen Nachweise sind der MAGIC-Datenbank (Fauna Coleoptera Thüringen) des Naturkundemuseums Erfurt entnommen.

Der Autor dankt an dieser Stelle nachdrücklich den mehr als 40 Coleopterologen, die durch Bereitstellung ihres Daten- und/oder Sammlungsmaterials die vorliegende Arbeit ermöglichten. Ebenso möchte sich der Autor bei den Kollegen bedanken, die eine der

Überprüfung kritischer Arten übernehmen: Dr. F. Hieke (Berlin), B. Jaeger (Berlin), Prof. Dr. G. Müller-Motzfeld (Greifswald), J. Schmidt (Rostock) und D.W. Wrase (Berlin).

Liste der Laufkäfer Thüringens (systematisch geordnet)

N - Nord- und Mittelthüringen x - Nachweis vor 1950
 E - Ostthüringen + - Nachweis nach 1950
 S - Südthüringen Anm. - Anmerkung (s. Text)

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
1	<i>Cicindela sylvatica</i> LINNAEUS, 1758	+	+	+	
2	<i>Cicindela sylvicola</i> DEJEAN, 1822	+	+	+	
3	<i>Cicindela hybrida</i> LINNAEUS, 1758	+	+	+	
4	<i>Cicindela campestris</i> LINNAEUS, 1758	+	+	+	
5	<i>Cicindina arenaria viennensis</i> (SCHRANK, 1781)		+		1
6	<i>Cylindera germanica</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
7	<i>Calosoma inquisitor</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	x	
8	<i>Calosoma sycophanta</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	2
9	<i>Calosoma maderae auropunctatum</i> (HERBST, 1784)	+	+	x	
10	<i>Calosoma reticulatum</i> (FABRICIUS, 1787)	x			3
11	<i>Carabus coriaceus</i> LINNAEUS, 1758	+	+	+	
12	<i>Carabus irregularis</i> FABRICIUS, 1792	+	x	+	
13	<i>Carabus violaceus</i> LINNAEUS, 1758	x	+	x	
14	<i>Carabus purpurascens</i> FABRICIUS, 1787	+	+	+	
15	<i>Carabus intricatus</i> LINNAEUS, 1761	+	+	+	
16	<i>Carabus auronitens</i> FABRICIUS, 1792	+	+	+	
17	<i>Carabus problematicus</i> HERBST, 1786	+	+	+	
18	<i>Carabus granulatus</i> LINNAEUS, 1758	+	+	+	
19	<i>Carabus clatratus</i> LINNAEUS, 1761	+		x	
20	<i>Carabus cancellatus</i> ILLIGER, 1798	+	+	+	
21	<i>Carabus auratus</i> LINNAEUS, 1761	+	+	+	
22	<i>Carabus convexus</i> FABRICIUS, 1775	+	+	+	
23	<i>Carabus nitens</i> LINNAEUS, 1758	x	+	x	4
24	<i>Carabus ulrichii</i> GERMAR, 1824			+	
25	<i>Carabus arcensis</i> HERBST, 1784	+	+	+	
26	<i>Carabus monilis</i> FABRICIUS, 1792	+		+	
27	<i>Carabus nemoralis</i> O.F. MÜLLER, 1764	+	+	+	
28	<i>Carabus hortensis</i> LINNAEUS, 1758	+	+	+	
29	<i>Carabus glabratus</i> PAYKULL, 1790	+	+	+	
30	<i>Carabus linnei</i> PANZER, 1810	+	+	+	
31	<i>Carabus sylvestris</i> PANZER, 1796	+	+	+	
32	<i>Cychrus caraboides</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
33	<i>Cychrus attenuatus</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
34	<i>Leistus spinibarbis</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+	x	
35	<i>Leistus rufomarginatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+		
36	<i>Leistus terminatus</i> (HELLWIG, 1793)	+	+	+	
37	<i>Leistus ferrugineus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
38	<i>Leistus piceus</i> FROELICH, 1799	x		+	5
39	<i>Nebria livida</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+		

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
40	<i>Nebria brevicollis</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
41	<i>Nebria salina</i> FAIMAIRE & LABOULBÈNE, 1854	+	+		
42	<i>Notiophilus aesthuans</i> MOTSCHULSKY, 1833	+	+	+	
43	<i>Notiophilus aquaticus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
44	<i>Notiophilus palustris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
45	<i>Notiophilus germyini</i> FAUVEL, 1863	+	+	+	
46	<i>Notiophilus rufipes</i> CURTIS, 1829	+	+		
47	<i>Notiophilus biguttatus</i> (FABRICIUS, 1799)	+	+	+	
48	<i>Omophron limbatum</i> (FABRICIUS, 1776)	+	+	+	
49	<i>Blethisa multipunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	x	+	
50	<i>Elaphrus uliginosus</i> FABRICIUS, 1775	+	x	+	
51	<i>Elaphrus cupreus</i> DUFTSCHMID, 1812	+	+	+	
52	<i>Elaphrus riparius</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
53	<i>Elaphrus aureus</i> P. MÜLLER, 1821	+	+	+	
54	<i>Elaphrus ullrichii</i> W. REDTENBACHER, 1842	x			
55	<i>Loricera pilicornis</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+	+	
56	<i>Clivina fossor</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
57	<i>Clivina collaris</i> (HERBST, 1786)	+	+	+	
58	<i>Dyschirius digitatus</i> (DEJEAN, 1825)			x	6
59	<i>Dyschirius thoracicus</i> (ROSSI, 1790)	+		x	
60	<i>Dyschirius nitidus</i> (DEJEAN, 1825)	+	x	+	
61	<i>Dyschirius agnatus</i> MOTSCHULSKY, 1844 (= <i>D. lucidus obenbergeri</i> MARAN, 1935)	+		+	
62	<i>Dyschirius politus</i> (DEJEAN, 1825)	+	+	+	
63	<i>Dyschirius chalcus</i> ERICHSON, 1837	+		+	
64	<i>Dyschirius extensus</i> PUTZEYS, 1846	+			
65	<i>Dyschirius salinus</i> SCHAUM, 1843	+		+	
66	<i>Dyschirius aeneus</i> (DEJEAN, 1825)	+	+	+	
67	<i>Dyschirius luedersi</i> WAGNER, 1915	+	+	+	
68	<i>Dyschirius intermedius</i> PUTZEYS, 1846	x	+		7
69	<i>Dyschirius laeviusculus</i> PUTZEYS, 1846	+			8
70	<i>Dyschirius angustatus</i> (AHRENS, 1830)	+	+	+	
71	<i>Dyschirius bonellii</i> PUTZEYS, 1846	+	+	+	
72	<i>Dyschirius globosus</i> (HERBST, 1784)	+	+	+	
73	<i>Brosicus cephalotes</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
74	<i>Perileptus areolatus</i> (CREUTZER, 1799)	x	x	x	
75	<i>Thalassophilus longicornis</i> (STURM, 1825)	+		x	
76	<i>Epaphius secalis</i> (PAYKULL, 1790)	+	+	+	
77	<i>Trechus rubens</i> (FABRICIUS, 1792)	x	+	+	
78	<i>Trechus quadristriatus</i> (SCHRANK, 1781)	+	+	+	
79	<i>Trechus obtusus</i> ERICHSON, 1837	+	+	+	
80	<i>Trechus splendens</i> GEMMINGER & HAROLD, 1868			+	
81	<i>Trechus pilisensis</i> CSIKI, 1918		+	+	
82	<i>Blemus discus</i> (FABRICIUS, 1792) [früher <i>Lasiotrechus</i>]	+	+	x	
83	<i>Trechoblemus micros</i> (HERBST, 1784)	+	+	+	
84	<i>Tachys scutellaris</i> STEPHENS, 1828	+			
85	<i>Paratachys bistriatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x		+	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
86	Paratachys micros (FISCHER V. WALDHEIM, 1828)	+	x		
87	Paratachys fulvicollis (DEJEAN, 1831)	+			
88	Elaphropus haemorrhoidalis (PONZA, 1805) [früher Tachys]		+		9
89	Elaphropus diabrachys (KOLENATI, 1845) [früher Tachys]	+			
90	Elaphropus parvulus (DEJEAN, 1831) [früher Tachys]	+	+	+	
91	Elaphropus quadrisignatus (DUFTSCHMID, 1812) [früher Tachys]	+	+	x	
92	Porotachys bisulcatus (NICOLAI, 1822) [früher Tachys]	+	+	+	
93	Tachyta nana (GYLLENHAL, 1810)	+	+	+	
94	Bembidion striatum (FABRICIUS, 1792)	x	x	x	10
95	Bembidion argenteolum AHRENS, 1812		x		10
96	Bembidion velox (LINNAEUS, 1761)	x			10
97	Bembidion litorale (OLIVIER, 1790)	x	x	x	10
98	Bembidion pygmaeum (FABRICIUS, 1792)	+	+	x	
99	Bembidion lampros (HERBST, 1784)	+	+	+	
100	Bembidion properans (STEPHENS, 1828)	+	+	+	
101	Bembidion punctulatum DRAPIEZ, 1821	+	+	+	
102	Bembidion bipunctatum (LINNAEUS, 1761)	+	x	x	
103	Bembidion dentellum (THUNBERG, 1787)	+	+	+	
104	Bembidion obliquum STURM, 1825	+	+	+	
105	Bembidion varium (OLIVIER, 1795)	+	+	+	
106	Bembidion semipunctatum (DONOVAN, 1806)	+	+	+	
107	Bembidion prasinum (DUFTSCHMID, 1812)	x	x		10
108	Bembidion tibiale (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
109	Bembidion geniculatum HEER, 1837	+	+	+	
110	Bembidion atrocaeruleum STEPHENS, 1828	+	+	+	
111	Bembidion ascendens K. DANIEL, 1902	x	x	x	
112	Bembidion monticola STURM, 1825	+	x	+	
113	Bembidion deletum AUDINET-SERVILLE, 1821	+	+	+	
114	Bembidion stephensii CROTCH, 1866	+	+	+	
115	Bembidion milleri JACQUELIN DU VAL, 1851	+	+	+	
116	Bembidion lunatum DUFTSCHMID, 1812	+	x	x	
117	Bembidion bruxellense WESMAEL, 1835	+	+	+	
118	Bembidion tetracolum SAY, 1823	+	+	+	
119	Bembidion femoratum STURM, 1825	+	+	+	
120	Bembidion testaceum (DUFTSCHMID, 1812)	+	x	x	
121	Bembidion fluviatile DEJEAN, 1831	+	+	x	
122	Bembidion decorum (ZENKER in PANZER, 1801)	+	+	+	
123	Bembidion modestum (FABRICIUS, 1801)	+		+	
124	Bembidion tetragrammum illigeri NETOLITZKY, 1916	+	+	+	
125	Bembidion stomoides DEJEAN, 1831	+		+	
126	Bembidion millerianum HEYDEN, 1883	x	+	+	
127	Bembidion schueppelii DEJEAN, 1831	+	+	+	
128	Bembidion gilvipes STURM, 1825	+	+	+	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
129	Bembidion fumigatum (DUFTSCHMID, 1812)	+		+	
130	Bembidion assimile GYLLENHAL, 1810	+	+	+	
131	Bembidion aspericolle (GERMAR, 1812)	+		+	
132	Bembidion minimum (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
133	Bembidion tenellum ERICHSON, 1837	+	x	+	
134	Bembidion azurescens DALLA TORRE, 1877	+	x	+	
135	Bembidion humerale STURM, 1825	+	+	+	
136	Bembidion quadrimaculatum (LINNAEUS, 1761)	+	+	+	
137	Bembidion quadripustulatum AUDINET-SERVILLE, 1821	+	+	+	
138	Bembidion doris (PANZER, 1797)	+	+	+	
139	Bembidion articulatum (PANZER, 1796)	+	+	+	
140	Bembidion octomaculatum (GOEZE, 1777)	+	+	+	
141	Bembidion obtusum AUDINET-SERVILLE, 1821	+	+	+	
142	Bembidion biguttatum (FABRICIUS, 1779)	+	+	+	
143	Bembidion mannerheimii C.R. SAHLBERG, 1827	+	+	+	
144	Bembidion guttula (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
145	Bembidion lunulatum (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)	+	+	+	
146	Ocys harpaloides (AUDINET-SERVILLE, 1821)	+	+	+	
147	Ocys quinquistriatus (GYLLENHAL, 1810)	x	+	+	11
148	Asaphidion pallipes (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	x	
149	Asaphidion flavipes (LINNAEUS, 1761)	+	+	+	
150	Asaphidion curtum (HEYDEN, 1870)	+	+		
151	Asaphidion austriacum SCHWEIGER, 1975		+		
152	Pogonus luridipennis (GERMAR, 1822)	x		x	
153	Pogonus iridipennis NICOLAI, 1822	x			
154	Pogonus chalceus (MARSHAM, 1802)	+			
155	Patrobus australis J. SAHLBERG, 1875	+			
156	Patrobus atrorufus (STROEM, 1768)	+	+	+	
157	Perigona nigriceps (DEJEAN, 1831)	+			
158	Anisodactylus binotatus (FABRICIUS, 1787)	+	+	+	
159	Anisodactylus nemorivagus (DUFTSCHMID, 1812)	x	x		
160	Anisodactylus signatus (PANZER, 1797)	x		x	
161	Anisodactylus poeciloides (STEPHENS, 1828)	+		+	
162	Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758)	+	+	x	
163	Trichotichnus laevicollis (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
164	Trichotichnus nitens (HEER, 1838)			+	12
165	Harpalus cephalotes FAIRMAIRE, 1856	x			
166	Harpalus signaticornis (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	x	
167	Harpalus flavescens (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	x	+	x	
168	Harpalus froelichii STURM, 1818	+	+		
169	Harpalus hirtipes (PANZER, 1797)	x	+	x	
170	Harpalus zabroides DEJEAN, 1829	+			
171	Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)	+	+	+	
172	Harpalus distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
173	Harpalus smaragdinus (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
174	<i>Harpalus dimidiatus</i> (ROSSI, 1790)	+	+	+	
175	<i>Harpalus caspius roubali</i> SCHAUBERGER, 1928	+	+	+	
176	<i>Harpalus atratus</i> LATREILLE, 1804	+	+	x	
177	<i>Harpalus solitaris</i> DEJEAN, 1829	+	+	+	
178	<i>Harpalus xanthopus winkleri</i> SCHAUBERGER, 1923	+			15
179	<i>Harpalus progrediens</i> SCHAUBERGER, 1922		+	x	16
180	<i>Harpalus latus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
181	<i>Harpalus luteicornis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	x	x	
182	<i>Harpalus laevipes</i> ZETTERSTEDT, 1828	+	+	+	
183	<i>Harpalus rubripes</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
184	<i>Harpalus sulphuripes</i> GERMAR, 1824	x			
185	<i>Harpalus honestus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
186	<i>Harpalus rufipalpis</i> STURM, 1818	+	+	+	
187	<i>Harpalus neglectus</i> AUDINET-SERVILLE, 1821	x		x	
188	<i>Harpalus autumnalis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x	x		
189	<i>Harpalus picipennis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x	x	x	
190	<i>Harpalus pumilus</i> STURM, 1818	+	+	+	
191	<i>Harpalus servus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x	x	x	
192	<i>Harpalus politus</i> DEJEAN, 1829	+	+	x	
193	<i>Harpalus tardus</i> PANZER, 1797	+	+	+	
194	<i>Harpalus modestus</i> DEJEAN, 1829	x	+		
195	<i>Harpalus anxius</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
196	<i>Harpalus subcylindricus</i> DEJEAN, 1829	+			
197	<i>Harpalus serripes</i> (QUENSEL, 1806)	+	+	x	
198	<i>Harpalus tenebrosus</i> DEJEAN, 1829	x	+		
199	<i>Ophonus sabulicola</i> (PANZER, 1796)	+	+	x	
200	<i>Ophonus stictus</i> STEPHENS, 1828	+	+	+	
201	<i>Ophonus diffinis</i> (DEJEAN, 1829)	+		x	
202	<i>Ophonus ardosiacus</i> (LUTSHNIK, 1922)	+		+	13
203	<i>Ophonus azureus</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+	+	
204	<i>Ophonus rufibarbis</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
205	<i>Ophonus schaubergerianus</i> PUEL, 1937	+	+	+	
206	<i>Ophonus cordatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	x	+	
207	<i>Ophonus nitidulus</i> STEPHENS, 1828	+	+	+	
208	<i>Ophonus parallelus</i> DEJEAN, 1829	+			14
209	<i>Ophonus puncticollis</i> (PAYKULL, 1798)	+	+	+	
210	<i>Ophonus melletii</i> HEER, 1837	+	+	+	
211	<i>Ophonus rupicola</i> STURM, 1818	+	+	+	
212	<i>Ophonus puncticeps</i> (STEPHENS, 1828)	+	+	+	
213	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (DEGEER, 1774)	+	+	+	
214	<i>Pseudoophonus griseus</i> (PANZER, 1797)	+	+	+	
215	<i>Pseudoophonus calceatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	x	
216	<i>Stenolophus teutonius</i> (SCHRANK, 1781)	+	+	+	
217	<i>Stenolophus skrimshirani</i> STEPHENS, 1828	+	+		
218	<i>Stenolophus mixtus</i> (HERBST, 1784)	+	+	+	
219	<i>Dicheirotichus gustavii</i> CROTCH, 1871	+			
220	<i>Dicheirotichus obsoletus</i> (DEJEAN, 1829)	+			

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
221	Dicheirotichus rufithorax (C.R. SAHLBERG, 1827)	+	+	+	
222	Dicheirotichus (Trichocellus) placidus (GYLLENHAL, 1827)	+	+		
223	Dicheirotichus (Trichocellus) cognatus (GYLLENHAL, 1827)	x			
224	Bradycellus ruficollis (STEPHENS, 1828)	+	+	x	
225	Bradycellus verbasci (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
226	Bradycellus harpalinus (AUDINET-SERVILLE, 1821)	+	+	+	
227	Bradycellus csikii LACZO, 1912	+	+	+	
228	Bradycellus caucasicus (CHAUDOIR, 1846)	+	+	+	
229	Acupalpus elegans (DEJEAN, 1829)	+		+	
230	Acupalpus flavicollis (STURM, 1825)	+	+	+	
231	Acupalpus brunnipes (STURM, 1825)	x	x		
232	Acupalpus meridianus (LINNAEUS, 1761)	+	+	+	
233	Acupalpus parvulus (STURM, 1825)	+	+	+	
234	Acupalpus maculatus (SCHAUM, 1860)	+			
235	Acupalpus dubius SCHILSKY, 1888	+	+	x	
236	Acupalpus exiguus DEJEAN, 1829	+	x	x	
237	Acupalpus interstitialis REITTER, 1884	+			17
238	Anthracus consputus (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
239	Stomis pumicatus (PANZER, 1796)	+	+	+	
240	Poecilus punctulatus (SCHALLER, 1783)	x	+	x	18
241	Poecilus kugelanni (PANZER, 1797)	x			
242	Poecilus sericeus FISCHER V. WALDHEIM, 1823	x			
243	Poecilus lepidus (LESKE, 1785)	+	+	+	
244	Poecilus cupreus (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
245	Poecilus versicolor (STURM, 1824)	+	+	+	
246	Pterostichus longicollis (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
247	Pterostichus pumilio (DEJEAN, 1828)			+	
248	Pterostichus negligens (STURM, 1824)			+	19
249	Pterostichus strenuus (PANZER, 1797)	+	+	+	
250	Pterostichus diligens (STURM, 1824)	+	+	+	
251	Pterostichus ovoideus (STURM, 1824)	+	+	+	
252	Pterostichus vernalis (PANZER, 1796)	+	+	+	
253	Pterostichus nigrata (PAYKULL, 1790)	+	+	+	
254	Pterostichus rhaeticus HEER, 1837	+	+	+	
255	Pterostichus anthracinus (ILLIGER, 1798)	+	+	+	
256	Pterostichus gracilis (DEJEAN, 1828)	+	+	x	
257	Pterostichus minor (GYLLENHAL, 1827)	+	+	+	
258	Pterostichus macer (MARSHAM, 1802)	+	+	+	
259	Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS, 1787)	+	+	+	
260	Pterostichus quadrioveolatus LETZNER, 1852	+	+	+	
261	Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)	+	+	+	
262	Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1798)	+	+	+	
263	Pterostichus aterrimus (HERBST, 1784)	x		x	
264	Pterostichus madidus (FABRICIUS, 1775)	+		+	
265	Pterostichus aethiops (PANZER, 1797)	+	+		
266	Pterostichus melas (CREUTZER, 1799)	+		+	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
267	<i>Pterostichus burmeisteri</i> HEER, 1841	+	+	+	
268	<i>Pterostichus cristatus</i> (DUFOUR, 1820)	+			
269	<i>Molops elatus</i> (FABRICIUS, 1801)	+	+	+	
270	<i>Molops piceus</i> (PANZER, 1793)	+	+	+	
271	<i>Abax parallelopipedus</i> (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	+	+	+	
272	<i>Abax parallelus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
273	<i>Abax ovalis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
274	<i>Abax carinatus porcatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)		x	+	20
275	<i>Synuchus vivalis</i> (ILLIGER, 1797)	+	+	+	
276	<i>Calathus fuscipes</i> (GOEZE, 1777)	+	+	+	
277	<i>Calathus erratus</i> (C.R. SAHLBERG, 1827)	+	+	+	
278	<i>Calathus ambiguus</i> (PAYKULL, 1790)	+	+	x	
279	<i>Calathus micropterus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
280	<i>Calathus melanocephalus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
281	<i>Calathus cinctus</i> MOTSCHULSKY, 1850 (= <i>C. mollis erythroderus</i> GEMM. & HAR., 1868)	+	+		
282	<i>Calathus rotundicollis</i> DEJEAN, 1828	+	+		
283	<i>Dolichus halensis</i> (SCHALLER, 1883)	+	x	x	
284	<i>Sphodrus leucophthalmus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	
285	<i>Laemostenus terricola</i> (HERBST, 1783)	+	+	x	
286	<i>Olisthopus rotundatus</i> (PAYKULL, 1790)	+	+	+	
287	<i>Olisthopus sturmii</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+			
288	<i>Agonum impressum</i> (PANZER, 1797)			x	
289	<i>Agonum sexpunctatum</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
290	<i>Agonum viridicupreum</i> (GOEZE, 1777)	x		x	
291	<i>Agonum gracilipes</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+		
292	<i>Agonum marginatum</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
293	<i>Agonum muelleri</i> (HERBST, 1784)	+	+	+	
294	<i>Agonum versutum</i> STURM, 1824	+	+	+	
295	<i>Agonum viduum</i> (PANZER, 1797)	+	+	+	
296	<i>Agonum afrum</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
297	<i>Agonum monachum</i> DUFTSCHMID, 1812 (= <i>A. atratum</i> DUFTSCHMID, 1812)	x			
298	<i>Agonum lugens</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x			
299	<i>Agonum micans</i> NICOLAI, 1822	+	+	+	
300	<i>Agonum piceum</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
301	<i>Agonum gracile</i> STURM, 1824	+	+	+	
302	<i>Agonum munsteri</i> (HELLÉN, 1935)	x			
303	<i>Agonum fuliginosum</i> (PANZER, 1809)	+	+	+	
304	<i>Agonum thoreyi</i> DEJEAN, 1828	+	+	+	
305	<i>Sericoda quadripunctata</i> (DEGEER, 1774) [früher <i>Agonum quadripunctatum</i>]	x		x	
306	<i>Anchomenus dorsalis</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	+	+	+	
307	<i>Platynus livens</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x	x	
306	<i>Limodromus assimilis</i> (PAYKULL, 1790) [früher zu <i>Platynus</i>]	+	+	+	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
308	<i>Limodromus longiventris</i> (MANNERHEIM, 1825) [früher zu <i>Platynus</i>]	x		x	
309	<i>Paranchus albipes</i> (FABRICIUS, 1796) [früher zu <i>Platynus</i>]	+	+	+	
310	<i>Oxypselaphus obscurus</i> (HERBST, 1784) [früher zu <i>Platynus</i>]	+	+	+	
312	<i>Zabrus tenebrioides</i> (GOEZE, 1777)	+	+	x	
313	<i>Amara plebeja</i> (GYLLENHAL, 1810)	+	+	+	
314	<i>Amara pseudostrenua</i> KULT, 1946	+	x		
315	<i>Amara strenua</i> ZIMMERMANN, 1832	+			21
316	<i>Amara similata</i> (GYLLENHAL, 1810)	+	+	+	
317	<i>Amara ovata</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
318	<i>Amara montivaga</i> STURM, 1825	+	+	+	
319	<i>Amara nitida</i> STURM, 1825	+	+	+	
320	<i>Amara convexior</i> STEPHENS, 1828	+	+	+	
321	<i>Amara communis</i> (PANZER, 1797)	+	+	+	
322	<i>Amara littorea</i> C.G. THOMSON, 1857	+	+	+	
323	<i>Amara curta</i> DEJEAN, 1828	+	+	+	
324	<i>Amara lunicollis</i> SCHIÖDTE, 1837	+	+	+	
325	<i>Amara aenea</i> (DEGEER, 1774)	+	+	+	
326	<i>Amara eurynota</i> (PANZER, 1798)	+	+	+	
327	<i>Amara spreta</i> DEJEAN, 1831	+	+	+	
328	<i>Amara famelica</i> ZIMMERMANN, 1832	x		+	
329	<i>Amara familiaris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
330	<i>Amara lucida</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	x	x	
331	<i>Amara tibialis</i> (PAYKULL, 1798)	+	+	+	
332	<i>Amara ingenua</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
333	<i>Amara erratica</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x		+	
334	<i>Amara fusca</i> DEJEAN, 1812	+	+		
335	<i>Amara cursitans</i> ZIMMERMANN, 1832	+	+	+	
336	<i>Amara municipalis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	x	
337	<i>Amara bifrons</i> (GYLLENHAL, 1810)	+	+	+	
338	<i>Amara infima</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	x	x	22
339	<i>Amara praetermissa</i> (C.R. SAHLBERG, 1827)	+	+	x	
340	<i>Amara brunnea</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	+	x	
341	<i>Amara sabulosa</i> (AUDINET-SERVILLE, 1821)	+	+		
342	<i>Amara fulva</i> (O.F. MÜLLER, 1775)	+	+	+	
343	<i>Amara consularis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
344	<i>Amara majuscula</i> CHAUDOIR, 1850	+	+	+	
345	<i>Amara apricaria</i> (PAYKULL, 1790)	+	+	+	
346	<i>Amara crenata</i> DEJEAN, 1828	+	+		
347	<i>Amara aulica</i> (PANZER, 1797)	+	+	+	
348	<i>Amara gebleri</i> DEJEAN, 1831		+	+	23
349	<i>Amara convexuscula</i> (MARSHAM, 1802)	+	+	+	
350	<i>Amara equestris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
351	<i>Chlaenius tristis</i> (SCHALLER, 1783)	+	+	x	24
352	<i>Chlaenius nigricornis</i> (FABRICIUS, 1787)	+	+	+	
353	<i>Chlaenius nitidulus</i> (SCHRANK, 1781)	+	+	x	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
354	Chlaenius vestitus (PAYKULL, 1790)	+	+	+	
355	Callistus lunatus (FABRICIUS, 1775)	+	+	+	
356	Oodes helopioides (FABRICIUS, 1792)	+	+	+	
357	Licinus punctulatus (FABRICIUS, 1792)	x		x	
358	Licinus depressus (PAYKULL, 1790)	+	x		
359	Licinus cassideus (FABRICIUS, 1792)	+	+	x	
360	Badister unipustulatus BONELLI, 1813	+	x	+	
361	Badister bullatus (SCHRANK, 1798)	+	+	+	
362	Badister lacertosus STURM, 1815	+	+	+	
363	Badister meridionalis PUEL, 1925	+	+	+	
364	Badister sodalis (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	x	
365	Badister dorsiger (DUFTSCHMID, 1812)	+			
366	Badister dilatatus CHAUDOIR, 1837	+	x		
367	Badister peltatus (PANZER, 1797)	+	+	x	
368	Badister collaris MOTSCHULSKY, 1844	+		+	
369	Panagaeus cruxmajor (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
370	Panagaeus bipustulatus (FABRICIUS, 1775)	+	+	+	
371	Odacantha melanura (LINNAEUS, 1767)	+	+	x	
372	Masoreus wetterhallii (GYLLENHAL, 1813)	+			
373	Lebia chlorocephala (HOFFMANN, 1803)	+	+	+	
374	Lebia cyanocephala (LINNAEUS, 1758)	+	+	x	
375	Lebia cruxminor (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
376	Lebia humeralis DEJEAN, 1825	x		x	
377	Lebia marginata (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)	x	+	x	
378	Demetrias atricapillus (LINNAEUS, 1758)	+	+	x	
378	Demetrias monostigma SAMOUELLE, 1819	+		x	
380	Demetrias imperialis (GERMAR, 1824)	+	+		
381	Cymindis humeralis (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)	+	+	+	
382	Cymindis axillaris (FABRICIUS, 1794)	+	+	x	
383	Cymindis angularis GYLLENHAL, 1810	+			
384	Cymindis macularis MANNERHEIM in FISCHER V. WALDHEIM, 1824	+		x	
385	Cymindis vaporariorum (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	
386	Dromius agilis (FABRICIUS, 1787)	+	+	+	
387	Dromius angustus BRULLE, 1834	+	+	x	
388	Dromius schneideri CROTCH, 1871	+	+	+	
389	Dromius fenestratus (FABRICIUS, 1794)	+	+	+	
390	Dromius quadrimaculatus (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
391	Paradromius linearis (OLIVIER, 1795) [früher zu Dromius]	+	+	x	
392	Calodromius spilotus (ILLIGER, 1798) [früher zu Dromius]	+	+	+	
393	Philorhizus sigma (ROSSI, 1790) [früher zu Dromius]	+	+	+	
394	Philorhizus notatus (STEPHENS, 1827) [früher zu Dromius]	+	+	+	

Nr.	Taxon	N	E	S	Anm.
395	<i>Philorhizus melanocephalus</i> (DEJEAN, 1825) [früher zu <i>Dromius</i>]	+		x	
396	<i>Syntomus obscuroguttatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x			
397	<i>Syntomus foveatus</i> (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)	+	+	+	
398	<i>Syntomus pallipes</i> (DEJEAN, 1825)	x			
399	<i>Syntomus truncatellus</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+	+	
400	<i>Lionychus quadrillum</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	x	
401	<i>Microlestes minutulus</i> (GOEZE, 1777)	+	+	+	
402	<i>Microlestes maurus</i> (STURM, 1827)	+	+	+	
403	<i>Polistichus connexus</i> (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)	x			
404	<i>Drypta dentata</i> (ROSSI, 1790)			x	
405	<i>Brachinus crepitans</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+	+	
406	<i>Brachinus explodens</i> (DUFTSCHMID, 1812)	+	+	+	
	Anzahl aktuell belegter Arten	337	291	260	
	Anzahl historisch nachgewiesener Arten	53	36	78	
	Summe	390	327	338	

Anmerkungen:

- 1 - *Cicindina arenaria viennensis*: 24.08.1995 Haselbach/Altenburg (leg. Poller) - Neufund für Thüringen.
- 2 - *Calosoma sycophanta*: letzter Nachweis 1951 in Wutha (in coll. Skale).
- 3 - *Calosoma reticulatum*: letzter Nachweis 1900 bei Sömmerda (RAPP 1933).
- 4 - *Carabus nitens*: Wiederfund bei Bad Klosterlausnitz, 1995 (mdl. Jänicke).
- 5 - *Leistus piceus*: Wiederfund 1996 bei Gräfenroda (leg. Apfel).
- 6 - *Dyschirius digitatus*: letzter Nachweis um 1900, Werra-Aue.
- 7 - *Dyschirius intermedius*: Wiederfund 1975 bei Treben (leg. Poller).
- 8 - *Dyschirius laeviusculus*: Wiederfund 1999 Unstrutau (leg. Gemeinhardt).
- 9 - *Elaphropus haemorrhoidalis*: 20.08.1999, Haselbach/Ronneburg (leg. Weigel) - Neufund für Thüringen.
- 10 - *Bembidion striatum*, *B. argenteolum*, *B. litorale*, *B. velox* und *Bembidion prasinum*: alle Funde aus dem vorigen Jahrhundert, mit Flußbegradigung und Talsperrenbau verschwunden.
- 11 - *Ocys quinquestriatus*: Wiederfund 1995, Sonneberg (leg. Frenzel).
- 12 - *Trichotichnus nitens*: Erstfund in Thüringen 1993, Dankmarshausen (leg. Apfel).
- 13 - *Ophonus ardosiacus*: Erstnachweis für Thüringen 1995, Steinach/Sonneberg (leg. Bock).
- 14 - *Ophonus parallelus*: im Naturkundemuseum Berlin befindet sich ein Männchen mit dem Fundort "Kyffhäuser", leg. Ermisch, 08.04.1955, teste Wrase (in litt.).
- 15 - *Harpalus xanthopus winkleri*: Erstnachweis für Thüringen 30.05.1987, Kelbra, Schloßberg (Kr. NDH), leg. Schnitter.
- 16 - *Harpalus progrediens*: Wiederfund 1999, bei Altenburg (leg. Sparmberg).
- 17 - *Acupalpus interstitialis*: Wiederfund 1998, bei Erfurt (leg. Bustami).
- 18 - *Poecilus punctulatus*: Wiederfund 1995, bei Altenburg (leg. Poller).
- 19 - *Pterostichus negligens*: Neufund für Thüringen 1999 (Rhön, leg. Molenda).
- 20 - *Abax carinatus porcatus*: Wiederfund 1999, Stresenhausen (leg. Weipert).
- 21 - *Amara strenua*: Wiederfund 1996, Wiehe/Unstrut (leg. Bustami).
- 22 - *Amara infima*: Wiederfund 1998, Kyffhäuser (leg. Weipert).
- 23 - *Amara gebleri*: Erstbeleg für Thüringen 1965, Katzhütte (Nüßler in litt.).
- 24 - *Chlaenius tristis*: Wiederfund 1993, bei Altenburg (leg. Poller).

Literatur

- HARTMANN, M. (1993): Laufkäfer (Carabidae). - in: Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 1: 13-20.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt, Selbstverlag.
- LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (1998): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 15, 4. Supplementband. - Goecke & Evers Krefeld im G. Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.
- PESCHEL, R. (1997): Die Coleopterenfauna des Kyffhäusergebietes in Thüringen (Bundesrepublik Deutschland) (Coleoptera, Carabidae). - *Lambillionea* **XCVII**, 1: 10-26.
- RAPP, O. (1933): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, Bd. I. - Erfurt, Selbstverlag
- TRAUTNER, J. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1995): Checkliste der Laufkäfer Deutschlands. - *Naturschutz u. Landschaftspl.* **27**, Beih. 3: 1-12.
- TRAUTNER, J.; MÜLLER-MOTZFELD, G. & M. BRÄUNICKE (1997): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae), 2. Fassung, Stand Dezember 1996. - *Natursch. u. Landschaftsplanung* **29** (9), 261-273.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. Matthias Hartmann
 Naturkundemuseum Erfurt
 Große Arche 14
 D-99084 Erfurt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Hartmann Matthias

Artikel/Article: [Aktualisierte Checkliste der Laufkäfer \(Coleoptera: Carabidae\) Thüringens 31-42](#)