

Checkliste der Palpenkäfer (Coleoptera: Pselaphidae) Thüringens

Stand : 01.11.1999

WOLFGANG APFEL, Eisenach

Die Familie der Pselaphiden ist mit ca. 700 Arten in Europa vertreten. Im Verzeichnis der Käfer Deutschlands von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) werden für Deutschland 89 Arten angegeben. Aus Thüringen lagen nur 49 Artnachweise vor. Der schlechte Bearbeitungsstand dieser Gruppe ist der Grund für die geringe Artenzahl. Bei vielen häufigen Arten wurden nur alte Funde eingetragen, obwohl diese überall in Thüringen verbreitet sind. Die Checkliste soll diesen Mangel beheben. Leider konnten in den Museumssammlungen nur wenige Tiere mit Fundortetiketten aus Thüringen gefunden werden. Ein großer Teil von Sammlungen ist nicht mehr aufzufinden, sodaß nicht mehr alle Meldungen von RAPP (1933) überprüfbar sind. Einige Arten von denen nur alte Meldungen vorliegen sind aber so markant, daß eine Fehlbestimmung ausgeschlossen werden kann. Leider werden die Pselaphiden nur wenig gesammelt bzw. als sogenannte Beifänge nicht beachtet. Beim Aussieben von Bodenstreu, Kompost, Mulm und anderen Substraten findet man häufig Vertreter dieser Familie. Einige leben bei Ameisen und sind nur bei intensiver Suche zu finden. In der letzten Zeit gelangen durch spezielle Sammelmethode einige Neunachweise bzw. aktuelle Wiederfunde für Thüringen.

Eine Pselaphidenart (*Tychobythinus spec.*), die von Herrn Kopetz (Erfurt) gefunden wurde, konnte bislang nicht determiniert werden, da es sich um ein Weibchen handelt. In Deutschland kommt nur *Tychobythinus bavaricus* (in Bayern) vor. Das gefundene Exemplar ist aber eher der Art *T. glabratus* zuzuordnen. Leider blieb eine Nachsuche bisher erfolglos. Der Autor nahm diesen Fund in die Checkliste auf, da es keine Verwechslung mit anderen Arten geben kann.

Für die Unterstützung bei der Determination schwieriger Arten möchte ich mich bei Herrn Brachat (Geretsried) herzlich bedanken. Allen Entomologen, die mir ihr Material zur Verfügung gestellt oder mir Daten zur Checkliste geliefert haben, möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen.

| Nr. | Art | vor 1960 | nach 1960 | Bemerkungen |
|-----|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | <i>Bibloporus bicolor</i> (DENNY, 1825) | x | x | c NME, c Apfel |
| 2 | <i>Bibloporus minutus</i> RAFFRAY, 1914 | | x | c Apfel |
| 3 | <i>Bibloporus mayeti</i> GUILLB., 1888 | | x | c Apfel |
| 4 | <i>Biblopectus ambiguus</i> (REICHENBACH, 1816) | x | | c NME |
| 5 | <i>Euplectus nanus</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel |
| 6 | <i>Euplectus piceus</i> MOTSCHULSKY, 1835 | | x | c Apfel |
| 7 | <i>Euplectus sparsus</i> BESUCHET, 1964 | | x | c Apfel |
| 8 | <i>Euplectus bescidicus</i> REITTER, 1881 | | x | c Apfel |
| 9 | <i>Euplectus sanguineus</i> DENNY, 1825 | x | x | c NME, c Apfel |
| 10 | <i>Euplectus signatus</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel |
| 11 | <i>Euplectus punctatus</i> MULSANT, 1861 | x | x | c NME, c Apfel |
| 12 | <i>Euplectus karsteni</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel |
| 13 | <i>Euplectus fauveli</i> GUILLB., 1888 | | x | c Apfel |
| 15 | <i>Euplectus brunneus</i> (GRIMM, 1841) | x | x | c NME, c Apfel |
| 16 | <i>Plectophloeus fleischeri</i> MACH., 1929 | x | | c NME, det.Brachat/ Apfel |
| 17 | <i>Plectophloeus erichsoni</i> (AUBE, 1844) | | x | c Apfel |
| 18 | <i>Plectophloeus nubigena</i> (REITTER, 1876) | | x | c Apfel |
| 19 | <i>Plectophloeus fischeri</i> (AUBE, 1833) | x | x | c NME, c Apfel |
| 20 | <i>Trimum brevicorne</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel |
| 21 | <i>Trichonyx sulcicollis</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel, c Frenzel |
| 22 | <i>Amauronyx maerkeli</i> (AUBE, 1844) | | x | c NME, c Apfel |
| 23 | <i>Batrisus fornicarius</i> AUBE, 1833 | | x | c Apfel, cWeigel, c Kopetz |
| 24 | <i>Batrisodes delaportei</i> (AUBE, 1833) | x | x | c Apfel |
| 25 | <i>Batrisodes venustus</i> (REICHENBACH, 1816) | x | | RAPP, Sammlung Petry |
| 26 | <i>Batrisodes adnexus</i> (HAMPE, 1863) | x | | Horion ohne Belege |
| 27 | <i>Batrisodes buqueti</i> (AUBE, 1833) | | x | c Gladitsch |
| 28 | <i>Batrisodes unisexualis</i> BESUCHET, 1988 | | x | c Apfel |
| 29 | <i>Batrisodes oculatus</i> (AUBE, 1833) | x | | RAPP ohne Beleg |
| 30 | <i>Tychobythinus spec.</i> | | x | c Apfel (Brachat) |
| 31 | <i>Bythinus macropalpus</i> AUBE, 1833 | x | x | c Apfel |
| 32 | <i>Bythinus burrelli</i> DENNY, 1825 | x | x | c NME, c Apfel |
| 33 | <i>Bythinus securiger</i> (REICHENBACH, 1816) | x | | RAPP ohne Beleg |
| 34 | <i>Bryaxis nodicornis</i> (AUBE, 1833) | x | x | c Apfel |
| 35 | <i>Bryaxis carinula</i> (REY, 1888) | | x | c Apfel |
| 36 | <i>Bryaxis puncticollis</i> (DENNY, 1825) | x | x | c NME, c Apfel |
| 37 | <i>Bryaxis nigripennis</i> (AUBE, 1844) | x | | RAPP ohne Beleg |
| 38 | <i>Bryaxis curtisi</i> (LEACH, 1817) | | x | c Apfel |
| 39 | <i>Bryaxis bulbifer</i> (REICHENBACH, 1816) | | x | c Apfel |

| Nr. | Art | vor 1960 | nach 1960 | Bemerkungen |
|-----|--|-------------|--------------|---------------------------|
| 41 | <i>Tychus niger</i> (PAYKULL, 1800) | x | x | c NME, c Apfel |
| 42 | <i>Rybaxis longicornis</i> (LEACH, 1817) | x | x | c NME, c Apfel |
| 43 | <i>Brachygluta fossulata</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel |
| 44 | <i>Brachygluta lefebvrei</i> (AUBE, 1833) | x | | RAPP ohne Beleg |
| 45 | <i>Brachygluta xanthoptera</i> (REICHENBACH, 1816) | x | | RAPP ohne Beleg |
| 46 | <i>Brachygluta haematica</i> (REICHENBACH, 1816) | x | x | c NME, c Apfel |
| 47 | <i>Brachygluta sinuata</i> (AUBE, 1837) | x | x | c NME, c Apfel |
| 48 | <i>Brachygluta haemoptera</i> (AUBE, 1844) | x | | RAPP ohne Beleg |
| 50 | <i>Reichenbachia juncorum</i> (LEACH, 1817) | x | x | c Apfel |
| 51 | <i>Trissemus impressus</i> (PANZER, 1803) | x | x | c NME, c Apfel |
| 52 | <i>Pselaphaulax dresdensis</i> (HERBST, 1792) | x | x | c Apfel |
| 53 | <i>Pselaphus heisei</i> HERBST, 1792 | x | x | c NME, c Apfel |
| 54 | <i>Chennium bituberculatum</i> LATREILLE, 1807 | x | | RAPP ohne Beleg |
| 55 | <i>Centrotoma lucifuga</i> HEYDEN, 1849 | x | | RAPP ohne Beleg |
| 56 | <i>Ctenistes palpalis</i> REICHENBACH, 1816 | x | | RAPP ohne Beleg, vor 1900 |
| 57 | <i>Tyrus mucronatus</i> (PANZER, 1803) | | x | c Apfel |
| 58 | <i>Claviger testaceus</i> PREYSSL., 1790 | | x | c NME, c Apfel |
| 59 | <i>Claviger longicornis</i> MÜLLER, 1818 | x | x | c NME, c Weigel |

Abkürzungsverzeichnis: c NME = Sammlung Naturkundemuseum Erfurt
c Apfel = Sammlung Apfel (Eisenach)
c Weigel = Sammlung Weigel (Pöbneck)
c Kopetz = Sammlung Kopetz (Erfurt-Kerspleben)
c Frenzel = Sammlung Frenzel (Sonneberg)

Literatur

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber., Beiheft 4, S. 1-185.
RAPP, O. (1933): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Bd. I. - Selbstverlag, Erfurt.

Anschrift des Verfassers: Wolfgang Apfel
Hellwigstraße 6
D-99817 Eisenach

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang

Artikel/Article: [Checkliste der Palpenkäfer \(Coleoptera: Pselaphidae\) Thüringens 55-57](#)