

Aktualisierte Liste der Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) Thüringens

Stand: 01.10. 1999

FRANK FRITZLAR, Jena

1. Einleitung

Die 1. Fassung der Checkliste Thüringer Insekten (FRITZLAR & PERNER 1994) ist aufgrund weiterer Recherchen in Sammlungen, der Auswertung der jüngsten Literatur zur Verbreitung der Blattkäfer Mitteleuropas und intensiver Geländearbeit überholt. Die erforderliche Aktualisierung umfaßt 10 Streichungen und 9 Neumeldungen sowie 21 Wiederfunde verschollener Arten. Damit sind 393 Blattkäferarten in Thüringen heimisch, von denen derzeit 37 verschollen sind, d. h. seit RAPP (1934) nicht nachgewiesen wurden.

Die folgenden Ausführungen haben unter anderem die weitere Überprüfung Thüringer Museumssammlungen zur Grundlage. Bisher sind die meisten Sammlungen noch in ihrem ursprünglichen Bestand und nicht in Hauptsammlungen zusammengefaßt. So befinden sich die Sammlung RAPP (als Leihgabe des Museums Erfurt) und die Sammlung KELLNER im Museum der Natur Gotha, die Sammlung HEYMES im Naturkundemuseum Erfurt und die Sammlung NICOLAUS im Naturkundemuseum Gera. Ich danke den Sammlungsbetreuern R. Bellstedt, M. Hartmann und F. Creutzburg für die Unterstützung der Arbeiten.

2. gestrichene Arten

Die nachfolgenden 10 Arten, die in der 1. Fassung der Checkliste Thüringer Insekten (FRITZLAR & PERNER 1994) aufgeführt wurden, sind gestrichen worden. Ihr Vorkommen ist nach weiteren Untersuchungen wegen festgestellter Fehlbestimmungen oder wegen des Fehlens von Belegen zu den Thüringer Meldungen und der ansonsten bekannten Verbreitung oder Biotopbindung der Arten unwahrscheinlich. Zur Bewertung der Lage eventueller Thüringer Vorkommen in Bezug auf das gesichert belegte Verbreitungsgebiet wurden u. a. die neuen Bearbeitungen von DOUGET (1994), KIPPENBERG & DÖBERL (1994), WARCHALOWSKI (1995, 1996), GRUEV & DÖBERL (1998) sowie KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) ausgewertet. Die Angaben bei RAPP (1934) und MOHR (1977, 1985), die zur Aufnahme der Arten in die Checkliste führten, sind bis zum Vorliegen entsprechender Belege als Fehlmeldungen zu interpretieren.

<i>Oulema septentrionis</i> (WEISE, 1880)	Beleg in coll. Rapp ist <i>O. gallaeciana</i> (GEOZE)
<i>Cryptocephalus variegatus</i> (FABRICIUS, 1781)	coll. Kellner: kein Thüringer Beleg
<i>Phyllotreta austriaca</i> HEIKERTINGER, 1909	Beleg für einzige Meldung in coll. Heymes ist <i>Ph. atra</i> (F.)
<i>Longitarsus juncicola</i> (FOUDRAS, 1859)	Belege in coll. Rapp sind <i>L. ferrugineus</i> (FOUDR.)
<i>Longitarsus aeneicollis</i> (FALDERMANN, 1837)	Belege für <i>L. suturalis</i> (Synonym zu <i>L. aeneicollis</i>) in coll. Rapp sind <i>L. nasturtii</i> (F.)
<i>Altica ampelophaga</i> GUERIN, 1858	kein Beleg in coll. Rapp
<i>Argopus ahrensi</i> (GERMAR, 1817)	kein Beleg in coll. Kellner; <i>Clematis recta</i> als einzige Wirtspflanze kommt an den gemeldeten Fundorten nicht vor
<i>Psylliodes pyritosus</i> KUTSCHERA, 1864	Belege in coll. Rapp sind <i>P. instabilis</i> FOUDR.
<i>Psylliodes luteolus</i> (MÜLLER, 1776)	kein Beleg in coll. Rapp; unveröff. Beleg in coll. Nicolaus ist <i>P. picinus</i> (MARSHAM)

3. hinzugefügte Arten

Die folgenden 9 Arten wurden neu in die Liste aufgenommen. Es liegen aktuelle Funde vor. Die genauen Daten dieser Funde wie auch von unpublizierten Funden, die der 1. Fassung der Checkliste zu Grunde lagen, wurden publiziert (FRITZLAR 1998a). Für zwei Arten, deren Vorkommen in Thüringen von uns bezweifelt worden war, die also in der 1. Fassung der Checkliste fehlten, wurden Belege für die alten Meldungen aufgefunden.

<i>Cryptocephalus ochroleucus</i> STEPHENS, 1834	Maaß leg. 1924 (s. FRITZLAR 1996)
<i>Gonioctena intermedia</i> (HELLIESEN, 1950)	Fritzlar leg. 1997: Römhild, 1998: Dermbach / Rhön
<i>Phyllotreta scheuchi</i> HEIKERTINGER, 1941	Fritzlar leg. 1997: Haßleben, 1998: Kalbsrieth b. Artern
<i>Longitarsus helvolus</i> KUTSCHERA, 1863	Perner leg., Fritzlar leg., um Jena häufig (s. PERNER 1996); auch in anderen Kalkgebieten und am Kyffhäuser
<i>Longitarsus monticola</i> KUTSCHERA, 1863	Fritzlar leg. 1993: Henneberg b. Meiningen, 1996: Meura, 1997: Hainich b. Langula, 1998: Oberweid b. Kaltennordheim, (Belege in coll. Rapp unter <i>L. curtus</i>)
<i>Longitarsus longiseta</i> WEISE, 1889	Fritzlar leg. 1998: Leibis b. Oberweißbach
<i>Longitarsus brisouti</i> HEIKERTINGER, 1912	Fritzlar leg. 1999: Schlechtsarter Schweiz b. Römhild
<i>Chaetocnema obesa</i> (BOIELDIEU, 1859)	Belege für <i>Ch. meridionalis</i> (Synonym zu <i>Ch. obesa</i>) aus Sömmerda in coll. Rapp sind richtig
<i>Psylliodes aereus</i> FOUDRAS, 1859	Belege vom Alten Stolberg und aus Alperstedt in coll. Rapp sind richtig

4. aktuelle Bestätigungen verschollener Arten

Von den 58 nach diesen Streichungen und Ergänzungen verbleibenden Arten, für die 1994 keine Funde aus der Zeit nach RAPP (1934) bekannt waren, konnten 21 bestätigt werden. Die genauen Daten dieser Funde (außer zu *Cryptocephalus distinguendus*, *Longitarsus languidus*, *L. gracilis*, *Altica palustris* und *Neocrepidodera (=Asioresta) nigritula*) wurden publiziert (FRITZLAR 1998a).

Soweit nicht anders angegeben, befinden sich die Belege in der Sammlung des Autors.

<i>Orsodacne lineola</i> (PANZER, 1896)	Skale leg. 1997: Schlechtsart b. Römhild
<i>Cryptocephalus distinguendus</i> SCHNEIDER, 1792	Sparnberg leg. 1999: Kammerforst b. Altenburg
<i>Cryptocephalus primarius</i> (HAROLD, 1872)	Schaffrath leg. 1994: Kyffhäuser
<i>Cryptocephalus imperialis</i> (LAICHH., 1781)	Kopetz leg. 1998: Kyffhäuser (coll. Kopetz), Stumpf leg. 1998: Kyffhäuser, Perner leg. 1999: Steudnitz b. Jena (coll. Perner)
<i>Cryptocephalus exiguum</i> SCHNEIDER, 1792	Nicolaus leg. 1936: Schlöben b. Jena (coll. Nicolaus)
<i>Cryptocephalus punctiger</i> PAYKULL, 1799	Nicolaus leg. 1965: Hain b. Gera
<i>Chrysolina limbata</i> (FABRICIUS, 1775)	Stumpf leg. 1994: Geba b. Meiningen
<i>Phratora atrovirens</i> (CORNELIUS, 1857)	Weipert leg. 1994: Liebenstein b. Plaue
	Fritzlar leg. 1996: Bad Klosterlausnitz

<i>Galeruca laticollis</i> (SAHLBERG, 1837)	Voigt leg. 1959; Kahla; Marstaller leg. 1960: Oelknitz b. Jena; Fritzlar leg. 1995-1998: Bad Klosterlausnitz, Dosdorf, Alperstedt, Berka v.d. Hainich, Stedtlingen
<i>Longitarsus languidus</i> KUTSCHERA, 1863	Fritzlar leg. 1997: Zeigerheim bei Rudolstadt, 1999: Kahle Schmücke b. Harras, Wipperdurchbruch b. Günserode
<i>Longitarsus gracilis</i> KUTSCHERA, 1864	Fritzlar leg. 1999: Burgau b. Jena, Stempeda b. Nordhausen
<i>Altica palustris</i> WEISE, 1888	Fritzlar leg. 1997: Jena
<i>Neocrepidodera nigritula</i> (GYLLENHAL, 1813)	Fritzlar leg. 1999: Altenberga b. Kahla
<i>Mantura mathewsi</i> (STEPHENNS, 1832)	Fritzlar leg. 1998: Berka v.d. Hainich, 1999: Wipperdurchbruch b. Günserode
<i>Chaetocnema arida</i> FOUDRAS, 1860	Fritzlar leg. 1997: Leutra b. Jena, Oberdorla b. Mühlhausen
<i>Apteropeda splendida</i> ALLARD, 1860	Platt leg. 1993: Mühlhausen (coll. Platt); Fritzlar leg. 1996: Hainich b. Langula, Schleusingen, 1998: Berka v.d. Hainich, 1999: Faulungen/Eichsfeld; Apfel leg. 1997: Gräfenroda (coll. Apfel), Weipert leg. 1997: Zella-Mehlis (coll. Weipert)
<i>Apteropeda globosa</i> (ILLIGER, 1794)	Fritzlar leg. 1993: Buchfart, 1997: Orlamünde, 1998: Hainich b. Langula, Berka v.d. Hainich; Apfel leg. 1996: Mühlberg, 1998: Stadtlegnsfeld
<i>Dibolia cryptocephala</i> (KOCH, 1803)	Fritzlar leg. 1993: Sülzfeld bei Meiningen; 1999: Schlechtsart b. Römhild, Roßdorf/Rhön
<i>Psylliodes thlaspis</i> FOUDRAS, 1860	Fritzlar leg. 1997: Zeigerheim bei Rudolstadt, Schlechtsart b. Römhild
<i>Cassida fastuosa</i> SCHALLER, 1783	Marstaller leg. 1964: Jena
<i>Cassida ferruginea</i> GOEZE, 1777	Fritzlar leg. 1996, 1997: Alperstedt

5. Korrektur aktueller Fehlmeldungen

<i>Aphthona ovata</i> FOUDRAS, 1860	Beleg für die Meldung in KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) in coll. U. Arnold, Berlin ist <i>Aphthona atrovirens</i> , (somit auch in FRITZLAR 1998a Fehlmeldung)
<i>Longitarsus cerinthes</i> (SCHRANK, 1798)	versehentliche Fehlmeldung (FRITZLAR 1998b)
<i>Altica aenescens</i> WEISE, 1888	versehentliche Fehlmeldung (FRITZLAR 1998b)

6. nomenklatorische Änderungen

bisher gebräuchlicher Name:	gültiger Name:
<i>Phaedon pyritosus</i>	<i>Neophaedon pyritosus</i>
<i>Hydrothassa</i>	<i>Prasocuris</i>
<i>Galerucella</i> [zum Teil]	<i>Neogalerucella</i>
<i>Aphthona cyanella</i>	<i>Aphthona atrocoerulea</i>
<i>Aphthona coerulea</i>	<i>Aphthona nonstriata</i>
<i>Asiorestia</i>	<i>Neocrepidodera</i>
<i>Psylliodes attenuata</i> , <i>P. cuprea</i> , ...	<i>Psylliodes attenuatus</i> , <i>P. cupreus</i> , ...
<i>Chrysolina haemisphaerica</i>	<i>Chrysolina purpurascens</i>

7. Liste der Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) Thüringens

Taxon	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
Unterfamilie Donaciinae		
<i>Donacia clavipes</i> FABRICIUS, 1793	+	+
<i>Donacia crassipes</i> FABRICIUS, 1775	+	+
<i>Donacia dentata</i> HOPPE, 1795	+	+
<i>Donacia versicolorea</i> (BRAHM, 1790)	+	+
<i>Donacia semicuprea</i> PANZER, 1796	+	+
<i>Donacia sparganii</i> AHRENS, 1810	+	
<i>Donacia aquatica</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Donacia impressa</i> PAYKULL, 1799	+	+
<i>Donacia brevicornis</i> AHRENS, 1810	+	+
<i>Donacia marginata</i> HOPPE, 1795	+	+
<i>Donacia bicolora</i> ZSCHACH, 1788	+	+
<i>Donacia obscura</i> GYLLENHAL, 1813	+	
<i>Donacia brevitarsis</i> THOMSON, 1884	+	
<i>Donacia thalassina</i> GERMAR, 1811	+	+
<i>Donacia vulgaris</i> ZSCHACH, 1788	+	+
<i>Donacia simplex</i> FABRICIUS, 1775	+	+
<i>Donacia tomentosa</i> AHRENS, 1810	+	+
<i>Donacia cinerea</i> HERBST, 1784	+	+
<i>Plateumaris sericea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Plateumaris braccata</i> (SCOPOLI, 1772)	+	+
<i>Plateumaris consimilis</i> (SCHRANK, 1781)	+	+
<i>Plateumaris rustica</i> (KUNZE, 1818)	+	+
Unterfamilie Orsodacninae		
<i>Orsodacne cerasi</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Orsodacne lineola</i> (PANZER, 1896)	+	+
Unterfamilie Zeugophorinae		
<i>Zeugophora scutellaris</i> SUFFRIAN, 1840	+	+
<i>Zeugophora frontalis</i> SUFFRIAN, 1840	+	
<i>Zeugophora subspinosa</i> (FABRICIUS, 1781)	+	+
<i>Zeugophora turneri</i> POWER, 1863	+	
<i>Zeugophora flavicollis</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
Unterfamilie Criocerinae		
<i>Lema cyanella</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Oulema erichsonii</i> (SUFFRIAN, 1841)	+	+
<i>Oulema gallaeciana</i> (HEYDEN, 1870)	+	+
<i>Oulema melanopus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Oulema duftschmidi</i> (REDTENBACHER, 1874)		+
<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Crioceris asparagi</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Lilioceris lili</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Lilioceris merdigera</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
Unterfamilie Clytrinae		
<i>Labidostomis tridentata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Labidostomis humeralis</i> (SCHNEIDER, 1792)	+	+
<i>Labidostomis lucida</i> (GERMAR, 1823)	+	+
<i>Labidostomis longimana</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
<i>Lachnaia sexpunctata</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+

TAXON	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
<i>Clytra quadripunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Clytra laeviuscula</i> RATZEBURG, 1837	+	+
<i>Smaragdina salicina</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Smaragdina flavidollis</i> (CHARPENTIER, 1825)	+	+
<i>Smaragdina aurita</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
<i>Smaragdina affinis</i> (ILLIGER, 1794)	+	+
<i>Cheilotoma musciformis</i> (GOEZE, 1777)	+	+
<i>Coptocephala unifasciata</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Coptocephala rubicunda</i> (LAICHARTING, 1781)	+	+
Unterfamilie Cryptocephalinae		
<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (LAICHARTING, 1781)	+	+
<i>Pachybrachis sinuatus</i> MULSANT, 1859	+	+
<i>Pachybrachis tessellatus</i> (OLIVIER, 1791)	+	+
<i>Pachybrachis picus</i> WEISE, 1882	+	+
<i>Pachybrachis fimbriolatus</i> SUFFRIAN, 1848	+	+
<i>Cryptocephalus coryli</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus cordiger</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus octopunctatus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus quinquepunctatus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Cryptocephalus distinguendus</i> SCHNEIDER, 1792	+	+
<i>Cryptocephalus primarius</i> HAROLD, 1872	+	+
<i>Cryptocephalus imperialis</i> LAICHARTING, 1781	+	+
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Cryptocephalus laetus</i> FABRICIUS, 1792	+	
<i>Cryptocephalus schaefferi</i> SCHRANK, 1789	+	+
<i>Cryptocephalus aureolus</i> SUFFRIAN, 1847)	+	+
<i>Cryptocephalus sericeus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus violaceus</i> LAICHARTING, 1781	+	+
<i>Cryptocephalus nitidus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus nitidulus</i> FABRICIUS, 1787	+	+
<i>Cryptocephalus punctiger</i> PAYKULL, 1799	+	+
<i>Cryptocephalus parvulus</i> MÜLLER, 1776	+	+
<i>Cryptocephalus caerulescens</i> SAHLBERG, 1839	+	+
<i>Cryptocephalus marginatus</i> FABRICIUS, 1781	+	+
<i>Cryptocephalus octomaculatus</i> ROSSI, 1790	+	+
<i>Cryptocephalus pini</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus frenatus</i> LAICHARTING, 1781	+	
<i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus moraei</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Cryptocephalus octacosmus</i> BEDEL, 1891	+	
<i>Cryptocephalus quadripustulatus</i> OLIVIER, 1791	+	+
<i>Cryptocephalus flavipes</i> FABRICIUS, 1781	+	+
<i>Cryptocephalus signatifrons</i> SUFFRIAN, 1847	+	+
<i>Cryptocephalus vittatus</i> FABRICIUS, 1775	+	+
<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
<i>Cryptocephalus elegantulus</i> GRAVENHORST, 1807	+	+
<i>Cryptocephalus chrysopus</i> GMELIN, 1788	+	+

TAXON	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
<i>Cryptocephalus frontalis</i> MARSHAM, 1802	+	+
<i>Cryptocephalus saliceti</i> ZEBE, 1855	+	+
<i>Cryptocephalus ocellatus</i> DRAPIEZ, 1819	+	+
<i>Cryptocephalus querctei</i> SUFFRIAN, 1848		+
<i>Cryptocephalus labiatus</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
<i>Cryptocephalus exiguum</i> SCHNEIDER, 1792	+	+
<i>Cryptocephalus pygmaeus</i> FABRICIUS, 1792	+	+
<i>Cryptocephalus fulvus</i> (GOEZE, 1777)	+	+
<i>Cryptocephalus macellus</i> SUFFRIAN, 1860		+
<i>Cryptocephalus ochroleucus</i> STEPHENS, 1834	+	
<i>Cryptocephalus populi</i> SUFFRIAN, 1848	+	+
<i>Cryptocephalus pusillus</i> FABRICIUS, 1777	+	+
<i>Cryptocephalus rufipes</i> (GOEZE, 1777)	+	+
Unterfamilie Lamprosomatinae		
<i>Oomorphus concolor</i> (STURM, 1807)	+	+
Unterfamilie Eumolpinae		
<i>Bromius obscurus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Pachnephorus pilosus</i> (ROSSI, 1790)	+	+
<i>Eumolpus asclepiadeus</i> (PALLAS, 1776)	+	+
Unterfamilie Chrysomelinae		
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (SAY, 1824)		+
<i>Chrysolina herbacea</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
<i>Chrysolina coerulans</i> (SCRIBA, 1791)	+	+
<i>Chrysolina graminis</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Chrysolina fastuosa</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Chrysolina polita</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Chrysolina staphylaea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Chrysolina cerealis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
<i>Chrysolina rufa</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
<i>Chrysolina purpurascens</i> (GERMAR, 1817) [= hemisphaerica]	+	+
<i>Chrysolina oricalcia</i> (MÜLLER, 1776)	+	+
<i>Chrysolina rufoaenea</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	
<i>Chrysolina haemoptera</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Chrysolina fuliginosa</i> (OLIVIER, 1807)	+	+
<i>Chrysolina sturmi</i> (WESTHOFF, 1882)	+	+
<i>Chrysolina reitteri</i> (WEISE, 1884)	+	+
<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Chrysolina gypsophilae</i> (KÜSTER, 1945)	+	+
<i>Chrysolina kuesteri</i> (HELLIESEN, 1912)		+
<i>Chrysolina aurichalcea</i> (MANNERHEIM, 1825)	+	+
<i>Chrysolina varians</i> (SCHALLER, 1783)	+	+
<i>Chrysolina hyperici</i> (FORSTER, 1771)	+	+
<i>Chrysolina brunsvicensis</i> (GRAVENHORST, 1807)	+	+
<i>Chrysolina geminata</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
<i>Chrysolina quadrigemina</i> (SUFFRIAN, 1851)	+	
<i>Chrysolina carnifex</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
<i>Chrysolina analis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	
<i>Chrysolina marginata</i> (LINNAEUS, 1858)	+	+
<i>Chrysolina limbata</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+

Taxon	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
Oreina alpestris (SCHUMMEL, 1843)	+	+
Oreina speciosissima (SCOPOLI, 1763)	+	+
Colaphus sophiae (SCHALLER, 1783)	+	+
Gastrophysa polygoni (LINNAEUS, 1758)	+	+
Gastrophysa viridula (De GEER, 1775)	+	+
Phaedon cochleariae (FABRICIUS, 1792)	+	+
Phaedon armoraciae (LINNAEUS, 1758)	+	+
Phaedon concinnus STEPHENS, 1831	+	
Neophaedon pyritosus (ROSSI, 1792)	+	
Sclerophaedon orbicularis (SUFFRIAN, 1851)	+	+
Prasocuris glabra (HERBST, 1783)	+	+
Prasocuris marginella (LINNAEUS, 1758)	+	+
Prasocuris hannoverana (FABRICIUS, 1775)	+	+
Prasocuris junci (BRAHM, 1790)	+	+
Prasocuris phellandrii (LINNAEUS, 1758)	+	+
Plagioderma versicolora (LAICHARTING, 1781)	+	+
Linaeidea aenea (LINNAEUS, 1758)	+	+
Chrysomela cuprea FABRICIUS, 1775	+	+
Chrysomela lapponica LINNAEUS, 1758	+	+
Chrysomela vigintipunctata (SCOPOLI, 1763)	+	+
Chrysomela collaris LINNAEUS, 1758	+	
Chrysomela populi LINNAEUS, 1758	+	+
Chrysomela tremulae FABRICIUS, 1783	+	+
Chrysomela saliceti (WEISE, 1884)	+	+
Gonioctena flavigornis (SUFFRIAN, 1851)	+	+
Gonioctena viminalis (LINNAEUS, 1758)	+	+
Gonioctena decemnotata (MARSHAM, 1802)	+	+
Gonioctena linnaeana (SCHRANK, 1781)	+	+
Gonioctena olivacea (FORSTER, 1771)	+	+
Gonioctena quinquepunctata (FABRICIUS, 1787)	+	+
Gonioctena intermedia HELLIES, 1913		+
Gonioctena pallida (LINNAEUS, 1758)	+	+
Phratora vulgatissima (LINNAEUS, 1758)	+	+
Phratora tibialis (SUFFRIAN, 1851)	+	+
Phratora laticollis (SUFFRIAN, 1851)	+	+
Phratora vitellinae (LINNAEUS, 1758)	+	+
Phratora atrovirens (CORNELIUS, 1857)	+	+
Timarcha tenebricosa (FABRICIUS, 1775)	+	
Timarcha goettingensis (LINNAEUS, 1758)	+	+
Timarcha metallica (LAICHARTING, 1781)	+	+
Entomoscelis adonis (PALLAS, 1771)	+	+
Unterfamilie Galerucinae		
Galerucella nymphaea (LINNAEUS, 1758) (in Revision)	+	+
Galerucella grisescens (JOANNIS, 1856)	+	+
Neogalerucella lineola (FABRICIUS, 1781)	+	+
Neogalerucella calmariensis (LINNAEUS, 1767)	+	+
Neogalerucella pusilla (DUFTSCHMID, 1825)		+
Neogalerucella tenella (LINNAEUS, 1761)	+	+
Xanthogaleruca luteola (MÜLLER, 1766)	+	+
Pyrrhalta viburni (PAYKULL, 1799)	+	+

Taxon	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
Galeruca tanaceti (LINNAEUS, 1758)	+	+
Galeruca interrupta ILLIGER, 1802	+	+
Galeruca pomonae (SCOPOLI, 1763)	+	+
Galeruca laticollis (SAHLBERG, 1837)	+	+
Lochmaea capreae (LINNAEUS, 1758)	+	+
Lochmaea suturalis (THOMSON, 1866)	+	+
Lochmaea crataegi (FORSTER, 1771)	+	+
Phyllobrotica quadrimaculata (LINNAEUS, 1758)	+	+
Calomicus circumfusus (MARSHAM, 1802)		+
Calomicus pinicola (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
Luperus xanthopoda (SCHRANK, 1781)	+	
Luperus longicornis (FABRICIUS, 1781)	+	+
Luperus luperus (SULZER, 1776)	+	+
Luperus flavipes (LINNAEUS, 1767)	+	+
Agelastica alni (LINNAEUS, 1758)	+	+
Sermylissa halensis (LINNAEUS, 1767)	+	+
Unterfamilie Alticinae		
Phyllotreta atra (FABRICIUS, 1775)	+	+
Phyllotreta vittula (REDTENBACHER, 1849)	+	+
Phyllotreta armoraciae (KOCH, 1803)	+	+
Phyllotreta nemorum (LINNAEUS, 1758)	+	+
Phyllotreta undulata KUTSCHERA, 1860	+	+
Phyllotreta christinae HEIKERTINGER, 1941		+
Phyllotreta tetrastigma (COMOLLI, 1837)	+	+
Phyllotreta dilatata THOMSON, 1866		+
Phyllotreta flexuosa (ILLIGER, 1794)	+	+
Phyllotreta striolata (FABRICIUS, 1803)	+	+
Phyllotreta ochripes (CURTIS, 1837)	+	+
Phyllotreta exclamationis (THUNBERG, 1784)	+	+
Phyllotreta cruciferae (GOEZE, 1777)	+	+
Phyllotreta scheuchi HEIKERTINGER, 1941		+
Phyllotreta astrachanica LOPATIN, 1977	+	+
Phyllotreta aerea ALLARD, 1859	+	+
Phyllotreta nigripes (FABRICIUS, 1775)	+	+
Phyllotreta procera (REDTENBACHER, 1849)	+	
Phyllotreta nodicornis (MARSHAM, 1802)	+	+
Aphthona cyparissiae (KOCH, 1801)	+	+
Aphthona abdominalis (DUFTSCHMID, 1825)	+	
Aphthona pallida (BACH, 1856)	+	+
Aphthona lutescens (GYLLENHAL, 1808)	+	+
Aphthona violacea (KOCH, 1803)	+	
Aphthona pygmaea KUTSCHERA, 1861	+	+
Aphthona atrocaerulea (STEPHENS, 1831)	+	+
Aphthona venustula KUTSCHERA, 1861	+	+
Aphthona euphorbiae (SCHRANK, 1781)	+	+
Aphthona nonstriata (GOEZE, 1777)	+	+
Aphthona erichsoni (ZETTERSTEDT, 1838)	+	
Aphthona herbigrada (CURTIS, 1837)	+	+
Aphthona atrovirens (FÖRSTER, 1849)	+	+
Longitarsus pellucidus (FOUDRAS, 1860)	+	+

Taxon	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
<i>Longitarsus ochroleucus</i> (MARSHAM, 1802)	+	
<i>Longitarsus jacobaeae</i> WATERHOUSE, 1858		+
<i>Longitarsus symphyti</i> HEIKERTINGER, 1912	+	+
<i>Longitarsus succineus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
<i>Longitarsus noricus</i> LEONARDI, 1976		+
<i>Longitarsus rubiginosus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
<i>Longitarsus tabidus</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
<i>Longitarsus foudrasi</i> WEISE, 1893		+
<i>Longitarsus nigrofasciatus</i> (GOEZE, 1777)	+	+
<i>Longitarsus lycopi</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
<i>Longitarsus ferrugineus</i> (FOUDRAS, 1860)		+
<i>Longitarsus helvolus</i> (KUTSCHERA, 1863)	+	+
<i>Longitarsus membranaceus</i> (FOUDRAS, 1860)		+
<i>Longitarsus nanus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
<i>Longitarsus melanocephalus</i> (De GEER, 1775)	+	+
<i>Longitarsus kutscherae</i> (RYE, 1872)		+
<i>Longitarsus curtus</i> (ALLARD, 1860)	+	+
<i>Longitarsus monticola</i> KUTSCHERA, 1863	+	+
<i>Longitarsus exoletus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Longitarsus pulmonariae</i> WEISE, 1893	+	+
<i>Longitarsus longipennis</i> KUTSCHERA, 1863	+	
<i>Longitarsus pratensis</i> (PANZER, 1794)	+	+
<i>Longitarsus scutellaris</i> (REY, 1873)		+
<i>Longitarsus reichei</i> (ALLARD, 1860)		+
<i>Longitarsus minimus</i> KUTSCHERA, 1864		+
<i>Longitarsus ballotae</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
<i>Longitarsus celticus</i> LEONARDI, 1975		+
<i>Longitarsus gracilis</i> KUTSCHERA, 1864	+	+
<i>Longitarsus longiseta</i> WEISE, 1889		+
<i>Longitarsus ganglbaueri</i> HEIKERTINGER, 1912	+	+
<i>Longitarsus brisouti</i> HEIKERTINGER, 1912		+
<i>Longitarsus atricillus</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
<i>Longitarsus suturellus</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
<i>Longitarsus nasturtii</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
<i>Longitarsus quadriguttatus</i> (PONTOPPIDAN, 1765)	+	+
<i>Longitarsus apicalis</i> (BECK, 1817)	+	
<i>Longitarsus holsaticus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	
<i>Longitarsus luridus</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Longitarsus brunneus</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
<i>Longitarsus languidus</i> KUTSCHERA, 1863	+	+
<i>Longitarsus minusculus</i> (FOUDRAS, 1860)	+	+
<i>Longitarsus echii</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Longitarsus weisei</i> GUILLEBEAU, 1895	+	+
<i>Longitarsus niger</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Longitarsus parvulus</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
<i>Longitarsus anchusae</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
<i>Longitarsus pinguis</i> WEISE, 1888		+
<i>Longitarsus absynthii</i> KUTSCHERA, 1862	+	+
<i>Longitarsus oblitteratus</i> (ROSENHAUER, 1847)	+	+
<i>Longitarsus salviae</i> GRUEV, 1975		+

Taxon	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
<i>Longitarsus obliteratoides</i> GRUEV, 1973		+
<i>Altica lythri</i> AUBÉ, 1843	+	+
<i>Altica brevicollis</i> FOUDRAS, 1860	+	+
<i>Altica queretorum</i> FOUDRAS, 1860	+	+
<i>Altica tamaricis</i> SCHRANK, 1785	+	
<i>Altica oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Altica palustris</i> WEISE, 1888	+	+
<i>Altica pusilla</i> DUFTSCHMID, 1825	+	+
<i>Altica longicollis</i> (ALLARD, 1860)	+	+
<i>Hermaeophaga mercurialis</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
<i>Batophila rubi</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
<i>Lythraria salicariae</i> (PAYKULL, 1800)	+	+
<i>Ochrosis ventralis</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
<i>Neocrepidodera transversa</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
<i>Neocrepidodera motschulskii</i> (KONSTANTINOV, 1991)		+
<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (SCOPOLI, 1763)	+	+
<i>Neocrepidodera femorata</i> (GYLLENHAL, 1813)	+	+
<i>Neocrepidodera nigritula</i> (GYLLENHAL, 1813)	+	+
<i>Derocepis rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Hippuriphila modeeri</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+
<i>Crepidodera aurea</i> (GEOFFROY, 1785)	+	+
<i>Crepidodera fulvicornis</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
<i>Crepidodera aurata</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
<i>Crepidodera plutus</i> (LATREILLE, 1804)		+
<i>Crepidodera lamina</i> (BEDEL, 1901)	+	+
<i>Crepidodera nitidula</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Epitrix atropae</i> FOUDRAS, 1860	+	+
<i>Epitrix pubescens</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Minota obesa</i> (WALTL, 1839)	+	+
<i>Podagrion fuscicornis</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
<i>Podagrion malvae</i> (ILLIGER, 1807)	+	
<i>Podagrion fuscipes</i> (FABRICIUS, 1775)	+	
<i>Mantura chrysanthemi</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Mantura obtusata</i> (GYLLENHAL, 1813)	+	+
<i>Mantura rustica</i> (LINNAEUS, 1767)	+	+
<i>Mantura mathewsi</i> (STEPHENS, 1832)	+	+
<i>Chaetocnema semicoerulea</i> (KOCH, 1803)	+	
<i>Chaetocnema concinna</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
<i>Chaetocnema laevicollis</i> (THOMSON, 1866)	+	+
<i>Chaetocnema obesa</i> (BOIELDIEU, 1859)	+	
<i>Chaetocnema aridula</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	+
<i>Chaetocnema confusa</i> (BOHEMAN, 1851)	+	
<i>Chaetocnema mannerheimi</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	+
<i>Chaetocnema arida</i> FOUDRAS, 1860	+	+
<i>Chaetocnema subcoerulea</i> (KUTSCHERA, 1864)	+	
<i>Chaetocnema hortensis</i> (GEOFFROY, 1785)	+	+
<i>Chaetocnema sahlbergi</i> (GYLLENHAL, 1827)	+	+
<i>Chaetocnema compressa</i> (LETZNER, 1846)		+
<i>Sphaeroderma testaceum</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+
<i>Sphaeroderma rubidum</i> (GRAËLLS, 1858)	+	+

TAXON	vor Rapp (1934)	nach Rapp (1934)
<i>Apteropeda splendida</i> ALLARD, 1860	+	+
<i>Apteropeda globosa</i> (ILLIGER, 1794)	+	+
<i>Apteropeda orbiculata</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
<i>Mniophila muscorum</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Dibolia schillingi</i> (LETZNER, 1847)	+	+
<i>Dibolia femoralis</i> REDTENBACHER, 1849	+	+
<i>Dibolia foersteri</i> BACH, 1859	+	
<i>Dibolia depressiuscula</i> LETZNER, 1847	+	+
<i>Dibolia rugulosa</i> REDTENBACHER, 1849	+	+
<i>Dibolia cynoglossi</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Dibolia occultans</i> (KOCH, 1803)	+	
<i>Dibolia timida</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
<i>Dibolia cryptocephala</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Psylliodes affinis</i> (PAYKULL, 1799)	+	+
<i>Psylliodes picinus</i> (MARSHAM, 1802)	+	+
<i>Psylliodes attenuatus</i> (KOCH, 1803)	+	
<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Psylliodes laticollis</i> KUTSCHERA, 1864		+
<i>Psylliodes sophiae</i> HEIKERTINGER, 1914	+	+
<i>Psylliodes napi</i> (FABRICIUS, 1792)	+	+
<i>Psylliodes thlaspis</i> FOUDRAS, 1860	+	+
<i>Psylliodes cupreus</i> (KOCH, 1803)		+
<i>Psylliodes isatidis</i> HEIKERTINGER, 1912	+	+
<i>Psylliodes cupreatus</i> (DUFTSCHMID, 1825)	+	+
<i>Psylliodes instabilis</i> FOUDRAS, 1860	+	+
<i>Psylliodes vindobonensis</i> HEIKERTINGER, 1914	+	+
<i>Psylliodes aereus</i> FOUDRAS, 1860	+	
<i>Psylliodes hyoscyami</i> (LINNAEUS, 1758)	+	+
<i>Psylliodes chalcomerus</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
<i>Psylliodes dulcamarus</i> (KOCH, 1803)	+	+
<i>Psylliodes cucullatus</i> (ILLIGER, 1807)	+	+
Unterfamilie Hispinae		
<i>Hispa atra</i> LINNAEUS, 1767	+	+
Unterfamilie Cassidinae		
<i>Cassida fastuosa</i> SCHALLER, 1783	+	+
<i>Cassida subferruginea</i> (SCHRANK, 1776)	+	+
<i>Cassida viridis</i> LINNAEUS, 1758	+	+
<i>Cassida hemisphaerica</i> HERBST, 1799	+	+
<i>Cassida canaliculata</i> LAICHARTING, 1781	+	+
<i>Cassida murraea</i> LINNAEUS, 1767	+	+
<i>Cassida nebulosa</i> LINNAEUS, 1858	+	+
<i>Cassida flaveola</i> THUNBERG, 1794	+	+
<i>Cassida atrata</i> FABRICIUS, 1787	+	
<i>Cassida vibex</i> LINNAEUS, 1767	+	+
<i>Cassida pannonica</i> SUFFRIAN, 1844		+
<i>Cassida panzeri</i> WEISE, 1907	+	+
<i>Cassida ferruginea</i> GOEZE, 1777	+	+
<i>Cassida rubiginosa</i> MÜLLER, 1776	+	+
<i>Cassida stigmatica</i> SUFFRIAN, 1844	+	+
<i>Cassida sanguinosa</i> SUFFRIAN, 1844	+	+

TAXON	vor RAPP (1934)	nach RAPP (1934)
Cassida rufovirens SUFFRIAN, 1844	+	+
Cassida denticollis SUFFRIAN, 1844	+	+
Cassida sanguinolenta MÜLLER, 1776	+	+
Cassida prasina ILLIGER, 1798	+	+
Cassida subreticulata SUFFRIAN, 1844	+	+
Cassida margaritacea SCHALLER, 1783	+	+
Cassida nobilis LINNAEUS, 1758	+	+
Cassida vittata VILLIERS, 1789	+	+

Literatur

- DOUGET, S. (1994): Coleopteres Chrysomelidae, Volume 2 Alticinae. - Faune de France **80**, 694 S.
- FRITZLAR, F., & J. PERNER (1994): Checklist der Blattkäfer (Chrysomelidae) Thüringens. - Checklisten Thüringer Insekten, Teil 2, S.: 16-27.
- (1996): Zum Vorkommen von *Cryptocephalus macellus* SUFFRIAN, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae) in Thüringen und Sachsen-Anhalt. - Thür. Faun. Abhandlungen III, S. 166-174.
 - (1998a): Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 1. - Thür. Faun. Abh. V: 193-214.
 - (1998b): Neozoen unter den Blattkäfern (Coleoptera, Chrysomelidae) Thüringens. - Mitt. Thür. Entomologenverband 5(2): S. 61-63.
- GRUEV, B., & M. DÖBERL (1997): General distribution of the Flea Beetles in the Palaearctic Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). - Scopula, Ljubljana, **37**, S. 1 - 496.
- KIPPENBERG, H. & M. DÖBERL (1994): 88. Familie: Chrysomelidae. - In: LOHSE, G. A. & W. H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, 3. Supplementband, Krefeld, S. 17-142.
- KÖHLER, F., & KLAUSNITZER, B. (1998): Entomofauna Germanica, Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomol. Nachr. Ber. (Dresden) Beiheft 4, S. 1-185.
- MOHR, K.-H. (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Chrysomelidae: Cryptocephalinae. - Beitr. Ent., Berlin 27 (2), S.: 197 - 231.
- (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Chrysomelidae: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clythrinae. - Beitr. Ent. Berlin **35**, S. 219-269.
- PERNER, J. (1996): Zur Phänologie und Biotopbindung ausgewählter Flohkäferarten (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). - Verhandlungen des. 14. Internationalen Symposiums über Entomofaunistik in Mitteleuropa, SIEEC, in München, S. 247-260.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Band II. - Erfurt.
- WARCHALOWSKI, A. (1995): Chrysomelidae, Stonkowate (Insecta, Coleoptera), Czesc V (podrodzina: Halticinae: rodzaje Phyllotreta, Aphthona, Longitarsus. - Fauna Polski tom 17, Warszawa, 360 S.
- (1996): Übersicht der westpaläarktischen Arten der Gattung *Longitarsus* Berthold, 1827 (Coleoptera: Chrysomelidae: Halticinae). - Genus , Wroclaw, 266 S.

Anschrift des Autors: Dr. Frank Fritzlar
Kernbergstr. 73
07749 Jena

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Fritzlar Frank

Artikel/Article: [Aktualisierte Liste der Blattkäfer \(Coleoptera, Chrysomelidae\) Thüringens 67-78](#)