

# V.

## D i a g n o s e n n e u e r C o p r o p h a g e n

vom

Herausgeber.

1. *Megathopa Candzei*: Piceo-olivacea et praeterea subpruimosa, elytris seriatim nigrotessellatis; capite dense punctato, punctis antice ocellatis, clypeo acute et anguste bidentato; thorace dense fortius punctato, lateribus medio angulato rotundatis; elytris humeris acutis calloque humerali carinato, laxe striatis, striis foveolis obsoletis longitudinalibus distinctis olivaceo-viridibus, interstitiis planis punctatis, maculis nudis elevatis, subquadratis; pygidio grosse ocellato-punctato; palpis antennisque rufo-piceis; corpore subtus cum pedibus nitido nigrovirescente, cum pedibus, metasterno excepto, dense punctato. — Long. 20 mill. Nicaragua. Insignem hanc speciem communicavit Dm. E. Candèze, in cuius honorem nominata.

2. *Disphysema* (Nov. Gen.): Juxta *Macroderes* locandum, a quo differt epipleuris fere nullis, parapleuris metathoracis triangularibus, non angustatis et articulo primo palporum labialium non dilatato. Mentum antice medio emarginatum. Palpi labiales articulis cylindricis, tertio minuto. Antennae articulis 9. Mesosternum breve, a metasterno sutura obsoleta divisum. Tibiae posticæ non compressæ, versus apicem leviter incrassatae. Tarsi filiformes.

*D. Candzei*: Nigrum, vix nitidum, breviter pubescens, undique dense granulatum; capite rotundato, margine postico et vertice medio

transversim carinatis, clypeo antice medio subemarginato. Thorace transverso, gibbose convexo et rotundato, angulis anticis deflexis, acutis. Scutellum nullum. Elytra thorace breviora et angustiora, rotundata, valde convexa, striis 7 parum profundis, margine utrinque leviter elevatis. Pygidium impresso-punctatum. Palpi aum antennis obscure rufo-picei. Tibiae anticae longiores, nonnihil incurvae, parum dilatatae. — Long. 9  $\frac{1}{2}$  mill. Malabar.

3. *Parachorius* (Nov. Gen.): Juxta *Canthidium* a quo differt inter alia articulo primo palporum labialium dilatato tibiisque posticis versus apicem parum tantum latioribus. Caput muticum. Antennae 9 articulatae. Mentum parvum, subquadratum, concavum, margine elevato, antice leviter subemarginato. Palpi labiales articulo primo et secundo incrassatis, tertio cylindrico. Coxae anticae conicae. Prosternum transversim carinatum. Metasternum a mesosterno sutura recta divisum. Tibiae posticae versus apicem leviter tantum dilatatae.

*P. Thomsoni*: Ovalis, convexus, nitidus, niger, antennis ferrugineis, pedibus rufo-piceis. Caput punctulatum, clypeo rotundato, medio subincisulo. Thorax aequaliter punctatus, angulis anticis deflexis acutis, basi immarginatus. Elytra parum profunde punctato-striata, interstitiis planis, irregulariter subseriatim punctatis. Tarsi compressi, metatarso articulis 2 sequentibus simul sumtis longitudine fere aequali. Mas: Femoribus posticis subtus dentibus duobus, uno basali, altero majore versus apicem, anticis sat crassis, margine superiore juxta genua dentato; tibiis anticis subtus versus apicem hamatis. Fem.: Pedibus simplicibus. — Long. 9 mill. India or. Dmo. J. Thomson dedicatus, a quo benevolenter communicatus.

4. *Onthophagus forcipatus*: Statura *O. ovati*, at major, breviter sat dense pubescens, parum nitidus, aeneo-niger, capite medio virescente, thorace interdum leviter subcupreо; clypeo antice leviter emarginato; thorace antice abrupte declivi ibique obsolete quadrituberculato, dense sat fortiter punctato, parte declivi autem laevigata; elytris leviter striatis, interstitiis subconvexis, internis sat regulariter biseriatim, externis confuse asperato-punctatis; pygidio rude punctato, longius pubescente; antennis piceo-rufis; pedibus cum corpore subtus nitidis, nigro-virescentibus. Mas: Fronte lamina erecta, angusta, laevi, apice emarginata et bidentata, vertice absque carina transversa. Fem.: capite transversim bicarinato, carina postica altiore. — Long. 8 mill. Mangalore Indiae orientalis.

5. *O. anthracinus*: Niger, opacus, subsericeus, pubescens, depresso; capite magis nitido, subcupo; thorace parum profunde minus dense punctato, longitudinaliter leviter sulcato, antice transversim carinato; elytris leviter striatis, interstitiis planis, subseriatim asperulato-punctatis; antennis rufo-picceis, clava nigro-cinerea; corpore subtus nitido, cum pedibus nigro-cupo. Mas differt a ♀ vertice non carinato, thoracis carina antica medio angulato-producta, tibiis anticis elongatis, arcuatis, angustis. Affinis *A. Lecontei* at maris capite non carinato sicut et thorace sulcato, remotius punctato optime distinctus. — 6½ mill. Guatemala.

6. *O. tristis*: Depressus, opacus, elytris parcus, thorace densius rufo-pubescent, niger, capite nitidior plerumque obscure viridi-aeneo; thorace parum dense punctato, postice medio sublaevi; elytris obsolete striatis, interstitiis irregulariter biseriatim punctatis. Antennis rufo-picceis. Corpore subtus nigro, nitido, tibiis tarsisque plus minusve rufescentibus. Mas: Occipite bicornuto, vertice absque carinis, thorace antice transversim medio tumidulo. Fem.: Capite transversim bicarinato, carina postica medio interrupta, thorace medio antice leviter transversim elevato. — Long. 7—8 mill. Brasilia. Affinis *O. hirculus*, at major, vertice in ♂ antice non carinato sicut et pube rufa facile dignoscendus. Variat thorace interdum obscure virescente.

7. *O. scabriusculus* (Mannerh. i. l.): Parum nitidus, dilatato-ovatus, breviter pubescens, niger, elytris basi et ad humeros sicut apice plus minusve distincte sanguineo-maculatis; capite dense subgranuloso punctato; elypto rotundato medio submarginato; thorace dense ocellato-punctato, punctis antice et ad latera subscabris; elytris in interstutiis planis subscabrose seriatim punctatis. Mas: fronte carina arcuata transversa, occipite medio breviter cornuto, thorace antice subretuso. — Long. 6—6½ mill. Kiachta. Proximus *O. semicornis*, at thorace densius subscabro sicut et occipite cornuto non laminato, dignoscendus.

8. *Oniticellus sumptuosus* (Klug i. l.): Nitidus, capite thoraceque nigro-cupo, elytris nigris, fascia media et apicali irregulari testaceis; thorace laevissimo, postice tantum versus latera punctis nonnullis; pygidio viridi-cupo, parce punctulato; corpore subtus cum pedibus aeneo. Capite in ♂ transversim bicarinato, fronte postice cornuta. Valde affinis *O. undatus*, at praeter colores vertice bicarinato, thorace

laevi et postice versus scutellum magis acuminato bene distinctus. — Long. 12—13 mill. Nossi Be.

9. *O. triangulatus*: Affinis *O. fulvo*, obscure lurido-testaceus, capite subtiliter punctulato, subeupreto; thorace dense punctato, punctis parvulis immixtis adhuc minoribus, maculis obscuris virescentibus, non nitidis; elytris leviter striatis, parum distincte variegatis. Mas: fronte concava, vertice antice carina transversa, non arcuata, clypeo carina angulata, angulo restrorsum directo; pygidio convexo. Fem.: capite parcius punctulato, laetius cupreo, carina frontali recta; pygidio plano. — Long. 7—9 mill. Africa australis (Fritsch!). A congeneribus carina clypei antica in ♂ retrorsum angulatim arcuata optime distinctus.

10. *O. africanus*: Simillimus *O. pallipedi* at minus nitidus et feminae vertice medio obsolete tantum transversim tuberoso, non ut in illa carina transversa medio subcornuta instructo. *O. intermedius* differt fronte in ♂ cornuta, in ♀ carina simplici transversa. — Long. 10—13 mill. Cap bon. spēi; Bloemfontein (Fritsch!).

11. *Liparochrus oblongus*: Nitidus, rufo-piceus, rufo-pubescent, modice convexus, oblongus; capite granulato; thorace marginibus explanatis, rotundatis, aequaliter asperato-punctato, basi marginata; elytris lateribus fere parallelis, geminato-striatis, juxta strias subseriatim, lateribus densius asperato-punctatis; tibiis anticis tridentatis, femoribus posticis subtus apice extus ampliatis. — Long. 8 mill. Austral. bor.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [V. Diagnosen neuer Coprophagen. 102-105](#)