

lineatocolle von Saloniki, *pilosellum* von Mytilene, *forcipiferum* (*vittatum* Sturm. Cat. 1843 p. 260) aus Palästina, *insulare* von Naxos, *latevittatum* aus Kleinasien, *Beckeri* von Derbent, *elegans* u. *sarcptanum* von Sarepta, *aurovittatum* u. *semireclutinum* aus Kleinasien, *seminudum* vom Caucasus, *semilucens* aus der Mongolei, *Piochardi* aus Kleinasien, *basale* (Sturm. Cat. 1843. p. 260) aus Armenien, *Kollarî* von Amasien, *quadripustulatum* von den Dardanellen, *fallax* von Rumelien, *Heldreichi* vom Parnass bei Athen, *Javeti* aus Griechenland und Kleinasien, *striolatum* vom Caucasus, *scrobicolle* von Kleinasien, *sericatum* vom Caucasus, *macropus* von Amasien, *libanoticum* vom Libanon.

Miscellen.

Geänderte Namen.

Listroptera perforata || Burm. (1865) ändere ich wegen *L. perforata* Klug (1825) in *parana* ab.

Tapina coronata † Thoms. (non Serv.) in *diadema*.

Phantasis crispa † Gmel. (non Fabr.) in *Gmelini*.

Die Solier'sche Malacodermiden-Gattung *Cosmocerus* (Cat. Vol. VI. p. 1685) hat sich erst nachträglich als vergebene (wegen des älteren *Cosmocerus* Guér. bei den *Cerambycidae*) herausgestellt; ich ändere daher den Namen derselben hiemit in *Cerocosmus* ab.

Dr. Gemminger.

Xantholinus morio || Reitter. Berl. Zeitschr. 1872. p. 167 taufe ich hiemit in *X. Haroldi* um.

Ed. Reitter.

Synonymisches.

Dichirotrichus barbarus Leder. Berl. Zeit. 1872. p. 137 = *D. praecustus* Dieck (sec. E. Reitter i. l.)

Onthophagus Mastersi Mac Leay. Trans. Soc. N. S. Wales. II (1871) p. 181 = *O. Thoreyi* Harold.

Amnoecius obscurus Mac Leay. l. c. p. 184 gehört zur Gattung *Atacnius*.

Aphodius praecustus Ballion. Bull. Mosc. 1870. p. 333 gehört zur Gattung *Plagiogonus*.

Aphodius barbarus Fairm. Ann. Fr. 1860. p. 171 = *limbatus* Germ.

Cerambyx elegans Dohrn. Stett. Zeit. 1873. p. 74 = *multi-punctatus* Motsh. (sec. Dohrn i. l.)

H.

Herr Eduard Steinheil (München, Landwehrstrasse 15. a.) ist vor Kurzem von seiner entomologischen Reise nach Neu-Granada glücklich zurückgekehrt. Derselbe hat während sieben Monaten die Umgebung von Bogotá durchforscht und ausserdem auch grössere Excursionen nach Ambalema, über den Quindiu-Pass nach Cartago und Medellin unternommen. Die mitgebrachte, ungemein reichhaltige Sammlung zeichnet sich durch vorzügliche Conservirung aus und sind darin auch die kleinsten und unansehnlichen Formen zahlreich vertreten. Die Bearbeitung dieser Ausbeute, mit welcher zugleich eine möglichst vollständige Fauna von Columbien gegeben werden soll, ist für die Coleopterologischen Hefte in Aussicht genommen.

H.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Gemminger Max, Reitter Edmund

Artikel/Article: [Miscellen. 146-147](#)