

### III.

#### Description

d'une espèce nouvelle du genre *Aphodius*.

Par M. S. de Solsky.

*Aphodius (Otophorus) brachysomus* (n. sp.): *Breviter ovatus, convexus, niger, nitidus; capite punctulato, clypeo margine reflexo, medio vix sinuato, fronte trituberculata, genis rotundatis parum prominulis; thorace inaequaliter disperse punctato, postice oblique truncato, angulis obtuse rotundatis, basi tota marginata; scutello profunde longitudinaliter impresso; elytris thorace quarta parte longioribus, crenulato-striatis, intersticiis convexis laevibus, palpis antennisque concoloribus, his clara griseopilosa.* — Long. 9 mill.

Mas: *Tibiarum antecarum calcari apice obtuse truncato; fronte fortius trituberculata, anterius carinula arcuata transversa instructa; thorace antice medio impresso, disperse subtilius punctato.*

Fem.: *Fronte tuberculis minus elevatis, carinula arcuata nulla; thorace minus convexo, crebrius et fortius punctato.*

Voisin de l'*A. sorex* Fabr. et appartenant au même petit groupe d'*Aphodius* à grand écusson. Court, épais, d'un noir luisant. La tête finement ponctuée, le bord du chaperon relevé, à peine sinué en avant, les joues arrondies, peu saillantes ; le front avec trois tubercules, celui du milieu plus grand et plus pointu que les autres, en avant de ces tubercules chez le mâle une petite carène en demi-cercle. Le corselet est presque de moitié plus large que long, obliquement tronqué et sinué aux angles postérieurs qui sont eux-mêmes arrondis, faiblement rétréci en s'arrondissant en avant, bisinué à la base, qui est rebordée

sur toute sa longueur. La surface est très-finement et densément indistinctement pointillée, comme chagrinée, parsemée vers la base d'assez gros points rares, irrégulièrement dispersés. L'écusson s'étend au-delà du quart des élytres, en triangle allongé avec les côtés parallèles, faiblement sinués sur les deux tiers de leur longueur, parsemé de points très-fins, profondément imprimé sur presque toute sa longueur. Les élytres d'un quart à-peu-près plus longues que le corselet, aussi larges que celui-ci à sa base, s'élargissant d'abord un peu près d'elle, puis se rétrécissant en arc de cercle vers le bout qui est arrondi; profondément ponctué-striées, avec les intervalles crénelés, lisses, convexes; la huitième strie s'efface longtemps avant d'atteindre le calus huméral, la neuvième rejoint le bord antérieur sous l'épaule. Les palpes ainsi que les antennes sont noirs, la massue de celles-ci grise; les cuisses non ponctuées, les tarses postérieurs de longueur ordinaire, leur premier article plus long que l'éperon supérieur des tibias; chaque article porte à l'extrémité interne un fascicule de longs poils. L'éperon des tibias antérieurs du mâle faiblement incurvé, parallèle, obtusément tronqué au bout.

Sibérie orientale (Grünwald!); vallées des rivières Sonyfoun et Lefou (Pouzilo!).

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Solsky M. S. de

Artikel/Article: [III. Description d'une espece noavelle du genre Aphodius. 13-14](#)