

II.

Ueber eine neue Gattung der Thorictidae

von

**Edmund Reitter.**

*Thorictodes* (n. g. Thorictidarum).

Caput verticale, oculi nulli. Prothorax postice angustatus, antice valde rotundato-ampliatus, lateribus vix deflexus. Elytra elongata, sublinearia. Metasternum simplex, non tenuissime longitudinaliter cristatum. Tibiae vix spinosae. Corpus distincte punctatum, glabrum.

Kopf vertikal, nicht in das Halsschild zurückgezogen, am Vorderrande wenig gebuchtet, an den Seiten geschwungen und die Ränder abwärts gebogen, ohne sichtbare Augen. Fühler an den vorderen Seiten des Kopfes, unter dem geschwungenen Theile des Stirnrandes eingefügt, robust, kurz, das erste Glied dick und stark, das zweite kleiner, rundlich, die nächsten gleichbreit, schmaler als das vorhergehende, das neunte eine grosse, zweimal geringelte, wie bei *Thorictus* geformte Keule bildend. Fühlerfurchen an der Unterseite des Kopfes kurz, dann erloschen, erst wieder die Seiten der Vorderbrust mit einer flachen ovalen Grube, zur Aufnahme der Fühlerkeule. Oberlippe wenig vortretend, schwach bewimpert. Kinn weit ausgeschnitten, oberer Rand dreibuchtig. Letztes Glied der Kiefertaster länglich oval. Die Mandibeln seitlich etwas lappig vortretend.

Halsschild etwas länger als breit, nach der Basis verengt, nach vorn sehr stark gerundet erweitert, seitlich kantig begrenzt, nicht wie bei *Thorictus* nach abwärts gebogen und verflacht. Die Vorderwinkel mit dem Vorderrande verrundet, die hinteren rechteckig. Schildchen

nicht sichtbar. Flügeldecken gestreckt, fast gleichbreit, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet, die Scheibe irregulär punktirt.

Vorderhüften etwas zapfenartig vortretend, einander genähert, leicht durch einen Vorsprung des Prosternums getrennt, die mittleren weniger genähert, durch das schmale Mesosternum getrennt, die hintersten etwas von einander absteheud. Metasternum quer, einfach, nicht wie bei *Thorictus* schmal und kielförmig längserhaben. Schenkel sehr wenig verdickt, Schienen gegen die Spitze nach aussen leicht erweitert, schwach beborstet, unbewehrt. Füsse stielrund, fünfgliederig, nach der Spitze zu verdünnt, deshalb das Klauenglied das schwächste, Klauen sehr klein. Bauch aus 5 Ringen bestehend, wovon der erste der grösste, die letzten 4 Segmente unter einander ziemlich gleich breit.

Körper klein, gestreckt, mit nach Vorne stark erweitertem und gerundetem Halsschilde.

Unterscheidet sich durch die gestreckte, kleine Körperform, die Bildung des Halsschildes, des Metasternums, der Schienen etc. sehr auffällig von *Thorictus*.

*Thorictodes Heydeni*: *Elongatus, ferrugineus, nitidus, glaber*; thorace latitudine parum longiore, antice valde rotundato-ampliato, postice cordatim angustato, evidenter subtiliter punctato, dorso leviter convexo, medio ante basin longitudinaliter obsolete impresso, basi bisinuato, angulis posticis rectis, anticis rotundatis, clytris thorace antico parum angustioribus, elongatis, lateribus medio minus rotundatis, vix dense subtiliter punctatis, punctis dorsalibus fere seriatis. — Long.  $1\frac{1}{3}$  mill.

Gallia, Aegyptus, Algeria.

Das Vaterland dieses Käfers ist Nord-Afrika; er wurde indess auch durch Schiffe nach Frankreich verschleppt, wie das eine Stück darthut, welches Herr von Marseul in Rouen fing.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [II. Ueber eine neue Gattung der Thorictidae 45-46](#)