

VIII.

Diagnosen neuer Arten.

I. Vom Herausgeber.

A. Coprophagen.

Eurysternus peruanus: Capite remote sat fortiter punctato, thorace fusco-rufo, aeneo-maculato, area parvula media antica cupreo-nitida, elytris fuscoirroratis, pectore femoribusque livido-aeneis, tibiis posticis in ♂ intus denticulatis, epipleuris sutura subhumerali obliqua brevissima. — Long. 16—17 mill. Affinis *E. marmorato*, epipleuris linea impressa sub humerum brevi discedens.

Copris Ritsemæ: Clypeo rotundato medio leviter emarginato; vertice cornu elongato, leviter incurvo, postice supra basin acute dentato; thorace fortiter densissime punctato, subnitido, cornubus duobus lateralibus loboque medio truncato, emarginato; elytris nitidis, interstitiis convexis, subrugose punctatis. Affinis *C. caelato*, elytris nitidis, interstitiis convexis, confluentem punctatis optime distinctus — Long. 17 mill. Basutoland (Afric. austr.).

Onthophagus Badeni: Niger, nitidus, fronte cornubus duobus longissimis, arcuatis, reclinatis, apice emarginatis, thorace lateribus granulato, antice transversim profundissime excavato, dorso supra cavitatem in cornu compressum, elongatum, rugosum et sulcatum præducto, elytris obsolete striatis, tibiis posticis margine apicali tridentato. ♂. — Long. 22 mill. Himalaya.

Onthophagus Smeei (Hope i. litt.): Nigro-coerulescens, clypeo rotundato, thorace granulato, elytris leviter striatis, interstitiis sub-

convexis, subconfluenter punctatis, tibiaram posticarum margine apicali integro. — Long. 13—15 mill. India or.

Mas: Frons carina brevi transversa; vertex cornubus duobus longis arcuatis corniculoque in medio anteriore; thorax antice transversim profundissime excavatus, supra medio in laminam compressam, dorso acutam productus.

Fem.: Frons carina transversa, pone carinam lamina brevi utrinque in cornu erectum breve producta; thorace densius granulato, antice in lobum brevem, apice rotundato-elevato marginatam producto.

Onthophagus batillifer: Obscure ferrugineus, pubescens, subvirescens, thoracis lateribus antice rufis, capite parce punctulato, clypeo medio reflexo et in laminam erectam, apice dilatatam et sinuatam producto, thorace sat fortiter punctato, elytris striatis, interstitiis subconvexis, punctulatis, corpore subtus fusco-castaneo, femoribus rufotestaceis. — Long. 6 mill. Malacca.

Onthophagus Sharpi: Nitidissimus, ater, omnino fere laevis, thorace tantum, antice medio subretuso, ad latera antice punctulato, clypeo antice angustato, in laminam erectam et subinflexam, basi angustatam, apice valde dilatatam et truncatam producto; pygidio subrugose fortiter punctato, antennis pedibusque piceis. ♂. — Long. 8 mill. Affinis *O. nasicorni* Dej., lamina clypeali basi angustata sicut et striis elytrorum vix punctulatis discedens.

Onthophagus smaragdinus: Viridi-aureus, depressus, tarsis tibiisque atro-coeruleis, antennis nigris, thorace granulato, postice longitudinaliter subsulcato, elytris limbo apiceque flavescens. Affinis *O. flavocincto*, thorace sulcato, parcius granulato inter alia discedens. — Long. 11—12 mill. Abyssinia australis.

Mas: Clypeo acuminato, apice reflexo emarginato; vertice carina transversa arcuata; fronte lamina reclinata, apice fissa, tibiis anticis apice intus spinosis.

Fem.: Clypeo rotundato, fronte lamina lata brevi, reclinata, medio triangulariter excisa.

Liparochrus ciliboides: Fuscus, subnitidus, antennis rufo-brunneis, pedibus corporeque subtus rufo-piceis, thorace punctis transversis sat dense, medio parcius obtecto, elytris leviter undulato-striatis, inter-

stitiis planis, rugulatis, rugulis nitidis, interstitiis 2 et 4 reliquis multo lätioribus. A. *L. sulphoides*, cui simillimus, statura majore et latiore, interstitiis non nitido-granulatis, sed aequaliter rugulatis discedens. — Long. 11 mill. N. S. Wales.

B. Phytophagen.

Dolometis (n. g. *Eumolpinarum*, Sect. *Colaspinæ*): Caput exsertum, oculi magni, integri. Thorax basi marginatus, lateribus undulatis. Elytris confuse punctatis, epipleuris latis, concavis. Prosternum medio transversim elevatum, postice recte truncatum. Episternis metathoracis non sulcatis. Pedibus simplicibus, unguiculis appendiculatis. Antennis filiformibus, articulo 3 secundo duplo longiore.

D. discoidalis: Oblongo-ovalis, sat lata, obscure cupreo-aenea, elytris disco solo nitidis, lateribus late opacis, thorace dense et inaequaliter subrugose punctato, elytris disco fortiter et dense, lateribus apiceque subtilius punctatis, pedibus piceis, femoribus et epipleuris rufis, antennis fuscis, articulis 1—4 rufotestaceis. — Long. 8 mill. Nov. Granada, Guayabál.

Metaxyonycha Lefevrei: Pallide flava, elytris vitta media postice abbreviata, subsinuata, rufo-brunnea, tibiis margine exteriori infuscatis, tarsis testaceo-brunneis, capite thoraceque sparsim remote punctatis, elytris sat fortiter, versus suturam subseriatim punctatis, apicem versus subsulcatis, margine basali carinato. — Long. 10—11 mill. S. Carlos, Nova Granada.

Colaspis hypochaleca: Ovalis, brunnea, subaenescens, corpore subtus cupreo-aeneo, pedibus antennisque brunneo-testaceis, his articulo 7 et 11 infuscatis; thorace rude irregulariter punctato, margine viridi-aeneo et medio acute angulato, elytris grosse irregulariter punctatis, interstitiis rugatis, apicem versus autem profunde sulcatis, interstitiis convexis et minus nitidis. — Long. 7—8 mill. Nov. Granada, Medellin.

Colaspis leucopus: Ovalis, aeneo-nigra, pedibus antennisque pallide flavis, his articulis 4—8 infuscatis; vertice longitudinaliter sulcato, thorace parum dense sat grosse punctato, margine laterali bidentato, elytris sat regulariter seriatim subgeminato-punctatis, apice

punctis rarioribus et seriebus simplicibus. — Long. 6—7½ mill. Nov. Granada, Canoas. Affinis *C. orientali*, elytris parcius punctatis, lateraliter vix carinatis et colore diversa.

Chrysomela rugipennis: Statura *Chr. sanguinolentae*, supra omnino nigra, subtus nigro-cyanescens, antennis pedibusque obscure violaceis; thorace capiteque subopacis, illo subtilissime sat remote punctulato, antice angustato, angulis anterioribus acutis, margine laterali postice sulco brevi, medio et antice punctis magnis limitato, elytris punctis magnis et immixtis minutis irregulariter dense obsitis, interstitiis valde rugatis, quae elytrorum sculptura omnino cum illa *sanguinolentae* convenit, accedunt autem puncta minuta copiosa. Prosterno marginibus lateralibus carinatis. — Long. 8—10 mill. Andalusia. Discedit *Chr. cribrosa* statura magis rotundo-globata, thorace nitido et dense punctato.

Metastyla Balyi: Cupreo-aenea, corpore subtus cum pedibus obscure viridi-aeneo, thorace basi punctulato, lateribus non incrassatis, elytris valde convexis, subseriatim subtiliter punctulatis, postice laevibus, intus juxta et extus pone callum humeralem impressis; metasterno cum prosterno, postice dilatato, contiguo, mesosterno occulto. — Long. 6 mill. Nov. Granada, Las Cruces.

II. Von Eduard Steinheil.

Odontocheila secedens: Cylindrica, cyanea, metallica, supra fusco-cuprea, elytris lateraliter violaceo-micantibus, punctis tribus marginalibus albis; palporum mandibularumque nigrorum basi flava; thorace postice subangustiore, depressione basali laete purpureo-aurea; labro viridi-nigro, ochraceo limbato, longitudinaliter cylindrico-inflato, septemdentato; pedibus cyaneis, femoribus parce, tarsis anticis subtus dense albo-setosis. — Long. 11—12 mill. Nov. Granada, Muzo.

Tetragonoderus columbicus: *T. quadriguttato* Dej. simillimus, sed capite inter antennis non impresso; antennarum tribus primis articulis rufo-testaceis, primo articulo supra non nigro-maculato; elytrorum macula basali non in octavum interstitium extensa et interiore parte cujusque guttae flavae in quinto interstitio apicem versus paulo

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [VIII. Diagnosen neuer Arten. 137-140](#)