

punctis rarioribus et seriebus simplicibus. — Long. 6—7½ mill. Nov. Granada, Canoas. Affinis *C. orientali*, elytris parcius punctatis, lateraliter vix carinatis et colore diversa.

Chrysomela rugipennis: Statura *Chr. sanguinolentae*, supra omnino nigra, subtus nigro-cyanescens, antennis pedibusque obscure violaceis; thorace capiteque subopacis, illo subtilissime sat remote punctulato, antice angustato, angulis anterioribus acutis, margine laterali postice sulco brevi, medio et antice punctis magnis limitato, elytris punctis magnis et immixtis minutis irregulariter dense obsitis, interstitiis valde rugatis, quae elytrorum sculptura omnino cum illa *sanguinolentae* convenit, accedunt autem puncta minuta copiosa. Prosterno marginibus lateralibus carinatis. — Long. 8—10 mill. Andalusia. Discedit *Chr. cribrosa* statura magis rotundo-globata, thorace nitido et dense punctato.

Metastyla Balyi: Cupreo-aenea, corpore subtus cum pedibus obscure viridi-aeneo, thorace basi punctulato, lateribus non incrassatis, elytris valde convexis, subseriatim subtiliter punctulatis, postice laevibus, intus juxta et extus pone callum humeralem impressis; metasterno cum prosterno, postice dilatato, contiguo, mesosterno occulto. — Long. 6 mill. Nov. Granada, Las Cruces.

II. Von Eduard Steinheil.

Odontocheila secedens: Cylindrica, cyanea, metallica, supra fusco-cuprea, elytris lateraliter violaceo-micantibus, punctis tribus marginalibus albis; palporum mandibularumque nigrorum basi flava; thorace postice subangustiore, depressione basali laete purpureo-aurea; labro viridi-nigro, ochraceo limbato, longitudinaliter cylindrico-inflato, septemdentato; pedibus cyaneis, femoribus parce, tarsis anticis subtus dense albo-setosis. — Long. 11—12 mill. Nov. Granada, Muzo.

Tetragonoderus columbicus: *T. quadriguttato* Dej. simillimus, sed capite inter antennis non impresso; antennarum tribus primis articulis rufo-testaceis, primo articulo supra non nigro-maculato; elytrorum macula basali non in octavum interstitium extensa et interiore parte cujusque guttae flavae in quinto interstitio apicem versus paulo

remota; prosterni medio, coxis, epipleuris tibiisque testaceis, femoribus tarsisque fuscis. — Long. 4 mill. Nov. Granada, Ambalema.

Phlucoxena biundata: Subtus tota testacea; capite supra opaco, nigro, intra oculos biimpresso; palporum apice antennisque testaceis; thorace cordato, lato, testaceo, angulis posticis subrectis, linea medio impressa, utrinque circulo nigro ornato; elytris thorace duplo latioribus, nigris, fasciis duabus transversis testaceis, valde undatis, his in sutura virga ferruginea inter se conjunctis. Thoracis elytrorumque margine pilis singulis longissimis obsito; pedibus testaceis. — Long. 4.7 mill. Nov. Granada, inter Chucuri et Nare.

Pachytles Haroldi: Rufulo-fuscus, mesosterno pallidiore, supra piceus; capite antice rufo, fronte biimpressa, postice lateraliter punctis nonnullis impressis; thorace capite latiore, latitudine brevior, valde cordato, angulis anticis prominulis, posticis rectis, lateribus late reflexis, obtuse denticulatis; elytris convexis, thorace latioribus, postice ampliatis, latitudine non duplo longioribus, humeris rotundatis, laevibus, punctis subtilibus, distantibus, utrinque quadriseriatim dispositis, impressis; femoribus anticis subtus unidentatis; antennis rufo testaceis, articulis 1, 3, 4 et 11 latitudine longioribus; pedibus testaceis — Long 7.3, lat. elytr. 2.9 mill. Nov. Granada, Muzo.

Pachytles Baleni: Subtus testaceus, lateraliter obscurior, supra piceus; capite utrinque biimpresso, antice rufo, postice utrinque puncto majore instructo; thorace cordato, longitudine multo latiore, angulis anticis brevissimis rectis, posticis subrectis; lateribus late reflexis; elytris thorace latioribus, postice ampliatis, in disco leviter striato-punctatis, in interstitio 3 et 5 circiter 10 punctis impressis, latera versus punctorum seriebus sat turbatis; antennarum fuscarum quatuor primis articulis rufis, 5—10 longitudine latioribus; pedibus testaceis, femoribus anticis subtus obtuse dentatis. — Long. 6, lat. elytr. 2.5 mill. Nov. Granada, infra Nare ad Fl. Magdalenae.

Taeniolobus Chaudoiri: *T. Guérini* Chand. sat affinis, sed vertice linea longitudinali impressa; thoracis disco non transversim undulato, angulis anticis subrotundatis; elytris fortiter punctato-striatis, punctis postice evanescentibus; interstitiis convexis, quorum secundo reliquis latiore, septimo fortissime carinato; tibiis anticis late triden-

tatis, posticis tri- vel quadridenticulatis, intermediis extrorsum 7—8 dentibus apicem tiliarum versus incrementibus. — Long. 19—20, lat. 5.3—6.0 mill. Nov. Granada, San Carlos.

Scarites zambo: Niger, nitidus, elongatus, parallelus; capite quadrato, fronte bisulcata, ad oculos strigoso; antennis nigris, articulis 5—11 fusco-pubescentibus; thorace longitudine duplo latiore, postice rotundato, utrimque fovea non profunda, subtiliter rugosa instructo, margine laterali subcrenato, linea media impressa; elytris striatis, interstitiis convexis, striis 3—7 postice subabbreviatis, 6 et 7 subtiliter punctulatis; elytrorum basi margineque laterali granulatis; tibiis anticis longe tridentatis posticeque 3—4 denticulatis, intermediis extrorsum pluridenticulatis, apicem versus bispinosi. — Long. 36, lat. 11 mill. Nov. Granada, ad Fl. Magdaleneae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Steinheil Eduard

Artikel/Article: [II. Von Eduard Steinheil. 140-142](#)