

III.

Diagnosen neuer Arten.

Von E. v. Harold.

~~~~~  
A. Scarabaeidae.

*Epilissus morio*: Nitidus, niger, laevis, clypeo tantum antice obsolete punctato, elytris subtilissime striatis, palpis antennisque piceorufis, tibiis posticis simplicibus leviter arcuatis. — Long. 10 mill. Madagascar.

*Heliocopris Sturleri*: Nigropiceus, elytris subopacis, subtilissime striatis, juxta septimam striam carina acuta, interstitiis planis, subtilissime rugosis, parte externa juxta limbum glabra, antennis nigropiceis. Mas: Capite ante oculos non dilatato, fronte cornu conico, basi crassissimo, subrecurvo, thorace antice abrupto, dorso asperatogranulato, antice late ad latera partis elevatae oblique truncato, parte declivi utrinque late foveolata et glabrata, medio valde at minus dense granulata. — Long. 70 mill. Species insignis, a Dom. Sturler in monte Salak insulae Javae capta et a Dom. van Lansberge amice mihi communicata. Feminam, ni fallor, in collectione defuncti Dom. Riehl vidi.

*Onthophagus penicillatus*: Obscure aeneus, subnitidus, elytris rufotestaceis, puncto utrinque basali medio, macula transversa apicali fasciisque duabus, e maculis pluribus, exterioribus majoribus, compositis nigris, capitis clypeo antice obtuse acuminato, occipite foveato et pone foveam cornu brevi obtuso, thorace dense granulato, utrinque nonnihil pone medium areola laevi, setis nonnullis ferrugineis instructa, elytris ovalibus, interstitiis planis, dense punctulatis, corpore subtus

cum pedibus obscure cupreo-aeneo, antennarum clava testacea. — Long. 10.5 mill. Birmá. Primo visu *O. maculato* similis, at occipite armato diversus et thoracis penicillo omnino singularis.

*Onthophagus remotus*: Obscure viridi-aeneus, thoracis marginibus lateralibus et basi anguste, sicut et elytris ferrugineis, his disco plus minusve fusco-ferrugineis, thorace dense punctulato, corpore subtus rufo-testaceo, metasterno medio vitta latissima fusco-aenea. Mas: Clypeo antice obtuse acuminato et leviter reflexo, vertice bicornuto, cornubus divaricatis, arcuatis, basi flexuose latioribus, inter se carina non junctis, thorace retuso, medio obtuse tuberoso. — Long. 7.5—8 mill. Birmá. Affinis *O. limbato*, major, subtus rufo-testaceus, clypeo magis acuminato, cornubus intus basi non angulatis sicut et thorace densius subtilius punctato diversus.

*Onthophagus birmanicus*: Subnitidus, niger, elytris testaceis, sutura, macula utrinque basali media fasciaque undulata media nigris; mas: vertice cornu elongato, basi latiore, subrecurso, thorace vage subtiliter punctato, omnino fere declivi, parte basali altiore medio obtuse tuberculata, lateribus dentatis; fem.: capite transversim bicarinato, thorace simplici fortius punctato. — Long. 5—6.5 mill. Birmá. *O. dromedarius* illi affinis, at thorace viridi-aeneo, convexo, antice trituberculato omnino diversus.

*Onthophagus pollicatus*: Subelongato-oblongus, opacus, breviter pubescens, obscure aeneus, omnino dense aciculato-granulatus, granulis elongatulis, capite carina brevi transversa frontali, occipite corniculo medio brevi, thorace antice leviter retuso medioque obtuse bituberculato, basi utrinque ante humeros impressa, corpore subtus fortiter punctato, antennis rufo-piceis, tibiaram anticarum calcari apicali, subcurvato, apice incrassato. ♂. — Long. 11.5 mill. Birmá.

*Onthophagus niloticus*: Castaneus, capite thoracisque disco piceis, illo transversim bicarinato, hoc disco laevi, ad latera parce fortiter punctato, punctis piliferis, antice medio transversim subcristato, basi marginata, elytris leviter striatis, interstitiis internis planis, externis convexis, utrinque juxta strias serie punctorum, punctis piliferis. — Long. 7 mill. Kordofan, Nilus coeruleus.

*Oniticellus martialis*: Nigroviridi-aeneus, elytris fere nigris, epipleuris margineque apicali, interdum etiam limbo laterali, antice saltem, testaceo-rufis, subtus ferrugineus, pectore aeneo-fusco, tibiis tarsisque plus minusve piceis; capite cornu frontali elongato, leviter recurvo, thorace oblique declivi, medio carinis tribus brevibus, intermedia tuberculiformi, utrinque carina laterali bidentata. ♂. — Long. 12 mill. Birmá. Species capitis thoracisque armatura omnino notabilis.

*Oniticellus tessellatus*: Testaceus, capite thoraceque nigroaeneo-variegatis, hoc aequaliter parum dense at rude punctato, elytris flavis, nigro-tessellatis, profunde striatis, striis anguste crenato-punctatis. — Long. 6.5 mill. Java.

*O. pictus* || Wiedem Zool. Mag. I. 3. p. 160. (1819).

Species *picto* Hausm. simillima, minor, thorace fortiter etiam disco punctato, macula dorsali nigroviridi-aenea antice utrinque striola flava notata, elytris multo fortius crenato-punctato-striatis sicut et tibiis posticis flavis omnino diversa.

*Aphodius brahminus*: Niger, elytris testaceis, macula maxima humerali nigra, capite antice lamina erecta angusta bidentata, vertice pone laminam foveolato, thorace amplo, parce punctato, basi non marginato, utrinque postice emarginato, scutello magno, triangulari, laevi, elytris brevibus, latis, thorace vix longioribus, punctato-striatis, interstitiis leviter convexis, basi vage punctulatis, apice minus nitidis et dense subtilissime punctatis; prosterno postice laminato-compresso, metasterno laevi. — Long. 5 mill. Birmá. Ex affinitate *A. bostrychoidis*, *contracti*, etc., frontis armatura prosternoque laminato omnino insignis.

*Aphodius segmentarius*: Subdepressus, obscure castaneus, thorace ad latera elytrisque plerumque dilutius rufobadiis, capite laevi mutico, oculis magnis, thorace lato, ad latera tantum parce punctulato, basi non marginata, lateribus nonnihil pone medium profunde sinuatis, elytris sat profunde striatis, striis subtiliter crenato-punctatis, interstitiis laevibus, postico et ad latera punctulatis et pubescentibus, tibiis anticis supra punctulatis, posticarum setis apicalibus inaequalibus. — Long. 7—7.5 mill. Birmá. Ex affinitate *A. depressi*, at omnino thoracis lateribus emarginatis distinctissimus.

*Rhyssemus madagassus*: Capite convexo, medio subgibboso, dense aequaliter sat subtiliter granulato, clypeo antice rotundato-emarginato, utrinque rotundato, non angulato, thorace dense subtiliter punctato, rugis transversis laevibus angustis, medio omnibus interruptis, elytris subtiliter striatis, interstitiis bifariam granulatis, serie granulorum externa minus distincta at in carinam altiore, praecipue in interstitiis alternis, confluentibus. — Long. 3.7 mill. Madagascar (Goudot!).

### B. Cerambycidae.

*Tragocephala opulenta*: Nigra, maculis tomentosae laete viridibus et aurato-flavis ornata: capite nigro, margine postico oculari maculaque suboculari juxta genas flavis, postice utrinque viridi; thorace ad latera unidentato, viridi-tomentoso et nigro transversim maculato, medio utrinque macula transversa flavescens; elytris nigris, vitta abbreviata obliqua antica, altera a medio juxta limbum, macula oblonga subhumerali et altera utrinque juxta suturam post medium, cum vitta externa antice subconnexa, aurato-flavis et viridi cinctis, maculis praeterea parvulis inter vittas viridibus; corpore subtus flavo-tomentoso, abdomine medio et ad latera viridi. Prosternum antice oblique declive, mesosternum truncatum. Pedes et antennae nigrae, viridi-tomentosa. — Long. 40 mill. Chinchoxo (Falkenstein!).

*Ceroplesis heroica*: Fusco-picea, elytris maculis parvis ferrugineis, ante medium in fasciam arcuatam densius congestis; thorace lateribus postice dentatis, ante dentem tumidulis, elytris basi fortiter, at vix granose punctatis, utrinque intra scutellum et humerum tuberculo sat acuto. — Long. 43 mill. Sansibar: Wito. Affinis *C. irregulari*, multo major et robustior, thorace minus acute dentato, elytris basi non granulatis et tuberculo basali bene distincta.

*Pachyteria polychroma*: Capite nigro, fronte nigro-aenea, thorace rufo, rugulato, scutello nigro, elytris testaceis, dimidio postico nigro-viridiaeneo, corpore subtus cum pedibus nigro, abdomine aenescens ad latera maculis cinereo-pubescentibus, antennis nigris, articulis 6 ultimis testaceis. — Long. 35 mill. Borneo.

*Pachyteria collaris*: Capite obscure viridi-aeneo, thorace sanguineo, parum dense punctato, spina laterali acuta, elytris laete

coorulescente-viridibus, sutura postice vittaque laterali a medio usque ad apicem, nigro-opacis, velutino-tomentosis, corpore subtus cum pedibus obscure viridi-aeneo, pectore abdomineque ad latera argenteo-sericeo, tibiis posticis cyaneis, antennis articulis 1—2 nigroviridibus, 3—5 flavis, reliquis nigris. Long. 27—30 mill. Borneo.

### C. Chrysomelidae.

*Colasposoma ardens*: Breviter oblongum, aurato-cupreum, scutello, thoracis elytrorumque marginibus omnibus cyaneis, subtus cum pedibus cyaneo-nigrum, antennis omnino nigris, articulis 2 et 3 interdum piceis; thorace brevi, subtiliter densissime punctato, elytris basi, intus juxta callum humeralem impressis; palporum articulo ultimo nigro. — Long. 6.5 mill. Cap bon. spei. Affine *C. fulgido*, thorace multo brevior, deusius punctato, postice minus angustato, elytris longioribus, ad latera minus rugatis diversum.

*Colasposoma subsericum*: Ovale, postice subacuminatum, minus nitidum, subsericans, viride vel purpureum, subtus nigrum, femoribus subaeneis, antennis nigris, articulis basalibus piceis, primo autem supra aeneo; capite thoraceque subtiliter minus dense punctulatis, elytris ovalibus, parce vage punctulatis, obsoletissime subtiliter rugosis. — Long. 6.5 mill. Cap bon. spei. Species elytris ovalibus omnino insignis.

*Colasposoma antiquum*: Oblongum, obscure viridi-aeneum, interdum fere omnino nigrum, subtus aeneo-piceum, pedibus antennisque fusco-ferrugineis, fronte inter oculos impressa, thorace subtiliter dense punctulato, elytris fortius punctatis, ad latera antice transversim rugatis, postice juxta limbum in costam latam, obtusam elevatis. — Long. 7—8 mill. Port Natal. Species thorace lateribus valde arcuatis, angulis posticis et anticis dentatis, his acutius, distincta.

*Colasposoma barbatum*: Aurato-viride, elytris ad suturam postice leviter cyanescentibus, ad latera aurato-cupreis, corpore subtus obscure aeneo, prosterno denso flavido-villoso, metasterno pedibusque obscure viridi-aeneis, antennis nigris, articulis basalibus 2—5 rufescentibus, thorace punctulato, elytris sat subtiliter, utrinque autem circa callum humeralem fortiter, juxta limbum medio biserialiter punctatis. — Long. 9 mill. Queensland.



*Colasposoma sansibaricum*: Abbreviato-oblongum, latiusculum, viridi-aeneum, thoracis elytrorumque lateribus aurato-cupreis, antennis nigris, articulo secundo solo rufotestaceo, corpore subtus cum pedibus nigro, femoribus aeneis, anticis et intermediis breviter distincte dentatis, posticis muticis, labro palpisque nigris; thorace lato, sat dense et fortiter, ad latera antice remotius punctato, elytris subrugose punctatis, ad latera transversim rugatis. — Long. 5.5 mill. Sansibar. Plerumque ad basin thoracis ante scutellum lineola impressa longitudinalis.

*Amasia falcata*: Viridi-aurata, epipleuris postice violaceis, subtus cum pedibus antennisque testacea; thorace antice angustato, ad latera parum dense punctato, elytris fortiter, antice confuse punctatis, postice subsulcatis, apice ipso laevi; femoribus anticis acute breviter dentatis, intermediis muticis, posticis dente magno acutissimo et apice subinflexo armatis, antennis gracilibus, articulo 3 quarto nonnihil brevior. — Long. 4.5 mill. Birmá.

*Colaspoides xanthopus*: Viridi-aenea, mesosterno cyanescente, abdominis apice, pedibus antennisque rufo-badiis, his articulis 3—4 apicalibus piceis, thorace fortiter parum dense punctato, scutello laevi, elytris subseriatim fortiter, disco postico autem obsoletius punctatis, pone basin utrinque transversim distincte impressis. — Long. 6.5 mill. Queensland.

*Nisotra badia*: Ovalis, nitida, ferruginea, thorace laevi, valde transverso, antice utrinque profunde sulcato, angulis anticis subdentatis, elytris sparsim subtilissime punctulatis, stria leviter impressa laterali juxta limbum, postice obsoleta; tarsis antennisque, articulis 4 basalibus exceptis, nigris. — Long. 4 mill. Ceylon.

*Nisotra Goudoti*: Ovalis, omnino rufo-testacea, antennarum articulis 6 apicalibus et apice septimi, genibus sicut et tarsis piceis, thorace laevi, antice utrinque sulco obsoleto at distincto, punctato, elytris sat dense, at subtilissime punctatis, punctis vix seriatis; metasterno antice truncato, medio subtilissime transversim strigoso. — Long. 6 mill. Madagascar (Goudot!). Affinis *N. (Haltica) spadiceae* Dalm., major, thoracis sulcis anticis longioribus elytris minus distincte punctatis diversa.

*Nisotra unicolor*: Obscure cyanea, antennis nigris, articulis 4 basalibus rufis, thorace subtilissime sat dense, latera versus evidentius punctato, angulis anticis truncatis, striola basali utrinque subtiliter, margine antico utrinque pone oculos foveolatim impresso, elytris subtiliter subseriatim et subgeminatim punctatis, limbo antice laevi et convexo, pedibus obscure rufo-piceis, metasterno antice obtuse truncato. — Long. 4 mill. Siam.

*Euphitrea birmanica*: Subrotunda, ferruginea, elytris cyaneis, sat regulariter seriato-punctatis, punctis apicem versus minoribus et minus ordinatis, limbo a basi usque ultra medium laevi et subincrassato; thorace dense punctulato; basi utrinque striola impressa brevi, margine laterali laevi et impressione vaga media a disco diviso; epipleuris latis, violaceis, transversim plicatis; antennis rufotestaceis. — Long. 6 mill. Birmá. Affinis *Eu. micanti*, elytris cyaneis, subtilius punctatis facile dignoscenda.

*Phyllotreta caucasica*: Nigra, elytris testaceis, sutura, antice et postice angustata, macula ad callum humeralem, limbo, medio valde ampliato, apiceque nigris, pedibus, femoribus posticis nigris exceptis, antennisque omnino testaceis, his in ♂ articulo 5 elongato at non incrassato. — Long. 2.7 mill. Caucasus (Leder!). Affinis *Ph. ochripes*, quae autem discedit tarsis fuscis, antennis articulis 4—11 nigris et quinto in ♂ evidenter incrassato.

*Chaetocnema eristata*: Parvula, regulariter ovalis, viridi-aenea, antennis basi articulis 1—6 vel 7 pedibusque testaceis, his femoribus posticis obscure viridi-aeneis; capite magno, deflexo, fortiter punctato, crista acuta transversa inter oculos margineque postico elevato, thorace subtilissime sat dense punctulato, nitidulo, elytris regulariter punctato-striatis, spatio inter suturam et striam primam usque ante medium irregulariter biseriatim punctulato. — Long. 1.7 mill. Sansibar. Ex affinitate *Ch. rugiceps* Baly, multo minor, crista transversa capitatis insignis.

*Chaetocnema mexicana*: Nitida, obscure cupreo-aenea, antennis pedibusque rufo-testaceis, femoribus posticis leviter infuscatis, vertice laevi, fronte carinata, thorace subtilissime punctulato, lateribus fere rectis, angulis anticis, insuper visis, acutis, elytris regulariter, disco

subtilius, ad latera fortius punctato-striatis, striis apicem versus obsoletis. — Long. 2 mill. Mexico. Affinis *Ch. concinnae*, pedibus testaceis et statura minore mox distinguenda.

*Chaetocnema fraterna*: Aenea, pedibus et antennarum basi rufotestaceis, femoribus posticis usque ante apicem aeneis, vertice lato non carinato, fronte dense punctata, thorace aequaliter sat dense punctato, angulis posticis rectis, elytris regulariter punctato-striatis, stria abbreviata juxtasuturali irregulari, interstitiis lateralibus convexis. — Long. 2.5 mill. Madagascar. Affinis *Ch. hortensi*, at elytris fortius et omnino regulariter punctato-striatis diversa.

*Chaetocnema solida*: Ovata, nitida, cupreo-aenea, pedibus testaceis, femoribus posticis aenescentibus, antennis testaceis, apice leviter infuscatis; capite sat dense fortiter punctato, fronte plana non carinata, thorace aequaliter sat dense fortiter punctato, basi non striolato, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis omnibus angustis et convexis, laevibus, spatio basi-suturali immixtis punctis nonnullis vagis. — Long. 2.7 mill. Columbia. Species elytris fere sulcatis, subcrenato-punctatis bene distincta.

*Dibolia maculata*: Obscure aenea, elytris postice cyaneo-viridibus et utrinque ante apicem macula magna rufa notatis, antennis nigris, articulis 4 basalibus rufis, corpore subtus cum pedibus nigro, femoribus posticis cyaneo-nigris, thorace dense punctulato, elytris minus regulariter subtiliter punctato-striatis, interstitiis punctulatis. — Long. 2.7 mill. Port Natal. Species elytrorum pictura omnino insignis.

---



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [II. Diagnosen neuer Arten. 225-232](#)