

V.
Diagnosen
neuer Coprophagen

vom

Herausgeber.

1. Ateuchus Erichsoni (Westerm.): *Similis A. sancto a quo differt thorace multo latiore, postice medio non laevigato elytrisque brevioribus. Subconvexus, modice nitidus, cupreo-viridis vel cyaneo-viridis. Frons transversim carinata, carina medio interrupta. Thorax lateribus medio valde ampliatis, dense asperato-granulatus. Elytra leviter striata, interstitiis variolose punctatis. Scutellum apparens. Tibiae posticae parce nigropilosae, medio autem dense fusco-setosae.* — Long. 10—11 lin.
India or.

2. Gymnopleurus aeruginosus: *Affinis G. coeruleuscenti, aliter coloratus et densius rugulosus. Parum nitidus, sat dense breviter pubescens, aeruginosus. Caput linea longitudinali elevata, clypeo sexdentato. Thorax omnino dense granulato-rugosus, maculis parvulis tantum laevibus. Elytra parum convexa, densissime aciculato-granosa, obsolete striata. Corpus subtus cum pedibus viridi-atrum, nitidum.* — Long. $4\frac{1}{2}$ lin.
Aegyptus, Kordofan.

G. aeruginosus Kollar. i. litt.

3. Uroxys coarctata: *Convexa, oblonga, nitida, picea. Caput antice transversim rugatum; vertice medio breviter unilobulato. Thorax transversus, laevis. Elytra crenato-striata,*

stria secunda ad apicem in foveola exeunte, interstitiis laevibus. Mas differt a femina thorace latiore, lateribus medio angulatis, elytris angustato-ovalibus, tibiis anticis elongatis, incurvatis, intus ante medium dentatis. — Long. $5\frac{1}{4}$ lin. Columbia.

Copris coarctata Dej. Cat. 3 ed. p. 155.

4. *Uroxys aterrima*: Oblonga, sat convexa, valde nitida, laevissima, nigra. Vertex transversim carinatus. Thorax brevis, margine basali utrinque juxta medium punctato. Elytra leviter striata, apice depressa, striis 4 internis ad apicem sulcatis. Corpus subtile cum pedibus nigro-piceum vel piceum, mesosterno utrinque juxta angulum suturalem metasterni punctis nonnullis majoribus. — Long. 4— $5\frac{1}{2}$ lin. Brasilia.

Mas. Differt a femina carina frontali minus elevata, thorace latiore, lateribus angulato et antice arcuato, elytris postice subtruncatis, tibiis anticis elongatis, angustis, apice incurvatis.

5. *Choeridium puncticolle*: Abbreviato-ovale, sat convexum, nitidum, piceum, interdum elytris piceo-rufis. Caput dense et subrugose punctulatum. Thorax medio subgibbose convexus, densissime, disco autem parcius punctatus, basi transversim leviter impressus, non marginatus. Elytra crenato-striata, striis apice nonnihil profundioribus, interstitiis planis, laevibus. Pygidium dense punctatum. Palpi ferruginei, antennae testaceo-clavatae. Corpus subtile rufo-piceum. — Long. $3\frac{3}{4}$ — 4 lin. Brasilia.

6. *Choeridium mutilatum*: Convexum, ovatum, nitidum, piceum. Caput rugose punctatum, clypeo medio bidentato, vertice tuberculis duobus carina subarcuata conjunctis. Thorax lateribus ante medium angulatis, margine antico medio obtuse tuberculatus, postice linea profunde impressa longitudinali. Elytra fortiter crenato-striata, interstitiis convexis, dense subtiliter punctulatis. Antennae ferrugineae, clava rufo-testacea. Tibiae anticae in $\frac{1}{2}$ subelongatae, subtus ante medium dentatae, apice margine interno emarginatae, spina apicali crassa, obtusa, intus deflexa; femoribus posticis versus apicem margine superiore

obtuse dentato; ♀ tibiis anticis femoribusque simplicibus. — Long³
5 $\frac{3}{4}$ —8 lin. Brasilia.

Copris mutila Germar i. litt.

7. Deltorhinum: (Nov. Gen.) *Choceridii* affine at
clypei forma tarsorumque structura valde discrepans. Caput
triangulare, genis clypeoque acuminatis fronte transversim cari-
nata. Thorax basi immarginatus. Prosternum transversim cari-
natum et antice foveolatum. Tibiae anticae scalpriformes. Tarsi
antici nulli, postici brevissimi, extus longe ciliati, articulo primo
lato, ultimo et penultimo fitiformibus, unguiculis minutis.

D. Batesi: *Oblongum, nitidum, convexum, piceum.*
Thorax laevis, linea longitudinali impressa, margine antice medio
transversim carinato. Elytra crenato-striata, interstitiis sub-
convexis, laevibus. Pygidium convexum, basi punctulatum.
Palpi cum antennis ferruginei. Tibiae anticae insuper rugose
punctatae. — Long. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Ega.

8. Onthocharis Germari: *Leviter elongata, pa-*
rallela, dorso subdepressa, nitida, aurato-cuprea vel obscure cu-
prea, elytris dilute viridi-aeneis interdum piceis. Caput laeve.
Thorax lateribus tantum subtiliter punctulatus, postice medio
longitudinaliter obsolete sulcatus, lateribus rotundatis, medio
non angulatis. Elytra leviter et simpliciter striata, striis cupreis,
interstitiis planis, sat laevibus. Palpi cum antennis ferruginei.
Corpus subtile cum pedibus piceo-cupreum, tarsorum posticorum
articulis quam lati longioribus. — Long. 2 $\frac{3}{4}$ lin. — Rio Janeiro.

9. Ontherus Kirschii: *Elongatulus, convexus, ni-*
tidus, piceus vel rufo-piceus, elytris, praecipue parte basali,
coeruleo-iridescentibus. Caput antice transversim rugosum;
carina frontali arcuata, medio breviter tuberculata. Thorax
lateribus tantum punctatus, postice medio vix longitudinaliter
impressus. Elytra thorace dimidio longiora, sat late et profunde
striata, striis leviter crenato-punctatis, interstitiis convexis
laevibus. Pygidium dense punctulatum. Differt ab O. sulcatore,

elytris longioribus, latius et profundius striatis. — Long. 8—9 lin.
Bogota.

10. *Ontherus brevipennis*: *Oblongo-quadratus, convexus, nitidus, piceus. Caput clypeo rotundato, integro, carina frontali brevi, elevata, bidentata. Thorax antice et lateribus punctulatus, basi marginatus, antice subretusus medioque obtuse tuberculato. Elytra thorace vix longiora, profunde crenato-striata, interstitiis convexis, laevibus. Pygidium parvulum, laeve. Metasternum medio longitudinaliter foveolatum.* — Long. $5\frac{3}{4}$ —7 lin.
— Nova Granada.

11. *Pinotus nutans*: *Affinis P. Buqueti, convexus, ovatus, sat nitidus, piceus. Caput transversim rugosum, triangulariter acuminatum, $\frac{1}{2}$ lamina reclinata, apice angustata et recurva, $\frac{1}{2}$ carina frontali medio obsolete bituberculata. Thorax brevis, basi marginatus, antice abruptus et excavatus, dorso longitudinaliter profunde sulcatus, sulco versus basin evanescente. Elytra late subcrenato-striata, striis internis ante apicem fulvo-tomentosis. Antennae obscure ferrugineae. Pygidium subtiliter punctatum.* — Long. 11—14 lin. — Uruguay.

12. *Pinotus sericeus*: *Ovatus, leviter convexus, subnitidus, piceus, omnino subcoeruleo-iridescens. Caput postice tantum punctatum, clypeo antice bidentato, vertice cornu brevi, conico. Thorax basi profunde marginatus et ante humeros foveolatus, laevis vel vix perspicue lateribus antice punctulatus. Elytra crenato-striata, interstitiis subconvexis, laevibus. Palpi cum antennis piceo-rufi, his fusco-testaceo clavatis. Metasternum longitudinaliter impresso-lineatum.* — Long. 7—8 $\frac{1}{2}$ lin. — Columbia.

13. *Pinotus irinus* (Dej.): *Praecedenti certe affinis thoraceque in angulis posticis ut in illo foveolato, at nonnihil latior, minus laete iridescens, capite thoraceque omnino punctatis, elytris profundius striatis, et interstitiis magis convexis leviter dignoscendus.* — Long. 8 $\frac{1}{2}$ lin. — Cayennae.

14. *Pinotus Satanus*: *Ex affinitate P. Mormonis summaque ut in illo differentia sexualis. Convexus, nitidus, piceus. Caput clypeo rotundato, antice vix emarginato. Elytra subcrenato-striata, striis 3 et 4 ante apicem conjunctis, interstitiis planis, dense subtilissime punctulatis. Antennae rufopiceae, clava rufo cinerea. — Long. 10—13 lin. — Columbia.*

Mas. (*Copris Cacus* Dej.) *Caput cornu complanato, brevi, obtusato, margini anticō approximato. Thorax parte maxima declivis, postice trituberculatus, tuberculo medio majore, insuper et antice directo. Individua minora (C. Satanus Buquet), tuberculis his fere aequalibus, parte antica minus declivi.*

Fem. (*Copris Danaus* Dej.) *Caput convexum cornu frontali brevi, triangulariter conico. Thorax antice abruptus, margine superiore quadrituberculato, tuberculis aequaliter distantibus ejusdem fere magnitudinis.*

15. *Pinotus protectus*: *Simillimus ($\frac{1}{3}$) praecedenti tantumque thoracis forma cornuque clypei postice ad apicem tuberculato distinguendus. Thorax postice non ut in illo tridentatus, sed parte elevata medio late surgente, emarginata et utrinque dentata; parte declivi longitudinaliter obsolete carinata. Feminam hucusque non vidi. — Long. 12 lin. — Columbia.*

16. *Pinotus depressicollis*: *Ex affinitate praecedentium, at thoracis forma in utroque sexu fere aequalis. Oblongus, convexus, nitidus, piceus. Caput transverse rugatum, clypeo oblongo integro; in $\frac{1}{3}$ cornu brevissimum, latum, emarginatum, margini appositum, in ♀ vertex leviter convexus, cornu simile in medio suturae frontalis positum. Thorax antice abruptus, parte superiore deplanata, medio obtuse lobata, utrinque excavata et extus obtuse tuberculata. Elytra crenato-striata, interstitiis subconvexis punctulatis. — Long. 12 — 14 lin. — Brasilia.*

17. *Pinotus andicola* (Reiche): *Oblongo-ovalis, convexus, nitidus, piceus. Caput ($\frac{1}{3}$) leviter rugosum, clypeo medio emarginato et utrinque iterum rotundato-lobato, cornu erecto, margini approximato, apice truncato. Thorax antice ab-*

rupte declivis, laevis, medio obtuse valde bidentatus, longitudinaliter subsulcatus, parte declivi medio dense punctata. Elytra leviter striata, striis vix punctatis, 5 ad basin foveolata, interstitiis laevibus. Antennae rufae. Metasternum lateribus fulrohirsutum, prosterno absque carinis transversis. — Long. 11 lin. — Summae Andes.

18. *Pinotus Achamas* (Buquet): *Ex affinitate P. Mormonis, Satanae et prolecti. Convexus, truncato-oblongus sat nitidus, piceus, elytris interdum rufo-piceis. Caput clypeo rotundato, integro, transverse rugosum. Thorax granulatus, antice fovea magna, laevi. Elytra lateribus fere parallelis, obsolete striata, interstitiis subnitidis, dense at parum distincte punctulatis. Antennae piceae, clava luteo-cinerea. — Long. 12—18 lin. Columbia.*

Mas. Caput cornu brevi, crasso, nonnihil recurvo, margini antico sat approximato. Thorax antice laevis, postice medio tuberculo lato et apice truncato, ascendente; parte declivi abrupta et granulata.

Fem. (C. Baal Buquet.) Capite postice convexo et breviter unituberculato. Thorax antice medio laevis, profunde excavatus, tuberculo insuper producto, apice truncato, deplanato, tuberculo subtus granulato.

19. *Pinotus fissus* (Germar.): *Oblongo-ovalis, convexus, valde nitidus, laevissimus. Caput postice cornu brevi deplanato, apice emarginato; clypeo medio fortiter bidentato; dentibus triangularibus, leviter divergentibus. Thorax antice retusus, obtuse lobatus, medio absque linea impressa. Elytra leviter punctato-striata, interstitiis planis. Pygidium laeve. Prosternum absque carinis transversis; metasternum postice foveolatum. P. bicuspis similis, at minor, elytris distinctius striatis cornuque verticis acuto. — Long. 6—13 lin. — Brasilia.*

20. *Euparia argentina*: *Elongata, parum convexa, leviter nitida, picea. Caput obsolete rugato-punctatum, vertice medio tumidulo. Thorax dense et fortiter punctatus, lateribus, praecipue antice deplanatis, rufescentibus, ciliatis. Elytra*

catenulato-striata, interstitiis laevibus, planis, ad latera autem et versus apicem convexis. Antennae ferrugineae. Metasternum longitudinaliter profunde sulcatum, tibiae posticae leviter arcuatae. — Long. $3\frac{1}{2}$ lin. — San Luis, Mendoza.

21. *Atuenius*: (Nov. Gen.) *Caput gibbosum, vertice mulico. Mandibulae occultae, dente molari solido, laminibus membranaceis. Maxillae matis membranaceis. Oculi plerumque obtecti. Abdominis segmenta connexa, ultimum praecedenti brevius, ab illo sulco divisum. Mesosternum carinatum. Pygidium liberum, deflexum, versus abdomen contractum. Tarsorum posteriorum articulus primus elongatus, anteriorum primus sequentibus singulis longior. Tibiae posticae simplices absque carinis transversis, rectae. Eupariis proximum, differt tibiis posticis non arcuatis, metasterno non abbreviato, thoracis lateribus non deplanatis.*

***A. opacus*:** *Elongatulus, leviter convexus, niger, opacus. Caput densissime viæque perspicue punctulatum. Thorax basi marginatus, densissime et subtilissime punctatus, angulis anticis rotundatis. Elytra crenato-striata, interstitiis planiusculis, primo tertioque subconvexis, laevibus, opacis. Corpus subtile nigrum, pedibus obscure rufo piceis, metasterno punctato. — Long. $2\frac{3}{4}$ lin. — Brasilia.*

22. *Caccobius jessoensis*: *Ovatis, deplanatus, leviter nitidus, nigro-aeneus, thorace subvirescente. Caput obsolete bicarinatum, clypeo integro. Thorax parum dense punctatus, punctis versus basin majoribus, angulis anticis acutiusculis. Elytra regione scutellari impressa, sat fortiter crenato-striata interstitiis leviter convexis, punctulatis. Pygidium aequaliter sat dense punctatum. Palpi cum antennis picei. Prosternum ut in *C. Schreberi* carina longitudinali accessoria. — Long. $3\frac{1}{3}$ lin. — Ins. Jesso.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [V. Diagnosen neuer Coprophagen 94-100](#)