

# I.

## Observations sur quelques Carabiques.

Par  
**M. Louis Reiche.**

La *Cymindis Servillei* Solier (Soc. ent. Fr. 1835) est la *C. humeralis* F.; c'en est à peine une variété. J'ai le type même de la collection Solier; M. Baudi s'est trompé complètement en la rapportant à la *C. confusa* Peyron, qui est la *C. seriepunctata* Redt.

La *Cymindis monticola* Chevrol. (Rev. Zool. 1866) = *C. singularis* Rosenthal.

Le *Brachinus berytensis* Reiche (Soc. ent. Fr. 1855) est à maintenir; l'identification avec le *Br. bombarda* Dej. est une erreur de Schaum.

Le *Brachinus bombarda* Illig. (Wiedem. Arch. I.) = *B. mutilatus* Fabr.

Le *Brachinus bombarda* Dej. (nec Illig.) = *B. plagiatus* Reiche.

Le *Brachinus sichemita* Reiche (Soc. ent. Fr. 1855) = *B. explodens* var.

Le *Brachinus atricornis* Fairm. (Faun. Fr. p. 42) = *obscuricornis* Brullé. Silb. Rev. II. p. 110; ce n'est pas du tout le *B. nigricornis* Dej.

La *Lebia pubipennis* Dufour (An. Sc. phys. VI.) se rapporte à la *L. africana* Sol., qui elle-même n'est que la *L. fulvicollis* F.

Le *Masoreus grandis* Zimmerm. (Mon. p. 121) = *M. orientalis* Dej.

M. de Castelnau a décrit dernièrement (Not. Austral. Col. 1867 p. 25 et 26) deux espèces du genre *Silphomorpha* sous le même nom de *marginata*. Je propose de changer la *S. marginata* Cast. (l. c. p. 26) en : *S. Castelnau*.

Le *Graphipterus Valdani* Guér. (Rev. Zool. 1859) = *G. variegatus* var.

Le *Harpalus grandicollis* Reiche (Soc. ent. Fr. 1861) est une variété du *H. caspius* Stéven.

Le *Harpalus Reichei* Desbroch. (Not. ent. Bourbonn. 1866) est une variété du *H. griseus* Panz.

*Harpalus Bellieri* Reiche (Soc. ent. Fr. 1861) = *H. sardicus* Dahl; Dej. Collect., où il était confondu avec le *H. consentaneus*. C'est à tort que le *H. Bellieri* a été mis en synonymie du *H. sulphuripes*, ses pattes étant toujours concolores, indépendamment des autres caractères signalés.

Mon *Harpalus subcylindricus* (Voy. Ferr. Abyss.), qui fait double emploi avec le *H. subcylindricus* Dej. doit changer son nom en *H. palangoides*.

Le *Zabrus validus* Schaum (Berl. Ent. Zeit. 1862) = *Z. graculus* var.

Le *Zabrus helopiooides* Reiche (Soc. ent. Fr. 1855) est une espèce à rétablir, qui s'éloigne par son corselet rétréci postérieurement du *H. damascenus*, auquel Schaum le reunissait par erreur.

Le *Patrobus Napoleonis* Reiche (Soc. ent. Fr. 1857) est également à maintenir; la réunion au *P. excavatus* est absurde, car il est aptère, les épaules sont effacées.

J'ajoute les descriptions suivantes de deux espèces nouvelles du genre *Cymindis* :

1. *Cymindis Leachi* (Solier i. litt.) Reiche.

*Oblonga, convexa, nitida, fusca; antennis, pedibus, thoracis limbo, elytrorum limbo, vittaque obliqua rufis.* — Long.  $11\frac{1}{2}$  mill. lat.  $4\frac{3}{4}$  mill.

Caput subrotundatum, crebre punctatum, rufescens, labro palpisque rufis, mandibulis piccis. Thorax transversus, capite tertia parte latior, antice late nec profunde emarginatus, lateribus reflexus et rotundatus, postice angustatus, subcordatus; angulis posticis extus prominulis; basi sinuatus medioque rotundatus; disco convexo,

crebre punctato, lateribus corroso, obsolete transversim rugato. Scutellum rufescens, rugosum. Elytra convexa, thorace fere duplo longiora et fere triplo longiora, punctato-striata, interstitiis convexiusculis, crebre et profunde punctatis. Subtus rufescens, abdomine laevigato. — Hab. in Italia meridionali. E collectione Solierana et in Mus. imperiali Parisiensi sub nomine *C. neapolitana*.

Magna in illo genere, affinis videtur *C. lineatae* Schönh. et *C. axillari* Fabr., at magnitudine, convexitate puncturaque distinctissima.

## 2. *C. sicelidis* Reiche.

*Oblonga, depressa, nitidula, piceo-rufa; ore, antennarum basi, pedibus, elytrorum limbo maculaque humerali oblonga pallide-rufis, elytris quadratis* — Long. 9 mill. lat.  $3\frac{1}{2}$  mill.

Caput subrotundatum, laxe punctatum, longitudinaliter obsolete strigatum. Thorax transversus, capite paulo latior, antice late vix emarginatus, lateribus reflexis rotundatis, postice parum angustatus, subcordatus, angulis posticis extus prominulis; basi sinuatus et in medio rotundatus; disco laxe valde punctato, transversim subruguloso, lateribus corroso. Scutellum rufulum laevigatum. Elytra depressa, quadrata, thorace fere duplo latiora, haud triplo longiora, crenato-striata; interstitiis convexiusculis, parum tenuiter punctatis, in tertio punctis majoribus quatuor vel quinque impressis; subtus dilutior, abdomine laevigato. — Habit. in Sicilia, Catanam versus.

Affinis *C. coadunatae* Dej. et *C. singulari* Rosenh., sed latior, planior, thorace postice minus angustato, elytris magis quadratis, striis crenatis dignoscenda.

La *Cymindis Gaubili* Luc. (Expl. Alg. Ent.) = *C. alternans* Ramb. M. Chevrolat, qui possède le type de la *C. Gaubili* a reconnu l'exactitude de cette synonymie; il est très douteux même que cet individu vienne de l'Algérie, et surtout de l'Est de cette régence.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Reiche M. Louis

Artikel/Article: [I. Observations sur quelques Carabiques. 1-3](#)