

## III.

### Diagnoses

### de quelques Rutélides nouvelles.

Par

M. le Dr. Candèze.

---

1. *Anomala (Heteroplia) breviinscula*: Ovalis, testacea, nitida; oculis prominulis; prothorace transverso, hanc dense punctato, elytris striis fortiter punctatis, intersticiis convexis, sutura obscura; corpore subtus. antennis pedibusque sparsim longe ciliatis, tibiis dilatatis, tarsis brunneis.  
— Long. 10 mill. lat. 5 mill. Sumatra.

2. *Anomala nigrosulcata*: Oblongo-ovalis, parum nitida; capite fortiter punctato, aenescente; prothorace transverso, crebre fortiterque punctato, linea longitudinali media marginibusque lateralibus testaceis; scutello punctato elytrisque testaceis, his striis profundis fusco-punctatis, intersticiis convexis, punctatis; propygidio obscuro; corpore subtus femoribusque testaceis, tibiis tarsisque cupreis. — Long. 15 mill. lat. 8 mill. Calabaria.

3. *Anomala (Euchlora) obesa*: Hujus generis maxima, ovalis, viridi-aenea, parum nitida; fronte prothoraceque crebre et fortiter punctatis; elytris vase multistriatis rugose punctatis, apice fulvotinctis; propygidio pygidioque opacis, strigatis, hoc utrinque foveato; corpore subtus pedibusque cupreis. — Long. 28 mill. lat. 17 mill. Ins. Philippinenses.

4. *Anomala (Euchlora) limata*: Oblonga, aeneo-aurata, nitidissima; fronte crebre punctata, clypeo rugoso, violaceo, marginato; prothorace longiusculo basi lobato, subtiliter sat dense punctato; elytris seriatim punctatis, apice plicatis et rugulosis, rufo-tinctis; corpore subtus pedibusque aeneo-rafescensibus, longe griseo-hirtis; pygidio sparsim fortiter punctato, hirto. — Long. 18 mill. lat. 10 mill. Borneo.

5. *Anomala (Euchlora) encausta*: Ovalis, convexa, parum nitida, nigro-cyanæa, olivaceo-micans; fronte dense punctata; clypeo rufescens, anguste viridi-cineto; prothorace punctato, margine laterali rufo-testaceo; scutello obscure viridi; elytris punctatis, striis subtilibus, nonnullis plicaturisque mediis notatis; corpore subtus testaceo, pygidio ruguloso, plagiisque duabus testaceis. — Long. 18 mill. lat. 11 mill. Manilla.

6. *Anomala planata*: Ovalis, depressa, testacea, nitida, aeneo-micans; vertice fortiter punctato viridi; clypeo inaurato; prothorace minus dense punctato, disco viridi, saepe linea media testacea; elytris subseriatim punctatis, plicaturis mediis notatis, sutura et nonnunquam regione scutellari viridibus; corpore subtus pedibusque testaceis, tarsis obscuris; pygidio basi viridi. — Long. 11 mill. lat. 7 mill. Manilla.

7. *Anomala fulvescens*: Ovalis, depressa, fulvo-viridis, parum nitida, fulvo micans; fronte crebre punctata, prothorace longiusculo, crebre punctato, lateribus flavomarginato, margine flavo intus viridi-terminato, medioque puncto concolori notato; scutello apice purpureo-tincto; elytris postice dilatatis, rugulosis, crebre punctatis, striis nonnullis plicaturisque notatis; corpore subtus pedibusque flavis, tibiis abdomineque cupreis; pygidio flavo-viridi anguste marginato. — Long. 12 mill. lat. 7 mill. Celebes.

8. *Anomala (Spilota) picturata*: Lata, deppressa, fulva, cupreomicans, nitida; fronte cuprea dense punctata; prothorace medio subtiliter et parce, lateribus densius et fortiter punctato, basi lobato, lobo subtruncato, maculis octo nigris notato; elytris profunde punctato-striatis striis apice sulciformibus, interstitiis haud punctatis, convexis, maculis nigris et pallidis variegatis; corpore subtus pedibusque testaceis, cupreomicantibus, tarsis posticis obscuris; pygidio nigro-bimaculato. — Long. 13 mill. lat. 8 mill. Manilla. Species *A. irroellae* Casteln. affinis.

9. *Anomala (Spilota) popiliopsis*: Lata, depressa, aeneo-cuprea, purpureo-micans, subnitida; fronte punctato-rugosa; prothorace foveola laterali, medio vix, lateribus fortiter sparsim punctato, basi lobata, lobo truncato; elytris deplanatis, punctato-sulcatis, interstitiis haud punctatis, inaequalibus, flavis undulatim nigrofasciatis et maculatis, cupreo seu violaceo, seu purpureo-micantibus; corpore subtus pedibusque nigro-violaceis, metallescentibus, femoribus posticis flavomarginatis; abdome flavofasciato et maculato; pygidio gibboso, plaga media flava notato. — Long. 15 mill. lat. 9 mill. Nepalia.

10. *Anomala (Spilota) Wallandii*: Lata, depressa, fulva, nitida; vertice nigro bimaculato, basi viriditincta; prothorace convexo, sparsim fortiter punctato, nigro-quadrivittato, lateribus viridi-tincto, basi lobata, lobo truncato, margine basali viridi; scutello nigro-marginato, viridi-tincto; elytris profunde punctato-sulcatis, interstitiis haud punctatis, inaequalibus, nigro-tessellatis; corpore subtus testaceo, nigro-viridi maculato; femoribus posticis flavis, macula nigra rotunda notatis; pygidio nigro, flavoplagiato. — Long. 13 mill. lat. 7 mill. Sumatra.

11. *Anomala (Callistethus) iris*: Oblonga, parum convexa, viridis, nitidissima, aureomicans; vertice sparsim clypeo densius punctatis; prothorace vix distinete punctulato; elytris punctato-substriatis, in margine laterali sub callo humerali elevatis, iricoloribus, sutura chalybea, disco viridi, extus sensim purpurescentibus. — Long. 12 mill. lat. fere 7 mill. Nepalia.

12. *Heterosternus Rodriguezii*: (♂) Ellipticus, convexus, fulvus, parum nitidus; clypeo nigro-marginato; prothorace transverso, angulis anticis productis, punctato, interstitiis punctorum tenuiter granulatis, anguste nigro-marginato; scutello nigro-cincto; elytris medio ampliatis, sutura postice elevata, grosse punctatis, rugosis, margine toto angustissime nigro; corpore subtus piceo-nigro; pedibus nigris, femoribus tarsisque posticis longissimis, illis intus apicem versus calcari valido, uncinato armatis. A *H. buprestoide* ♂ forma elliptica et calcari femorum praecipue differt. — Long. 45 mill. lat. 24 mill. Guatemala.

13. *Antichira Haroldi*: Oblongo-subquadrata, parum convexa, viridis, haud metallica, subnitida, fronte vertice crebre punctata; prothorace subtilissime sparsim punctato, lateribus postice parallelis;

elytris rufo-brunneis ; corpore subtus femoribusque virescentibus ; tibiis tarsisque rufo-cupreis, unguibus simplicibus. Affinis *A. splendenti* at major, minus nitida, haud metallica, colore elytrorum pedumque diversa. — Long. 18 mill. lat. 10 mill. Nicaragua.

14. *Parastasia basalis*: Nigra, nitidissima; fronte grosse sparsim punctata; prothorace antice lateribusque sparsim fortiter punctato, postice laevi; elytris latiusculis, striato-punctatis, plaga lacerata basali rufa; corpore subtus pedibusque obscure brunneis. *P. binotatae* Westw. affinis at latior, minus punctata, elytris seriatim punctatis. Variat prothorace rufescente. — Long. 18 mill. lat. 11 mill. Taprobana.

15. *Chlorota pallida*: Convexa, fulvotestacea, nitida; vertice sparsim punctato; clypeo strigato; prothorace sparsim inaequaliter sat fortiter punctato, interstitiis punctorum tenuiter punctulatis, margine laterali flavo; scutello flavo; elytris seriatim punctulatis, flavo-marginatis, metathorace obscuro, flavohirto; mucrone mesosterni brevi. — Long. 18 mill. lat. 11 mill. Guatemala.

16. *Popilia vestita*: Nigra, dense pilosa; fronte cuprea vel aenea, rugosa; prothorace transverso, postice arcuato, pilis fulvis dense vestito; scutello albicante; elytris brevibus, apice angustatis, subcostatis, nigris vel rubiginosis; pygidio piloso, maculis duabus vel quatuor nudis; mesosterno haud mucronato. — Long. 9 mill. lat. 5 mill. Celebes.

17. *Popilia strigata*: Subrhomboidealis, nigra, parum nitida, glabra; prothorace longinsculo, transversim strigato, lobo postico late emarginato; elytris deplanatis, prothorace multo latioribus, anguste costatis et punctis umbilicatis latis seriatim dispositis, notatis; propygidio limbo postico, pygidii maculis duabus, in abdominis lateribus plagisque quatuor, metathorace albopilosus; mesosterno vix mucronato. — Long. 8 mill. lat.  $4\frac{1}{2}$  mill. Celebes.

18. *Popilia lacertosa*: Lata, aeneo-viridis, metallica; fronte et clypeo creberrime punctatis, hoc rufescente; prothorace convexo. creberrime punctato, flavo late limbato; scutello purpurascens; elytris seu fulvis seu viridi-violaceis, fulvo-maculatis, punctato-sulcatis, interstitio secundo basi dilatato, impresso, punctato; pygidio albo-biplagiato; corpore subtus aenescente; pedibus crassis, fulvis, tarsis obscuris. — Long. 13 mill. lat. 7 mill. Calabaria.

19. *Popilia lucidipennis*: Viridis, saepe purpureo-cincta; vertice strigis concentricis notato; prothorace crebre punctato, basin versus punctis evanescens; scutello punctato; elytris parum nitidis, subopalinis, punctato-striatis, interstitio secundo ultra medium, quarto basi tantum, inaequaliter punctatis, callo humerali irregulariter punctato; pygidio albo-plagiato; corpore subtus cupreo-aeneo; pedibus cupreis. *P. viridipenni* Blanch. affinis, sed prothorace aliter punctato distincta. — Long. 13 mill. lat. 6 mill. Calabaria.

20. *Popilia octogona*: Viridis, nitida, vertice laevi; clypeo rugoso punctato, prothorace medio vix punctato, late flavo-limbato; scutello parum punctato; elytris punctato-striatis, vitta lata, obliqua, flava notatis; pygidio albo-biplagiato; corpore subtus pedibusque rufo-cupreis, posticis obscuris. — Long. 8 mill. lat. 5 mill. Calabaria.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Candéze M. le Dr.

Artikel/Article: [II. Diagnoses de quelques Rutelides nouvelles. 41-45](#)