

IV.

Description

de 14 nouvelles espèces de Curculionides d'Europe,
d'Algérie, de l'Asie mineure et d'un nouveau genre
de cette famille

par M. A. Chevrolat.

1. *Strophosomus flavipes* : Squamosus, elongato-ovatus, brunneus griseo-pruinosis, infra albus, crebre et rugose punctatus; rostro conico, apice truncato et infra emarginato, postice transversim impresso, sulco longitudinali, capite brevi transverso; antennis fuscis; clava cinerea, acuta, triarticulata; oculis nigris globosis exsertis albo-cinctis; prothorace longiore quam lato, crebre et rugose punctato, antice recto, postice subangulose rotundato; elytris ovalibus, conjunctim rotundatis; basi et lateribus albido-pruinosis; pedibus flavis. — Long. 4, lat. 3 mill. Hispania: Asturia.

2. *Metallites pruinosis* : Elongatus, fuscus, pube brevi densa grisea vestitus, antennis pedibusque fulvis, rostro sat lato capiteque griseo lanuginosis, fovea inter oculos, antennis crassiusculis, scapo clavato, marginem prothoracis attingente, oculis globosis, nigris; prothorace elongato, antice posticeque recto, lateribus rotundato et lanugine densa griseo-argentea tecto, vix conspicue punctato, subcarinato; elytris oblongis, postice obtuse productis, punctato-striatis, fuscis, griseo-pruinosis,

interstitiis subconvexis; femoribus clavatis validis. — Long. 4, lat. $1\frac{1}{2}$ mill. Algeria, (D. Poupillier.)

Cette espèce est beaucoup plus étroite et plus allongée que le *M. anchoralifer*; elle devra se placer près des *M. globosus*, *murinus*, *tibialis* et *ovipennis*. J'ai obtenu dernièrement un exemplaire du *M. anchoralifer* des environs d'Oran, dont la tache en forme d'ancore des élytres a presque totalement disparu.

*Piezocnemus**) : Genre nouveau du groupe des *Naupactides*, tribu des Brachydérides de Lacordaire, formé aux dépens de l'une des espèces du genre *Polydrosus* : le *P. paradoxus* Schönh., l'une des plus remarquables. Pattes robustes courtes, cuisses épaisses inermes, jambes larges, aplanies, largement canaliculées, un peu arquées, légèrement anguleuses en dehors, très-amincies à leur base, antérieures crochues au sommet interne, tarsi à 1^{er} article assez grand triangulaire, 2^e de même forme plus petit, 3^e largement bilobé, dernier mince très-peu renflé n'offrant qu'un seul ongle. Trompe et tête larges, en plan incliné, la première échancrée au sommet, la deuxième offrant une petite fossette entre les yeux. Antennes courtes, scape dépassant à peine les yeux, funicule de 7 articles : 1^{er} un peu plus long que les suivants, ceux-ci moniliformes poilus, massue ovalaire, allongée, aiguë. Yeux latéraux, petits, arrondis. Prothorax, presque carré, droit en avant et transversalement comprimé sur le tiers antérieur, modérément arrondi sur le côté, plan en dessus. Ecusson arrondi. Elytres aplanies, légèrement arrondies au milieu de la base, un peu élargies et assez convexes vers le sommet, terminée chacune sur la suture en un angle plus ou moins obtus, à stries ponctuées. Abdomen de 5 segments, 1^{er}, 2^e et 5^e à peu près de même longueur, pénultièmes égaux plus courts.

L'espèce suivante, qui habite les hautes montagnes du Nord de l'Italie et qui présente des caractères analogues, m'a déterminé à établir ce nouveau genre.

3. *P. pedemontanus* : Squamosus, elongatus, subdepressus viridis, pilis brevibus erectis nigris et fuscis, sed longioribus in pedibus, tibiis et tarsis flavis, oculis nigris, rostro valde emarginato, medio sulcato et inter oculos transversim impresso, fovea parva frontali; prothorace subquadrato, antice posticeque recto, lateribus rotundato; elytris elongatis,

*) πιεζω, je comprime; νήμη, jambe.

singulatim angulose productis punctato-striatis, femoribus crassis squamulis viridibus indutis. — Long. 5—6 mill., lat. 2—2 $\frac{1}{3}$ mill. Italia septentrionalis. (Mus. Lacordaire).

Cette espèce se distinguera aisément par la couleur verte des cuisses et par les poils raides de la tête et ceux des jambes.

4. *Polydrosus (Eustolus) florentinus* : Elongato-ovatus squamulosus, prasino-viridis, nigro-adspersus, antennis pedibusque flavis (femoribus viridi-squamosis); rostro brevi, capite convexo, oculis rotundatis nigris; prothorace elongato, antice posticeque recto, ante medium transversim constricto, punctis minutis nigris irrorato; scutello rotundato; elytris prothorace latioribus, subparallelis, postice convexis, punctato-striatis, striis geminatis alterne pallidioribus nigroadpersis nigroque setosis, femoribus posticis vix dentatis. — Long. 4, lat. 1 mill. Italia : Fiesole, (D. Bellier de la Chavignerie!)

Le genre *Eustolus* de Mr. le Dr. Thomson me paraît bon à maintenir; le *Phyllobius ligurinus* Gyll. Schönh. Syn. Ins. II. p. 450 de Crimée doit en faire partie.

Pour ce qui est du vrai *Polydrosus armipes* Gyll. l. c. VI. 1. p. 445 (type sicilien de ma collection) il ne me paraît différer du *P. dentipes* Brullé. Exped. Mor. III. de Grèce que par les élytres qui se prolongent un peu plus en pointe obtuse sur le sommet de la suture.

C'est bien à tort qu'on trouve réuni comme synonyme (Cat. de Marseul. 1866. p. 93) le *P. chrysocephalus* à *l'armipes*, ce dernier a de très-forts éperons aux cuisses, tandis que le précédent en est tout-à-fait privé.

5. *Polydrosus nodulosus* : Elongatus, crebre et rugose punctatus, niger, cinereo-pilosus, in elytris cinereo-maculatus, antennis piceis scapo rufo; rostro longitudine capitis, apice paullulum attenuato, fovea inter oculos, fronte convexa, oculis rotundatis nigris; prothorace antice constricto, basique recto, lateribus rotundato, anguste sulcato; elytris prothorace triplo longioribus, ultra medium paullulum latioribus et convexis, conjunctim rotundatis, punctato-striatis, interstitiis convexis, in humero et in basi secundum scutellum lineis duabus brevibus elevatis, pedibus longis, femoribus valde calcaratis. — Long. 6, lat. 2—2 $\frac{1}{3}$ mill. Gallia meridionalis : Nizza, (D. Peragallo!)

Cette espèce devra avoisiner le *P. cervinus* Linn.

6. *Polydrosus melanostictus* : Affinis *P. cervino* Lin. sed magis squamatus, longus, griseo-argenteo-micans, antennis ferrugineis (articulis tribus ultimis et clava elongata nigricantibus), rostro et capite aureo-squamosis, ante oculos angulose sulcato, fronte convexa, fovea obsoleta frontali; prothorace rotundato. antice posticeque recto, sulcato atque reflexo, obscuro lineis tribus griseis; scutello luteo; elytris elongatis, singulatim productis in sutura, punctato-striatis, interstitiis paullulum convexis, griseo-virescente squamosis nigroque maculatis (maculis glabris); corpore infra cinereo; pedibus nigris cinereo-pubescentibus, femoribus valde calcaratis. — Long. $5\frac{1}{2}$, lat. 2 mill. Gallia orientalis: Mons Pilat; (D. Saintpierre!)

Cette espèce viendra se placer entre le *P. nodulosus* et le *P. cervinus* L.

7. *Tanymecus alboscutellatus* : Ex minimis hujus generis, elongatus, minutissime coriaceus et granulosis, pube brevi grisea et umbrina mixtus; rostro lato, latitudine et longitudine capitis, virenti-nitidus, crebre punctatus, foveola utrinque supra oculos, fronte convexa, ore pedibusque cinereo-pilosis, antennis fuscis, scapo nitido, oculis globosis nigris; prothorace granulato, elongato, planiusculo, antice et postice recto, lateribus rotundato, linea media subelevata et angusta, foveis quatuor: una antica, altera basali in utroque latere; scutello albo; elytris elongatis, obsolete punctato striatis, postice angulose emarginatis, modice convexis, griseis vel umbrinis et aliquoties cum vitta humerali fusca; corpore cinereo, femoribus fusco-annulatis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 2 mill. Oran. (D. Saintpierre!)

C'est la plus petite espèce du genre, elle égale à peine en taille la ♀ du *Sitones Regensteinensis*.

8. *Otiorhynchus asturiensis* : Nigerrimus, subnitidus, glaber, minutissime coriaceus rostro elongato, apice plano, tricarinato, minute punctato, foveola frontali; scapo longo recto, modice clavato, articulo 1 funiculi fere longitudinis secundi, ambo elongatis, 3—7 nodosis subaequalibus, clava ovata acuminata articulis tribus; prothorace antice posticeque recto, planiusculo, pone medium rotunde ampliato; elytris ovalibus, conjunctim obtuse productis, coriaceis; femoribus clavatis, tibiis valde arcuatis, anticis apice uncinatis, posticis intus albo-pilosis et versus apicem intus dente magno armatis; abdomine crebre ruguloso, primo

segmento late depresso ♂. — Long. 10, lat. 4 mill. Hispania, Asturia.

Cette espèce devra être placée près de l'*O. dentipes* Graëlls.

9. *Otiorynchus (Eurychirus) Coyi*: Niger, nitidus, crebre et rugose punctatus, rostro compresso, supra costis tribus, capite convexo, grosse punctato, antennis gracilibus, oculis subrotundatis fuscis; prothorace subgloboso, antice attenuato et postice recto, crebre punctato (punctura elevata et reticulata); elytris oblongis, conjunctim apice rotundatis, punctato-striatis, interstitiis subelevatis rugosis; femoribus clavatis inermibus, tibiis apice ampliatis, parce fusco-pilosis, tarsis rufescentibus; corpore infra nigro, nitido, punctato, primo segmento abdominis medio valde depresso. ♂. — Long. 9, lat. 3 mill.

Cette espèce, que je dédie à Mr. le capitaine Coxe, mon ami, a été trouvée par lui sur les montagnes du pays des Druses, lors de la dernière expédition française en Syrie.

10. *Cleonus (Cyphocleonus) sardous*: Elongato-ovatus, cinereus, rostro sat longo lineis tribus albis, occipiti brevi medio bicostato et unisulcato, oculis oblongis nigris, albocinctis, antennis cinereis clava fusca; prothorace fusco, minute granulato, lineis tribus albis, lateralibus antice et postice anguste duplicatis, infra oculos lobato, basi bisinuato; scutello parvo declivi; elytris ovalibus, postice ampliatis, conjunctim rotundatis, rugulosis, obsolete punctato-striatis, cinereis, maculis tribus fuscis; prima communi semicirculari, pone medium baseos incipiente, 2 obliqua in medio longitudinis, 3 parva, triangulari in callo; corpore infra pedibusque cinereis nigropunctatis, tarsis infra ochraceis, anguste sulcatis medio, unguiculis brevibus validis subconicis basi. ♂. ♀. — Long. 17, lat. 6—6½ mill. Sardinia, (D. Baudi!)

Cette espèce doit avoisiner le *C. morbillosus* Fabr.

11. *Cleonus (Conorhynchus) turbinatus*: Subcylindricus, antice attenuatus, creberrime punctatus, griseus vel fuscus, lateribus cinereus, infra albidus et in pedibus guttulis nigris adpersis; rostro turbinato, antice angulose emarginato, carinato, utrinque obsolete canaliculato, fronte convexa, mandibulis nigris nitidis, antennis cinereis, clava fusca albo-annulata, oculis magnis subrotundatis nigris, albocinctis; prothorace cylindrico, obsolete costato, fusco, lineis oblitteratis quinque cinereis

(vitta lata fusca infra marginem lateralem), antice rotundato-lobato infra oculos, postice angulose emarginato; scutello semirobundato, fusco; elytris cylindricis, postice convexis et paullulum latioribus, conjunctim rotundatis, breviter in apice emarginatis, punctato-striatis, cum lineolis elongatis fuscis undique signatis praesertim versus marginem et suturam, in basi lineolis quatuor albis, sutura fusca vel rufa; pedibus brevibus, femoribus albo-annulatis. — Long. 9—12 (rostrum except.), lat. 3—4½ mill. Algeria; Oran. (D. Saintpierre!)

Espèce remarquable par sa forme amincie en avant et élargie en arrière.

12. *Stephanocleonus gaditanus* (Rambur): Lanuginosus, cinereus, rostro elongato albo, fere prothoracis longitudine, anguste carinato, foveola frontali nigra, lateribus infuscato, oculis oblongis nigris, albocinctis; prothorace inaequali, argute carinato usque ad medium, utrinque angulose elevato, plicato, versus latera vage et grosse punctato, in angulo antico rectangulariter producto; elytris prothorace triplo longioribus, extra humerum oblique angulatis et ad apicem angulose emarginatis, punctato-striatis, cinereis, alboguttatis, in margine albo nigroque breviter fasciculatis, in basi notulis sex, fasciis duabus abbreviatis; prima ante et secunda pone medium et puncto in callo nigris; corpore infra pedibusque cinereis albopilosis, nigropunctatis, femoribus albo-annulatis. — Long. 10—11, lat. 3—3¾ mill. Hispania merid. (Rambur!)

Cette espèce qui vient de Cadix se place près du *St. ericae* Fabr.

13. *Stephanocleonus?* (*Plagiographus**) *Saintpierrei*: Subelongatus, cinereo-albidus, rostro longo, subconico, fortiter carinato, utrinque canaliculato, lineis duabus albis, fronte lateribus impressa et in medio fovea signata, oculis oblongis, nigris, albo circumcinctis; prothorace inaequali, magna macula dorsali infuscata, medio depresso et carinato, utrinque linea alba extus angulata ornato, antice juxta oculos lobato, postice bi-arcuato, versus latera vage et grosse punctato; scutello parvo; elytris elongatis, apice oblique emarginatis punctato-striatis, leucophaeis, fusco-variegatis et ordine alboguttatis; in basi notulis quatuor, fasciis duabus latis et extus abbreviatis (prima ante medium

*) Nouvelle coupe générique.

et secunda ultra) notulaque in callo apicali fusco-obscuris, sutura rufa, interstitiis convexis; corpore infra pedibusque parce pilosis, albis et ochraceis nigroque punctatis. — Long. 9—14, lat. 3—5 $\frac{1}{2}$ mill. Algeria : Oran.

Cette espèce devra être placée près du *St. vittiger* Ehr. Je saisis cette occasion de témoigner ici toute ma reconnaissance à Mr. Charles Saintpierre et d'honorer la mémoire de feu son jeune frère Ernest, pour les intéressantes découvertes entomologiques faites aux environs d'Oran par ces deux chasseurs, découvertes dont ils ont bien voulu me faire profiter pour une grande part. Je leurs dédie cette nouvelle espèce; elle rappelle un peu par le dessin des élytres et du prothorax le *St. excoriatus* Illig., mais elle est plus étroite et plus allongée et offre plusieurs autres caractères distinctifs faciles à saisir.

Le *C. Pelleti* Fairm. devra venir en synonymie du *St. tabidus* Oliv. dont je possède le type. Schönh. et Gyllenhal n'ont pas reconnu cette espèce et ce dernier a décrit sous ce nom un tout autre insecte.

14. *Bothynoderes luscus*: Similis *B. conicicollis* Oliv., cinereus, rostro longo subconico, medio carinato, utrinque obsolete canaliculato, lateribus infuscato, fovea parva inter oculos, oculis oblongis nigris albocinctis, antennis fuscis, clava angusta acutissima; prothorace subconico, antice valde attenuato, inaequali, medio breviter carinato et depresso, lineis 6 fuscis: duabus centralibus latis apice inter se junctis et ante medium extus recte angulatis, lateralibus rectis et duabus aliis infra marginem lateralem positis, magnis et triangularibus; elytris ovalibus, apice breviter emarginatis, singulo in basi maculis duabus, fasciola media obliqua, lineolaque obliqua juxta callum nigris (ipso callo macula ovali oculus album efficiente); corpore infra albido pedibusque elongatis parce pilosis, nigroguttatis. — Long. 14 (rosto except.), lat. 5 mill. Hispania: Carthagera, (Sommer!)

Cette espèce se distingue de ses congénères par la forme conique de son prothorax.

Namen *simplex* verwendet, keine derselben mit den etwa zunächststehenden vergleicht, von *Copris Lycaon* Klug, *Phanaeus Hermes* Dej. und *Ph. scabrosus* Dupont spricht, wie sie eben zu Dejean's Zeiten in den Catalogen cursirten, u. s. w. Um die anderen Familien steht es wahrscheinlich auch nicht besser, denn der als neu beschriebene *Psolidognathus Wallisi* wird mit *Ps. Freindi* (sic!) verglichen, den der Verf. für die bis jetzt einzige beschriebene Art hält! — meines Wissens sind deren bis jetzt schon 7 publizirt, ja Herr Thomson (Arcan. Natur. 1859.) hat sogar eine eigene Monographie darüber veröffentlicht!

Berichtigungen zu Heft V.

- p. 72. Z. 10. v. o. *P. paradoxus* Stierlin statt Schönherr.
 p. 92. Z. 8. v. u. — 1792 statt 1799.
 p. 116. Z. 7. v. u. — 1368 statt 1386.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year:

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Chevrolat M. A.

Artikel/Article: [IV. Description 71-77](#)