

Berichtigungen und Zusätze zum *Catalogus Coleopterorum*
synonymicus et systematicus.

1. Von Herrn G. R. Crotch.

Ad Vol. I.

The following names must be cited from Serville's 1st ed. of the Faune Française; the first livraison was published in 1821 at Paris. (Hagen does not cite this work). *Cicindela scalaris* p. 6. 7., *Brachinus causticus* 8. 1, *Br. psophia* 8. 3, *Lebia Bonfisi* 11. 4, *Aristus capito* 24. 2, *Harpalus neglectus* 26. 8, *funestus (vernalis* Duft.) 26. 9, *nubilus* 26. 10, *cordicollis (ditomoides)* 27. 13, *castaneus* 28. 14, *brevicollis* 28. 16, *fulripennis* 30. 23, *tibialis* 31. 24, *obesus (Zabrus)* 32. 28, *curtus (Amara)* 33. 29, *fulvipes (A)* 35. 35, *sabulosa (A)* 35. 36, *latus (Calathus)* 35. 37, *depressus (C)* 37. 41, *luxatus (Masorens)* 39. 47, *grandicollis* 39. 49, *corsicus (Feronia)* 42. 57, *Licinus aquatus* 52. 3, *Cyclorus elongatus* 56. 1, *Carabus pyrenaeus* 65. 18. t. 5. f. 7., *Nebrria rubripes* 68. 6, *Lafresnayei* 68. 8, *Bembidion coerulatum* 76. 1. t. 7. f. 3., *rufipes* 77. 3, *deletum* 77. 4, *harpaloides* 78. 6, *cirens* 79. 8, *semistriatum* 79. 10, *bipustulatum* 80. 2. t. 7. f. 7., *bisignatum* 82. 16, *obtusum* 83. 19, *Trechus harpalinus* 84. 1, *littoralis* 85. 2.

p. 14. *C. dongolensis* Klug. (1832) = *fimbriata* Dej. (1831); Dejean's name is older.

,, 16. *Cicind. funerea* Mac Leay. Here the ed. Lequien is quoted and further on the original; either both or the same should be quoted.

,, , *C. sardea*. — dele the reference to Spec. génér. I. p. 120.

- p. 18. *C. lateralis* Fisch. — The t. I. f. 7. is in Vol. I. and is called on the plate *hybrida* var.
- ,, 20. *C. limbata* Say. Is published in the same year as Wiedemann's name, and as this was already renamed *tetraspilota* Chaud. Say's name should not have been changed.
- ,, 22. *C. nivea* Kirby. 1845. — lege 1818.
- ,, 24. *C. lepida* Gory. — see p. 17. where it occurs as distinct.
- ,, „ *C. quadripunctata* ‡ Fabr. — Use *quadriguttata* Quens., which precludes Wiedemann (1821); for this use *rotundicollis* Dej.
- ,, 31. *Odontoch. mexicana* 1835. — lege 1834, the first livraison of the Etudes is 1834.
- ,, 59. *Carabus haeres* — bis at p. 66!
- ,, 61. *C. chaleonatus* Mannerh. 1850. — lege 1830.
- ,, 65. *C. Careeli* Casteln. — lege Gory.
- ,, 66. *C. Hellucigi* Schäum. — lege *Schaumi* Gabil. 1850.
- ,, 69. *Carabus Mannerheimi* Fisch. — Fischer's name *Latreillei* must stand; Bonelli has not described one and Dejean is 5 years later. The reference to *C. Dejeani* is erroneous, I cannot find the name in Fischer.
- ,, 71. *C. prodigus* Er. — Erichson wrote *prodigus*.
- ,, „ *C. obruersis* Motsch. — Motschulsky himself regarded it as var. of *Hummeli*.
- ,, 75. *C. tuberculatus* Fisch. — Ought to stand, no other *Carabus* has been described by this name.

Ad Vol. II.

- p. 426. *Haliphus impressus* Fabr. Ent. Syst. — lege Mant. I. p. 193.
- ,, „ *H. marmoreus* Oliv! — Vide p. 445, (= *Laccophilus certe*).
- ,, 427. *Cnemidotus* as a genus was proposed by Illiger for what we call *Haliphus*. *H. fulvus* was in fact his type and *caesus* was not known to him.
- ,, 428. *H. tarda* Herbst. — lege *H. Hermanni* Fabr. Syst. Ent. 1775, thus excluding *tarda* Herbst. 1779.
- ,, 429. *H. gibbus* Fabr. — lege Gen. Ins. p. 238.
- ,, 432. *Hydroporus depressus* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 233.

- p. 432. *H. dorsalis* Fabr. — lege Mant. I. p. 192.
 „ „ *H. 12pustulatus* Fabr. — lege Oliv. Ent. III. 40. p. 31.
 This livraison was at least contemporaneous with Fabricius,
 the dates of the volumes of Olivier are quite misleading,
 much of Vol. IV. was published in 1799 only.
 „ 433. *H. pusillus* Fabr. — lege Spec. Ins. p. 297.
 „ „ *H. gabriusculus* — lege *glabriusculus*.
 „ 434. *H. haleensis* Fabr. — lege Mant. I. p. 192.
 „ „ *H. hyperboreus* Gyll. — var. *assimilis* Payk. see. Thoms.
 Skand. Col. IX.
 „ „ *H. inaequalis* Fabr. — lege Gen. Ins. p. 239.
 „ 435. *H. lineatus* DeGeer. — lege Fabr. Syst. Ent. p. 234;
 there is no such name in DeGeer, the reference is to *D. griseostriatus*.
 „ „ *H. lituratus* Fabr. — lege Spec. Ins. p. 296.
 „ 436. *H. piceus* Sturm. — var. *fuscipennis*, where it stands cor-
 rectly.
 „ 437. *H. trifasciatus* Wollast. Was described from Ireland only
 and is not really found there.
 „ „ *H. morio* Dej. In using this name, *morio* Heer = *nivalis*
 has been forgotten, I should propose *atriceps* thor this
 species.
 „ 438. *H. 6pustulatus* Fabr. — lege Gen. Ins. p. 239.
 „ 439. *H. pictipes* Fabr. — lege Mant. I. p. 192 (1787), but use
 impressopunctatus Schaller. 1783.
 „ „ *H. pictus* Fabr. — lege Mant. I. p. 192.
 „ „ *H. planus* Fabr. — lege Spec. Ins. App. p. 501; use the
 older name *ater* Forst. 1771.
 „ „ *H. fusculus* Ill. — lege Schrank. Enum. p. 203; use the
 older name *ater* Forst. 1771.
 „ 441. *H. tinctus* Clark = *palustris* var., sec. exempl. typicum.
 „ 448. *Rhantus bistriatus* Bergstr. — See p. 466 under *Hydaticus*
 seminiger DeGeer; his right place is as *Rhantus*.
 „ 449. *Rh. notatus* Fabr. 1792. — lege Bergstr. Nom. V.
 p. 10.
 „ „ *Rh. signatus* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 234. (1775).
 „ „ *Rh. varius* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 233.
 „ 450. *Colymbetes cicur* Fabr. — lege Mant. I. p. 190.

- p. 450. *C. Grappi* — lege *Grapii*.
 „ 451. *H. fenestratus* Fabr. — lege Spec. Ins. p. 294. (1781).
 „ 452. *H. sexdentatus* Schiödt. — *obscurus* var. ♂; even Thomson
agrees tho this now in Skand. Col. IX.
 „ „ *Liopt. haemorrhoidalis* Fabr. — lege Mant. I. p. 191.
 „ „ *Agabus undulatus* Herbst. 1783. — lege Schrank.
Beytr. p. 70. (1776); to be used as much older for *abbre-
riatus* Fabr.
 „ 454. *A. congener* Payk. — lege Thunb. Ins. Suec. VI. (1794.)
 „ 459. *Tr. costalis* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 230.
 „ „ *Tr. immarginatus* Fabr. — lege Ent. Syst. App. p. 444.
 „ „ *Tr. laevigatus* Oliv. — lege Enc. méth. V.
 „ „ *Tr. latus* Fabr. India or. — Amer. merid. secund. Fabr.
 „ 460. *Tr. aciculatus* Oliv. — lege Herbst. Arch. V. 1783.
p. 123.
 „ „ *Tr. virens.* — lege *Roeselii* Füssly. Verz. schweiz. Ins.
1775, which is anterior to Müller 1776.
 „ 463. *Eunectes griseus* Fabr. — lege Spec. Ins. p. 293.
 „ „ *Aeilius fasciatus* DeGeer. Certainly = *suleatus*, as he men-
tions the pilose thorax in the ♀; the name *canaliculatus* Ni-
colai is to be used.
 „ 466. *Hydaticus Hübneri* Fabr. — lege Mant. Ins. p. 190.
 „ 467. *H. transversalis* Bergstr. (1778) — lege Pontopp. Dansk.
Atl. 1763.
 „ 468. *Gyrinus capensis* Thunb. — Vide *striatus* p. 470!
 „ 470. *G. striatus* Fabr. Ent. Syst. 1792. — lege Oliv. Ene.
méth. VI. p. 701. (1791), but *capensis* Thunb. is oldest.
 „ 471. *Dineutes comma* Thunb. — lege Mus. Acad. Ups. IV. p. 45.
 „ 472. *D. longimanus* Oliv. — lege Enc. méth. VI. p. 701.
 „ „ *D. praemorsus* Fabr. Syst. El. — use *indus* Fabr. 1798.
 „ 473. *Gyretes bidens* Oliv. — lege Enc. méth. VI. p. 702.
 „ 475. *Hydropilus ater* Fabr. — lege Ent. Syst. I. 1792. p. 183;
the *ater* Oliv. Ent. III. 39 is contemporaneons.
 „ „ *H. olivaceus* Fabr. — lege Spec. Ins. I. p. 289. (1781).
 „ 477. *Trop. collaris* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 229.
 „ 479. *Hydrob. scarabaeoides* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 228.
 „ „ *H. limbatus* Fabr. — lege Ent. Syst. I. p. 82 (1792); to
be used before *globulus* Payk. 1798.

- ,, 480. *Philhydr. atlanticus* Blanch. — *melanocephalus* var.
- ,, 481. *Ph. chrysomelinus* Panz. — lege Fabr. Mant. I. p. 192.
- ,, „, *Ph. fulrus* Marsh. bis! It is — *testaceus*, not *lividus*.
- ,, 483. *Laceobius bipunctatus* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 229.
- ,, „, *Berosus signaticollis* Charpent. — This name is older than *aericeps* Curtis.
- ,, 485. *Limnebius* — Scribe *Limnobius*.
- ,, 487. *Helophorus aeneipennis* Thoms. — *obscurus* Muls. Palp. p. 36.
- ,, 488. *H. dorsalis* Marsh. — Not of Mulsant.
- ,, „, Adde: *H. Mulsanti* Rye. Cat. Brit. Col. 1867 (*dorsalis* ‡ Muls.)
- ,, „, *H. fennicus* Payk. It is a good species, no variety of *H. rugosus*.
- ,, 489. *H. minutus* Oliv. — lege Fabr. Syst. Ent. p. 66.
- ,, 491. *Ochthebius ruformarginatus* Steph. — Is a good species.
- ,, 492. *O. punctatus* Steph. — Is older than *hibernicus* Curtis. Mulsant's opinion (Mém. Nat. Sc. Cherb.) that there are two species is unfounded.
- ,, „, *O. nanus* Steph. — The name *aeratus* Steph. used by Waterhouse should be maintained.
- ,, 493. *Hydrena rufipes* Curtis = *nigrita* Germ.
- ,, „, *H. concolor* Waterh. = *gracilis* Germ.
- ,, 498. *Ceryon minutus* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 68.
- ,, „, *C. lugubris* Oliv. — lege Fourcr. Ins. I. p. 22.
- ,, 499. *C. xanthocephalus* Steph. = *haemorrhoidalis* Fabr.
- ,, 504. *Bolitochara lunulata* ‡ Payk. (non Linné!) — Use *pulchra* Grav.
- ,, 506. *Phytosus dimidiatus* Wollast. — Certainly *spinifer* var.
- ,, „, *Ph. mynios* Wollast. — lege *minyops*.
- ,, 509. *Leptusa analis* ‡ Gyll. (nec Grav.) — use *apicalis* Dej.
- ,, 513. *Aleochara fuscipes* ‡ Fabr. — use *curtulus* Goeze. p. 730 (1776).
- ,, 515. *A. sanguinea* Linné. — There are no names in the Ed. I. of the Faun. Suec. (The supposed Linnean type is very doubtful).
- ,, 520. *Myrmecodia collaris* Payk. — lege Mon. Staph. 1790.
- ,, 523. *Calodera longitarsis* Er. — lege Steph. Man. V. p. 110.

- p. 527. *Oxypoda ferruginea* Er. — the name *brachyptera* Steph. should be restored.
- „ „ *O. glabriventris* Rye. = *Calodera Bonnairei* (sec. Fauvel).
- , 529. *O. ruficornis* † Gyll. (non Grav.) — use *spectabilis* Märk.
- „ „ *O. umbrata* † Gyll. (non Grav.) — use *cuniculina* Er.
- , 531. *Homalota annigera* — lege *annigena*.
- , 532. *H. brunnea* † Fabr. (non Payk.) — use *depressa* Gyll.
- , 533. *H. subpubescens* Steph. = *labilis* Er.
- , 535. *H. fuscofemorata* Waterh. i. l. — lege Proc. ent. Soc. Febr. 1863.
- , 536. *H. imbecilla* Waterh. — adde Proc. ent. Soc. April 1858.
- , 537. *H. liturata* Steph. = *nigritula* Grav., Gyll.
- , 540. *H. platicephala* Waterh. — misprinted for *planifrons*.
- „ „ *H. algae* Hardy. — older than *puncticeps* Thoms. and must therefore be retained.
- , 541. *H. Saundersi* Rye. = *varicornis* Kraatz (*testaceipes* Heer).
- , „ „ *H. axillaris* Mannerh. — This name must be restored, Sahlberg altered it on account of a MSSname only.
- , 542. *H. musorum* Bris. = *picipes* Steph.
- , „ „ *H. velox* Kraatz (1858) = *vambrica* Wollast. (1855).
- , 547. *Oligota castanea* Wollast. = *rufipennis* Kraatz.
- , 551. *Myllaena gracilicornis* Fairm. = *elongata* Matth.
- , 554. *Tachinus bipustulatus* † Fabr. (non Linné) — must be renamed.
- , „ „ *T. flaripes* † Fabr. (non Linné) — use *dubius* Gyll.
- , 557. *Tachyporus abdominalis* † Gyll. (non Fabr.) — must be renamed.
- , 558. *T. nitidulus* Oliv. — lege Fabr. Spec. Ins. 1781. p. 337. and use this name for *brunneus* || Fabr.
- , „ „ *T. nitidicollis* Steph. = *obtusus* var.
- , „ „ *T. macropterus* Steph. — to be employed for *scitulus* Er.
- , 561. *Conurus obseuripennis* Steph. — to be employed for *lividus* Er.
- , 562. *Bolitobius apicalis* Steph. — to be employed for *exoletus* Er.
- , 567. *Heterothops binotatus* Er. — lege Grav. Micr. p. 28.
- , 568. *Quedius attenuatus* † Gyll. (non Grav.) — use *nitipennis* Steph.
- , 569. *Q. fulgidus* Fabr. — See p. 601; the reference should be Ent. Syst. I. 2. p. 525.

- p. 570. *Q. impressus* Panz. — use the older name *cinctus* Payk.
 „ „ *Q. microps* Grav. = *semiobscurus* Er.
 „ 571. *Q. resplendens* Thoms. = *luevigatus* var.
 „ 578. *Staph. fossor* Scop. — the description cannot possibly apply,
 use *fodiens* Grav.
 „ 579. *St. hesperus* Crotch = *aethiops* Waltl (*Ocyptus*).
 „ 581. *Ocyptus cupreus* Rossi. — lege *aenococephalus* De Geer
 (1774).
 „ 582. *O. cyaneus* Payk. — lege *ophthalmicus* Scop. (1763).
 „ „ *O. morio* Grav. — lege *edentulus* Block. (1798).
 „ 583. *O. quartus* Schäff. — Schäffer only numbers his species in
 order, which is no specific name.
 „ „ *O. similis* † Fabr. (non Payk.) — use *nitens* Schrank.
 1781. p. 231.
 „ 584. *Philonthus addendus* Sharp. — lege Trans. ent. Soc. V. 1867.
 p. 440.
 „ „ *Ph. aeneus* Rossi. — Linnaeus's specimen, which I think is
 certainly his own type, is *Ph. aeneus* and the species ought
 to be called *politus*.
 „ 586. *Ph. bipustulatus* † Panz. (non Linn.) — use *cruentatus*
 Gmel. 1788. p. 2035.
 „ „ *Ph. chalceus* Steph. = *succicola* Thoms.
 „ 588. *Ph. fulvipes* † Fabr. (non *fulvipes* Scopoli) — lege *flavop-*
terus Fourer.
 „ 590. *Ph. marginatus* Fabr. — lege Müller. Faun. Fridr. 230.
 „ 599. *Vulda* — Derivation: Duval anagramm.
 „ 603. *Xanthol. ochraceus* † Gyll. (non Grav.) — use *angustatus*
 Steph.
 „ 605. *Leptacenus linearis* † Grav. (non Oliv.) — use *pusillus*
 Steph.
 „ 609. *Lathrob. brunnipes* Fabr. (1792). — lege *punctatum* Fourer.
 (1785.)
 „ 615. *Cryptob. fracticorne* Payk. — lege *glaberrimum* Herbst.
 Arch. V. (1784); Paykull changed this name for no reason.
 „ 617. *Stilicus fragilis* Grav. — lege *angustatus* Fourer. 1785.
 „ 623. *Lithocaris tricolor* † Marsh. (non Fabr.) — use *ruficollis*
 Kraatz.
 „ 624. *Sunius intermedius* Er. — use the older *immaculatus* Steph.

- p. 628. *Paederus gregarius* Scop. — This evidently is == *littoralis* Grav. and should be restored.
- ,, „, *P. ruficollis* Fabr. — lege Gen. Ins. Mant. 1777.
- ,, 632. *Stenus aeris* Steph. Lacord. == *impressus* Germ.
- ,, 633. *St. argenteus* Kirby. — lege Waterh.
- ,, 634. *St. bupthalmus* † Grav. (non Schrank) — use *angustatus* Steph.
- ,, 635. *St. debilis* Rye == *carbonarius* Gyll.
- ,, 637. *St. Juno* Fabr. — lege *bupthalmus* Schrank. 1776.
- ,, 638. *St. oculatus* Grav. — lege *similis* Herbst. Arch. V. 1784.
- ,, 640. *St. Shepherdii* Crotch — species vera.
- ,, „, *St. speculator* Lacord. — lege *clavicornis* Scop. Ent. Carn. 1763.
- ,, 647. *Platyst. morsitans* || Payk. — lege *arenarius* Fourer.
- ,, 648. *Oxytelus depresso* Grav. — lege *tetraacarinatus* Block. 1798.
- ,, 654. *Trogophl. riparius* Lacord. — lege *bilineatus* Steph.
- ,, 657. *Anthoph. alpinus* Fabr. — lege Payk. Mon. Staph. App.
- ,, „, *A. armiger* Grav. — lege *bicornis* Block. 1799.
- ,, 659. *Lesteva macroelytron* Fourer. — lege *longoclitratus* Goeze. Ent. Beytr. I. (1777.)
- ,, „, *L. collina* Haliday. — lege Nat. Hist. Rev. 1855. p. 11.
- ,, 663. *Micr. brevipenne* Gyll. — lege *marina* Ström. Act. Nerv. 1785.
- ,, 666. *Homalium conformatum* Hardy. — adde 1857. p. 97.
- ,, „, *H. impar* Muls. == *riparium* Thoms.
- ,, 667. *H. mesomelas* Holme == *iopterum* Steph. (*lucidum* Er.).
- ,, 671. *Anthob. torquatum* † Kraatz. — Species vera et bene distincta == *collaris* mihi.
- ,, 680. *Micropepl. torquatus* Fabr. — lege Payk. Mon. Staph.
- ,, 717. *Necrophorus grandis* Fabr. — lege Ent. Syst. 1792.
- ,, 718. *N. humator* Fabr. — lege Goeze. Ent. Beytr. I. 1777.
- ,, „, *N. mortuorum* Fabr. 1792. — use *vespilloides* Herbst. 1784.
- ,, 719. *N. anglicus* Steph. == *investigator* Zett. (*ruspator* Er.); *sepulchralis* does not occur in England.
- ,, „, *N. vulgaris* Preyssl. — lege Fabr. Syst. Ent. p. 72.
- Ad Vol. III.
- p. 908. *Litargus trifasciatus* Wollast. == *coloratus* Rosenh.

Ad Vol. VI.

p. 1713. *Haploenemus impressus* Marsh. = *pini* Redt. Marsham's name ought to stand.

2. Vom Herausgeber.

Ad Vol. I.

p. 64. *Carabus Holbergi*. — lege *Holbergi*.

,, 76. *C. violaceus* L. Herr Preudhomme de Borre, gegenwärtig mit der Conservation der entomologischen Sammlung des Brüsseler Museum betraut, theilt mir mit, dass von den Drapiez'schen, in den Ann. gén. des Sc. phys. beschriebenen Arten, sich mehrere Typen vorgefunden haben und dass Herr Putzeys, der die *Carabidae* untersucht hat, den *Carabus detritus* Drap. l. c. VIII. 1821. p. 273. t. 127. f. 1 als = ♀ *Germari* Sturm erkannt hat. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die Drapiez'sche Arbeit, obwohl die Thiere recht gut beschrieben und abgebildet sind, von den meisten Autoren ignorirt wurde, von denen manche es vorgezogen haben neue Arten zu beschreiben, statt sich um die Leistungen ihrer Vorgänger umzusehen. Ist dann ein gewisser Zeitraum darüber verstrichen, so beliebt man die unrechtmässig übergangenen Namen einfach als „verschollene“ zu bezeichnen. Wenn ich nicht irre, so beschreibt Drapiez ebenda auch drei deutsche (Nüremberger) *Cryptocephalus*-Arten, die bis jetzt von Niemanden citirt wurden.

,, 88. *Odontacantha* Fabr. — lege Paykull. Faun. Suec. I. 1798. p. 169.

,, 185. *Scarites gigas* Fabr. (1781) — lege *buparius* Forst. Nov. Ins. Spec. (1771).

,, 218. *Chlaenius extensus* Eschsch. — lege Mannerh. Humm. Essai. 1825. p. 19; das folgende Eschscholtz-Citat: Entomogr. etc. ist zu streichen.

,, 220. *Ch. holosericeus* Fabr. (1787); der Name *tristis* Schaller (1783) gehört als der ältere voran.

,, 222. *Ch. nigricornis* Fabr. Diese Art sollte eigentlich *nitidulus* Thunb. heissen, unter welchem Namen sie vor Fabricius schon im Jahre 1784 beschrieben wurde. Da aber für *Ch. Schranki* Duft. der ältere Name *nitidulus* Schrank (1781)

einzutreten hat, so muss *nitidulus* || Thunb. gegen *nigricornis* Fabr. zurücktreten.

p. 312. *Omaseus magus* Eschsch. — lege Mannerh., ebenso

,, 374. *Platynus inauratus* Eschsch. — lege Mannerh.

,, 390. *Trechus Audouini* Gory. — lege Guérin.

Speciell auf den Catalog Bezug nehmende Bemerkungen über *Carabidae* hat Herr E. Ballion in den Bull. Soc. Imp. Mosc. 1869. I. geliefert, auf welche ich hiemit verweise. Ebenso ist manche Berichtigung aus der Revision der *Trechidae* zu entnehmen, die Herr Putzeys in der Stett. Ent. Zeit. 1870 veröffentlicht hat.

Ad Vol. II.

p. 488. *Helophorus granularis* L. — lege p. 214 statt nr. 214.

,, 499. *Cercyon xanthopterus* Laich. — lege p. 85 statt 86.

,, 575. *Creophilus maxillosus* L. — lege Faun. Suec. p. 230. nr. 841, statt nr. 891.

,, 722. *Silpha marginalis* Fabr. (1781). — Als älterer, von 1771 datirender Name ist *S. noveboracensis* Förster herzustellen. Hagen giebt in seiner Bibliographie für die Förster'sche Arbeit irrthümlich 1781 an.

Zahlreiche synonymische Berichtigungen und Zusätze über die *Staphilinidae* sind ferner von Herrn A. Fauvel publizirt worden in der Abeille. V. 1869. p. 479—494.

Ad Vol. III.

p. 841. Gattung *Trogosita* Oliv. Dieselbe muss den Namen *Tenebrioides* Piller et Mitterp. (It. Poseg. 1783) führen, da die Olivier'sche Gattung auf *T. coerulea* gegründet ist und sohin für *Temnochila* Westw. einzutreten hat. Diese Berichtigung ist aus Herrn Crotch's Arbeit über die Chronologie der Gattungen zu entnehmen, über die weiteren Veränderungen, welche durch dieselbe nöthig erscheinen, berichte ich im nächsten Heft.

p. 844. *Peltis dentata* F. (1787); als älterer Name ist voranzusetzen *scabra* Thunb. Nov. Act. Ups. 1784.

p. 871. *Palaestes Freyersi* — lege *Freyreissi*. Die Art ist nach Herrn G. W. Freyreiss benannt, der 1809 mit Langsdorff und später mit dem Prinzen Max v. Neuwied Brasilien bereiste und an

die Senkenberg'sche Gesellschaft in Frankfurt grosse Naturaliensendungen machte.

p. 941. *Lueanidae*. — Einen revidirten Catalog dieser Familie giebt Herr Major Parry in den Trans. ent. Soc. Lond. 1870 (Siehe Literatur).

p. 943. *Lamprima* — lege Latreille. Nouv. Dict. Hist. nat. 1804.

p. 960. *Platycerus caraboides*. Als Varietät ist beizufügen: *aeneus* Pollich. Bemerk. Kuhrpf. ökonom. Ges. 1781. p. 278.

p. 968. *Sinodendr. cylindricum* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 346.

Ad Vol. IV.

p. 979. Gattung *Scarabaeus*. Es scheint mir unzweifelhaft, dass für diese Gattung, welche sonst *Actinophorus* heissen müsste, der Linné'sche Name zu conserviren sei. Eine eigentliche typische Art, auf welche *Scarabaeus* gegründet wäre, bezeichnet Linné nicht, indem er aber dem bekannten *Se. sacer*, für den er die Bezeichnung *Scarabaeus* nicht erst erfindet sondern von der Tradition übernimmt, fremd-artige Elemente beigesellt, scheint es mir ganz unnatürlich, gerade auf eines von diesen, etwa auf *Dynastes Hercules* den Namen *Scarabaeus* anwenden zu wollen. *D. Hercules* ist allerdings der erste in der Linné'schen Aufzählung, die Arten sind aber bei Linné nicht nach ihrem typischen Werthe, sondern einfach nach der Grösse in gewissen Gruppen geordnet.

p. 982. *Se. sacer* L. — lege Syst. Nat. 1758. ed. X. p. 347; die zehnte Ausgabe, welche die ersten Originalbeschreibungen enthält, sollte allemal citirt sein, da in vielen Fällen, wenn nur Ed. XII. 1767 angegeben wird, Poda (1761) oder Scopoli (1763) die Priorität hätten.

p. 982. *Pachysoma cristatus* Fabr. — lege *cristatum* Fabr. Syst. Ent. 1775. p. 27; der Name wäre dann älter als der Olivier'sche, vorläufig ist mir aber die Fabricius'sche Art eine zu zweifelhafte, um ihren Namen aufzunehmen. Sollte nicht eher der seltene, auch mir in natura unbekannte *Scarb. Silenus* Oliv. auf diese Art zu deuten sein?

p. 985. *Sisyphus Schäfferi* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 349.

p. 987. *S. Koenigi* Fabr. — lege Syst. Ent. 1775. p. 29.

p. 987. *S. corruseus* Dup. — lege *coruseus*.

p. 991. *Canthon laevis* Drury. (1773). — Hierfür ist der ältere

Forster'sche Name *hudsonias* (Nov. Spec. Ins. 1781. p. 3) herzustellen. Beschrieben ist die Art zwar schon früher von Drury (Ill. L. 1770.), aber ohne Benennung; Namen nach der Linne'schen Methode giebt Drury erst nachträglich im Index. Vol. II. 1773.

- p. 1011. *Heliocopr. gigas* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 348.
- p. 1013. *Cathars. Pitheeius* Fabr. — lege p. 21 anstatt 43.
- “ “ *C. Molossus* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 347.
- “ “ *C. tricornutus* De Geer. — lege 1778 anstatt 1752.
- “ “ *C. Nemestrinus* Fabr. — lege Spec. Ins. 1781. p. 22.
- p. 1014. *Copris hispanus* L. — lege Mus. Lud. Ulr. 1764. p. 12.
- p. 1015. *C. lunaris* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 346; der Synonymie ist beizufügen: *bifidus* Poda. Mus. Graec. 1761. p. 18. t. 1. f. 1.
- p. 1017. *Phanaeus carnifex* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 346.
- p. 1018. *Ph. lanceifer* L. Der Synonymie ist beizufügen: ♂ *Setelles* Lichtenst. Cat. Mus. Hamb. 1795. p. 5. nr. 48. — Voet. Cat. Col. I. p. 36. t. 23. f. 1.
- p. 1018. *Ph. Minas* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 347.
- “ “ *Ph. festivus* L. — l. c. p. 350.
- “ “ *Ph. Minos* Erichs. = *Meleagris* Blanch.
- p. 1019. *Ph. Rosalia* Fabr. — lege *Rosalius*.
- p. 1022. *Onitis Olivieri*. — lege Illig. Oliv. Ent. Uebers. I. 1800. p. 245. not. a.; Mag. II. 1803. p. 197.
- p. 1028. *Onthophagus fissicornis* Kryn. — lege Steven. Mém. Mosc. II. 1809. p. 34.
- p. 1031. *O. decempunctatus* Schall. — lege Abhandl. Halle. Ges. 1783.
- p. 1033. *O. nuchicornis* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 347.
- p. 1035. *O. pygmaeus* Fabr. — lege Schaller. Abhandl. Halle. Ges. 1783. I. 239.
- p. 1035. *O. sagittarius* F. — lege Syst. Ent. 1775. p. 24.
- “ “ *O. quadripustulatus* F. — lege Syst. Ent. 1775. p. 27.
- p. 1038. *O. truncaticornis* Schaller. Abhandl. Halle. Ges. 1783. I. p. 238, aus Malabar; diese Art ist nachzutragen, dafür *O. truncaticornis* || Bohem. in *trueidatus* zu ändern.
- p. 1038. *O. unifasciatus* Fabr. — lege Schaller. Abhandl. Halle. Ges. 1783. I. p. 240.
- p. 1039. *O. vitulus* F. — lege Gen. Ins. Mant. 1778. p. 209,

- p. 1039. *Oniticellus cinctus* F. — lege Syst. Ent. 1775. p. 30.
 „ „ *O. flavipes* Fabr. — Der ältere Name *verticicornis*
 Fabr. Syst. Ent. 1775. p. 27 ist dafür herzustellen.
- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| p. 1043. <i>Aphodius aurelianus</i> Harold | $= ruricola$ Melsh. |
| p. 1045. <i>A. conspurcatus</i> L. | p. 348. |
| p. 1047. <i>A. simetarius</i> L. | p. 348. |
| „ „ <i>A. erraticus</i> L. | lege Syst. Nat. ed. X. p. 348. |
| p. 1048. <i>A. fossor</i> L. | p. 348. |
| p. 1049. <i>A. haemorrhoidalis</i> L. | p. 348. |
- p. 1053. *A. meridionalis* Villa $= hydrochoeris$ Fabr.; nach den typischen, vom Autor mitgetheilten Stücken.
1058. *A. rufipes* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 353; bei dessen Synonymie *capitatus* De Geer ist t. 10. f. 6 anstatt 7 zu lesen.
- p. 1058. *A. rufescens* Fabr. (1801). Für den in der Synonymie stehenden *rufus* Moll ist als ältestes Citat zu setzen: Füssl. Neu. Mag. I. 2. 1782. p. 372; die naturalhistorischen Briefe sind erst von 1785. Moll beschreibt den *A. rufescens* ganz unzweifelhaft und ist sein Name daher anstatt *A. rufescens* aufzunehmen. *A. rufus* Sturm bedarf somit einer Aenderung, und schlage ich hiefür *Sturmi* vor.
- p. 1061. *A. subterraneus* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 348.
- p. 1064. *Oxyomus porcatus* Fabr. (1775).¹ Als ältester Name ist für diese Art herzustellen: *sylvestris* Scop. Ent. Carn. 1763. p. 5. 11. Bei *foveolatus* Moll ist vor Naturh. Brief. I. zu citiren: Füssl. Neu. Mag. II. 1784. p. 170.
- p. 1066. Beizufügen: *Ataenius horticola* Harold. Abeille. V. 1869. p. 429. Orient.
- p. 1067. *A. stercorator* F. — lege Syst. Ent. 1775. p. 19.
- p. 1078. *Bolboceras furcum* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 14.
- „ „ *B. Cephus* Fabr. — lege Syst. Ent. p. 18.
- p. 1018. *Odontaeus mobilicornis* Fabr. — lege:
armiger Scopol. Annus V. hist. nat. 1772. p. 78.
 nr. 16. — Laichart. Verz. Ins. Tyrol. I. 1781.
 p. 18. — Hohenw. Schrift. Berl. Ges. VI. 1785.
 p. 358. t. 8. f. 12—15.
mobilicornis Fabr. Syst. Ent. 1775. p. 11. — Sturm.
 Ins. I. p. 20. t. 6. f. 8—v.
♀ bicolor Fabr. Spec. Ins. 1781. p. 17. — Herbst etc.

- p. 1085. *Geotrupes stercorarius* L. — lege Syst. Nat. ed. X.
p. 349.
- p. 1085. *G. splendidus* F. — lege Syst. Ent. 1775. p. 18.
„ „ *G. Typhoeus* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 346.
„ „ *C. vernalis* L. — l. c. p. 349.
- p. 1088. *Trox hispidus* Laich. — lege Pontopp. Dansk. Atl. I. (1763); die Art wurde zuerst beschrieben, aber ohne Speciesnamen, von Brünniche im Prodr. Ins. Siaelandicae. 1761. p. 26. 1; in die Synonymie gehört *tomentosus* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 55. 477.
- p. 1089. *T. sabulosus* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 350.
„ „ *T. perlatus* Scriba. — lege Goeze. Ent. Beytr. I. p. 74. (1777).
- p. 1090. *T. scaber* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 349.
- p. 1094. *Glaphyrus maurus* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 348.
- p. 1095. *Gl. acuminatus* Lepech. — lege Goeze. Ent. Beytr. I. p. 96. Lepechin beschreibt zwar die Art, giebt aber keinen Speciesnamen. Eine Revision der *Glaphyrus*-Arten habe ich in der Berl. Ent. Zeitschr. 1869. p. 424—45 gegeben.
- p. 1096. *Amphicoma syriaca* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 351.
- p. 1100. *Anisonyx longipes* L. — lege Mus. Lud. Ulr. 1764. p. 20.
- p. 1112. *Hoplia farinosa* L. — lege Faun. Suec. 1761. p. 138; Poda's Beschreibung des *Sc. argenteus* ist gleichzeitig.
- p. 1118. *Serica brunnea* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 352.
- p. 1119. *S. holosericea* Scop. — lege Annus V. Hist. Nat. 1772. p. 77; in die Synonymie gehört noch: *cinerascens* Goeze. Ent. Beytr. I. 1777. p. 75. Scopoli's Werk, das auch Schönherr nur ausnahmsweise citirt, enthält noch viele unbekannte Arten.
- p. 1178. *Rhizotr. solstitialis* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 351.
- p. 1181. *Polypylla fullo* L. — ebenda p. 352.
- p. 1192. *Euchirus longimanus* L. — ebenda p. 349.
- p. 1193. *Anisoplia agricola* † Fabr. — lege *villosa* Goeze. Ent. Beytr. I. p. 74. Ueber *agricola* Linné (aus Südeuropa) hat die Kritik noch nicht entschieden; wegen der *elytra glabra* kann aber keine der rauhhaarigen Arten darunter gemeint sein und ich vermuthe daher die Identität mit *austriaca* Herbst. Linné's *agricola*, die von 1767 datirt, könnte aber wegen *agricola* Poda (1761) immer nur in der Synonymie erscheinen.

p. 1197. *Phyllopertha horticola* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 351 und Faun. Suec. p. 137. nr. 391 anstatt p. 391; in der Synonymie ist bei *adiaphorus* als ältestes Citat vor Scopoli zu setzen: Poda. Ins. Mus. Graec. 1761. p. 20. Dass Poda's Ins. Mus. Graec. mit Griechenland nichts zu thun hat, sondern eine Anfzählung der Insecten des Grazer Museums ist, erwähne ich nebenbei, weil ich vielleicht nicht der einzige bin, der geraume Zeit der Meinung war, es handle sich um griechische Thiere.

p. 1204. *Anomala oblonga*. Das Scopolicitat ist falsch und überhaupt zu streichen, da der *Scarab. oblongus* Scop., den Fabricius citirt, = *Aphodius rufipes* Linné ist. Die Art hat den Namen *dubia* Scop. Ent. Carn. 1763. p. 3. nr. 4. zu führen, unter dem sie auch den älteren Autoren Laicharting, Moll, Schrank u. s. w. bekannt war, bis derselbe durch den späteren und falsch citirenden *oblonga* † Fabr. verdrängt wurde. Das fehlerhafte Citat Scop. Ent. Carn. p. 10 scheint aus Fabr. Syst. El. nachgeschrieben.

- p. 1215. *Antichira chrysis* L. {
- p. 1220. *Rutela lineola* L. {
- p. 1223. *Pelidnula punctata* L. {
- p. 1227. *Cotalpa lanigera* L. {
- p. 1254. *Dipelicus Geryon* Fabr. — lege Drury. Ill. Vol. II.
- p. 55. t. 30. f. 6. (1773).
- p. 1258. *Oryctes nasicornis* L. {
- „ „ *O. rhinoceros* L. {
- p. 1263. *Strategus Antaeus* Fabr. 1775. — lege Drury. Vol. II.
- 1773. App.; 1. p. 74. t. 34. f. 3—4.
- p. 1263. *St. Alocus* L. — {
- p. 1265. *Dynastes Hercules* L. {
- „ „ *Golofa Aegeon* Fabr. 1775. — lege Drury. l. c. II.
- p. 54. t. 30. f. 5.
- p. 1267. *Xylotrupes Oromedon* Fabr. (1775). — lege Drury.
- l. c. p. 81. t. 36. f. 5.
- p. 1267. *Chalcosoma Atlas* L. {
- p. 1268. *Megasoma Actaeon* L. {
- „ „ *M. simson* L. {
- p. 1269. *Agaocephala bicuspis* Er. — lege 1848 statt 1858.
- p. 1270. *Phileurus didymus* L. {
- p. 1271. *Ph. valgus* L. {

p. 1274. *Goliathus caeicus* Voet. Das Citat ist zu berichtigen in: Cat. syst. I. p. 34. t. 22. f. 151; das Datum der Publication kann ich zur Zeit, wo ich mit Nachforschungen über Voet's Werk noch nicht zu Ende bin, nicht angeben, ich denke aber es ist 1775. Uebrigens kann Voet gar nicht als Autor zu *caeicus* citirt werden, da er a. a. O. den umbranchbaren Namen *Caeicus ingens* aufstellt; als erster Autor für die *Cetonia caeca* erscheint Olivier Ent. I. 6. p. 8. (1789).

p. 1288. *Cotinis nitida* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 350.

p. 1290. *Gymnetis lanius* L. — l. c. p. 352.

p. 1294. *Agestrata orichalcea* L. — lege p. 504 statt 507; in der Synonymie ist bei *chinensis* vor Fabricius zu citiren: Forst. Nov. Spec. Ins. 1771. p. 2.

p. 1303. *Pantolia flavonarginata* — lege Dej. Cat. p. 190 statt 191.

p. 1313. *Euphoria indica* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 352.

p. 1317. *Oxythyrea stictica* Linné (1767). Als älterer Name ist voranzusetzen: *O. funesta* Poda. Ins. Mus. Graec. 1761. p. 20. — Scop. Ent. Carn. 1763. p. 4. — Schrank. Enum. Ins. Austr. p. 13. (1781). Geoffroy's *Searabaeus* nr. 14 (le drap mortuaire) citirt zuerst Fabricius (1775) ganz richtig bei dieser Art, DeGeer (1774) hatte ihn für den *Sc. variabilis* Linné gehalten. Bekanntlich hat diese Linné'sche Art (ein *Gnorimus*) den älteren Autoren zu vielfachen Missdentungen Anlass gegeben, Panzer hielt sogar den *Sc. viridiobscurus* Voet (= *Cetonia aurata*) für denselben.

p. 1318. *Tropinota squalida* Linné (1767). — lege Scop. Ent. Carn. p. 6. 13 (1763).

p. 1318. *T. hirta* Fabr. — lege Poda. Mus. Graec. 1761. p. 21; der Name ist als der ältere dem Linné'schen, der von 1767 datirt, voranzustellen; Linné citirt (Ed. XII. p. 556) richtig Poda und Scopoli, ändert aber ganz willkürlich den Namen in *hirtellus* ab.

p. 1319. *Trichostetha capensis* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 352.

p. 1319. *T. fascicularis* L. — lege Mus. Lud. Ulr. 1764. p. 28.

p. 1320. *Cetonia aeruginosa* † Drury. — Drury citirt den *Sc. aeruginosus* L., der eine *Polidnota* ist; der Name *speciosissima* Scop. ist daher für diese Art wieder einzuführen.

p. 1321. *C. aurata* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 352.

p. 1327. *C. marginata* Drury. — lege p. 58 statt 59.

p. 1340. *Osmoderma eremita* Linné (1767). Als Autor ist bei dieser Art Scopoli zu citiren, der sie schon vier Jahre früher (Ent. Carn. 1763. p. 7. nr. 15) beschrieben hat.

p. 1343. *Gnorimus nobilis* L. — lege Syst. Nat. ed. X. p. 353.

“ “ *G. variabilis* L. { l. c. p. 352.

p. 1345. *Trichius fasciatus* L. {

p. 1346. *Valgus hemipterus* L. — l. c. p. 351.

Ad. Vol. V.

p. 1377. *Buprestis*. — lege Syst. Nat. 1758 anstatt 1760.

p. 1548. *Cardiophorus Farinesi* Villa. Herr A. Villa war so freundlich mir auf gestelltes Ansuchen das typische Stück dieser Art zuzuschicken, und finde ich, dass dasselbe = *C. ornatus* Cand. ist. Mit vollem Rechte hat Herr v. Kiesenwetter (Berl. Zeit. 1861. p. XXVI.) diese Form als Abänderung des *C. biguttatus* erklärt.

p. 1569. *Athous Oeskayi* (= *riddatus*) — lege Oeskayi.

p. 1458. *Drapetes cinctus* Panz. — lege 31. 21. statt 21. 31.

Im Index bei *Strigoptera* 1393 statt 1394, bei *Trichophorus* 1588 statt 1558.

Von Dr. Max Gemminger.

Ad Vol. VI.

p. 1727. *Bostrichoides*. — lege *Bostrychoides*, ebenso in der Etymologie *Bostrycheus* statt *Bostrichus*.

p. 1769. *Gibbium scotias* Fabr. Als älterer Name ist herzustellen: *G. psylloides* Czenpiński Dissert. zool. medic. 1778. p. 51; beim Gattungssynonym *Scotias* ist ebenfalls Czenpiński statt Czempinski zu lesen.

p. 1776. *Trypopitys serricornis*. — lege Oeskay statt Oeskay.

Im Index: Apate 1788 statt 1789, Dorcatoma 1782 statt 1783, Dupontiella 1727 statt 1724, Ellipotoma und Eumepus 1750 statt 1751, Lycus 1626 statt 1627, Natalis 1730 statt 1731, Silis 1774 statt 1775.

Metriophthalmus. — lege Metriorrhynchus.

Paralichus. — lege Paralichas.

p. 1796. Beizufügen: *Cis caucasicus* Ménétr. Cat. rais. 1832.

p. 224. *Caucasus*.

Weitere Zusätze aus Ann. nat. Hist. XIX. 1867. von Murray über *Bostrychidae*, *Lymexylonidae* und *Malacodermidae* aus Old Calabar folgen im nächsten Hefte. Leider ist das betreffende Werk verspätet eingetroffen um es rechtzeitig benützen zu können.

Ad Vol. VII.

p. 1801. Bei dem Citat der Gattung *Trictenotoma* ist T. 35. zu streichen.

p. 1841. Gattung *Himatismus*. — Als Synonym ist beizufügen: *Cyphostethus* Marseul.

p. 1861. Die Bemerkungen von Dr. Kraatz über Arten der Gattung *Blaps* (Berl. Zeit. 1869) müssen bezüglich ihrer Pagination zwischen 276—282 abgeändert werden. Ich übersah die Notiz auf dem Umschlage, welche anzeigen, dass der seiner Seitenzahl nach spätere Artikel nach p. 128 eingeschoben wurde.

p. 1953. Die von mir in *vicinum* geänderte Art *picipes* Casteln. et Brullé tritt wieder selbstständig ein, da *Platydema picipes* Say zur Gattung *Phaleria* gestellt wurde.

p. 1958. *Pseudostenia* — lege *Pseudostene*.

p. 2173. *Ischnomera mansueta* statt *manseuta*.

Im Index ist *Ernocharis* p. 2050 einzuschalten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologische Hefte](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Crotch G. R.

Artikel/Article: [Berichtigungen und Zusätze zum Catalogus
Colcopteronum synonymicus et systematicus. 94-111](#)