

6/9/10

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.



Pars 19:

M. Bernhauer et K. Schubert.

Staphylinidae I.

Einzel-Preis: Mark 8.10

Subscriptions-Preis: Mark 5.40

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

30. VIII. 1910.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **R. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephallidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

6/9/10.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.



M. Bernhauer et K. Schubert.

Staphylinidae I.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1910.

pp. 86

Fam. Staphylinidae.

Auct. M. Bernhauer et K. Schubert.

- Microptera* Gravenhorst, Col. Micropt. Brunsv. 1802, VII.
Staphylinii Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 172;
 Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 203. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58.
Brachyptera Latreille, Fam. nat. règne anim. 1825, p. 243.
Brachélytres Latreille in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 431.
 — Mannerheim, Mém. Acad. Petersb. I, 1830, p. 415.
Staphylinidae Westwood, Introd. mod. classif. Ins. I, 1839, p. 162.
 — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 22, 71; II, 1860, p. 136; IV, 1863, p. 195. — Leconte, Classif. Col. North Amer. 1861—62, p. 58. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 89.
 — Arribalzaga, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884, p. 5. — Ganglbauer, Käfer Mitteleuropas II, 1895. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909.
Staphylini Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 5.
Staphyliniens Lacordaire, Gen. Col. II, 1855, p. 17.
Staphylinides Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 1. — Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, p. 1.
Brévipennes Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 145.
 Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 502.
 — Duvivier, Enum. Staph. 1883, p. 93. — Eichelbaum, Katalog der Staphyliniden-Gattungen (Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909).

I. Subfam. Oxytelinae.

- Oxytelini* + *Phloeocharini* + *Omalini* + *Proteinini* Er. Käf. Mark Brdbg. I, 1837, p. 576, 612, 613, 641.
Oxytelini (excl. Subtrib. *Megalopini*) + *Piestini* + *Phloeocharini* + *Omalini* + *Proteinini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 749, 823, 842, 846, 901.
Oxytelini (excl. *Oxyporus*) + *Omalini* + *Proteinini* + *Phloeocharini* + *Piestini* + *Micropeplini* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 798, 904, 1019, 1034, 1039, 1049.
Oxytérites + *Piestites* + *Phloeocharites* + *Omalites* + *Proteinites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 54, 62, 64, 66, 78.
Oxytelina + *Phloeocharina* + *Olisthaerina* + *Omalina* + *Micropeplidae* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 113, 117, 175, 177; IV, 1862, p. 194.

- Piestini* + *Phloeocharini* + *Protinini* + *Homalini* + *Oxytelini* (excl. Sect. II *Oxypori*) + *Micropeplidae* Fauv. Fn. Gall. Rhén. III, 1872, p. 14, 19, 24, 33, 124, 8.
- Oxytéliens* + *Phléochariens* + *Trigonuriens* + *Protéiniens* + *Phléobiens* + *Omaliens* + *Pholidiens* + *Micropeplides* Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (5.) VIII, 1875, p. 209, 205.
- Phloeocharini* + *Oxytelini* (excl. Group. I *Megalopes* et Group. II *Oxypori*) + *Homalini* + *Protinini* + *Piestini* Lec. and Horn, Classif. Col. North. Amer. 1883, p. 101—105.
- Oxytelinae* + *Omaliinae* + *Micropeplinae* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887, p. 677, 744, 747.
- Oxytelinae* + *Micropeplinae* Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 608, 765.
- Phloeocharinae* + *Olisthaerinae* + *Oxytelinae* + *Piestinae* + *Omaliinae* + *Proteininae* + *Euphaniae* + *Pseudopsinae* + *Thoracophorinae* + *Micropeplinae* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 14, 16.

1. Tribus: **Piestini.**

- Piestini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 823. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1039. — Fauvel, Fn. Gall. Rhén. III, 1872, p. 14 (+ *Pholidus*). — Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 681.
- Piestites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 62. (+ *Trigonurus* + *Pholidus*).
- Piestidae* Lec. Classif. Col. North-Amer. I, 1862, p. 72.
- Trigonuriens* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 211; + *Oxytéliens* 3^ebranche *Prognathaires* Hist. Nat. Col. Fr. Brév. 1879, p. 385; + *Pholidiens* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 407.
- Piestina* + *Eleusina* + *Leptochirina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887, p. 710, 728, 733.

1. Subtribus: **Trigonuri.**

Apatetica Westw.

- Westw. Cab. Or. Ent. Lond. 1848, p. 86; Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 71. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.
- Trigaeus* (*Trygaeus*) Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420.
- Idiochila* Friv. Term. Füzet. V, 1883, p. 135, t. 2, f. 1—3.
- brunneipes** Rits. Not. Leyd. Mus. 1879, I, p. 76; VI, p. 134. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.
- spinipennis** Friv. Term. Füzet. VI, 1883, p. 137, t. 1, f. 4. Sumatra, Borneo
- javanica** Sharp, Notes Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 61. Java. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194. Ost-Indien
- laevicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 87. Tonkin
- lebioides** Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 86, t. 41, f. 9. — Lacord. Gen. Col. t. 16, f. 6. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 193. Ost-Indien

- nitiduloides** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 11; Java
Thes. Ent. Oxon. 1879, p. 69, t. 5, f. 11. —
Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.
- princeps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 421; Japan
Ann. Mag. Nat. Hist. 1889, III, p. 467. —
Ch. O. Waterh. Aid Ident. Ins. t. 133, f. 3.
— Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.
- rotundicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 85. Ost-Indien
- semiviolacea** Fauv. l. c. p. 85. Java
- siamensis** Lewis, Not. Leyd. Mus. XV, 1893, p. 248. Siam
— Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.
- Sikkimi** Fauv. l. c. p. 193. Ost-Indien
- sparsicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 86. „
- viridipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192. „

12

Nodynus Waterh.

Ch. O. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 12. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 467. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas III, 1899, p. 67.

- leucofasciatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, Japan
1879, p. 460. — Waterh. Aid Identif. of Insects
II, 1883, t. 133, f. 4.
- nitidus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 13. Ost-Indien

2

Trigonurus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1847, p. 515; l. c. XXV, 1878, p. 212.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—61, p. 61. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 805. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 642. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872—75, p. 17. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 162. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 421; Ann. Mag. Nat. Hist. 1889, p. 467. — Ganglb. Käfer Mitteleuropa II, 1895, p. 682.

- asiaticus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 642. Caucasus
— Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 161.
- caelatus** Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1874, p. 48. — Kalifornien
Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 186.
- Crotchii** Lec. l. c. p. 48. — Fauv. l. c. p. 187. Kalifornien,
Vancouver
- Edwardsi** Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 205. Kalifornien
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II 1877—78, p. 186.
- Lecontei** Sharp, l. c. p. 205. — Fauv. l. c. p. 187. „
- Mellyi** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1847, p. 515, Seealpen
t. 7, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. t. 23, f. 113. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872—75, p. 17. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 214.
- rugosus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 204. Kalifornien
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 185.
- subcostatus** Mäkl. Bull. Mosc. 1852, II, p. 320. Sitkha

8

2. Subtribus: **Piesti.****Piestus** Grav.

Grav. Monogr. Micropt. 1806, p. 223. — Cast. Étud. ent. I, 1834, p. 126.
 — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 830. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 127.
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 21. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, p. 712.

Irenaeus Leach.

Trichocoryne Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306.

Subgen. **Zirophorus** Dalm.

Dalm. Act. Holm. 1821, p. 371; Anal. Ent. 1828, p. 23. — Sharp, l. c. p. 711.

Biologie: Lacord. Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, p. 65; Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 358.

- | | |
|---|---|
| bicornis Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 128. — Ol. Encycl. méth. VIII, 2, p. 615. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 832. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712. | Kolumbien,
Nicaragua,
Panama,
Peru,
Bolivien,
Carthagena |
| <i>fronticornis</i> Dalm. Act. Holm. 1821, p. 373; Anal. Ent. 1828, p. 24, t. 4, f. 1. | |
| <i>striatus</i> Guér. Ic. Règne Anim. Ins. t. 9, f. 12. | |
| var. <i>oxytelinus</i> Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129, t. 4, f. 4. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 832. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 23. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712. | Nicaragua,
Venezuela,
Peru,
Bolivien |
| capricornis Cast. l. c. p. 129, t. 4, f. 4. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 26. | Guadeloupe,
Cayenne |
| var. <i>muticus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 22. | Para |
| frontalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 405. | Amazon. |
| fureatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 712. | Panama |
| Lacordairei Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129. — Er. Gen. Staph. p. 832. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 25. | Cayenne |
| longipennis Fauv. l. c. p. 24. | Kolumbien |
| planatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 711. | Mittel-amerika |
| spinosus F. Syst. El. II, 1801, p. 93. — Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 128. — Schönh. Syn. Ins. III, 1836, p. 53. — Dalm. Anal. Ent. 1828, p. 25. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 26. | Cayenne |
| <i>oxytelinus</i> Perty, Del. anim. 1830—34, p. 33, t. 9, f. 9. | |
| validus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 404. | Amazon. |

Subgen. **Piestus** s. st.

- | | |
|---|----------------------|
| alternans Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 714. | Panama |
| angularis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 35, t. 1, f. 10. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 715. | Brasilien,
Mexiko |
| aper Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 408. | Amazonas |

Buqueti Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 32.	Cayenne
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 715.	Panama
costatus Sharp, l. c. p. 715.	„
crassicornis Sharp, l. c. p. 716.	„
erythropus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 29.	Antillen, Mexiko
striatus Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306, t. 32, f. 5 (forte) (<i>Trichocoryne</i>).	
extimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 713.	Mexiko
filicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 22.	Bolivia
fulvipes Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 833. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 27.	Guadeloupe
Gounellei Fauv. l. c. p. 24.	Brasilien
heterocephalus Fauv. l. c. p. 22.	Venezuela
laevis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 311 (gen. dubium).	Peru
mexicanus Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 130. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 836. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 34, t. 1, f. 9. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 714, t. 19, f. 5.	Mittel- Amerika, Brasilien
minutus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 31. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 713.	Mittel- Amerika, Kolumbien, Brasilien
sulcatus Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129.	
niger Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 28, t. 1, f. 7. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712.	Mexiko, Guatemala, Panama
nigrator Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.	Amazonas
penicillatus Dalm. Act. Holm. 1821, p. 373; Anal. Ent. p. 24, t. 4, f. 2. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 27.	Mexiko Brasilien
pennicornis Fauv. l. c. p. 30, t. 1, f. 8.	Kolumbien, Brasilien
plagiatus Fauv. l. c. p. 30, nota 1.	Brasilien
puncticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.	Amazonas
pygialis Fauv. l. c. p. 23.	Brasilien
pygmaeus Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 130. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 835. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 33. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 713.	Mittel- Amerika, Süd- Amerika
rectus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 406.	Amazon
rugosus Sharp, l. c. p. 407.	„
Sanctae-Catharinae Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 193.	Brasilien
sulcatus Grav. Monogr. Micropt. 1806, p. 224. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 835. — Serv. Encycl. méth. Ins. X, p. 123. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 34, nota 1.	„
Wasmanni Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 25.	„

Eupiestus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 182. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 27 nota 1.	
angulatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 29.	Sikkim
callosus Fauv. l. c. p. 28.	Sumatra

Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 187.	Birma
longicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 28.	Sumatra
miriceps Fauv. l. c. p. 27.	"
ocularis Fauv. l. c. p. 29.	Java
rhinoceros Fauv. l. c. p. 30.	Sumatra
sculpticollis Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 182, t. 3. f. 4 a—b.	Ceylon
Sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30.	Darjeeling
spinifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 186.	Birma
temporalis Fauv. l. c. p. 188.	"

11

Euphantias Fairm.

Fairm. Fn. Fr. I, 1856, p. 657. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858), p. 65. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 806; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 51. — Bergroth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 573.

Pholidus Muls. et Rey, Op. Ent. VII, 1856, p. 7; Ann. Lyon XXVII, 1880, p. 408. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 689.

Ganglbaueri Bernh. Arch. Naturgesch. 1908, p. 286.	Brasilien
insignis Muls. et Rey, Op. Ent. VII, 1856, p. 9; Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 409. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 690.	Süd-Frankreich
insignicornis Fairm. Fn. Fr. I, 1856, p. 657. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 51. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858) t. 28, f. 140.	

2

Siagonium Kirby.

Kirby and Spence, Introduct. Ent. I, 1815, t. 1. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 23. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 15. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 684.

Prognatha Latr. in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 439. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 836. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 128. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858), p. 63. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1043. — Muls. et Rey, Brévipennes 1879, p. 386. Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1827—28, p. 56, t. 2, f. 1.

americanum Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 42.	Pennsylvanien,
convergens Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 147.	Georgia
debile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.	Japan
(decisum Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205.	Ceylon = <i>Ino.</i>)
gracile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.	Japan
humerales Germ. Fauna Ins. Eur. XVIII, 1817, p. 6.	Süd-Europa
— Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 837. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1046.	
— Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 16. — Muls. et Rey, Brév. 1879, p. 391.	

- quadricorne* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 114.
indicum Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21. Sikkim,
 Darjeeling
nobile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 463. Japan
punctatum Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 376. Pennsylvanien
quadricorne Kirby and Spence, Introd. Ent. I, 1815, t. 1, f. 3. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 23. Europa,
 — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 837. — Kraatz, Süd-
 Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1045. Europa,
 — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 16. — Muls. England
 et Rey, Brév. 1879, p. 388.
rufipenne Blondel, Ann. Sc. Nat. X, 1827, p. 414, t. 18, f. 14.
 Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1827—28, p. 58, t. 2, f. 1 A.
vittatum Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 1, nota. Ost-Sibirien,
Haroldi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, Japan
 1879, p. 148.

10

Cephaloxynum Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 282.

Gestroi Bernh. l. c. p. 282.

Bolivien

1

Piestoneus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.

Lewisi Sharp, l. c. p. 465.

Japan

1

Hypotelus Er.

Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 840. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 130. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 42. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 409; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 710. — Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 249.

capito Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 181. Brit. Kolumbien, Texas

hostilis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 43. Mexiko
 — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 710.

lucidus Sharp, l. c. p. 710.*marginatus* Sharp, l. c. p. 711.*micans* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 409.*praecox* Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 841.*pusillus* Er. l. c. p. 841, t. 2, f. 8.

Panama
 Guatemala
 Amazon.
 Kolumbien
 Brasilien

7

3. Subtribus: **Eleusii.****Eumalus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 732.

- nigrella** Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59. Kalifornien,
canadensis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, Nord-
 p. 299. Amerika
nigriceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 733.
strigosus Sharp, l. c. p. 733. „

3

Triga Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 183.

- picipennis** Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59. Kansas

1

Eleusis Cast.

Cast. Étud. ent. I, 1835, p. 131. — Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 836, nota. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 127. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865) p. 35; l. c. (3) II, 1877—78, p. 180; Abeille V, 1868—69, p. 494; Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 206; Notices Ent. VII, 1878, p. 17; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 256. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 297. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728

Chasolium Cast. l. c. p. 132.

Isomalus Er. l. c. p. 838. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, IX, 1863—64 (1865), p. 35; Notices Ent. II, 1864, p. 31.

- acuticollis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 171. Madagaskar
adusta Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), Brasilien
 p. 37.
agilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 410. Amazonas
alutella Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 237. Kamerun,
 Madagaskar
apicalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298. Madagaskar
apicipennis Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 291. — Fauv. Tahiti
 Ann. Mus. Genova 1877, p. 186.
bicarinata Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Madagaskar
 p. 7.
bicolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 839. — Guatemala
 Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 5. — Fauv.
 Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865),
 p. 38. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887,
 p. 279.
 var. *divisa* Sharp, l. c. p. 729, t. 19, f. 16.
bisulcata Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Madagaskar
 p. 8.
boops Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 299. „
brachyptera Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, „
 1904, p. 6.
breviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 731.

<i>brevipennis</i> Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 242.	Neu-Caledonien
<i>cephalotes</i> Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 218.	Mexico
<i>coarctata</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 466.	Japan
<i>conifrons</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 82.	Sumatra
<i>Conradti</i> Fauv. l. c. p. 292.	Deutsch-Ostafrika
<i>corvina</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 730.	Guatemala
<i>discalis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Sumatra
<i>diversicollis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 77.	Neu-Guinea
<i>dubia</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 411.	Brasilien
<i>Ernestini</i> Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 132.	Madagaskar
<i>complanata</i> Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 839, t. 2, f. 7.	„
<i>Feae</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 188.	Birma
<i>fenestrata</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 730.	Guatemala
<i>flavipennis</i> Sharp, l. c. v. 731.	„
<i>frater</i> Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 39.	Venezuela
<i>fulvicornis</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 140.	Togo, W.-Afr.
<i>fusciceps</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 184.	Ceylon, Nias
<i>hesperidum</i> Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XX, 1857, p. 504.	Cap Verden
<i>heterodera</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 299.	Madagaskar
<i>howa</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 170.	„
<i>humilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 839. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 44.	Brasilien,
<i>fasciata</i> Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59.	Sunda-inseln,
<i>indica</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 183.	Ostindien,
<i>pallidipennis</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 40.	Ceylon,
<i>subtilis</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 467.	Kalifornien,
<i>tenuis</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 41.	Mexiko,
<i>tenuis</i> Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52.	Kolumbien,
<i>hydrocephala</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 300.	Venezuela,
<i>impressicollis</i> Fairm. Natural. 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880 (1881), p. 326.	Japan
<i>inermis</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr., 1901, p. 171.	Madagaskar
<i>infima</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 731.	Nicaragua
<i>insignis</i> Sharp, l. c. p. 732.	Guatemala
<i>interrupta</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 839.	Kolumbien
<i>Kolbei</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 292.	Deutsch-Ostafrika
<i>Kraatzi</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 207.	Ostindien,
<i>apicipennis</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 183.	Ceylon,
<i>laticeps</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.	Nias
<i>longiceps</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 208.	Birma,
	Sumatra,
	Nias
	Neu-Guinea,
	? Ceylon

<i>longicornis</i> Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 236.	Kamerun
<i>lunigera</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 84.	Neu-Guinea, Ostindien, Sunda- Inseln
<i>mixta</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 732.	Mexiko, Guatemala
<i>mutica</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 9.	Gabun
<i>myrmidon</i> Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455.	Chile
<i>nigerrima</i> Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 37.	Brasilien
<i>obscura</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172.	Madagaskar
<i>pallida</i> Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 58.	Pennsyl- vanien
<i>parva</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 24.	N. S. Wales
<i>Perrieri</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298.	Madagaskar
<i>pieta</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 139.	West-Afrika
<i>plagiata</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Ostindien
<i>planicollis</i> M ^r Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, II, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 186, nota.	Australien
<i>australis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 482.	
<i>propinqua</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 5.	Madagaskar
<i>punctigera</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 208.	Neu-Guinea
<i>pusilla</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.	Birma, Nias
<i>quadridens</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 84.	Perak, Hinter- indien
<i>Raoulti</i> Fairm. Natural. 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880 (1881), p. 326.	Nossi-Bé, Madagaskar
<i>rectangulum</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 6.	Madagaskar
<i>rotundiceps</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Ostindien
<i>ruficollis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 207.	Neu-Guinea
<i>rufiventris</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 81.	Sumatra
<i>rufula</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 729.	Panama
<i>scapularis</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 171.	Madagaskar
<i>scita</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 731.	Guatemala
<i>semirufa</i> Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455.	Chile
<i>spectabilis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 4.	Madagaskar
<i>testacea</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 840.	„
<i>tibialis</i> Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 131; Hist. Nat. I, 1837, p. 186, t. 13, f. 4. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 36, t. 1, f. 11.	„
<i>vermicularis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 189.	Birma
<i>virgula</i> Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 243.	Neu-Seeland
<i>viridans</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 189.	Sumatra, Java, Ostindien
<i>Warburgi</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 82.	Celebes

4. Subtribus: **Leptochiri.****Leptochirus** Germ.

Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 35. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 824. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 125. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—1864 (1865), p. 12. — Sharp, Tr. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420; Biol. Centr.-Amer. 1882—1887 (1887), I, 2, p. 733. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 180. — Heller, Abhdl. Mus. Dresden VII, Nr. 3, p. 6—7. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 113.

Biologie: Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 190. — Candèze, Mem. Soc. Sc. Liege 1861, p. 333, t. 1, f. 4, p. 334.

Subgen. **Leptochirus** s. st. Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- | | |
|--|--|
| angustulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 736. | Kolumbien,
Venezuela |
| brasilianus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 128. | Brasilien |
| cephalotes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 740. | Mexiko |
| diversus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 129. | Mexiko,
Guatemala |
| edax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 736. | Mittel-
Amerika- |
| fontensis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 420. | Amazon. |
| gastralis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130. | Brasilien |
| gracilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 738. | Panama |
| incertus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 129. | Peru |
| Klimschi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 281. | Süd-
Brasilien |
| Kolbei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 127. | Bolivien |
| laeviventris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 16. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126. | Bolivien,
Neu-
Granada,
Ecuador,
Brasilien |
| mexicanus Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 19, t. 1, f. 3. | Mexiko |
| quadricollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 739 (veris). — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 123. | |
| molossus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 735. | Mittel-
amerika |
| novus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 127. | Ecuador |
| paradoxus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 128. | „ |
| punctiger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 738. | Mexiko |
| ramosus Sharp, l. c. p. 740. | Mexiko |
| scoriaceus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 35, t. 1, f. 1. — Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 825. | Brasilien,
Paraguay |
| coriaceus Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306, t. 32, f. 4. | |
| serriger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 738. | Mexiko |

- Sharpi** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 16. — Bernh. Mexiko
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130.
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—
 1887 (1887), p. 739.
tenuicornis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130. Brasilien

Subgen. **Mesochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- arcifer** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. — Bernh. Bolivien,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 131. Peru
brunneoniger Perty, Del. anim. 1830—34, p. 32, t. 7, Brasilien
 f. 7. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 17.
cayennensis Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 125,
 t. 4, f. 5.
extimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—1887 Mexiko
 (1887), p. 735.
latro Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 421. — Amazon.
 Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 124.
maxillosus F. Syst. El. II, 1801, p. 93. — Er. Gen. Spec. Brasilien,
 Staph. 1839—40 (1840), p. 825. — Fauv. Bull. Antillen,
 Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 18, t. 1, f. 2; Trinidad
bicolor Lucas, Voy. Cast. Amer. Sud 1857, p. 51.
 var. *anthracinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, Mittel-
 p. 17. Amerika,
 Brasilien,
 Peru
 var. *bolivianus* Heller, Abh. Mus. Dresden 1898— Bolivien,
 99, p. 9. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, Peru
 p. 124 nota. Kolumbien
collaris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. Brasilien,
tenuis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 132. Bolivien
truncatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. „

Subgen. **Tropiochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- Helleri** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 132. Peru
Proteus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), Kolumbien,
 p. 16. Venezuela
maxillosus Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 825 (pars).

Subg. **Strongylochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- Atkinsoni** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182. Birma
laevis Cast. Hist. nat. I, 1840, p. 186. Sunda-Inseln
laticeps Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826.
Idae Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 19 nota.
Loriae Hell. Abh. Dresd. Mus. VII, 3, 1898—99, p. 14. Sumatra

- quadridens** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 501.
 var. *uniformis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 9.
 var. *major* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903,
 p. 126.

Ostindien
 Ostindien,
 Sunda-
 Inseln,

35

Borolinus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 116, 133.

- antilope** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.
 var. *nigripennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902,
 p. 10.
borneensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 133.
javanicus Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 126, t. 4, f. 6.
 — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 817.
 var. *nigricollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902,
 p. 10.
minutus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 186.
bispinus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 827.
 var. *cruentus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.

Birma
 Sumatra
 Borneo
 Sunda-Inseln
 Luzon
 Ost-Indien,
 Sunda-Inseln
 Malacca,
 Sumatra,
 Borneo
 Sumatra
 Birma

- var. *inermis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.
semirufus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.

5

Priochirus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 740. — Heller,
 Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 9. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1903, p. 114, 135.

Biologie: Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 190, t. 3, f. 3a.

Subgen. **Triacanthus** Bernh.

Bernh. Deutsche Zeitschr. 1903, p. 136.

- alutaceus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 149.
apicalis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 68.
bifurcatus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 74.
bipunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895 p. 180.
 var. *nigrita* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 13.
caviceps Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 408.
ceylanensis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12.
Doriae Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.
Gestroi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 147.
immarginatus Bernh. l. c. p. 147.
integrifrons Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99,
 p. 18.
Kraatzi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 150.
Modiglianii Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 150.
 var. *punctiventris* Bernh. l. c. p. 151.
neptunus Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.

Sumatra
 Ost-Indien
 Neu-Guinea
 Birma,
 Siam
 Malacca,
 Sumatra
 Sumatra
 Ceylon
 Borneo
 Sumatra
 Perak
 Celebes
 „
 Sumatra
 „
 Java, Sumatra

- parabolicus* Hell. l. c. p. 18. Celebes
Poseidon Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 148. Sumatra
subnitidus Bernh. l. c. p. 149. „
subtridens Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19. Celebes
sulcifer Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12. Sumbawa
sumatrensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 146. Sumatra
tonkinensis Bernh. l. c. p. 148. Tonkin
tridens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 502. Ost-Indien
 var. *insularis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139. Mentawai
 var. *trifidus* Bernh. l. c. Java
 var. *depressus* Bernh. l. c. Sumatra
unicolor Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 125. — Er. Gen. Spec. Sunda-Inseln
 Staph. 1839—40, p. 826.
 coronatus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 146.

Subgen. *Cephalomerus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139.

- bifoveatus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 69. Sikkim
combustus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10. „
ducalis Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 15. Sumatra
exaratus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 406. Birma, Perak,
 Java
Fauveli Hell. Abh. Mus. Dresd. VII, 1898—99, p. 15. Sumatra
hoplites Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182. Birma,
 Sumatra
japonicus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 468. Japan, China
 Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 11.
micrognathus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 13. Sikkim, Siam
pygmaeus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859 p. 191. Ost-Indien,
 Sumatra
sanguinosus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 501. Ost-Indien,
 Java

Subgen. *Pseucodontus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140.

- mandibularis* Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 189, t. 3, f. 3a—b. Ceylon

Subgen. *Stigmatochirus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

- Dohrni* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 19. — Bernh. Sumatra
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 151.

Subgen. *Leptarthrus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

- longicornis* Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 14. Ost-Indien

Subgen. **Syncampsochirus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

Albertisi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 188, t. 1, f. 4.	Neu-Guinea
alternus Fauv. l. c. p. 191, t. 1, f. 8.	
forticornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 185.	Samoa
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 250.	
— Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.	
Lorquini Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 190, t. 1, f. 6.	Neu-Guinea, Molukken
miles Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 152.	Cooktown
politiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 15.	Neu-Guinea
propinquus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 152.	
quadrifidus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 194, t. 2, f. 13; XV, 1879—80, p. 73.	Molukken
samoensis Blanch. Voy. Pole Sud Ent. 1853, p. 54, t. 4, f. 11.	Polynesien
spinosulus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 190, t. 1, f. 7.	Neu-Guinea

Subgen. **Catacamptus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

cilifrons Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 16.	Celebes
extensus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 189.	Neu-Guinea
frater Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 17.	Celebes
impressifrons Hell. l. c. p. 17.	Celebes

Subgen. **Plastus** Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

antennarius Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 187, t. 1, f. 3.	Neu-Guinea
ascedens Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 171.	Birma
Beccarii Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 191, t. 1, f. 9.	Aru, Neu-Guinea
brachycerus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 191.	Ceylon
cavifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 194, t. 2, f. 14.	Ins. Key
conicicollis Fauv. l. c. p. 189. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144	Neu-Guinea
convexus Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 132.	Madagaskar
ebeninus Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826.	
excavatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 502.	Ost-Indien, Sumatra, Borneo
Freminvillei Le Guillon, Journ. Instit. IX, 1841, p. 280.	Samoa
— Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144.	
galeatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.	Sumatra
heterodon Fauv. l. c. p. 14.	Deutsch-Neu-Guinea
inaequalis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 153.	Neu-Guinea
luzonicus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 143; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179.	Luzon, Celebes

- monilicornis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 193, t. 2, f. 11; XV, 1879—80, p. 73. Neu-Guinea, Aru, Australien
Haakei M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 142. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 143 nota.
- opacicollis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 193, t. 2, f. 12. Neu-Guinea
- parcus** Fauv. l. c. p. 187, t. 1, f. 2. „
- ruficus** Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 16. Celebes
- sexdentatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 153. Sumatra
- simplex** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 15. Deutsch-Neu-Guinea
- sinuatus** Fauv. l. c. p. 14. Neu-Guinea
- taurus** Fauv. l. c. p. 14. „
- tetraodon** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 154. Sumatra
- vitulus** Fauv. Ann. Mus. Genov. XII, 1878, p. 195, t. 2, f. 15. Neu-Guinea
- Weißi** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 172. Tonkin

Subgen. **Priochirus** s. str. Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

- bicornis** Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 20. Mexiko
- brevicornis** Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 827. Java, Ost-Indien
- centralis** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 18. Guatemala
- collaris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 742. „
- comes** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 11. Sumatra
- dilutus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 741. Panama
- divergens** Sharp, l. c. p. 742. „
- haemorrhous** Sharp, l. c. p. 741. Guatemala
- laticornis** Sharp, l. c. p. 742. Mexiko
- laxus** Sharp, l. c. p. 741. Brit.-Honduras, Guatemala
- parvicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 18. Kolumbien
- Salvini** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 742. Guatemala
- socius** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 154. Sumatra

Thoracochirus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 116, 155.

- aspericollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 20. Java
- Foersteri** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156. Sumatra
- nanus** Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, 1898/99, p. 14. Mentawai
- piestoides** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 19. Sumatra
- var. *cribrellus* Fauv. Mitth. Mus. Hamb. XXII, 1905, p. 77. Java
- Raffrayi** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21. Sumatra, Penang
- rugosus** Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 74. Neu-Guinea

Simoni Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21.
variolosus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 183.
verrucifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182.

Ceylon
 Birma
 Tenasserim

9

5. Subtribus: **Lispini**.

Ancaeus Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 60. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 716.

Holotrochus (pars) Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 387.

circumductus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 26.

Sumatra,
 N.-Guinea
 Amazon.

clavipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 391;
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 718.

cordicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 296.

crassicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 716.

Madagaskar
 Guatemala

exiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 830.

Kosmopolit
 der Tropen

— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 59.

aruensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 200.

Fauveli Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 392.

laevigatus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.

pallescent Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1902, p. 126.

rufescens Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 718.

var. **piceus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 27.

Neu-Guinea

incisus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 26.

megacephalus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 61.

Mexiko

— Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 717.

minutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 717.

Guatemala

nitidissimus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 10.

politus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 718.

Engano
 Guatemala

porrectus Sharp, l. c. p. 717.

„

11

☪ **Lispinodes** Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 54.

americanus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 226

Brasilien,
 Argentinien

bistriatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.

bisulcatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 32.

Ost-Indien
 Sumatra

crassus Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 542.

Hawai

duplicatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 197.

Aru, Borneo

explicandus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53; Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 540.	Hawai
germanus Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 542.	„
hawaiensis Sharp, l. c. p. 541.	„
heteroderes Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30.	Ost-Java
kauaiensis Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 541.	Hawai
mauiensis Sharp, l. c. p. 541.	„
molokaiensis Sharp, l. c. p. 540.	„
obscurus Sharp, l. c. p. 541.	„
oxytelinus Sharp, l. c. p. 540.	„
pallidus Sharp, l. c. p. 540.	„
rugosus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 31.	Sumatra, Java
seriatus Fauv. l. c. p. 31.	Birma, Sumatra, Borneo

Holosus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 496.

aberrans Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 78.	Ceylon
ambigenus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 183.	Birma
basicollis Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 166.	Congo
brevipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 77.	Hongkong, Ost-Indien, Sumatra
conuriformis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 499.	Ost-Indien
elegans Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 15.	Sumatra
fossulatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 495.	Ost-Indien
foveolatus Motsch. l. c. p. 496.	„
insularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 77.	Sunda-Inseln
mycetoporiformis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 500.	Ost-Indien
olisthaeriformis Motsch. l. c. p. 500.	„
parcestriatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 76.	Java
pennifer Fauv. l. c. p. 76.	Anam
plicatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 14.	Sumatra
politulus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 199.	Neu-Guinea
singularis Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 30.	Zanzibar
sinuatus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 217.	Mentawai-Ins.
substriatus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 199.	Ins. Aru
sumatrensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 15.	Sumatra
tachiniformis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 498. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, t. 3, f. 5 a—b.	Ost-Indien
tachyporiformis Motsch. l. c. p. 498.	„
tenuicornis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 236. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 13.	Kamerun, Gabun

Lispinus Er.

- Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 828. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 126. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 44; Not. Ent. II, p. 40. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 411.
- acicularis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80. Java
- acupunctus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 137. Togo, Gabun
- aequalis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 205. Neu-Guinea,
Ins. Key
Neu-Mexiko
- aequipunctatus** Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1868, p. 50.
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877 — 1878, p. 177.
- aethiops** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 138. Togo, Sierra Leone
- agnatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 297. Madagaskar
- alutaceus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 205. Neu-Guinea
- anguinus** Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 54. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 720. Mexiko,
Antillen
- angustatus** Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 829, t. 2, f. 6. Madagaskar
- apicalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 413. Amazon.
- asper** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 466. Japan
- attenuatus** Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 828. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 48. Portorico
- bicolor** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 721. Guatemala,
Brit.-
Honduras
- binotatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 81. Neu-Guinea
- birmanus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 184. Birma,
Tenasserim
- breviceps** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 9. Mexiko
- brevicollis** Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 56. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 722. Mexiko,
Guatemala,
Nicaragua
- brevicornis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 187. Ost-Indien
- caledonicus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 481. Neu-Caledonien
- californicus** Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 59. Californien
- castaneus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 206. Neu-Guinea
- catena** Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1876, p. 412; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 719. Amazonas,
Nicaragua
- cavipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 177. Madagaskar
- coarcticollis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 186, t. 3, f. 6. Ost-Indien
- cognatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 415. Amazonas
- colossus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172. Madagaskar
- coriaceus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185. Birma,
Tenasserim,
Java
- curticollis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 204. — ? Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12. Ins. Key,
Java
- dejectus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 721. Tonkin,
Guatemala
- depressus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417. Amazonas
- elongatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12. Sumatra

- externepunctus** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 235.
Fauveli Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 720.
tenellus Chevr. et Fauv. (nec. Er.) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 443; Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 53.
foveatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 204.
fulvus Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 495.
granadensis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 52.
— Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 719.
holosinus Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 95.
impressicollis Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 495. — Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 186. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 150.
filiformis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205.
quadratus Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 125.
var. *longulus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 101.
impressithorax Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290.
insignicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 293.
insularis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 442.
laetus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.
laeviusculus nom. nov. Bernh.
laevigatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 193 (nec Kr. in Archiv Naturg. 1859, I, p. 188).
laevior Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 203.
laevipennis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 185.
laticollis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 828. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 49. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 718.
linearis Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 829.
lineipennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 202.
longicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 722.
lucens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 322.
macropterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 78.
microcephalus Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 319.
modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 415.
nigrifrons Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 443.
nitidus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 203.
nitdiventris Bernh. Denkschr. med. nat. Ges. Jena 1908, p. 101.
obscurus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298.
obscurus Lec. New. spec. Col. I, 1863, p. 59. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 89.

Kamerun
Mittel-
Amerika,
Kolumbien,
Antillen
Neu-Guinea
Ost-Indien
Grenada,
Nicaragua,
Mexiko,
Guatemala
Deutsch-
Ostafrika
Ost-Indien,
Ceylon,
Hongkong,
Hawai,
Madeira,
D.-Afrika,
Comoren
Japan
Taïti
Deutsch-
Ostafrika
St. Domingo,
Mexiko,
Grenada,
St. Vincent
Amazonas
Paraguay
Neu-Guinea
Ceylon
Cuba,
Panama
Kolumbien
Java,
Neu-Guinea
Panama
Brasilien
Celebes
Ins. Bourbon
Amazonas
Cuba
Neu-Guinea
Deutsch-
Ostafrika
Madagaskar
Californien.
Arizona

- opacus* Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 55.
parvipennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 318.
planellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 722.
planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 416; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 720.
linearis Fauv. (nec Er.) Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 51; Rev. d'Ent. X, 1891, p. 89.
politulus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 114.
prolixus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 250. — Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 178.
pubiventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 10.
punctatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 414.
quadrillum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 76.
quadripunctulus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 49. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 718.
quadrinotatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.
rivularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1906, p. 214.
rufulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194.
rugipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.
sculpturatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 721.
sculptus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.
sidneensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 481.
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.
sobrinus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 47; Not. Ent. II, 1864, p. 43.
specularis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 11.
strigiventris Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 186.
striola Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 829. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 442; Not. Ent. II, 1864, p. 46. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 719.
sublucens Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 184.
subopacus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 187.
sulcatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 79.
sulcipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 27.
strictus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 225.
tardus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 719.
tenellus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 830. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 57.

Kolumbien
Madagaskar
Panama

Amazonas,
Mexiko

Seychellen
New-York

Gabun

Amazonas
Neu-Guinea

Caracas,
Kolumbien,
Mittel-
amerika,
Grenada,
Amazonas
Ost-Indien,
Sunda-
Inseln
N.-S.-Wales

Gabun
Java
Guatemala

Ceylon
Sydney

Amazonas,
Bolivien,
Brasilien
Caracas,
Col. Tovar
Ins. Nias

Ost-Indien

Süd-Amerika,
Mittel-
Amerika

Tenasserim,
Java
Ceylon

Neu-Guinea
Queensland

Brasilien
Panama

Kolumbien,
Caracas

- flavipennis* Fauv. l. c. p. 58. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 721. Mexiko,
Nord-
Amerika
tenuis Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Ceylon
tenuicornis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 187.
terminalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 413. Amazonas
testaceus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188. Ceylon
unistriatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 202. Neu-Guinea
usambarae Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 293. Deutsch-Ost-afrika
validicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 79. Queensland
varians Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 296. Madagaskar

94

6. Subtribus: **Thoracophori.****Espeson** Schauf.

- Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 45; Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882—83, p. 168. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, t. 1, f. 16; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.
crassulus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35. Antillen,
Guade-
loupe,
St. Vincent
crenicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 196, t. 1, f. 16; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35. Ins. Key,
Gilolo
euplectoides Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 37. Guadeloupe
mexicanus Fauv. l. c. p. 37. Mexiko
microphthalmus Fauv. l. c. p. 36. Franz.
Guyana
moratus Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 45; Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882—83, p. 168. St. Thomas
nitens Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 36. Brasilien
Guadeloupe
Novae-Guineae Fauv. l. c. p. 37. Neu-Guinea

8

Bothrys Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.

- personatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 186. Birma,
Sumatra

1

Diploopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 33.

- alternans* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 34. Bahia
laevipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 323. Paraguay

laeviuscula Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35.
multicostata Fauv. l. c. p. 34.

Bahia

”

4

Rhopalophorus Bernh.

Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 227.

Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 228. Argentinien

1

Thoracophorus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou V, 1837, p. 98 (*Thoraxophorus*); Bull. Moscou XIII, 1840, p. 197; Etud. Ent. VIII, 1859, p. 66. — Fauv. Faune Gallo-Rhén. III, 1872, p. 14. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 725. — Ganglb. Käfer Mitteleuropas II, 1895, p. 687.

Glyptoma Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 908 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 148. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1047. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 62. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 62; (2) I, 1868, p. 59. — Muls. et Rey, Brévip. 1879, p. 392 (nec *Glyptoma* Motsch., Sharp).

Subgen. **Thoracophorus** s. str.

- aequalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 727. Guatemala
- Alluaudi** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115. Seychellen
- Blackburni** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53; Trans. Dublin Soc. III, 1885, p. 227; Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 538. Hawai
- Bonvouloiri** Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 59. Santiago
- brevicristatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 332. Nord-
- Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1865, p. 176. Amerika,
- var. *deletus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 32. Mexiko
- brevipennis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53. Réunion,
- certatus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 465. Philippinen
- corticinus** Motsch. Bull. Moscou V, 1837, p. 98, t. 7, f. A. — Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 909. Hawai
- Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1048. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 24, f. 116. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872, p. 15. — Muls. et Rey, Brévip. 1879, p. 394. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 688. Japan
- costalis** Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 909. Mitteleuropa
- crassus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 419. Nord-
- curtipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 256. Amerika
- *brevipennis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 244. Brasilien
- denticollis** Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 910. Neu-
- discretus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 727. Caledonien
- Portorico
- Guatemala
- Panama,

<i>exilis</i> Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 910.	Brasilien
<i>filum</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728.	Guatemala
<i>Heyeri</i> Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 101.	Brasilien
<i>longicollis</i> Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 68.	Nordamerika,
<i>pallidus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728.	Guatemala
<i>pusillus</i> Sharp, l. c. p. 727.	"
<i>ruficollis</i> Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 65.	Mexiko
<i>Sallaei</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 725.	Mexiko,
<i>sculptilis</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 910.	Guatemala
<i>sculptus</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 26.	Kolumbien
<i>sordidus</i> Blackb. l. c. p. 26.	Australien
<i>subnitidus</i> Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 66.	"
<i>Truquii</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 726.	Ost-Indien
	Mexiko

Subgen. *Stilbogastrus* Bernh.

Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 285.

<i>nitidus</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 285.	Brasilien
---	-----------

27

Calocerus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 88.

Glyptoma Er. (pars) Gen. 1839—1840 (1840), p. 908. — Motsch. Etudes ent. VIII, 1859, p. 67. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 723.

<i>cicatricosus</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 494.	Kolumbien,
	Venezuela
<i>cognatus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 724.	Guatemala
<i>crassicornis</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 908, t. 2, f. 9.	Kolumbien,
	Venezuela
<i>cribrellus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887) p. 724.	Guatemala,
	Panama
<i>hirticornis</i> Sharp, l. c. p. 724.	Guatemala
<i>Klimschi</i> Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 285.	Brasilien
<i>laeviceps</i> Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 723.	Panama
<i>longipes</i> Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 723.	Guatemala
<i>nitens</i> Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 284.	Brasilien
<i>nitidus</i> Bernh. l. c. p. 284.	Paraguay
<i>obscuricollis</i> Bernh. l. c. p. 284.	Brasilien
<i>opacus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 418.	Amazon
<i>punctatoplicatus</i> Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1870, p. 267.	Cayenne
	Brasilien

Aneucamptus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 725.

excisicollis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 68.

Panama

1

2. Tribus: Micropeplini.

Micropeplida Heer, Fn. Helv. I, 1838—1841, p. 169.

Micropeplini Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1049.

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766.

Micropeplidae Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 194. — Leconte, Classif. Col. North. Amer. I, 1862, p. 72. — Fauvel, Fn. Gallo-Rhén. III, 1872, p. 8.

Micropeplides Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 205. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1888, p. 153.

Micropeplinae Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 747. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.

Micropeplines Motschulsky, Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 541.

Micropeplus Latr.

Latr. Gen. Crust. Ins. IV, 1809, p. 377. — Er. Käf. Mark Brand. 1837, p. 646; Gen. et Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 911. — Lacord. Gen. Col. 1854, p. 150. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 82. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1050. — Thoms. Skand, Col. IV, 1863, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 8. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 153. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 365—367. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), I, 2, p. 747. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766. — Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.

Biologie: Lubbock, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 275, t. XIII.

acumen Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 747. Guatemala

brunneus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 326. Russ.

caelatus Er. Käf. Mark. Brand. 1837, p. 647; Gen. Spec. 1839—1840 (1840), p. 912. — Kraatz, Nat. Ins. Dtschl. 1856—58, p. 1053. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 769. Amerika
Deutschland,
Schweden

calabricus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 484. Calabrien

caspicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 226. Lenkoran

cribratus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Georgien
(Amerika)

fulvus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 912. Mittel-
— Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1054. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 165. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 769. Europa,
Süd-
Europa,
Algier

angulosus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 542.

- ferrugineus* Motsch. l. c. p. 541.
Margaritae Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 82, t. 28, f. 139. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 68.
 var. *japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 101. Japan
- graecus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 228. Griechenland
- laevipennis** Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX, 1880, p. 213. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 771. Ungarn, Siebenbürgen, Ost-Sibirien
- interstitialis* Sahlb. Sv. Ac. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 112.
- laticollis** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 199. Russ. Amerika
- latus** Hampe, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 65. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb.-Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. Croatien
- longipennis** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 69. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1883, p. 159. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Caucasus
- staphylinoides* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1053.
- Eppelsheimi* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 514.
- Marietti** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. Mitteleuropa, Italien, Brit. Kolumbien, Alaska
- obliquus** Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 252. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 170. Brit.-Kolumbien
- obsoletus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1886, p. 364—65; Ann. Soc. Ent. Fr. XXX, p. 169. Frankreich, Corsica
- Devillei* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 203.
- porcatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 530. — Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 35, t. 4, f. 33. — Er. Käf. Mark Brand. 1837, p. 646; Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 911. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1052. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 156. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 768. Europa
- Mathani* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. V, 1860, p. 256.
- sulcatus* Hbst. Käf. V, 1793, p. 247, t. 54, f. 6.
- punctatus** Lec. List. Col. N.-Amer. 1863, p. 26. Sitkha
- costatus* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325.
- sculptus** Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Georgien (Amer.)
- Sikkimi** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 8. Sikkim

- staphylinoides* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 137. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 913. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 167. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 769.
Duvali Fauv. Bull. Soc. Norm. V, 1860, p. 261.
fulvus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—1861, p. 82.
Maillei Guér. Ic. Ins. t. 10, f. 4a. — Cast. Hist. nat. I, 1835, p. 193.
obtusius Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 201. — Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 407.
ab. *intermedius* Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 3—11.
var. *laticollis* Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 98.
tesserula Curtis, Brit. Ent. 1823—1840, V, p. 204. — Er. Gen. Spec. 1839—40, p. 913. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 1055. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 11. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1883, p. 170. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770.
baicalicus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 541. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 112.
costatus Lec. Agassiz Lake sup. 1850, p. 221.
costipennis Mäkl. Bull. Moscou XXVI, 1853, III, p. 200.
staphylinoides Gyll. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 213. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 169.
vulcanus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 9.

Mittel- u.
Süd-
Europa

Europa,
Caucasus,
Ostsibirien,
Nord-
amerika

Sikkim

2

Kalissus Lec.

Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 50.

nitidus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 51.

Ins.
Vancouver

1

3. Tribus: **Pseudopsini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 690.

Pseudopsinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Pseudopsis Newm.

Newman, Ent. Mag. II, 1834, p. 313. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 149. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 81. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22.

— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 691.

adustipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455. Chile

detrita Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 226.

Süd-
Kalifornien

minuta Fall, l. c. p. 226.

obliterata Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, p. 511.

Colorado

sulcata Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 314. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 50. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1858—1861, t. 28, f. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 23. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 208. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.

Europa,
Caracas

columbica Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 11.

6

4. Tribus: **Phloeocharini.**

Phloeocharini Er. Käf. Mk. Brdbg. I, 1837—1839, p. 612; Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 842. — Kraatz, Natg. Ins. Dtschl. II, 1856—1858, p. 1034 (excl. *Pseudopsis*). — Fauv. Fn. gall-rhén. III, 1872, p. 20 (excl. *Pseudopsis*). — Lec. and Horn, Classif. Col. North-Amer. 1883, p. 101 (excl. *Pseudopsis*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.

Phloeocharides Lacord. Gen. Col. II, 1859, p. 130.

Phloeocharina+*Olisthaerina* Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 113, 175.

Phléochariens Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 191 (excl. *Pseudopsis*).

Phloeocharina Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708.

Phloeocharinae+*Olisthaerinae* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 14.

Phloeocharis Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 612; Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 844. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 64. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1037. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 113. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 20; Rev. d'Ent. I, 1882, p. 138. — Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 196. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, 1895, p. 693.

Subg. *Scotodytes* Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 18.

— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 200.

Thermocharis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22.

acutangula Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 93.

Tunis

antipodum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 483. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. 1888, p. 191.

Australien

australis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 257.

Neu-
Kaledonien

- Biroi** Eppelsh. Term. Füzet. XVII, 1895, p. 220 (*Scotodytes*). Croatien
- brachyptera** Sharp, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1873, p. 266 (*Scotodytes*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. p. 2. Spanien
- umbratilis** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 288.
- conurella** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 11. Algier
- corsica** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. p. 1 (*Scotodytes*). Corsica
- Diecki** Sauley in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 90, t. 2, f. 2 (*Scotodytes*). Asturien
- Fauveli** Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 273. Ariège
- ichnusae** Dod. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 404 (*Scotodytes*). Sardinien
- laticollis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 25 (*Scotodytes*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1905, p. 695. Piemont
- longipennis** Fauv. Cat. Syst. Staph. 1872, p. II, nota. Syrien
- microptera** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 156. Canigou
- Normandi** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 202. Ost-Pyrenaen
- paradoxa** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 19. „
(*Scotodytes*.)
- coeca** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 48; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22, t. 1, f. 4. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 411.
- subclavata** Muls. et Rey, Op. Ent. XIV, p. 207; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 194.
- parallela** Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLII. Algier
- subtilissima** Mannerh. Brachél. 1830, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1839, p. 612; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 845. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1038. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 117. Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 114. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 21. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 694.

17

Ecbletus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708.

- simplex** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708. Panama

1

Charhyphus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 709.

- brevicollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 709, t. 18, f. 25. Guatemala

1

Derops Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 418.

longicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 418.

1

Olisthaerus Heer.

Heer, Fn. Helvet. I, 1838—42, p. 183. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, (1840), p. 843. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 131. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 64, t. 23, f. 115. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 175. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 19. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 192. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, 1895, p. 695.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — J. Sahlb. Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. XVII, nr. 4, p. 105.

megacephalus Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 56. — Heer, Lappland
Fn. Helv. I, p. 173. — Er. Gen. Staph. 1839—40,
p. 843. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II,
1858, t. 23, f. 115. — Thoms. Skand. Col. III,
1862, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 20 nota. — Muls. et Rey, Ann. Lyon. XXV,
1878, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 696.

laticeps Lec. Agass. Lake super. 1850, p. 219.

Canada

nitidus Lec. in Agassiz, Lake super. 1850, p. 219.

substriatus Gyll. Ins. Spec. II, 1808—1828, p. 233. — Lappland
Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 173. — Er.
Gen. Staph. 1839—1840, p. 844. — Thoms.
Skand. Col. III, 1862, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-
rhén. III, 1872, p. 20. — Muls. et Rey, Ann.
Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 195. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 697.

3

5. Tribus: **Proteinini**.

Proteinini Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 641 (excl. *Micropeplus*); Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 901 (excl. *Glyptoma*, *Micropeplus*). — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1019. — Rye, Ent. Monthly Mag. IV, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 226.

Proteinides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 145.

Proteinites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 78 (excl. *Pseudopsis*, *Micropeplus*).

Omaliina Subtrib. *Proteinides* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217.

Protinini Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 24. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 105.

Protéiniens + *Phléobiens* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 217, 253.

Proteinina Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 743.

Proteininae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Phloeobium Boisd.

Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 492. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 907. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 148. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 80. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1032. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 24. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 764.

Metopsia Woll. Ins. Mad. 1854, p. 616.

ampliatum Woll. Ins. Mader. 1854, p. 616, t. 13, f. 7.

cimicoides Woll. Cat. Canar. 1864, p. 605.

clypeatum Müll. in Germ. Mag. IV, 1816, p. 204. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 646; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 907. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 28, f. 137. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1033. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 25. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 256. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 764.

refusum Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 331.

flavum Steph. l. c.

corticale Boisd. et Lac. Fn. Ent. Par. I, 1835, p. 494.

Madeira
Teneriffa
Europa

3

Proteinus Latr.

Latr. Préc. Car. Ins. 1796, p. 9. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 642; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 902. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 146. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 78. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1022. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pandellé, Mat. Cat. Gren. II, 1867, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 29 (*Protinus*). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 757.

Biologie: Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 402. — Rupertsberger, Biol. Liter. Käf. Eur. 1894, p. 126.

atomarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 904.

— Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1025.

— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. —

Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 169. — Muls.

et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 230.

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.

clavicornis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31.

Olivieri Sauley, Bull. Ac. Hippon. 1866, p. 51.

parvulus Lec. Smith. Misc. Coll. VI, 1867, p. 58.

altaicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 227.

basalis Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 324.

brachypterus F. Ent. Syst. I, 1, 1792—98, p. 235. — Latr.

Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 298. — Er. Käf.

Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 642; Gen. Spec.

Staph. 1839—40, p. 603. — Jacq. du Val, Gen.

Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 135. — Kraatz,

Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1024. —

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pand.

Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169. — Fauv. Fn.

gallo-rhén. III, 1872, p. 31. — Muls. et Rey,

Europa,
Canada

Altai
Sitkha
Europa

3

- Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 223. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
laevicollis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 180.
nigricornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 336.
nitidus Steph. l. c. p. 337.
ovatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 215.
 var. *lividipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV,
 1905, p. 228.
- *crassicornis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 100.
laevigatus Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 174.
 — *limbatus* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Muls.
 et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 225.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
 — *crenulatus* Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169.
Maeklini Fvl. Ab. V, 1868, p. 494; Bull. Soc.
 Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 195.
atomarius Er. var. *oblongus* Petri, V. V. Herm.
 1891, p. 22.
- *macropterus* Gyllh. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 209.
 — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 643;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 903. — Kraatz,
 Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1025.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. —
 Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 169. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31. — Muls. et
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 227.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.
- nigriceps* Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 55.
ovalis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 335. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
subsulcatus Steph. l. c. p. 336.
brevicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840),
 p. 903. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858,
 p. 1024. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867,
 p. 168. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXV, 1878, p. 220.
- planicollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 201.
- reflexicollis* Reitt. l. c. p. 226.
salebrosus Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. I, 1885, p. 323.
sulcatus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78,
 p. 195.

Japan
 Süd-Rußland
 Südl. Mittel-
 Europa,
 Caucasus,
 Nord-
 amerika

Nördl.
 Mittel-
 Europa

Chile
 Europa

Armenien,
 Araxes-Tal

„
 Kalifornien
 „

Anepius Blackb.

Blackb. Trans. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 29.

Koebeli Blackb. Trans. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 30. Australien

raucus Blackb. l. c. p. 30. „

Megarthrus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 330. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39,
 p. 643; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 904. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,

p. 147. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 79. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1026. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 25. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 232. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, p. 743. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 156. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xambeu, Moeurs Ins. VI, p. 109.

affinis Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1852, p. 28. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 350. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 27. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762.

Bellevoeyi Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 69, t. 2, f. 6. — Rye, Ent. Monthly Mag. 1868, p. 208.

sinuatocollis Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1029.

americanus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 149.

atratus Maekl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325.

basicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 87.

bimaculatus Fauv. l. c. p. 87.

birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.

Chobauti Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 179.

convexus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 100.

corticalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 468.

denticollis Beck, Beitr. 1817, p. 26, t. 7, f. 40. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 906. — Jacq.

du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 28, f. 136. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1030. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 219. — Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 5. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895 p. 762.

affinis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 333.

hemipterus var. a Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 355.

marginatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 333.

marginicollis Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 492. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 644.

rufescens Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 331, t. 27, f. 5.

depressus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 70. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 644; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 905. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1027. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 7. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 26. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762.

emarginatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 332.

Südl. Mittel-
Europa

Nord-
Amerika
Alaska,
Sitkha

Sikkim

Ceylon

Birma

Algier

Japan

„
Europa

- macropterus* Grav. Mon. 1806, p. 215.
pusillus Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 333.
excisus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 58. Canada
hemipterus Ill. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 597. — Europa
 Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 645;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 906. — Kraatz,
 Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1031. —
 Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 219. — Saulcy,
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 9.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. —
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878,
 p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 763.
depressus var. c. Gyll. Ins. Spec. II, 1808—1828,
 p. 699.
hemipterus var. b. Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 355.
melanocephalus Oliv. Ent. III, 1789—1808,
 42, p. 38, t. 4, f. 52.
nitiduloides Boisd. et Lacord. Faun. Ent.
 Par. I, 1835, p. 493.
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 99. Japan
impressicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, Baikal.
 p. 67.
longicornis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 615, t. 13, f. 9. Madeira
nitidulus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858 Mitteleuropa
 (1858), p. 1028. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 27. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXV, 1878, p. 248. — Ganglb. Käf. Mitt.-
 Eur. II, 1895, p. 763.
parallelus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 99. Japan
pictus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 39. — Sitkha
 Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 324.
Prosseni Schatzmayr, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, Kärnthen
 p. 212.
scriptus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469. Japan
serrula Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 76. Gomera
sinuatocollis Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Par. I, 1835, Europa
 p. 493. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 905.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. —
 Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70,
 t. 2, f. 8. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII,
 1868, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXV, 1878, p. 243. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762.
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala
 (1887), p. 743.
stercorarius Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, Pyrenaeen
 1877, p. 238.
Thomsoni Varenus, Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 22. Schweden
umbonatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194. Birma,
 Sikkim
zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala
 (1887), p. 743.

6. Tribus: Neophonini.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 98.

Neophonus.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 98.

Bruchi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 99.

Argentinien

1

7. Tribus: Omaliini.*Omaliini* Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 697.*Omaliini* Erichson, Kf. Mk. Brdbg. I, 1837—1839, p. 613; Gen.

Spec. Staph. 1839—1840, p. 846. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 904.

Omalides Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 132.*Omalites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 66.*Omaliina* Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 177 (excl. *Proteinides*).*Homalini* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 33.*Omalien*s Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 1.*Homalini* Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 103.*Omaliinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 744.*Omaliinae* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 16.**Tanyrhinus** Mannerh.

Mannerh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXV, 1852, II, p. 349. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 132. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 198, 230.

Tanyrrhinus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 2062.**singularis** Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 349. Alaska

— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—

78, p. 230; Not. Ent. VII, 1878, p. 66.

1

Trigonodemus Lec.

Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 231.

Trigonodesmus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 663.*Arimimelus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 105.

— Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1889, p. 473.

striatus Lec. New. Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Fauv. Nord-

Not. Ent. VII, 1878, p. 68.

Amerika

1

Anthobium Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 335. — Er. Käf. Mark Brandenb. I 1837—39, p. 637; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 890. — Lacord. Gen' Col. II, 1854, p. 145. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77

- Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1005. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 34.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 290. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 745.

Subgen. *Eusphalerum* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1003. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 293, 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 746.

Anthobium s. str. Ganglb. l. c. p. 746.

Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1900, p. 14.

- abdominale** Grav. Mon. 1806, p. 219. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 639; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 893. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1007. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 321. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. Mittel-Europa, Italien
- semicoleoptratum* Panz. Faun. Germ. Heft 24, 1794, nr. 6.
- aetolicum** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 129. Griechenland, Dalmatien, Herzegowina
- albipilis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 219. Süd-Tirol
- alpinum** Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842 (1838), p. 180. Mitteleuropa
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 48. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755.
- alpestre* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491.
- luteipenne* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 898. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1013.
- montanum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 897. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1012.
- subjectum* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 352.
- anale** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 898. „
 — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1011. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 45. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 358. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756.
- difficile* Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 87.
- longiusculum* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 670.
- longulum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 78. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1012. — Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 46. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 360.
- nivale* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 569.
- rhododendri* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 319.
- andicola** Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 51. Chile

- angusticolle** Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) V, 1869, p. 73; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 47. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756. See-Alpen, Piemont, Ligurien
- angustum** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 436. Pyrenäen
- atriceps** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. Caucasus
— Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 109.
- atriventre** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 431. Nord-Amerika
- atrum** Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 178. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 36. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 300. Mittel-Europa, Italien, Sizilien
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748.
- nigrum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 892. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009.
- aucupariae** Kiesw. Berl. Ent. Zeitsch. X, 1866, p. 288. Alpen, Sudeten, Karpathen, Pyrenäen
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 40. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 346. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Kalifornien
- aurifluum** Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 201. Calabrien
- Baudii** Fiori, Nat. Sic. 1894, p. 96. Sizilien,
- bivittatum** Eppelsh. Nat. Sic. VII, 1887, p. 45. Calabrien
- brachiale** Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 87. Algier
- californicum** Fauv. l. c. p. 199. Kalifornien
- caucasicum** Bernh. Münch. Kol. Zeit. III, 1908, p. 321. Caucasus
- clavipes** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 159. Apennin
- convexum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 201. Nord-Amerika
- cribrellum** Fauv., Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 218. Calabrien
- densipenne** Fauv. l. c. p. 218. Armenien
- diversicolle** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 428. Nord-Amerika
- elongatum** Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. West-Alpen
palligerum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 49.
- florale** Panz. Faun. Germ. 1789—1810, Heft 11, nr. 20. Mittel-Europa
— Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 891. Europa
— Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748.
- sorbi** Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.
- triviale** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 180.
- foveicolle** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1868, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 47. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755. Mitt.-Europa, West-Alpen, Pyrenäen
cribricolle Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 403.
- fraternum** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 432. Nord-Amerika
- fulvipenne** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 5, 1874, p. 210. Turkestan

- gilvipenne** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 428. Nord-Amerika
- granulipenne** J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 426; En. Col. Brach. Fenn. p. 216. — Mars. Abeille VII, 1871, p. 406. Lappland
- Heydeni** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LII, 1902, p. 704. Afghanistan
- hirtellum** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 2. Japan
- hispanicum** Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 362. Spanien
- Horni** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 202. Nord-Amerika
- Hummleri** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 320. Süditalien
- impressicolle** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 437. Pyrenäen
- japonicum** Bernh. Soc. Ent. 1909, p. 52. Japan
- Korbi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 192. Anatolien
- Kraatzi** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, t. 27, f. 134. — Ch. Brisout, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 43. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. Pyrenäen, Croatien, Bosnien
- longipenne* Jacq. du Val, l. c.
- lapponicum** Mannerh. Brachél. 1830, p. 52. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. Nord-Europa, Sudeten
- flavipenne* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 896. Ostsibirien
- limbatum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 894. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1008. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 38. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. Mittel-Europa
- ♀ *adustum* Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 182.
- ♂ *fuscipenne* Heer, l. c. p. 183.
- longipenne** Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839, p. 640; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 898. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1014. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 50. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 216. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. Mittel-Europa, Finnland
- Imhoffi* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 184.
- luteicorne** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 897. Spanien, Sizilien, Algier
- var. *maculicolle* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164.
- cincticolle* Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 448.
- macropterum** Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1015 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. Westalpen
- marginatum** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 463. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 890. Nord-Amerika
- Marshami** Fauv. Abeille V, 1868, p. 494; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 52. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Mittel-Europa
- collare* Crotch. Col. H. II, 1879, p. 101. Nördl. Appennin

- punctulatum* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 335.
sorbi var. b, c Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895.
torquatum Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1018.
metasternale Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. Algier, Oran, Madeira, Caucasus
microcephalum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hochh. I. c. XXXV, 1862, III, p. 108.
minutum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 254. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 638; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 896. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1010. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 44. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 305. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. Europa
appendiculatum Heer, Faun. Helv. I, 1838—42, p. 181.
brevicolle Heer, I. c. p. 568.
paludosum Heer, I. c. p. 179.
picipenne Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 337.
ranunculi Grav. Micr. 1802, p. 110.
 ab. *puncticolle* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 125.
miricolle Deville, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 1. Seealpen
montivagum Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 184; Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755. Westl. Mittel-Europa
sordidulum Kraatz, Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1013.
 ♂ *sparsum* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 370.
 ♀ *macropterum* Rey, I. c. p. 373.
nigerrimum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 427. Nord-Amerika
nigriceps Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 67; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 41, suppl. p. V. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. Corsica
nigriventre Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 544.
nitidicolle Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 114. Ost-Sibirien
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 46. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. Alpen
oblitum Fairm. Faun. Fr. I, p. 648. Pyrenaeen
obsoletum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 892. Spanien
obtusicolle Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, suppl. p. 48. Frankreich, Spanien
Octavii Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2), V, 1869, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39, t. 1, f. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 318. West-Alpen
 — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 399. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751.
ophthalmicum Payk. Faun. Suec. III, 1800, p. 409. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 894. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1017. Mitteleuropa
 — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 133. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 42, t. 1, f. 7. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 343. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752.

- luteum* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 128. — Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 338.
- pallidum* Grav. Mon. 1806, p. 217.
var. *discinum* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 127.
- pallens** Heer, Faun. Helv. I, 1838—42, p. 570. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. Alpen, Sudeten
- puberulum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 328. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1016.
- palligerum** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 78 nota. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1014 (nec Fauvel, Rey). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. Ost-Alpen, Albanien
- longipenne* var. Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 899 nota.
- parallelum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 476. Japan
- pollens** Sharp, l. c. p. 476. Japan
- pothos** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 235. Nordamerika
- dimidiatum* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 43.
- primulae** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 356. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. Mittel-Europa, Italien, Albanien
- cribrosum* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 568.
- florale* Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 472.
- nigricolle* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 357.
- triviale* Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 639; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 892. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1004. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 313.
- procerum** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 114. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Westalpen
- pruinsum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19. Corsica
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 42.
- pulcherrimum** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 654. Südtirol
- punctatum** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 429. Nord-Amerika
- rectangulum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 17; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 52. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 407. — Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 403. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752. Mittel-Europa
- sorbi* Letzn. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 360.
- rhododendri** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752. West- und Central-Alpen, Sardinien
- obliquum* Muls. Op. ent. XII, 1861, p. 168. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 340.
- robustum** Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 43. — Rey, Alpen, Pyrenäen,

- Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 294. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. — Deutsch-land
- ♀ *alpestre* Heer, l. c. p. 178.
- excavatum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 893. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009.
- rufoscutellatum* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508. — Caucasus
- rufotestaceum* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 111. — „
- rugulosum* Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1853, III, p. 199. — Russ. Amerika
- sareptanum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 423. — Caucasus
- Starcki* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 190.
- Scribae* Schauf. Sitz.Ber. Isis 1862, p. 147. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 160. — Spanien
- obscurum* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 361.
- segmentarium* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 322. — Sitkha
- signatum* Märkel, Allg. Nat. Zeit. 1857, III, p. 172. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1006. — Mittel-Europa, Italien
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 38. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 324.
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.
- Sikkimi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 88. — Sikkim
- sinuatum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 70; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 44. — Mars. West-Alpen
- Abeille VIII, 1871, p. 405. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 309. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.
- solitare* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 98. — Japan
- sorbi* Gyllenh. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 206. — Er. Europa
- Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 640; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1018. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 53. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 335. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752.
- ophthalmicum* Gravenh. Mon. 1806, p. 216.
- silesiacum* Letzner, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 359.
- testaceum* Gravenh. l. c. p. 218.
- sparsum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 49. — Alpen, Apennin
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753.
- ♂ *macropterum* Muls. et Rey, Brév. 1880, p. 373.
- stramineum* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1015. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. — Alpen
- laevipenne* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404.
- Stussineri* Bernh. Soc. Ent. 1909, p. 52. — Südtalien
- subangulatum* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 430. — Nord-Amerika

- tempestivum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 895. Italien, Corsica, Sardinien, Russland
- tibiale** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 429. Nord-Amerika
- torquatum** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1860, p. 107. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Westliches Mittel-Europa, Alger, Madeira, Groß-Brit., Pyrenäen, Italien
- mucronatum** Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 339.
- scutellare** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1016. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 329.
- testaceum** Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 489.
- var. **adustum** Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 438. Pyrenäen, Spanien
- adultum** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 156.
- pumilio** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 87.
- ustulatum** Fairm. Fn. Fr. I, p. 649.
- transcaasicum** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 705. Talysch-gebirge
- umbellatarum** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 439. Pyrenäen, Italien, Sizilien
- Viertli** Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748. Ungarn, Griechenland
- Zolotarevi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 55. Caucasus

95

Acrulia Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 56. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 285. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 745.

Biologie: Bagnall, Trans. Nat. Hist. Soc. New Castle I, 1907, p. 416.

angusticollis Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. Croatien

inflata Gyll. Ins. Suec. III, 1808—1828, p. 700. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 883. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1002. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 56, t. 1, f. 8. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 287. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 745. Mittel- und Nord-europa

corticalis Heer, Mitt. I, p. 76.

longicollis Gredl. Col. H. XII, p. 52.

egregia Rdtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1872, p. 550.

tumidula Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1853, III, p. 199. Russ.

Amerika

Pycnoglypta Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 198. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54, nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 269. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 583.

- arctica** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 586. Sibirien
- baicalica** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 544; Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 107. — Luze, l. c. p. 486, 588 (gen. dub.). Ost-Sibirien
- Heydeni** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 45. — Luze, l. c. p. 588. Amur
- lurida** Gyll. Ins. Suec. III, 1808—1828, p. 701. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 960. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54, nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 585. Nord-Europa, Nord-amerika
- sibirica** Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 24. — Mäkl. Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 44. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 109. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 587. Ost-Sibirien

5

Acrolocha Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50, et III, 1861, p. 201. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743.

- amabilis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 567. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 999. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 59. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 268. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. Mittel-Europa
- Hampei** Redtb. Faun. Austr. ed. II, 1858, p. 250.
- striata** Grav. Micr. 1802, p. 119. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 632; Gen. Staph. 1839—40, p. 882. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1000. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60, t. 1, f. 9, Suppl. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 262. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743. Europa
- minuta** Ol. Ent. III, 1789—1808, 42, p. 38, t. 6, f. 53.
- sulculus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 336. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 265. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. West-Europa, Corsica, Caucasus, Finnland
- striata** Boisd. et Lacord. Faun. Paris, I, 1835, p. 475.

3

Phyllodrepa Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, 52 et III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 547.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 576, t. 17, f. 49—55; Hist. Ins. Pin. marit. 54 (nach Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738 nicht zu *Phyllodrepa* gehörig). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126.

Subgen. **Phyllodrepa** s. str. Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 793.

- angustata** Mäkl. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 28; Ost-Sibirien
Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 43. —
J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4,
p. 110. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI,
1906, p. 555.
var. *obscuricornis* J. Sahlb. Ann. Mus. Petersb.
1897, p. 365.
- atra** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 420. Nord-
Amerika
- baicalensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII,
1903, p. 591. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien LVI, 1906, p. 485, 562. Ost-Sibirien
- cacti** Schwarz, Psyche VIII, 1899, Suppl. I, p. 9. Arizona
- Caseyi** nom. nov. Kalifornien
pacifica Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 421
(nec Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877,
p. 163).
- cribripennis** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—
78, p. 88. Algier
- floralis** Payk. Mon. Staph. 1789, p. 67. — Er. Käf. Europa
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 633; Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 879. — Kraatz,
Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 996.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. —
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
p. 234. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
LVI, 1906, p. 560. Caucasus
- Fahraei* Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 52.
- maculicornis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42,
p. 178.
- ruficornis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 352.
- rufipes* Fauv. (ex. p.) Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 62.
- viburni* Gravenh. Micr. 1802, p. 117.
- melanocephala** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 222. — Fauv. Europa
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 63. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 552,
- brunnea* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 63. —
Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 633;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 881. — Kraatz,
Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 995. —

- Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 239.
- nigra** Grav. Mon. 1806, p. 212. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 880. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 997. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 238. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 558.
- salicina* Gyll. Ins. Suec. IV, 1808—1828, p. 467. — Mannh. Brachél. 1830, p. 54.
- atra* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 178.
- rufipes* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 62 (ex p.).
- polaris** J. Sahlb. Ann. Mus. Petersb. 1897, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487.
- puberula** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 191. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 556.
- ruficornis* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 997 (nec Steph.).
- punctiventris** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 210; Not. Ent. 1878, p. 46.
- rufipennis** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 554.
- Sahlbergi** Luze, l. c. p. 561.
- crassicornis* J. Sahlbg. En. Ins. Fenn. 1876, p. 217; Svensk. Ak. Handl. 1880, 4, p. 110.
- salicis** Gyll. J. Suec. II, 1808—1828, p. 226. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 880. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 994. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1877, p. 62. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 553.
- crassicornis* Matthews, Zoologist 1863, p. 8650.
- strigipennis** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 320; XXVI, 1853, III, p. 197. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 554.
- translucida** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 998.
- turanica** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 209. (*Omalium*). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488.

Nord- und
Mittel-
europa

Novaja-
Semlja

Bosnien,
Krain,

Schweiz,
Deutsch-
land,
Spanien

Pennsyl-
vanien,
Missouri
Ost-Sibirien

Lappland,
Ost-
sibirien
Nord- und
Mittel-
Europa

Sitkha

Deutschland,
Vorarlberg
Turkestan

Subgen. **Dropephylla** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739.

atricapilla Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 191. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 565.

Altai

- caucasica** Kolen. Melet. ent. III, 1846, p. 28. — Luze, Verh. zool. bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 568. Caucasus, Kleinasien, Transcaspien
- clavigera** Luze, l. c. p. 566. Finnland
- curticollis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 182. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 573. Syrien
- Devillei** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 705. See-Alpen
- elegans** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II., 1856—1858, p. 989. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. Deutschland
- Gobanzi** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 650. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 563. Dalmatien, Italien, Sardinien, Griechenland
- gracilicornis** Fairm. Faun. Fr. I, p. 642. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 993 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 64. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 257. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 511. West-Europa, Preussen
- hiemalis* Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 355. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 67.
- ioptera** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 569. Nord- und Mittel-Europa
- brunnea* var. β Payk. Mon. Staph. 1789, p. 64.
- brunnea* var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 227.
- brunnea* var. l Gravenh. Mon. Col. Micr. 1806, p. 206.
- lucida* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 634; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 881. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 995. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 130. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 242.
- linearis** Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 53. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 636; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 884. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 990. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 66. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 564. Nord- und Mittel-Europa
- var. *scabriuscula* Kraatz, l. c. p. 988. — Fauv. l. c. p. 66. — Rey, l. c. p. 249. — Ganglb. l. c. p. 741. — Luze, l. c. p. 504.
- palpalis** Luze, l. c. p. 567. Italien
- philorinoides** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 485. Victoria
- puella** J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 111. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488. Ost-Sibirien
- Reitteri** Luze, l. c. p. 570. Lenkoran

seriata Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1903, p. 258.

Neu-Kale-
donien
Europa

vilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 882. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 993. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 65. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 572.
brevicornis Er. l. c. p. 884. — Rey, l. c. p. 251.
gracilicornis Rye, Ent. Ann. 1870, p. 88.
Heeri Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 571. — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 152.
obsoleta Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 254.
var. *perforata* Fiori, Att. Mod. 1899, p. 90.
var. *pulchella* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 572.

Subgen. *Hapalaraea* Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50 und III, 1861, p. 200. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739.

alutacea Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193.
megarthroides Fauv. Not. Ent. 1878, p. 44.
obesa Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89.
pygmaea Gyll. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 223. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 883. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1001. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 201. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 61, t. 1, f. 1. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 282. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742.
ulmi Motsch. Bull. Mosc. XXX. 1857, IV, p. 493.
rudis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 90.

Circassien
Kalifornien
Sumatra
Nord- und
Mittel-
Europa,
Corsica,
Nord-
Amerika

Sumatra

Subgen. *Hypopycna* Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 739. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 574.

rufula Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 883. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1000. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60, t. 1, f. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 575.
distincticornis Rey, l. c. p. 279.
marina Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 96.

Mittel-
Europa,
Mittel-
meergebiet

Subgen. *Dialycera* Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739, 743. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 576.

aspera Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 183. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 581.

Syrien

- Akbesiana* Pic, Rev. Sc. Bourbon XI, 1898, p. 91
(sec. Luze).
- bimaculata** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 578. Kleinasien
- distincticornis** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 402 nota. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 397. Piemont,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60. — Süd-
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 279. frankreich
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743. —
Luze, l. c. p. 577.
- subrugata* Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXIX.
- minuta** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 582. Galiläa
- Sekerae** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 242. Mittelitalien
- striatipennis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 321. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, p. 479. Caucasus

46

Omalissus Broun.

Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1042.

- castaneus** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1042. Neu-Seeland

1

Eunonia Cas.

Casey, Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 313.

- keeniana** Cas. Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 314. Brit.-
Columbien

1

Haida Keen.

Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285.

- Keeni** Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285. Queen Char-
lotte-Island

1

Omalius Grav.

Grav. Col. Micr. 1802, p. 111. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 874.
— Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl.
II, 1856—58, p. 974. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 76.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXVII, 1880, p. 189. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 744. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 733. — Luze, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien LVI, 1906, p. 501.

Anthobium Mannerh. Mém. Acad. Petersb. 1830, p. 53.*Homalius* Gemm. et Har. Cat. Col. II, p. 665. — Fauv. Fn.
gallo-rhén. III, 1872, p. 57 (ex parte).*Ochthexenus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 546. —
Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 493.

Biologie: Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xambeu, Moeurs I, p. 94; Natural. 1903, p. 55. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 164. — Mjöberg, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 140, f. 8.

Subgen. *Omalium* s. str. Luze.

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 505.

- | | |
|--|---|
| actobium Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1035. | Neu-Seeland |
| Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. X, 1888, p. 191. | Süd-Australien |
| africanum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 12. | Kiliman-dscharo |
| agreste Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 117. | Neu-Seeland |
| albipenne Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 162. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova 1877, p. 118. | Auckland |
| algarum Cas. Bull. Cal. Ac. Sci. I, 1885, p. 316. | Kalifornien |
| algidum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 12.
var. <i>signatum</i> Eichelb. Schwed. Ac. Wiss. 1908, p. 83. | Kiliman-dscharo |
| Allardi Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 44. — Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 324. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 75. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 520. | West-Europa, Mittelmeergebiet, Skandinavien |
| <i>genistarum</i> (<i>Anthobium</i>) Coq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164. | |
| <i>Salzmanni</i> Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1864, p. 658. | |
| alutaceum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 207, 215.; Not. Ent. VII, 1878, p. 51. | Kalifornien |
| angulatum Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 142. | Ceylon |
| antipodum Broun, Man. Nov-Zeal. Col. 1893, p. 1036. | Neu-Seeland |
| apicicorne Solsky, Fedt. Reise Turkest. 1874, p. 207. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 537. | Turkestan, Caucasus |
| arenarium Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 61. | Cap |
| asturicum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 221. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 536. | Asturien |
| australe Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 426. | Neu-Seeland |
| Balassogloi Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 66. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 525. | Turkestan |
| brevicolle Thoms. Op. Ent. X, 1869, p. 1033. — Luze, l. c. 1906, p. 486, 523. | Tirol, Schweiz, |
| <i>-lagopinum</i> J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 426; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 221; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 110. | Russland, Sibirien, Norwegen |
| <i>-strigicolle</i> Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 419. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 395. | |
| brevipenne Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 545. | Ost-Sibirien |

- caesum** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 209. — Er. Käf. Mark Brand. I, 1837—39, p. 630; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 981. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 214. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 539.
- corticinum** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.
- impressum** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 176.
- minus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218.
- oxyacanthae** Gyll. Fn. Suec. II, 1810, p. 27.
- rugatum** Rey, l. c. p. 217.
- var. **litorale** Kraatz, l. c. p. 980. — Thoms. l. c. p. 325. — Ganglb. l. c. p. 736.
- var. **subruficorne** Bagnall, Ent. Rec. XVIII, 1906, p. 72.
- callosum** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 205; Not. Ent. VII, 1878, p. 44.
- capito** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 423.
- carinigerum** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1036.
- Chalmeri** Broun, l. c. p. 1037. *actobium* Broun
- cinnamomeum** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1000 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 535.
- clavatum** Luze, l. c. p. 522.
- cognatum** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1037.
- conicum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 484.
- costipenne** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 301.
- crassicorne** Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 212.
- cribriceps** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 221. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 530.
- cribrum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 216.
- curtipenne** Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 30; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 44. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4., p. 110. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 514.
- curtillum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 473.
- debile** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1039.
- denticolle** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 475.
- diffine** Sharp, l. c. p. 474.
- diffusum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 207; Not. Ent. 1878, p. 43.
- divergens** Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 26.

Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Kalifornien

Durham

Sitkha

Nord-
Amerika
Neu-Seeland

„
Dalmatien,
Griechen-
land

Ostsibirien
Neu-Seeland

„
Madagascar
Australien

Syrien,
Persien,
Meso-
potamien

Nord-
Amerika
Ost-Sibirien

Japan

Neu-Seeland
Japan

„
Nord-
Amerika
Ost-Sibirien

- Escayraci** Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 659.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 521.
- excavatum** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 355. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 75, t. 1, f. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 544.
- caesum** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 215. — Mannh. Brachél. p. 53.
- conformatum** Hardy, Cat. Northumb. 1857, p. 97.
- fossulatum** Fr. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839, p. 630; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 877. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. 1858, II, p. 979. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218.
- exiguum** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 218. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 984. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 72. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 528.
- exsculptum** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 321.
- falsum** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 21. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 541.
- excellens** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 190.
- faustum** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 746.
- ferrugineum** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 980. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 74 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 224 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 533.
- flavidum** Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1896, p. 347.
- flavipenne** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 198. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 206.
- foraminosum** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 321.
- fractum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 212; Ent. Not. 1878, p. 48.
- funebre** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 99; Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 396. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 527.
- fusciventre** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 426.
- gayndahense** M^r Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1871, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 190 nota.

Syrien,
Cypern

Europa

Nord- und
Mittel-
europa,
Spanien

Nordwest-
Amerika
Caucasus,
Caspi-
Gebiet

Panama

Deutschland,
Sudeten,
Karpathen,
Ungarn,
Balkan-
halbinsel,
Ostalpen
Pennsyl-
vanien
Alaska

Russ.
Amerika
Kalifornien

Pyrenäen,
Alpen,
Transsyl-
vanien,
Elba

Neu-Seeland

Australien

- hamatum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 209; Not. Ent. 1878, p. 45. Michigan
- hebes* Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 116. Neu-Seeland
- hova* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 300. Madagascar
- humerosum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 209; Not. Ent. 1878, p. 45. Michigan
- humile* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 197. Alaska
- japonicum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 98. Japan
- imitator* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 534. Ungarn
- impar* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 166; Opusc. Ent. XII, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513. Süd-frankreich, Corsika, Istrien, Dalmatien
- incultum* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 746. Guatemala
- insulare* Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 189. Auckland
- italicum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 704. Süd-Frankreich, England, Nord- und Mittel-Italien
- nigriceps* Fowl. Col. Brit. II, p. 415.
- tricolor* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218 (nec Woll.). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 541.
- Kronei* Kiesw. l. c. p. 161. — Fauv. l. c. p. 188 nota.
- lacustre* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 422. Nord-Amerika
- lacrymale* Fleutiaux u. Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 381. Guadeloupe
- laeviusculum* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 464. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 193. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 512. Nord-Europa, Süd-Frankreich
- fucicola* Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 286; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 978, nota; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 378.
- laticolle* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 983. — Thoms. Skand. Col. X, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 525. Deutschland, Russland, Skandinavien
- cordicolle* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 220.
- littoreum* Broun, Man. New Zeal. Col. 1886, p. 942. Neu-Seeland
- Lokayi* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 152. Siebenbürgen
- Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 532.
- longicorne* Luze, l. c. p. 543. Nördl. Mongolei
- longulum* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. Alaska
- madegassa* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 173. Madagascar
- mesomelas* Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1841, p. 128. England

- micrarthrum** Broun, Man. Col. New Zeal. 1893, p. 1037.
Morrisi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 28. Neu-Seeland Süd-Australien
monilifer Broun, Man. Col. New Zeal. 1893, p. 1038. Neu-Seeland
montivagum Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 128. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 529. Caucasus
Münsteri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 540. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 542. Norwegen
nigriceps Kiesw. Stett. Ent. Ztg. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 435. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 74. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 225. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 532. West-Alpen, Pyrenaeen
niponense Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 474. Japan
ocellatum Woll. Ins. Mader. 1854, p. 613. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487. Madeira, Kanarische Inseln
oxyacanthae Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 210. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 877. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58 p. 982. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 209. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, l. c. p. 521. Mittel-Europa, Italien, Corsica, Sardinien, Sicilien, Nord-Amerika
caesum Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Par. I, 1835, p. 470.
subdepressum Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 211 nota.
pacificum Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190. Auckland
parallelum Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 212. Tasmanien
perplexum Broun, Ann. Mag. Nat.-Hist. (6) XIV, 1894, p. 428. Neu-Seeland
Philpotti Broun, l. c. p. 427.
picipenne Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 44. Chile
plagiatum Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 235. Alaska
prolixum Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1039. Neu-Seeland
pullus Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120 (Gen. dub. = ?*Oxytelus*). „
pumilio Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 746. Guatemala
quadrifossulatum Motsch. Etud. Ent. 1859, p. 68. Ceylon
quadripenne Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 425. Nord-Amerika
repandum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 878. „
riparium Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1856, p. 224; Skand. Col. III, 1861, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513. Nordeuropa

- rivulare** Payk. Mon. Staph. 1789, p. 65. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 629; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 875. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 978. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 129. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 516. Europa, Mittelmeergebiet, Caucasus, Kalifornien
- cursor* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97.
- incisum* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 209.
- oxyacanthae* Mannerh. Brachél. 1830, p. 53.
- piceum* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 341.
- var. *porosum* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 378; Col. Hefte I, 1867, p. 72. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 202 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487. Italien
- foraminosum* Scriba, l. c. p. 378.
- var. *obscuricorne* Popp. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1903, p. 110. Lappland
- var. *nitidicollé* Popp. l. c. p. 108. „
- rufum** Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 148. Cap
- flavescens* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.
- rugipenne** Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. I, 1885, p. 317. Kalifornien
- rugulipenne** Rye, Ent. Annual 1864, p. 58. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III 1872, Suppl. I, p. 9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 511. Britannien, Frankreich
- russatum** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 453. Chile
- sagoloide** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 381. Neu-Seeland
- Saulcyi** Fauv. Cat. Syst. Staph. 1875, p. V nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 518. Syrien, Griechenland
- sculpticollé** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 602. — Luze, l. c. p. 538. Kanarische Inseln
- septentrionis** Thoms. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1856, p. 223; Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, l. c. p. 518. Nord- und Mittel-Europa, Ost-Sibirien
- clavicorné* Motsch. (*Ochthexenus*) Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 546. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 104. — Luze, l. c. p. 486.
- impressum* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 982.
- languidum* Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 29; Sv. Ac. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 43.
- rivulare* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 51.
- spadix** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 117. Neu-Seeland
- stenosoma** Broun, Man. New Zeal. Col. 1903, p. 1040. „

- subcylindricum** Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 164. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190. Auckland
- sulcithorax** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 116. Neu-Seeland
- taschkentense** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 208. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488. Turkestan
- tasmanicum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. XXVI, 1902, p. 27. Tasmanien
- tenue** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 95. Japan
- texanum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 213; Not. Ent. 1878, p. 49. Texas
- Theveneti** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1876, p. 218. Californien
- tibiale** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120. (Gen. dub., *Oxytelus*?). Neu-Seeland
- validum** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 977. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 77. Mitteleuropa
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 222. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 515.
- var. *Fuistingi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 199.
- Vaulogeri** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 192. Tunis
- Xambeui** Fauv. Fn. gallo-rhén. Suppl. III, 1875, p. 50. Frankreich,
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Italien,
p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Mesopo-
p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, tamien
1906, p. 531.
- xanthorrhoeae** Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 213. West-Australien

Subgen. *Scribaia* Luze.

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 505.

- blandum** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LVI, 1906, p. 546. Italien

120

Phloeonomus Heer.

- Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 589.

Distemmus Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861, p. 69.

Phloeostiba + *Xylodromus* + *Phloeonomus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208—210.

Phloeostiba + *Phloeonomus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 171, 179.

- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 578, t. 17, f. 56—59; Hist. Ins. Pin. marit. p. 56. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. 1894, p. 126.

Subgen. *Xylostiba* Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731.

Xylodromus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 209 (nec Heer).

- bosnicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 701. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 596. Bosnien, Schweiz, Oesterreich, Sizilien
- clavicornis** Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 204. — Luze, l. c. p. 599. Madeira
- monilicornis** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 219. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 985. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 70, t. 1, f. 15. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 181. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731. — Luze, l. c. p. 594. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien
- tricolor** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 53. — Luze, l. c. p. 594. Madeira

Subgen. *Phloeostiba* Thoms.

- Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 171. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731, 732.
- azoricus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 219. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 593. Azoren
- lapponicus** Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 73. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 69. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 176. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, l. c. p. 598. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Nord-Amerika
- Argus* Lec. in Agassiz, Lake sup. 1850, p. 22.
- conformis* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 987; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 90.
- pineti* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1856, p. 227; Skand. Col. III, 1861, p. 209.
- planipennis* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 198.
- planus* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 52 (nec Payk.).
- subtilis* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 987.
- planus** Payk. Mon. Curc. App. 1792, p. 145. — Grav. Col. Micr. 1802, p. 121. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 636; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 886. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 70, t. 1, f. 14. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 173. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 596. Europa, Sibirien
- bipunctatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 545. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 105. — Luze, l. c. p. 486.
- flavipes* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 527. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 53.
- usambarae** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 291. Usambara

Subgen. **Phloeonomus** s. str. Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731, 732.

- anceps** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I. 2, 1882—87 (1887), p. 745. Guatemala
- atomarius** Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 16; Not. Ent. III, p. 8. — Sharp, l. c. p. 746. Mexiko,
Guatemala
- chlorizans** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 10. Sumatra
- laeticulus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 747. Guatemala
- minimus** Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 631; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 878. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 984. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 71. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 187. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 601. Mittel-
Europa
- nanus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 402. Amazonas-
gebiet
- nitidus** Bernh. Denkschr. med. naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 102. Brit.-Süd-
west-Afrika
- obscurus** Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 181. Ceylon
- pedicularius** Er. Gen. et Spec. Staph. 1839—1840, p. 887. Portorico
- philanthus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 181. — Er. Gen. Spec. Staph. 1838—40, p. 887 (Gen. dub.). Cap
- Märkeli* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 148.
- praeustus** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492. Kolumbien,
Caracas
- xanthopterus* Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 14.
- pusillus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 205. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 631; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 879. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 988. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 71, t. 1, f. 16. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 600. Paläarkt.
Region,
Nord-
Amerika
- abietinus* Thoms. Skand. Col. III, 1867, p. 318.
- foveolatus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 353.
- granulatus* Woll. Ins. Madeira 1854, p. 613.
- laesicollis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 322.
- var. *punctipennis* Thoms. Skand. Col. III, 1867, p. 317. — Luze, l. c. p. 600.
- rufotestaceus** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 102 (Gen. dub.). Kapland,
Brit. Süd-
afrika
- singulare** Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 181. Ceylon
- sordidus** Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 744. Mexiko,
Guatemala
- suffusus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 424. Nord-
Amerika
- sulcicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89. Sumatra
- sumatrensis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 11. „
- tenellus** Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1040. Neu-Seeland
- triste** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 745. Guatemala

Xylodromus Heer.

Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 174. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 729.

Etheothassa Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206.

Drephophylla Fiori Atti Soc. Mod. 1899, p. 90. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1906, p. 493.

Biologie: Meinert, Ent. Medd. 1891—92, p. 205. — Lundbeck, Not. Grönl. Ent. Fn. l. c. p. 45.

- affinis** Gerh. Zeit. Ent. Breslau 1877, p. 32. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, p. 341; Fn. Tr. p. 363. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 499. Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Ungarn, Caucasus
- cephalotes* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 170. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730.
- concinus** Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 886. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 991. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68, t. 1, f. 13. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 167. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 500. Europa
- brunnipennis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 348.
- brunnipes* Steph. l. c. p. 347.
- deplanatus* var. *fuliginosus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 175.
- var. *ater* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 158.
- daimio** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 475. Japan
- depressus** Grav. Col. Micr. 1802, p. 113. — Seidl. Fn. Balt. p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 498. Europa
- deplanatus* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 222. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 635; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 885. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 991. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 163.
- oblongus* Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 474.
- opaculus** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 497. Sibirien
- opacus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 592. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 496. Altai
- testaceus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 885. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 992. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 67. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. Nord- und Mittel-Europa
- brunneus* var. 3 Grav. Col. Micr. 1802, p. 114.
- deplanatus* var. b. Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 635.
- deplanatus* var. *pygmaeus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 175.

pygmaeus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 206. —
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
p. 500.

var. *heterocerus* Fiori, Atti Mod. XXXII, 1899, Italien
p. 90.

7

Carcinocephalus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 592.

Astacops Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03, p. 61.

mehadiensis Bernh. Münch. Kol. Zeit. I, 1902—3, p. 62. Süd-Ungarn

Merkli Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 305. Balkan

2

Philorinum Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 965. — Fauv. Fn. gallo-
rhén. III, 1872, p. 83. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 153.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 727.

floricola Woll. Cat. Canar. 1864, p. 602.

pallidicorne Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Canar. Inseln
p. 629. Corsica

sordidum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 349. — Fauv. Süd- und
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 84, t. 1, f. 18. — Mittel-
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 727. Europa,
cadomense Fauv. Cat. Gren. 1863, p. 42. Ural

humile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 860.
— Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—
58, p. 966. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII,
1880, p. 155.

myops Halid. in Newm. Entomol. 1841, p. 187.

nitidulum Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 966 nota.

pilosulum Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 353.

ruficolle Schauf. Sitzungsber. Isis 1861, p. 47.

subpubescens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 350.

var. *Hopffgarteni* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit.
XI, 1892, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 728.

var. *nigriventre* Rosh. Tiere Andalus. 1856, p. 86.

3

Micralymma Westw.

Westw. Mag. Zool. Bot. II, 1838, p. 129, t. 4. — Er. Gen. Spec. Staph.
1839—40, p. 819. — Schiödte in Kröyer, Nat. Tidskr. (n. s.) I, 1844—45,
p. 374; Linnaea Ent. I, 1846, p. 156. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 134.
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 66. — Thoms. Skand. Col. III,
1861, p. 187. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 81. — Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 4. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 728.

Microcalymma Gemm. et Har. Cat. Col. II, p. 633.

Microlymma Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549.

Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 73, t. 23.

— Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Packard,

Amer. Natural. II, p. 278, f. 3. — Meinert, Ent. Medd. III, 1891—92, p. 205. — Lundbeck, l. c. p. 45.

- brevilingue* Schiödte in Kröyer, Tidskr. (n. s.) II, 1, 1844—45, p. 370, t. 4, f. 2. Grönland
- Dicksoni* Mäklin, Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 24; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 42. Sibirien
- laticolle* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. Sibirien
- marinum* Stroem, Norsk. Selsk. Skrift. 1785, p. 1. — Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 729. Nord-Europa, Meeresküste
- brevipenne* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 234. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 420. — Schiödte in Kröyer, Tidsskr. (n. s.) II, 1, 1844—45, t. 4, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 118. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 188. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 6.
- Johnstoni* Westw. Mag. Zool. Bot. II, p. 130, t. 4, f. 1.
- Stimpsoni* Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. Maine (Nordamerika)

5

Cylletron Thoms.

- Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50; III, 1861, p. 191. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 493; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota.
- nivale* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 191. Lappland, Finnland

1

Porrhodites Kraatz.

- Kraatz, Nat. Ins. II, 1856—1858 (1858), p. 961. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 726.
- fenestralis* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 50. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 726. Finnland, Lappland, Deutschland, Sibirien, Nordamerika
- ♀ *pubescens* Zett. l. c. p. 52.
- brevicollis* Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 320; XXVI, 1853, III, p. 196. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 963.

1

Orochares Kraatz.

- Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 955. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 100. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725.
- angustatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 874 (*Deliphrum*). — Kraatz, l. c. p. 956. — Fauv. l. c. p. 100. t. II, f. 1. — Rey, l. c. p. 91. Mittel-Europa, Britannien, Nordamerika

1

Mannerheimia Mäkl.

Mäklin, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879—80, p. 80. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 251.

- arctica* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 873. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 253. Nordeuropa, Sibirien, Tirol
- affinis* Mäkl. Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 40 (*Homalium*).
- confusa* Mäkl. l. c. p. 40.
- saginata* Mäkl. l. c. p. 41.
- divergens* Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 1880, p. 80. — J. Sahlb. Sv. Ac. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 108. Sibirien, Nord-russland
- micros* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 222. Turkestan

3

Phyllodrepoidea Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 247.

- crenata* Grav. Col. Micr. 1802, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 873. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 954. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 131. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 96. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 249. Mittel- und Süd-Europa
- creatoris* Gozis, Rech. de l'esp. typ. 1886, p. 15.

1

Deliphrum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 627; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 872. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 142. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 951. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 73. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 95. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 110. — Mäklin, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879/80, p. 80. — Casey, Ann. Ac. Sc. N. York VII, 1892—94, p. 419. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 723. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1905, p. 241.

Subg. *Arpediopsis* Ganglb. l. c. p. 723, 724. — Luze, l. c. p. 244.

Subg. *Deliphrum* s. st. Ganglb. l. c. p. 723. — Luze, l. c. p. 723.

- aequicolle* Cas. Ann. Ac. N. York VII, 1893, p. 419. Kalifornien
- algidum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 874. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 953. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 96. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724 (*Arpediopsis*). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 246. Deutschland, Österreich, Frankreich,

- Schatzmayeri* Bernh. Münch. Kol. Zeit. III, 1906, p. 123.
- expansum* Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, 1875, p. 510. Colorado
- frigidum* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 108. Ost-Sibirien
- occiduum* Cas. Ann. Ac. N. York VII, 1893, p. 420. Kalifornien
- tectum* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 68. — Oliv. Ent. III, 42, p. 36, t. 3, f. 21. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 627; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 872. — Kr. Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 952. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 95. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 723. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 245. Nord- und Mittel-europa, Ostsibirien
- laeve* Grav. Mon. 1806, p. 211.

6

Lathrimaeum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 624; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 868. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 141. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 943. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 75. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 92. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 119. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1892—94 (1893), p. 416. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 721. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 53.

Subgen. *Lathrimaeum verum* Luze, l. c. p. 58.

Subgen. *Prionothorax* Luze, l. c. p. 68.

- atrocephalum* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 463. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 625; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 870. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 946. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 128. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 63. Nord- und Mittel-Europa, Mittelmeergebiet, Kaukasus, Kleinasien, Japan, Kalifornien
- Baudii* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 402. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 389.
- cicatrix* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 130.
- melanocephalum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 128.
- ruficolle* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 340. var. *Fauveli* Pic, Echange IX, 1893, p. 88.
- fimetarium* Mannerh. Brachél. 1830, p. 72; Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. Sitkha
- fuscum* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 626; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 870. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 947. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 131. Mittel-Europa

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. —

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 67.

Ganglbaueri Luze, l. c. p. 65. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 123.

gracilicorne Luze, l. c. p. 66.

hamatum Luze, l. c. p. 59.

humerales Cas. Bull. Ac. Sc. Cal. II, 1886, p. 243.

longicorne Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 16.

melanocephalum Ill. Mag. V, 1794, p. 596. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 869. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 944. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 92. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 125. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 58.

atrocephalum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 187.

metallicum Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 63.

nigropiceum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 417.

pictum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 233.

reflexicollis Cas. Amer. N. York Ac. VII, 1893, p. 417.

reflexum Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 195 (*Prionothorax*).

sordidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 871.

marginatum Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 89.

spretum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 418.

tenue Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 507. — Luze, l. c. LV, 1905, p. 60.

unicolor Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 93. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 61.

assimile Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 342.

luteum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 869.

— Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—

58, p. 945. — Thoms. Skand. Col. IX, p. 315.

— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 122.

var. **diabolicum** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 61.

18

Ungarn,
Serbien,
Moldau
Nordafrika
Caucasus
Kalifornien
Algier
Mittel-
Europa

Syrien

Nord-
Amerika
Kalifornien

Nord-
Amerika
Taschkent,
Buchara

Nord-
Amerika

„
Caucasus

Mittel-
Europa,
Spanien,
Portugal,
England

Camioleum Lew.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 394.

loripes Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 395. Japan

1

Olophrum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1837), p. 622; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 863. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 140. — Kraatz, Natur-

gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 938. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 74. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 192. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 97. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 719. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 33.

Lathrium Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 21.

Biologie: Riley, Ins. life III, nr. 7—8, p. 330.

- alpinum** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 180. — Alpen, Pyrenäen, Sudeten
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 99. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 141. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 44.
- alpestre** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 867. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941.
- assimile** Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 409. — Er. Käf. Nord- und Mittel-Europa, Caucasus
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 624; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 865. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 942. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 98. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 41.
- boreale** Payk. Mon. Curc. App. 1792, p. 146. — Gyllh. Lappland
Ins. Suec. II, 1810, p. 138. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 866. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 43.
- brevicolle** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 190. Altai
— Luze, l. c. p. 40.
- caucasicum** Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. VII nota. Caucasus
— Luze, l. c. p. 39.
- consimile** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 199. — Er. Gen. Nord-Europa
Spec. Staph. 1839—40, p. 867. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 99 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 143 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 721. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 45.
- boreale** ♀ Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 411.
- limbatum** Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 23.
- minor** J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. IX, p. 150; En. Col. Brach. Fam. 1876, p. 213.
- convexum** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 195. Russ. Amerika
- fuscum** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 211. — Er. Käf. Nord- und Mittel-Europa, Caucasus, Sibirien, Nord-Mongolei, Alaska
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 623; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 865. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 940. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 98. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 39.
- laticolle** J. Sahlb. En. Brach. Fenn. 1876, p. 211.
- latum** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 194.

- var. *transversicolle* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 41. Tirol
- interglaciale* Mjöberg, Geol. Förh. Stockholm XXVI, 1906, p. 493. Schweden
- marginatum* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 196. Kenai (Nord-amerika)
- nigropiceum* Motsch. in Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 10. Kamtschatka
- obtectum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 865. Nord-Amerika
emarginatum Er. l. c. p. 868.
rotundicolle Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 464 (nec Sahlb.).
- parvulum* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 195. Russ. Amerika
- piceum* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 200. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 623; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 864. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 939. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 127. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 97. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 38. Nord- und Mittel-Europa
- blattoides* Ahrens, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 20, t. 2, f. 2, f. 3.
- puncticolle* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 42. Oesterreich-Ungarn, Kleinasien, Syrien
- rotundicolle* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 281. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 866. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941 nota. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 46. Sudeten, Nord-europa, Nord-Amerika
- convexicolle* Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 21, t. 8, f. 7.
- simplex* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 97. Japan
- vicinum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472. „

Arpedium Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1837), p. 618; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 858. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 139. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 957. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 72. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 188. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717.

Subgen. *Arpedium* s. st. Reitt. l. c. p. 186.

Subgen. *Deliphrosoma* Reitt. l. c. p. 187.

Subgen. *Eucnecosum* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186.

angulare Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, d. 1877/78, p. 226. Nord-Amerika

brachypterum Grav. Col. Micr. 1802, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 859. — Kraatz, Nord-Europa, Sudeten,

- Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 959. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 189 (ex parte). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 87 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 151. — Hardy and Bold, Ent. Amer. 1885, p. 126. (*Euclyptus*)
- Gyllenhali* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 286.
impressum Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 52.
engadinicum Heyd. Jahrb. Graub. 1863, p. 21.
trogodytes Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 77. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.
- brunnescens* J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. XI, 1870, p. 423; En. Brach. Fenn. 1876, p. 211. — Seidl. Fn. Balt., p. 237. (*Euclyptus*)
- Gyllenhali* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 52 (nec Sahlb.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 88 Anm.
- cribratum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 225.
- fratellum* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 330. (*Delphacinae*)
- var. *major* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 702.
- var. *Skalitzkyi* Bernh. l. c. p. 703.
- libanicum* Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. VI nota.
- limbatum* Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 80.
- macrocephalum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 86. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1872, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 719. (*Delphacinae*)
- pallens* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.
- prolongatum* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 204. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. II, 1899, p. 437. — Hubenthal, Entom. Blätter V, 1909, p. 3. (*Delphacinae*)
- puncticolle* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 106.
- quadrum* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 213. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 619; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 858. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 958. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 125. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 189. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 86. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 147. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718. (*Arctocampa* S.S.)
- castaneum* Runde, Brachél. Hal. 1835, p. 23.
- consimile* Heer, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. I, p. 43.
- Heydeni* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 190.
- piceum* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 50.
- var. *alpinum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 87. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.
- Heydeni* Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 958 nota.
- Schwarzi** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 225.

Alpen

Lappland,
Skandi-
navienNord-
Amerika
Griechenland,
Herze-
gowina
GriechenlandCaucasus
Libanon
Sibirien
Ost- und
Westalpen,
Herze-
gowinaBombay
Altvater,
Riesen-
gebirge

Ost-Sibirien

Nord- und
Mittel-
EuropaAlpen,
Nord-
Amerika

Ohio

sibiricum Mannerh. Brachél. 1830, p. 52.

tenue Lec. New Spec. Col. 1863, p. 55. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 226.

brachypterum Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.

mixtum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 702.

15. *Arpedium* *Sand*

Sibirien

Nord-

Amerika,

Nord-

europa

Acidota Mannerh.

Mannerh. Brach. 1830, p. 55, 424. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 357. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Fr. 1835, p. 476. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1837), p. 620; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 860. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 935. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 72. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 88. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 716. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 69.

✓ Biologie: Beling, Arch. Nat. XXXIII, 1877, I, p. 50.

baicalensis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 72. Ost-Sibirien

clandestina Luze, l. c. p. 75.

crenata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 525. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 358. t. 27, f. 6. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 620; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 861. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 936. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 204. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 73.

Croatien

Nord- und

Mittel-

Europa,

Caucasus,

Sibirien,

Nord-

Amerika

castanea Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 207.

pulchra Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.

rufa Grav. Col. Micr. 1802, p. 115.

seriata Lec. New Spec. Col. 1863, p. 55.

cruentata Mannerh. Brachél. 1830, p. 55. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 621; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 862. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 937. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1895, p. 74.

Nord- und

Mittel-

Europa,

Algier

ferruginea Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 477. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 862. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 937.

rufa Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 228. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 204.

minuta Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 76.

Morea

- quadrata** Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 53. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 205. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89 nota; Not. Ent. VII, 1878, p. 65. — J. Sahlb. En. Brachél. Fenn. 1876, p. 217. *Frankenhäuseri* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 194. *patruelis* Lec. New Spec. Col. 1863, p. 56. *quadra* Zett. Fn. Lapp. 1828, p. 54. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 78. var. *major* Luze, l. c. p. 79.
- subearinata** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 863. — Fauv. Notices Ent. VII, 1878, p. 64.
- sculpturata** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 77.

Lappland,
Skandi-
navien,
Sibirien,
Nord-
Amerika

Nord-
Amerika
Caucasus

8

Amphichroum Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858 (1858), p. 947; Berl. Ent. Zeit. XII, 1868, p. 345. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 90. — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 93. — Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 240; Ann. New York Ac. VII, 1892—1894, p. 412. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1890—1892 (1892), p. 396. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 715.

Stachygraphis Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 285.

- Adelaidae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 23. Süd-Australien
- australe** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 191; XIII, 1878, p. 486. N. S. Wales
- canaliculatum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 871. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 949. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 91, t. 1, f. 19. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 715. Alpen, Karpathen, Deutsches Mittelgebirge
- ♂ *dentipes* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 181.
- ♀ *tenuipes* Heer, l. c. p. 182.
- cribriceps** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 486. Süd-Australien
- debile** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472. Japan
- flavicornis** Cas. Bull. Calif. II, 1886, p. 235. Kalifornien
- floribundum** Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 56. "
- hirtellum** Heer, Fn. Helv. 1838—1842, I, p. 191. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, p. 950. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 91. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 99. West-Alpen, Tirol
- maculatum** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 285, t. 9, f. 7 (*Stachygraphis*). Californien
- maculatum* Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 3. — Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 413.
- maculicollis** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. Sitkha
- ruficeps** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 547. Ost-Sibirien
- spinipes** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 487. West-Australien

Lesteva Latr. 15

Latr. Précis caract. Ins. 1796, p. 75. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 616; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 855. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 137. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 930. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 71. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 101. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 63. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 712. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 179.

binotata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 48. — Turkestan
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903,
p. 192.

bucharica Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 222. — Buchar
Luze, l. c. p. 196.

cordicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. Trans-
— Hochh. op. c. XXXV, 1862, III, p. 102. — baikalien
Luze, l. c. p. 188.

corsica Perris, Ab. VII, 1869, p. 8. — Fauv. Fn. gallo- Corsica,
rhén. III, 1872, p. 103. — Rey, Ann. Soc. Linn. Sardinien
Lyon 1880, p. 86 nota. — Luze, l. c. p. 186.

crassipes Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471. Japan

curvipes Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 78. Süd-
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 714. — Luze, Frankreich
Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 191.

fasciata Luze, l. c. 1903, p. 188. Transcaspien

fenestrata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 97. Japan

fontinalis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Pyrenäen,
Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 434. — Alpen,
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 102. — Rey, Mittel-
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 69. — meergebiet
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. —
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903,
p. 195.

nigra Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 934 nota.

omissa Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 71.

foveolata Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Apenninen
p. 187.

Heeri Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 106; Cat. syst. Europa
Staph. 1875, p. LIII. — Kraatz, Deutsche Ent.
Zeitschr. XIX, 1875, p. 433. — Fauv. Rev.
d'Ent. III, 1884, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn.
Lyon XXVII, 1880, p. 84.

punctata Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857
p. 124 (nec Er.). — Thoms. Skand. Col. IX,
p. 310.

sicula Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903,
p. 185.

longelytrata Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 729. — Fauv. Europa
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 104. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-
bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 189.

alpina Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 361.

bicolor F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 529. — Er.
Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 616; Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 855. — Kraatz, Natur-

- gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 932. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 72.
- dimidiata* Panz. Fn. Germ. 1789—1810, 36, 3.
- impressa* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
- intermedia* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 221.
- longula* Mannerh. Brachél. 1830, p. 57.
- macroelytron* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 164.
- major* Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 117; Ann. Soc. Linn. Lyon 1870, p. 93. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 788.
- nigripes* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
- oblonga* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.
- obscura* Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 388. — Gravh. Micr. 1802, p. 122. — Heer, Fn. Helv. I, 1839—42, p. 192.
- planipennis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
- punctulata* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 369.
- rufitarsis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 362.
- staphylinoides* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 464.
- var. *dorsalis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184.
- var. *maculipennis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 189.
- var. *maura* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 856. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 932 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714.
- nivicola* Fauv. l. c. p. 104. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75.
- luctuosa** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 129; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 79 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 193.
- monticola** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 77. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 933. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 105. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 190.
- collina* Haliday, Nat. Hist. Rev. 1855, p. 11.
- Sharpi* Rye, Ent. Monthly Mag. III, 1866, p. 124.
- nova** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 61. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 191.
- Pandellei** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 387. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 195.
- lepontia* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 401.
- plagiata** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472.

Caucasus
Kleinasien

Europa

Französische
Alpen,
CaucasusMittel-
Europa,
Britannien

Turkestan

West-Alpen,
Pyrenäen,
Dalmatien

Japan

- praeses** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 223. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 184. Corsica
- pubescens** Mannerh. Brachél. 1830, p. 57. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 617; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 856. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 931. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 101. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 66. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, l. c. p. 196. Nord- und Mittel-Europa
- var. *subaptera* Rey, l. c. p. 69.
- punctata** Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 618; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 857. — Kraatz, l. c. p. 934. — Fauv. l. c. p. 105. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433. — Rey, l. c. p. 82. — Ganglb. l. c. p. 714. — Luze, l. c. p. 184. Mittel-Europa
- muscorum* Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 37.
- riparia* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 193.
- villosa* Walzl, Isis 1838, IV, p. 268 (veris).
- sicula** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 857. Sizilien
- Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78.
- syriaca** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 192. Syrien
- turkestanica** Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 76. Turkestan
- Villardi** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Suppl. p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 194. Süd-Frankreich

24

Paralesteva Cas.

Casey, Canad. Ent. 1905, p. 164.

Pseudolesteva Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 399.

- pallipes** Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 55. Maryland u.
- biguttula* Lec. l. c. Pennsylvanien,
- picescens* Lec. l. c. Canada, Alabama

1

Tevales Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 399.

- cribratulus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 399. Kalifornien

1

Unamis Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 400.

- truncata** Cas. Bull. Calif. Ac. I, 1885, p. 322. Kalifornien

1

Artochia Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 400.

productifrons Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 401. Kalifornien
1**Vellica** Cas.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 321; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 399, 401.

longipennis Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 431. Kalifornien
1**Tilea** Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 246. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 402.

Phloeopterus Motsch. Etud. Ent. 1852, p. 78. — Casey, Bull. Col. Ac. 1886, p. 234; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 402.**brevipennis** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 404. Nord-Amerika**castanea** Cas. l. c. p. 404.**cavicollis** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 246. Brit.-Kolumbien**filicornis** Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 318. Kalifornien**fusconigra** Motsch. Etud. Ent. 1852, p. 78. — Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 193. Unalaschka**longipalpus** Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 318. Kalifornien**rufitarsis** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 403. Nord-Amerika

7

Brathinus Lec.

Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 156. — Casey, Ann. N. York Ac. IX, p. 354.

nitidus Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 157. Neu-Schottland**varicornis** Lec. l. c. p. 157. Nord-Amerika

2

Orobanus Lec.

Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 2, 1878, p. 453. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 249. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1892—94 (1893), p. 405.

densus Cas. Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 246. Kalifornien**rufipes** Cas. l. c. p. 245.**simulator** Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 2, 1878, p. 453. Nord-Amerika
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 249.

3

Microedus Lec.

Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 273. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 250.

Austinianus Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 273. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 250. Nord-Amerika
laticollis Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. Sitkha

2

Pelecomalium Cas.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 241; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 412. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1890—92 (1892), p. 396.

alutaceum Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 236. Kalifornien
binolatum Cas. l. c. v. 242. „
crassicorne Cas. l. c. p. 239. „
flavescens Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 414. „
laevicollis Lec. Proc. Ac. Philad. 1866, p. 375. — Fauv. Pennsylvanien
 Not. ent. VII, 1878, p. 74.
opaculum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 241. Kalifornien
pallidum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 415. „
pilosellum Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 237. „
puberulum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 240. „
scutatum Fauv. l. c. p. 238. „
sparsum Fauv. l. c. p. 237. „
testaceum Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. Russ.
veterator Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 238. Amerika
 ♂ *modestum* Cas. l. c. p. 242. Kalifornien

13

Geodromicus Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 224. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 70. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 107. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 53. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 406. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 103.

Geobius Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 193.

Geodromus Heer, l. c. p. 572.

Subgen. *Geodromicus verus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107.

Subgen. *Trichodromeus* Luze, l. c. p. 116.

asiaticus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 249. Kleinasien
 — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 110.

Bodemeyeri Bernh. l. c. p. 250. — Luze, l. c. p. 113.

brunneus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 158. — Östliches
 Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 406, 407. Nord-amerika
caesus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 853.

- constricticollis** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 172. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 116. Caucasus
antennatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 189.
- convexicollis** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 112. Taschkent
- debilis** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 409. Nord-Amerika
- Fauveli** Cas. l. c. p. 408.
- languidus** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 110. Caucasus
- globulicollis** Mannerh. Brachél. 1830, p. 56. — Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 49. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 927. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 181. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 113. Nord- und Mittel-Europa, Caucasus
- flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 551.
- Kunzei* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 193; App. p. 572.
- longipes* Mannerh. Brachél. 1830, p. 56.
- plagiatus* var. d, e Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 853.
- plagiatus* var. e Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109.
- transversus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, p. 550 (veris.).
- var. *curtipennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 110. (nec Kraatz).
- lituratus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. 1865, p. 316.
- var. *brevicollis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, VII, nota 7; Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78. Caucasus
- Kunzei* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 202.
- gracilicornis** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 111. Caucasus
- Humboldtianus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 411. Nord-Amerika
- integer** Cas. l. c. p. 412.
- latiusculus** Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 126, t. 2, f. 10. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 115. Caucasus
- lestevoides** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228. Buchara
 — Luze, l. c. p. 116.
- lituratus** Kr. Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 928. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. Tirol, Schweiz
- plagiatus* var. *marginatus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 135; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 386.
- globulicollis* ab. *lituratus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 114.
- major** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 550. Caucasus
 — Hochh. op. cit. XXXV, 1862, III, p. 102.
 — Luze, l. c. p. 109.

- nubilatus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 408. Nord-
Amerika
- ovalis** Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 77. Turkestan
- penicillatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 49. Bucharā,
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Turkestan
p. 116 (*Trichodromeus*).
- plagiatus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 180. — Er. Gen. Nord- und
Spec. Staph. 1839—40, p. 852 (pars). — Kraatz, Mittel-
Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 925 Europa,
(pars). — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 181. Caucasus,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 107. Sibirien
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Nord-
p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. Amerika
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 108.
- ab. *nigrita* Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 226.
— Er. l. c. p. 853. — Kraatz, l. c. p. 926. —
Fauv. l. c. p. 108. — Rey, l. c. p. 57. — Ganglb.
l. c. p. 711. — Luze, l. c. p. 108.
- anthracinus* Bris. Cat. Gren. 1863, p. 40.
- nigrophthalmus* Block, Ins. Plauen'schen Gr. 1799, p. 117, f. 9.
- ovipennis* Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 1877, p. 452. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 253.
- verticalis* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 463.
- puncticollis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Ungarn,
p. 364. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Türkei,
p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 111. Balkan
- cordicollis* Petri, Verh. Ver. Herm. XLI, 1891, p. 18.
- punctulatus** Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 77. Turkestan
- strictus** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 126. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 408.
- nigrita* Fauv. Not. Ent. VII, 1878, p. 90 (nec Müll.).
- suturalis** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 283. Alpen,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Pyrenäen
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107.
- plagiatus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 123.
- plagiatus* var. a Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 926.
- plagiatus* var. b Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 852. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 57.
- plagiatus* var. a Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 108.
- ab. *concolor* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107.
- temporalis** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 410. Nord-
Amerika
- tumidus** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Bucharā
p. 117 (*Trichodromeus*).

Hygrogeus Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 529.

aemulus Rosh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 12. — Kraatz, Alpen Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 929. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113, t. 1, f. 20. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 61. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 529.
cenisius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 647.

1

Anthophagus Grav.

Grav. Col. Micr. 1802, p. 20. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 614; Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 847. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 912. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 111. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 194. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, II, p. 69. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 178. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 704. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 505.

Subg. *Phaganthus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 12.
 Subg. *Anthophagus* s. st. Rey, l. c. p. 12.

abbreviatus F. It. Norw. 1779, p. 263. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 850. — J. Sahlb. Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 207. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 516. Mitteleuropa, Finnland, Britannien, Caucasus
angusticollis Mannh. Brach. 1830, p. 56.
caraboides Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 614; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 850. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, p. 922. — Thoms. Skand. Col. III, 1871, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 116, t. 1, f. 23. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 29.
gracilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 573.
Hookeri Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 361.
obscuriceps Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 551.
 ab. *fascifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 150. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 516.
aeneicollis Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 13. West-Alpen
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 514.
alpestris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 115, t. 1, f. 22. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 37. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. Alpen, Jura, Sudeten, Karpathen

— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 512.

austriacus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 849. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 918.

ab. *transversus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 494.

alpinus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 526. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 848. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 918. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 121. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 121. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1902, p. 518.

Nord- und
Mittel-
europa

♂ *mandibularis* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 460.

♂ *maxillosus* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 45.

♀ *lapponicus* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 275.

flavipennis Boisd. et Lac. Faun. Ent. Par. I, 1835, p. 480.

apenninus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 401. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 119. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 385. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 514.

Apenninen

aquatilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469.

Japan

arpedinus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 186. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 524.

Caucasus

bicornis Block, Ins. Plauen'schen Gr. 1799, p. 118, f. 10. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 118, t. 1, f. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, l. c. p. 513.

Mittel-
Europa

armiger Grav. Col. Micr. 1802, p. 122. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 848. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 706.

ab. *marginicollis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 181.

ab. *nigrinus* Eppelsh. l. c. p. 181.

ab. *nivalis* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 15.

ab. *subfasciatus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 513.

bosnicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 539. — Luze, l. c. LII, 1902, p. 519.

Bosnien

caliginosus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470.

Japan

caraboides L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 180. — J. Sahlb. Enum. Brachel. Fenn. p. 207. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 526 (*Phaganthus*).

Mittel-
Europa

palustris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 572.

testaceus Grav. Col. Micr. 1802, p. 121. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 482. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 615;

- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 851. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 924.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén III, 1872, p. 114.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 46.
 ab. *maculipennis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 526.
- fallax** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 326. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 920. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 122. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 35. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, l. c. p. 522.
carinthiacus Rey, l. c. p. 37.
- Fauveli** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 524 (*Phaganthus*). Sizilien
- forticornis** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 21. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 917. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 118 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, l. c. p. 521. Alpen, Sudeten
- lestevoides** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470. Japan
- melanocephalus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 195. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 921. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 117. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 522. Alpen
 var. *fenestrellanus* Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 197. Piemont
- muticus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 433. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916. — Fairm. Faun. Fr. I, p. 627. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 120. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 27. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 515. Pyrenaeen
- noricus** Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, l. c. p. 520. Tauern
- omalinus** Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 46. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 849. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 921. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 179. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 40. — Ganglb. l. c. p. 709. — Luze, l. c. p. 523. Nord- und Mittel-Europa
alpinus J. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 274.
homalinus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 123.
- pracustus** Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 228. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 852. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 924. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 122. — Fauv. l. c. p. 115, t. 1, f. 21. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 527 (*Phaganthus*). Mittel-Europa

bimaculatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 481.

pyrenaeus Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 41. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 120. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 22. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 519. Pyrenaeen, Cantabr. Gebirge

rotundicollis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 195. — Fauv. l. c. Suppl. p. 30. — Rey, l. c. p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, l. c. p. 528 (*Phaganthus*). Alpen

brevicornis Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 376. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113. *crassicornis* Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 791.

ab. imitator Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 528.

Schneideri Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 125. — Luze, l. c. p. 517. Caucasus, Trans-caucasien

scutellaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 851. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 116. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, l. c. p. 525 (*Phaganthus*). Alpen, Frankreich

caraboides var. b Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 572. — Fairm. Fn. Fr. I, p. 627.

sinuatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470. Japan

spectabilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 197. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. I, 1856—58, p. 915. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 511. Alpen, Vogesen

picipennis Gredl. Correspond. Ver. Regensb. XVII, 1863, p. 166.

var. *Muelleri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 539. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 511. Vorarlberg

subtilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471. Japan

sudeticus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 22. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 920. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 121 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 16. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 520. Sudeten, Karpathen

trimaculatus Luze, l. c. p. 527 (*Phaganthus*). Caucasus

Hadrognathus Schaum.

Schaum, Cat. Col. Eur. ed. IV, 1852, p. 31. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 43; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 910. — Jacq.

du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Eugnathus Muls. et Rey, Mém. Ac. Sc. Lyon 1851, I, p. 143; Opusc. Ent. I, 1852, p. 1. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 387.

Oncognathus Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 144.

longipalpus Muls. et Rey, Mém. Ac. Sc. Lyon I, 1851, p. 143, t. 1, f. A; Opusc. Ent. I, 1852, p. 1, t. 1, f. A. Frankreich,
Pyrenäen
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 55.
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 389. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 704.

1

Tetradelus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 90.

trigonuroides Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 91. Sikkim

1

Eupsorus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1904, p. 45.

costatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1904, p. 46. Neu-Seeland

1

Ischnoderus Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 51.

Fultoni Broun, Manual Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1041. Neu-Seeland

genalis Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 118; l. c. 1886, p. 943. „

insignis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 454. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 53, t. 1, f. 9—12. Chile

morosus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1041. Neu-Seeland

pictulus Broun, l. c. p. 1040. „

politulus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 119; l. c. 1886, p. 943. „

tectus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, d. 117; l. c. 1886, p. 943. „

7

Eudectus Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 972. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 398. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

crassicornis Lec. Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 4. Louisiana

Gerhardti Pietsch, Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) XIX, 1894, p. 17. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. Schlesien

1894, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Giraudi Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 246. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 973; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, t. 1, f. c. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 79 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 400. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Deutschland,
Schweiz,
Schottland,
Schweden

var. *Whitei* Sharp, Ent. Monthly Mag. VIII, 1871, p. 73; l. c. XXIII, 1887, p. 209. — Rye, Ent. Ann. 1872, p. 61.

Kuleynskii Rybinski, Bull. Acad. Cracow 1902, p. 4.

Tatra

rufulus Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 96; Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 270.

Japan

5

Ephelinus Cock.

Cockerell, Entom. News 1906, p. 241 (nom. mut.).

Ephelis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 219 (nec Lederer).

guttatus Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 58.

Nord-

notatus Lec. l. c. p. 58.

Amerika

pallidus Lec. l. c. p. 57.

Penn-

sylvanien

Kansas

3

Coryphium Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 344. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 968. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 68. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 392. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 701.

Harpognathus Wesm. Rec. Enc. Belg. I, 1834, p. 119.

Macropalpus Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 613.

Polychelus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 74. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 595.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 573, t. 17, f. 47—48.

aeneipennis Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 75.

angusticolle Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 344. —

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, t. 1, f. 4a;

Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 971.

— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24,

f. 120. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 80.

— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,

p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,

p. 702.

bifoveolatum Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 186.

Centr.-Asien

Nördliches

Mittel-

Europa,

Russland

- brevicolle* Halid. in Newm. Entomol. 1841, p. 187.
melanocephalum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 542.
pallipes Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 613, t. 13, f. 1—7.
Robynsi Wesm. Rec. Belg. I, 1834, p. 119.
 var. *Letzneri* Schwarz, Jahrb. schles. Ges. 1873, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 702; Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 198. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 146.
Gredleri Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 416. Tirol,
 — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 390. — Ganglb. Schweiz
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 702.
 var. *dilutipes* Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. II, Tirol
 1904, p. 197.
hyperboreum Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, Novaja-Sem-
 1879—80, p. 84; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, lia (Nord-
 p. 41. russland)
parvulum Poppius, Medd. Soc. Fn. F. Fenn. XXIX, Ost-Sibirien
 1903, p. 107.

5

Coryphiodes Bernh.

- Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 532.
Deubeli Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, Siebenbürgen
 p. 532.

1

Boreaphilus Sahlb.

- Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 433. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 899.
 — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 39; Naturgesch. Ins. Deutschl.
 II, 1856—58, p. 909. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 67.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 80. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 401. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 699.
Chevrieria Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 188.
astur Sharp, An. Soc. Esp. I, 1873, p. 266. Asturien
carinthiacus Ganglb. Soc. ent. VII, 1892, p. 17; Käf. Kärnthen
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700.
Henningianus Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 433. Lappland
 var. *longicornis* J. Sahlb. En. Brach. Fenn., Finnland
 p. 209.
Henningianus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I,
 1857, p. 41.
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 96. Japan
Lewisianus Sharp, l. c. p. 96. "
Nordenskiöldi Mäkl. Oefv. Finsk Vet. Soc. Förh. XIX, Ost-Sibirien
 1876—77, p. 25. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl.
 XVII, 1880, nr. 4, p. 106, t. 1, f. 18.

- Sahlbergi** Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXIX, 1903, p. 106. Sibirien
- velox** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 188. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 42. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 81. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 403. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700. West-Europa, Italien, Istrien, Skandinavien
- angulatus** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854—56, p. 631.
- angustatus** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 119.
- guadarramus** Sharp, An. Soc. Esp. I, 1873, p. 266.

8

Niphetodes Mill.

Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 699, 700. — Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 2, 1896, p. 174.

Subgen. *Hypsonothrus* Ganglb. l. c. p. 177.

Subgen. *Niphetodes* s. st. Ganglb. l. c. p. 177.

- Apfelbecki** Ganglb. Soc. Ent. VII, 1892, p. 17; Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 701; Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 2, 1896, p. 178. Bosnien
- Deubeli** Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 178. Siebenbürgen
- Eppelsheimi** Ganglb. l. c. p. 178.
- Leonhardi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1905, p. 588. Bosnien
- Redtenbacheri** Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 17. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 143. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700; Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 177. Ost-Karpathen
- Sahlbergi** Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 641. Bosnien
- Spaethi** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 259. Trans-sylvanien

7

Physognatus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1850, p. 303. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 152. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 61.

Physognathus Gemm. et Harold, Cat. Col. Monach. II, 1868, p. 671.

- obscurus** Sol. in Gay, Hist. Chile. IV, 1850, p. 304, t. 5, f. 9. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Bull. Norm. (2) I, p. 60. Chile

1

8. Tribus: **Dimerini.**


Bernhauer, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 326.

Dimerus Fiori.

Fiori, Soc. Nat. Mat. Modena 1899, p. 103. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 21. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 326.

staphylinoides Fiori, Nat. Mat. Modena 1899, p. 104.

Italien, Ober-
oesterreich,
Frankreich



Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 29:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae II.

Einzel-Preis: Mark 9.75

Subscriptions-Preis: Mark 6.50

10/10.87-1911



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

10. IV. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.**
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.**
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.**
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.**
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.**
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.**
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.**
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.**
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.**
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.**
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.**
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.**
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.**
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.**
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.**
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.**
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.**
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephallidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.**
(Mark 3.30) Mk. 2.15

9 MAY 1911



87

9. Tribus: **Oxytelini.**

- Oxytelini* Er. Käf. Mk. Brdb. I, 1837—1839 (1839), p. 576. — Kraatz, Natg. Ins. Dtschl. II, 1856—1858, p. 798 (excl. *Oxyporus*, *Osorius*, *Holotrochus*, *Euphantias*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.
- Oxytelini* Subtrib. tertia *Genuini* + Subtrib. quarta *Coprophilini* (excl. *Micralymma*) Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 814.
- Oxytelides* Sou-Trib. III: *Oxytelides* vrais (excl. *Trigonurus*) et Sou-Trib. IV: *Coprophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 132.
- Oxytelites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 54 (excl. *Trigonurus*).
- Oxytelina* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 117.
- Oxytelini* Sect. I: *Oxyteli* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 124 (excl. *Pholidus*).
- Oxytéliens* Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxytel. 1879, p. 11 (excl. *Prognatha*, *Glyptoma*, *Cylindrogaster*).
- Oxytelini* Group IV: *Oxyteli* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 102.
- Oxytelinae* Group *Oxytelina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 685 + Group *Thinobiina* Sharp l. c. p. 705.
- Oxytelinae* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163.

1. Subtribus: **Coprophili.**

Syntomium Curt.

Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 228. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 821. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 60. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 890. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 140. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 130. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp., Oxytel., 1879, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 679.

Biologie: Schiødte, Naturhist. Tidskr. (3) VIII, 1872—1873, p. 559—563, t. 20, f. 1—12.

aeneum Müller in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 216. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 821. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 892. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 112. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 141. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 131. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 383. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 681.	Nord- und Mittel- Europa
<i>nigroaeneum</i> Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 228.	
confragosum Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 319.	Russ. Amerika

Coprostygnus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, t. 12, f. 14.

optandus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1409. Neu-Seeland
sculptipennis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, „
 t. 12, f. 14.

2

Deleaster Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 610; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 818. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 122. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 60. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—1858, p. 901. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 125. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 376. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.

bactrianus Semen. Hor. Ross. XXXIV, 1899—1900, p. 684. Bucharra

concolor J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1866, p. 375. Kalifornien

dichrous Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 188. — Er. Mittel-
 Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839, p. 611; Gen. Europa,
 Spec. Staph. 1839—40, p. 819. — Kraatz, östl. Mittel-
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 902. — meergebiet,
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, Marocco
 f. 111. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 126.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 378. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 678.

brassicae Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 644.

var. **Leachi** Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 678. Süd-Europa,
 Caucasus

adustus Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 49.

var. **Erichsoni** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 57. „

pekinensis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 212. China

pectinatus Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 129. Abessinien

5

Zalobius J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 259. — Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) V, 1895, p. 236.

serricollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 170. Kalifornien
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 260.

spenicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Vancouver
 Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 259.

2

Asemobius Horn.

Horn, Proc. Calif. Ac. V, 1895, p. 238.

caelatus Horn, l. c. p. 238.

Kalifornien

1

Coprophilus Latr.

Latr. in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 439. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I 1837—39 (1839), p. 609; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 815. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 139. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 893; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 143. — Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 85. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 44; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 129; Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 226. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 240. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 177, 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 676. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 327.

Elonium Samouelle, Entom. Compend. I, 1819, p. 175.

Homalotrichus Solier, Hist. Chile IV, 1849, p. 472.

Subgen. *Coprophilus* s. str. Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.

Subgen. *Zonoptilus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, 39 (*Zonyptilus*); l. c. XXX, 1857, IV, p. 502.

alticola Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 93.

Himalaya

impressicollis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 323, t. 6, f. 8. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129; Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 46.

Chile

impressus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415.

Japan

longicornis Bernh. Münch. Kol. Ztsch. I, 1903, p. 188.

Turkestan

bimaculatus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 6.

pennifer Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 39; l. c. XXX, 1857, IV, p. 502; l. c. XXXI, 1858, III, t. 1, f. 6. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 99. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 328.

Turkestan,
Kaukasus

striatipennis Epp. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 291.

var. *araxis* Reitt. l. c. p. 179.

Kaukasus,
Krim

obsoletus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 292.

pennifer Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 86 (non Motsch.).

var. *dimidiatipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.

Transkaspien

var. *lateralis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. VIII; Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.

Persien,
Margelan

var. *marginalis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 292.

Sibirien

Eppelsheimi Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.

China

lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 177 (non Fauv.).

Mongolei

var. *obscurus* Reitt. l. c. p. 179.

Kaukasus

var. *sellula* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 894.

Mesopo-
tamien,
Turkestan

pentatoma Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.

Turkestan,

obscurus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 79.

Baku

piceus Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677. — Bernh.

Österreich,
Ungarn,

Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 328.

Deutsch-
land,

Russland

- rufipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 178, 292. Margelan
Schuberti Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 120. Süd-Russ-
Reitteri Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, land,
p. 69 (forte). Turkestan
simplex Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415. Japan
Solskyi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 330. Dobrudja
lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 291
(non Fauv.).
striatulus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 529. — Er. Käf. Nord- und
Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 609; Gen. Spec. Mittel-
Staph. 1839—40, p. 816. — Kraatz, Nat. Ins. Europa
Deutschl. II, 1856—58, p. 894. — Jacq. du Val,
Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 110. — Thoms.
Skand. Col. III, 1861, p. 143. — Fauv. Fn. gallo-
rhén. III, 1872, p. 130. — Muls. et Rey, Col. Fr.
Brévip. 1879, p. 243. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.
II, 1895, p. 677.
laesus Germ. Fn. Ins. Eur. XV, 1831, nr. 2.
rugosus Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 30, t. 5, f. 43.
striatus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 323, t. 6, f. 7. Chile
— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. —
Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129.
substriatus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 16. Santiago
14

Sartallus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1871, p. 217.

- signatus** Sharp, l. c. p. 217; Fauv. Ann. Mus. Genova X, Süd-
1877, p. 205. Australien
1

Oncophorus Eppelsh.

Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 46.

- miricollis** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 96. Tunis
Pirazzolii Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, „
p. 47.
2

Acrognathus Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 607; Gen. Spec. Staph.
1839—40, p. 816. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 898. —
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 59. — Thoms. Skand. Col. III,
1861, p. 141. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 126. — Muls. et Rey,
Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 674.

- mandibularis** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 468. — Er. Mittel-
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 608; Europa,
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 817. — Kraatz, Mittelmeer-
Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 900. — gebiet
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22,
f. 109. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 127. —
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 237. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 675.
1

2. Subtribus: **Actochari.****Actocharis** Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19. — Sharp, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 279. — Rye, Ent. Annual 1871, p. 27. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133.

marina Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133, t. 2, f. 2. — Rye, Ent. Ann. 1871, p. 27. *Readingi* Sharp, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 279. Frankreich, England, Istrien, Sizilien, Corsica, Constantine

1

Corallis Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 212.

polyporum Fauv. l. c. p. 213, t. 1, f. 17.

Ins. Aru,
Key

1

3. Subtribus: **Toxoderi.****Toxoderus** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 189.

Sharpia Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 488 (non Borage).

Banksi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 488. Victoria

1

Crymus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 92.

antarcticus Fauv. l. c. p. 93.

Südl. Neu-
Georgien

1

4. Subtribus: **Oxyteli.****Planeustomus** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859 (1859), p. 58. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 127. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes Oxyp. Oxyt. 1879, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 671.

Compsochilus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 895.

africanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 338.

Constantine,
Tunis

Bonnairei Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94.

cephalotes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 817. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 410. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 672.

Constantine
Dalmatien,
Griechen-
land,
Cypern,

- procerus* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 211. Korfu, Kleinasien, Süditalien
- congoensis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 66. Kongogeb.
- curtipennis* Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 43; Fn. gallo-rhén. Cat. Staph. 1875, p. VIII. Algier, Oran, Marocco, — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 383. Tunis, Weberi Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183. Sizilien, Sardinien
- elegantulus* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 896 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 674. Mittelmeer-gebiet
- filiformis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183.
- flavicollis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 155; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 129. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 384. Belgien, Kaukasus, Asturien
- Heydeni* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. Ungarn, Kroatien, S.-Rußland, Kleinasien, Kaukasus
- indicus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 21. Birma
- Kahri* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 897 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 128. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 229. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 414. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. Mittelmeer-gebiet
- macellus* Kraatz in Heyden, Span. Reise 1870, p. 85.
- microphthalmus* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 17. Algier
- miles* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 158. Italien, Algier, Tunis
- palpalis* Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 608; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 818. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 108. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 896. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 128. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brév. 1879, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. Nord- und Mittel-Europa
- Panciei* Matits, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 142. Serbien
- Rosti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1884, p. 105. Korfu, Italien

Ancyrophorus Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 886. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 666.

Ochtheophilus Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon. III, 1856, p. 1; Opusc. Entom. VII, 1856, p. 1; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 352 (nec *Octephilum* Steph.).

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 125.

Subgen. **Misancyrus** Gozis.

Gozis, Recherche, Montluçon 1886, p. 15.

Psilotrichus Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 69.

- emarginatus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 141
 nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 374. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 667. Süd-Frank-
 reich,
 Spanien,
 Marokko,
elegans Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
 p. 70.
Rosenhaueri Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 358 (nec Kiesw., Kraatz). Griechenland,
 Kaukasus

Subgen. **Ancyrophorus** s. str.

- angustatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 803. —
 Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858,
 p. 890. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 142,
 nota. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 669. Mittel-
 Europa,
 Marokko,
 Algier,
 Tunis
aureus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 168;
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 142, t. 2, f. 5. — Südl. Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Korsika,
 Marokko,
 Algier
oblitus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 364. Görz
 var. *ruficornis* Reitt. Fn. German. II, 1909,
 p. 175 nota.
biimpressus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 319. Russ.
 Amerika,
 Pyrenäen
curtipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 65. Baikal
filum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. IX, nota 2. — Portugal,
 Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, Böhmen,
 p. 401. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Österreich,
 p. 670. Bosnien
flexuosus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 614. — Frankreich
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 144. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 355. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 670.
forticornis Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 553; Daurien
 l. c. XXXV, 1862, III, p. 97.
longipennis Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854—56, Mittel-
 p. 614. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, Europa,
 1856—58, p. 888. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Italien,
 1872, p. 141. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. Korsika,
 1879, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, Sizilien
 1895, p. 668.
 ♀ *praepositus* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 370.
omalinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. — Nord- und
 Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, Mittel-
 p. 889. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 140. Europa,
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 143. — Mittelmeer-
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 371. gebiet
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 669.
parvulus Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877,
 p. 124.

- venustulus* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 84. —
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 366.
planus J. Lec. List Col. N. Amer. I, 1866, p. 26; Amer. Col. 1880, p. 242. Oberer See
Rosenhaueri Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Tirol,
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, Ungarn,
p. 887. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Sieben-
p. 668. bürgen
sericinus Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 206. Turkestan
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. IX
nota.

13

Trogophloeus Mannh.

- Mannh. Brach. 1830, p. 49. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839),
p. 599; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 801. — Lacord. Gen. Col. II,
1854, p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 56. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 868. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
1872, p. 144. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 134. — J. Lec. Trans.
Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 242. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr.
Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 255. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2,
1882—1887 (1887), p. 697. — Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 322. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 647. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr.
II, 1904, p. 43.

Subgen. **Thinodromus** Kraatz.

- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 866. — Muls. et Rey,
Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 247. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
p. 44.

- angulicollis** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, Chile
p. 36.
araucanus Fauv. l. c. p. 35.
arcitenens Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 78. „
Bernhaueri Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50. Ost-Sibirien
brevicornis Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 80. Turkestan
deceptor Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 416. Japan
dilatatus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), Mittel-
p. 599; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. — Europa,
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Mittel-
p. 867. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, meergebiet
1858, t. 21, f. 104. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III.
1872, p. 146. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 649,
— Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50.
eminens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 416. Japan
fuscipalpis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 94. Ceylon
hirticollis Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, Mittel-
p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Europa,
p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, Kaukasus,
p. 50. Nord-Afrika
latipennis Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 81. Neu-Guinea
lunatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504. — Ost-Indien
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50 nota.
nitidifrons Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 38. Chile

- Perrieri** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 177; l. c. XXIII, 1904, p. 301. Madagaskar
segnis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802.
sericatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415. Japan "

Subgen. *Carpalimus* Steph.

Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 324. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II,
 1904, p. 44.

Amisanimus Gozis, Recherche, Montluçon 1886, p. 14.

- Alluaudi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 302. Madagaskar
americanus nom. nov. Kentucky,
anthracinus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, Virginia
 p. 330 (nec Muls.).
arcifer J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 245. — Texas,
 Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 329. Florida
arcuatus Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 324. — Fauv. Fn. Nord- und
 gallo-rhén. III, 1872, p. 148. — Ganglb. Käf. Mittel-
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Europa,
 Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 53. Kaukasus,
scrobiculatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, Algier,
 p. 805. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856— Tunis
 1858, p. 870. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 134. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 263.
 var. *nigricornis* Muls. et Rey, l. c. p. 265. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650.
Motschulskyi Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 553. — Motsch. Bull. Mosc. XXXV, 1862, II, p. 93.
armicollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 95. — Klima, Algier,
 Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 54. Tunis
bicyclus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13. Brit. Ost-
 Afrika
Bodemeyeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, Kleinasien,
 p. 701. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, Korfu,
 p. 52. Ungarn
corcyreus J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1903, Sep. p. 8.
brasiliensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Brasilien
 p. 21.
caloderinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Texas
 p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 329.
centralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala,
 p. 701. Panama
corsicus Klima, Münch. Kol. Zeit. II, 1904, p. 51. Korsika
corvinus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 331. Massachu-
 setts
croceipes Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. Kuba
arcuatus Fauv. Ann. Soc. Fr. (4) III, 1863, p. 438.
dilaticollis Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 16. Lenkoran
 — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 54.
dilutus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 255. Cap Verde
distinctus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 615. — Westalpen,
 Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 870 Süd-Frank-
 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 147. reich,

- Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 51. Italien, Piemont
- episcopalis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 354. Mexiko
- fortepunctatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 22. Brasilien
- Kiesenwetteri** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 55. Kaukasus
— Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52.
- luteipes** Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 325. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 36; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 450. Chile, England
- andicola** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 450.
- fuscus** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 325. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 451.
- spinicollis** Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 8; Ent. Annual 1871, p. 36. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 374. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148 nota. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43.
- Mannerheimi** Kolen. Melet. Entom. III, 1846, p. 26, t. 12, f. 2. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 51. Frankreich, Piemont, Sizilien, Spanien, Kaukasus, Schweiz, Marokko, Algier, Tunis
- Brebissoni** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1864, p. 312.
- plagiatus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 428. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 147. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 261.
- mollis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 702. Guatemala, Panama
- multivittatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 354. Mexiko
- obscurus** Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 324, t. 6, f. 9. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 37; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. Chile
- mersus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 448.
- puncticollis** Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 332 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 7.
- pauloensis** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 288. Brasilien
- pilosellus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 228. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 53. Kaukasus, Lenkoran
- pustulatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 20. Brasilien
- signatus** Er. Act. Ac. Caes. Leop. XVI, 1834, Suppl. I, p. 229. — Meyen, Reise u. Erde III, 1834, p. 353. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 803. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 447. Chile
- singularis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13. Kilimandjaro

- socius** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 21.
tibialis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13.
transversalis Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 202. —
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52.
triangulum Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 701.
vittatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 702.

Annam
 Brit. Ost-
 Afrika
 Madeira,
 Canar. Ins.,
 Oran,
 Algier
 Guatemala

„

Subgen. *Trogophloeus* s. str.

- Boopinus* Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.
Taenosoma Mannh. Brachel. 1830, p. 50. — Steph. Ill. Brit. V,
 1832, p. 323. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr.
 II, 1904, p. 27.
- aequalis** Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 44. — Fauv.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 441.
agonus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 356.
alutaceus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 95. — Klima,
 Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.
anceps Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 194 (*Boo-*
pinus).
angulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 804.
angusticollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LVII, 1907,
 p. 373.
anthracinus Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 177.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 150. —
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 274. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. —
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.
apacheanus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 344.
apicalis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 229. —
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.
apicicornis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.
argentinus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.
argutus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 801.
aridus Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 43.
rubripennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III,
 1863, p. 440 (veris).
arizonae Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 338.
armatus Cas. l. c. p. 335.
atramentarius Lynch, Estaf. Buen. Air. 1884, p. 371.
Augustae Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901,
 p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
 p. 55.
bilineatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 324, t. 27, f. 4. —
 Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 181. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 149; Ann.
 Mus. Genova XIII, 1878, p. 489. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch.
 Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.

Kuba
 Tennessee
 Süd-Europa,
 Nord-
 Afrika,
 Australien
 Brasilien
 Japan
 Frankreich,
 Spanien,
 Ungarn,
 Turkestan
 Arizona
 Kaukasus,
 Korsika
 Zanzibar,
 Kongo
 Argentinien
 Mexico
 Kuba
 Arizona
 Kalifornien
 Buenos Aires
 Istrien,
 Algier
 Paläarktische
 Region,
 Nord-
 Amerika,
 Chile,
 Capland,

- caucasicus* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 194. Australien
- corticinus* var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 645.
- lathrobioides* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 433.
- riparius* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 467. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 600; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 807. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 871. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 267.
- sobrinus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 449.
- suspectus* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 270.
- bipuncticollis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 372. Texas
- blediinus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. Kalifornien
— Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 375.
- bovinus** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289. Argentinien
- brachypterus** J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 361. Michigan
- breviceps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 398. Amazon.
- carbonarius** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 490. Victoria
- Caseyi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 23. Michigan
- confinis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 369. Kalifornien
- confusus** Cas. l. c. p. 378. New Jersey
- congener** Cas. l. c. p. 355. Pennsylvanien
- congoensis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67. Kongo
- conjunctus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 342. Oregon
- convexulus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 374. Kansas
- cordovens** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356. Mexiko
- corticinus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 192. — Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 603; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 809. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 876. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 153. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. II, 1904, p. 59. Paläarkt.
- atratus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 327. Reg., Nord- und Mittel-Amerika,
- exiguus* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 600. Kuba
- minus* Runde, Brach. Hal. 1835, p. 20.
- nanus* Woll. Ins. Mad. 1857, p. 611.
- var. *fulvipennis* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 440.
- curtulus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699. Guatemala.
- debilis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 374. Panama
- decoloratus** Cas. l. c. p. 382. Kalifornien
- delicatus** Cas. l. c. p. 365. Pennsylvanien
Michigan,
Pennsylvanien.
Indiana

- dentiger** Cas. l. c. p. 333.
detractus Cas. l. c. p. 361.
dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 302.
difficilis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 354.
- diffusus** Cas. l. c. p. 350.
duplex Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 248.
- egregius** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 352.
elongatulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I. 1837—39 (1839), p. 601; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 807. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 874. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 154. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
brevipennis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 199.
- excellens** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.
- facetus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 378.
- fallax** Cas. l. c. p. 375.
- ferrugineus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 804.
- filarius** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 698.
- filum** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 381.
- flavipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 808.
- fontinalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 52; Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 544.
- foveicollis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 180.
- foveolatus** Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 419. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 878. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 156. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 60.
- fuliginosus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 102. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 602; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 808. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 875. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 152. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 283. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
- fulvipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 804. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 697. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 71.
- texanus* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 334.

Arizona
 Iowa
 Madagaskar
 Nord-
 Carolina,
 Maryland
 Kalifornien
 Neu-Kale-
 donien
 Rhode Island
 Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Italien

Guatemala.

Rhode Island
 Oberer See
 Venezuela
 Guatemala

Kalifornien
 Antillen,
 Mexiko
 Hawai

Ost-Indien,
 Sunda-I.,
 Neu-Guinea
 Europa,
 Kaukasus,
 Mittelmeer-
 gebiet

Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Kaukasus

Antillen,
 Nord- und
 Mittel-
 Amerika,
 Süd-
 Amerika,
 Hawai

- Ganglbaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59. N. Österreich, Ungarn
- genalis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67. Kongo, Natal
- gilae** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 335. Nord-Amerika
- globicollis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 145. West-Afrika
- globulicollis** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 231. Argentinien
- gracilis** Mannh. Brach. 1830, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 657. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65. Europa, Kaukasus, Nord-Amerika,
- litoralis* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 314.
- tenellus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 605; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 811. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 880. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 160. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 311. Marokko, Oran, Algier, Tunis, Azoren
- graphicus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 362. Missouri
- halophilus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 373 nota. Europa, Kaukasus, Mittelmeergebiet
- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 158. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 298. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 63. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.
- curtipennis* Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 300.
- subrugulosus* Rey, l. c. p. 301.
- var. *simplicicollis* Woll. Ins. Mader. 1857, p. 203.
- Heydeni** Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59. Turkestan, Kaukasus
- hilaris** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 399. Amazon.
- imbellis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 346. Iowa
- impressipennis** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 448. Chile
- impressus** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 467. Europa, Kaukasus, Constantine
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.
- affinis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 202.
- bilineatus* var. Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806.
- incrassatus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221.
- inquilinus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 603. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 874. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 295.
- obsoletus* Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 279.
- incertus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 364. Nord-Amerika

- indicus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 179. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 144; l. c. VIII, 1889, p. 247.
ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 44.
flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, p. 43. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 150.
- ingens** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 363.
- inquisitus** Cas. l. c. p. 377.
- insignellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700.
- insolitus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 380.
Klimai Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 593. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.
- Koppi** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 146.
- languidus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 371.
- lapsus** Cas. l. c. p. 350.
- latifrons** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 399.
- lepidicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 94.
- lepidus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 347.
- lithocharinus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 245. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 353.
- longicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 373.
- macropterus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 180.
- malgaceus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.
- maritimus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1903, p. 615.
- mediocris** nom. nov.
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356 (nec Casey).
- memnonius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 61.
- mexicanus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 333.
- misellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700.
- modestus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 359.
- monachus** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 232.
- morio** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 805. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 342.
- mundus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 397.
- nanulus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 358.
- nigrellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.
- nigrita** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 202. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 61. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 57.
bilineatus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 599.
insularis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 127.
oculatus Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 74.
- Ost-Indien,
Ceylon,
Sunda-
Inseln
- Iowa,
Illinois
Texas
Guatemala
- Kalifornien
Kleinasien
- West-Afrika
- Texas
Kalifornien
Amazon.
Celebes
Iowa
Kalifornien
- Japan
- Constantine
Madagaskar
Neu-Seeland
Mexiko
- Ägypten
- Mexiko
Guatemala
- Texas
Argentinien
Pennsyl-
vanien,
Michigan,
Kansas
Amazon.
Texas
Guatemala
- Madeira,
Mittel-
meergeb.,
Madagaskar
Canar.,
Reunion,
Kaukasus,
Neu-
Guinea,
Ostindien

- niloticus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 808. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64. Ägypten,
Algier,
Tunis
- nitidiventris** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I,
1861, p. 447. Chile
- nitidus** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 147. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 878 nota. Südl. Mittel-
Eur., Kau-
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 155. — kusus,
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 289. — Mittel-
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 654. — meergeb.
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.
- obesus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 375. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 873. — Mittel-
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 276. Europa,
fossulatus Motsch. Bull. Mosc. XXIX, 1857, IV, Mittel-
p. 505. meergeb.,
mancus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 345. Nord-
memnonius Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Amerika,
p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Neu-Kale-
p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, donien,
p. 56. Cap Verde
- spectatus* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 345.
- tarsalis* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 196.
- obliquus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 353. Kalifornien
- occiduus** Cas. l. c. p. 339. „
- opacus** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 146. — Kraatz, Naturg. Piemont,
Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 871 nota. — Fauv. Krain,
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 149 nota. — Muls. Schweiz,
et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 270 nota. — Istrien,
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima, Kroatien
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.
- pacificus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 337. Kalifornien
- pallidulus** Cas. l. c. p. 373. Oberer See
- paludicola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, Süd-
p. 49. Australien
- papuensis** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 81. Neu-Guinea
- parvulus** Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 175 (*Oxy- Frankreich,*
telus). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 159. Griechen-
— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 306. — land,
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Klima, Korsika,
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64. Nord-
Afrika
- pauperculus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 370. Kalifornien
- pertenuis** Cas. l. c. p. 360. Texas
- phloeoporinus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Illinois,
p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 351. Iowa
- planellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala,
p. 698. Panama
- planicollis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 45. Ceylon
- politus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221, 431. — Mittelmeer-
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 875 gebiet
nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 152.
— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 280. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima,
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
- Poppiusi** nom. nov. Ostsibirien
- latipennis* Popp. Öfv. Finska Vet. Soc. LI, 1908—
09, nr. 4, p. 7 (nec Fauv.).

- probus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 358. Nord-Carolina
- prominens** Cas. l. c. p. 336. Kalifornien
- providus** Cas. l. c. p. 376. New Jersey
- pseudorivularis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 355. Mexiko
- pudicus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 368. New Jersey
- pueblanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356. Mexiko
- punctatellus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 879. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 155. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 287. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59. Mittel-Europa, Italien
- myrmecophilus* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 281.
- pygmaeus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 574.
- punctatus** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 194; l. c. XIII, 1878, p. 490 Australien
- punctipennis** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 431. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 156. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 293. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 62. Frankreich, Spanien, Korsika, Nord-Afrika,
- pusillus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 78. — Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 605; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 811. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 880. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 159. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 309. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64. Europa, Kaukasus, Madeira, Nord-Amerika, Mittelmeergebiet
- affinis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 326.
- corticinus* Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 468.
- exilis* Woll. Ann. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 105.
- fuliginosus* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 460.
- picipennis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 325.
- rufipennis* Steph. l. c. p. 326.
- tantillus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 383 (*veris*).
- quadripunctatus** Say (*Stenus*), Trans. Am. Philad. Soc. IV, 1834, p. 459. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 340. Pennsylvanien, New York
- laticollis* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 55.
- Reitteri** Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 57. Korfu
- rivularis** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 552. Paläarktische Region, Nord-Amerika
- Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.
- bilineatus* Er. Käf. Mark 1837—39 (1839), p. 600; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 872. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 271.

- corticinus* Gyll. Ins. Spec. II, 1810, p. 645.
Erichsoni Sharp, Ent. Month. Mag. VII, p. 182. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 150.
metuens Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 274.
obscurus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 326.
spretus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 343
 (veris).
subaequus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 279.
robustus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 369.
rufipennis Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878,
 p. 422. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
 p. 62.
rufitarsis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 14.
salicola Cas. Ann. N. York Ac. VIII, 1895, p. 450.
scabrosus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 179.
scrupulus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 379.
sculptilis Cas. l. c. p. 354.
sedatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 417.
senilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 51; Fn.
 Hawaiens. III, V, 1908, p. 543.
Sharpi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 229;
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 355.
punctipennis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—
 1887 (1887), p. 701.
siamensis Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 144; Ann. Soc.
 Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 178.
siculus Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp.
 Oxyt. 1879, p. 291. — Klima, Münch. Kol.
 Zeitschr. II, 1904, p. 60.
simplex Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 505. —
 Kraatz, Archiv Natg. XXV, 1859, I, p. 180. —
 Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 26.
simplarius J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244.
 — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 373.
Smithi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 229.
stricticollis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861,
 p. 449.
subdenticulatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.
subtilis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 606;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 812. — Kraatz,
 Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 881. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 160. — Muls. et Rey,
 Col. Fr. Brévip. 1879, p. 314. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 657. — Klima, Münch.
 Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
indigens Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 362.
suffusus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 698.
temporalis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 357.

New York
 Griechenland,
 Syrien,
 Nord-
 Afrika

Brit.
 Ost-Afrika
 Utah
 Ost-Indien
 Texas
 Kalifornien
 Japan
 Hawai

Guatemala,
 Mexiko

Ost-Indien,
 Madagas-
 kar, Sunda-
 Inseln

Sizilien,
 Süd-Italien,
 Korfu

Ost-Indien,
 Sunda Ins.,
 Australien
 Coney-Island

Grenada,
 Bolivien,
 Argentinien
 Chile

Paraguay
 Mittel-
 Europa,
 Rhode
 Island,
 Pennsylvanien

Guatemala

New York,
 Massachu-
 setts

- tener** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 249. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
- transmarinus** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 14.
- trogloodytes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. —
Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 62. — Klima,
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 61.
var. *ruficollis* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 601. —
Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 62.
- uniformis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244.
— Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 381.
- vagus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 417.
- varicornis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV,
1904, p. 24.
- velutinus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 700.
- vicinus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 400.
- Zellichi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 189. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 61.
- Turkestan
- Brit. Ost-
Afrika
- Mittelmeer-
gebiet,
Canar.
Inseln
- Georgien,
Pennsyl-
vanien
- Japan
- Grenada
- Panama
- Amazon.
- Dalmatien

Subgen. *Teropalpus* Sol.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 330. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX,
1900, p. 182.

Trogolinus Sharp, Ent. Monthly Mag. (2) XI, 1900, p. 200.

- coloratus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 231.
- luniger** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 40.
- senex** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 40.
- suturalis** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 331, t. 5,
f. 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859,
p. 7. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 128.
var. *melanocephalus* Sol. l. c. p. 331.
- unicolor** Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 232.
— Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 182. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43.
- Neu-Seeland
- Chile
- „
- „
- Neu-Seeland,
England

Subgen. *Troginus* Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 317. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 46.

- abdominalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 52;
Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 544.
- boops** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.
- exiguus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 604;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 809. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877. —
J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 180.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 157; Ann.
Mus. Genova XIII, 1878, p. 195. — Muls. et
Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 317. — Klima,
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
aberrans Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 85.
atomus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 658.
- Oahu,
Antillen
- Madagaskar
- Europa,
Mittel-
meergebiet,
Afrika,
Mada-
gaskar,
Turkestan,
Japan,
Ostindien,
Ceylon,
Sunda-Ins.

- bledioides* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 601.
despectus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 658.
discolor Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 400.
glabricollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 552.
luteicornis Muls et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 319.
minimus Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, p. 180.
minusculus Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 144.
despectus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 400. Nord- und
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 157. — Mittel-
 Mars. Ab. VIII, 1871, p. 376. — Muls. et Rey, Europa,
 Opusc. ent. XIV, 1870, p. 113; Ann. Soc. Linn. Kaukasus
 Lyon XVIII, 1870, p. 19; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 320. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
exiguus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 658.
Schneideri Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 659. — Borkum
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 66.
taprobanae Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. Ceylon
zealandicus Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, Neu-Seeland
 p. 233.
 223

Xerophygus Kraatz.

Kraatz, Archiv Natg. XXV, 1859, I, p. 178.

- flavipes** Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 143. Ceylon
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 95. Sumatra
pallipes Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 505. Ost-Indien
 — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 178,
 t. 3, f. 1a u. b.

3

Blediotrogus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 234.

- eribricollis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 184. Auckland
guttiger Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 234. Neu-Seeland

2

Trogactus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 702.

- Championi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 Panama
 (1887), p. 702.
elegans Sharp, l. c. p. 702. „
funnebris Sharp, l. c. p. 703. „
Godmani Sharp, l. c. p. 703. „
mirabilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 353.

5

Parosus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 704.

hilaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
p. 704.

Skalitzkyi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 12. Antillen
2

Apocellus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 812. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 807. — Lynch, Estaf. Buenos-Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 373. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 153. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 694; Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 400.

albipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 814.

analis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 247.
— Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 159.
— Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 695.

argentinus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 287.

barbatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 696.

bicolor Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 154.

brevipennis Cas. l. c. p. 158.

cognatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 695.

crassicornis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 156.

curtipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
p. 357.

gracilicornis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 157.

gracilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887).
p. 696.

laevis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 401.

longipennis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 287.

mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. XII, 1880,
p. 254.

moestus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 801.

muticus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 695.

niger Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 232.

opacipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
p. 357.

opacus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 287.

parvipennis Bernh. l. c. p. 288.

planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 401.

praestans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 696.

sericeus Wasm. Krit. Verzeichn. Myrmec. 1894, p. 212.

sordidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 697.

sphaericollis Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 455.

— Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 813,
t. 2, f. 5. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI,
1877, p. 248. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc.
1884, p. 155. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I,
2, 1882—87 (1887), p. 694.

Kolumbien

Kalifornien,

Arizona,

Louisiana,

Mexiko

Argentinien

Panama

Nebraska

Louisiana

Louisiana,

Mittel-

amerika

Colorado

Mexiko

Kalifornien

Mexiko

Amazon.

Paraguay

Mendoza

Mexiko

„

Texas

Mexiko

Argentinien

Paraguay

Amazon.

Guatemala,

Panama

Brasilien

Guatemala

Nord-

Amerika,

Mexiko,

Guatemala

- amabilis* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 116 (*Falagria*).
globosus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 30.
longicornis Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 116.
stilicoides J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 247. Florida
 — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 161.
ustulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 813. Antillen

27

Oxytelopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 199.

- apicipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 200. Birma
cimicoides Fauv. l. c. p. 200. "
genalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 96. Perak
madecassa Fauv. l. c. p. 96. Madagaskar
pseudopsina Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 201. Birma

5

Delopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 198.

- cornuta* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 198. Birma
microphthalma Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 95. Java
 — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 12.
seticornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 199. Birma

3

Oxytelodes Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 290.

- Holdhausi* Bernh. l. c. p. 290. Brasilien

1

Hoplitodes Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 109.

- echidne* Fauv. l. c. p. 110. Natal

1

Aploderus Steph.

- Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 321. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133.
 — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 219.
 — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 71.

Haploderus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 863.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 645.

Phloeonaeus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 597;
 Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 799. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 56.

- annectens* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 242. Kalifornien
 — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 77.

- caelatus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 103. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 597; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 800. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 106. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 865. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 161. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 221. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 646.
- biarcuatus* Matth. Entom. Mag. V, 1838, p. 198.
- brachypterus* Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 510.
- spinipes* Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. p. 116, f. 6.
- caesus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1837), p. 598; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 800. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, p. 866. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 162. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 647.
- cephalotes** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 74.
- cordicollis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 57.
- flavipennis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 76.
- japonicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 374.
- linearis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 55. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 73.
- princeps** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 75.
- speculiventris** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 97.
- Nord- und
Mittel-
Europa,
Mittel-
meerg.

Mittel-
Europa

Nord-
Amerika
Neu-Seeland

Nord-
Amerika
Japan

Oregon,
Kalifornien
Br.-Ko-
lumbien
Nord-
Amerika
Java

10

Anisopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 108.

- carinata** Fauv. l. c. p. 109.
- flexuosa** Fauv. l. c. p. 108.
- Zanzibar
Zambesi

2

Oxytelus Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 101. — Mannh. Brachél. 1830, p. 47. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 314. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1837), p. 588; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 785. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 118. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 847. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 55. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 163. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 43. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 633.

Subgen. *Anotylus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 130.Subgen. *Caccoporus* Thoms. l. c. p. 127.Subgen. *Epomotylus* Thoms. l. c. p. 128.

Subgen. *Emopotylus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359.

Subgen. *Oxytelus* s. str.

Subgen. *Tanycraerus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 129.

Biologie: Walzl, Isis 1837, p. 277. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 400, t. 2, f. 2. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 64, 74, 88. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124, 125. — Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 1.

- africanus** Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 83. Tripolis,
flavipennis Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, Tunis
 1889, p. 313.
- akazawensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, Japan
 1907, p. 379 (*Caccoporus*).
- alpicola** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 394. Colorado
- alutaceifrons** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, St. Helena
 p. 410.
- alutellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 120. Gabun
- antennalis** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 249. Neu-
 Kaledonien
- antennarius** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, Japan
 1907, p. 377 (*Oxytelus* s. str.).
- anticus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 304. Madagaskar
- antipodum** Bernh. Fauna Südwest-Austral. II, 2, 1908, Südwest-
 p. 15 (*Anotylus*). Australien
- apicalis** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494. West-
 Australien
- apicicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127. Kolumbien
- armatifrons** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 Panama
 (1887), p. 692.
- armiger** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 202. Birma
- asperiventris** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 260. Neu-
 Kaledonien
- atriceps** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 98 (*Anotylus*). Celebes
- aurantiacus** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 236; Ann. Madagaskar
 Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 325.
- barbatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 113. Java
- Barbiellinii** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 292 (*Anotylus*). Brasilien
- bellicosus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 202 (*Tanycraerus*). Birma
- bengalensis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), Bengal
 p. 789. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
 I, p. 171.
- Bernhaueri** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, Österreich,
 1898, p. 400 (*Anotylus*). Ungarn
- bicolor** Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. Ceylon
- bidentulus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 125. Natal
- bigemmatulus** Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, Java
 p. 80.
- Boehmi** Bernh. Entom. Blätter VI, 1910, p. 256 (*Anotylus*). Ägypten
- Bohemani** nom. nov. Kapland
picipennis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 295 (nec
Steph. rugosus var.).
- borealis** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 11. Ost-Sibirien
- brasiliensis** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 803 Brasilien
 (*Anotylus*).
- breviceps** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 385. N. York

- brevipennis** Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 42; Fn. gallo-rhén. III, Cat. Staph. 1875, p. XI nota; Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 93. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 370 (*Anotylus*).
- brunneipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199 nota.
- bubalus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 97 (*Anotylus*).
- caffer** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 790 (*Anotylus*).
- celebensis** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 145; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 178.
- cephalotes** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 66.
- Championi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 131.
- clavicornis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 219.
- claviger** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104.
- clypeatus** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 12.
- clypeonitens** Pandellé, Mat. Cat. Grenier 1867, p. 171. — Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 174. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 92. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 643 (*Anotylus*).
- cognatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94 (*Anotylus*).
- collaris** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 789.
- colonus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 135 (*Tanycraerus*).
- complanatus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 595; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 795. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 858. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 172. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 (*Anotylus*).
- depressus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 457.
- pallipes** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 319.
- congoensis** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 237.
- convergens** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 386.
- cordovens** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 358 (*Caccoporus*).
- coriaceus** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 250.
- crassicornis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 92 (*Oxytelus* s. st.).
- crassus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 106.
- crebratus** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 377 (*Anotylus*).
- crenaticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 96.
- crenulifer** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 117.
- cribriceps** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 496 (*Anotylus*).
- cribrum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 114.
- cuernavacanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359 (*Emopotylus*).
- curticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 124.
- Algier,
Marokko,
Oran
- Australien
- Java
- Kapland
- Manila,
Celebes
- Himalaya
Guatemala
Neu-Guinea
Abessinien
Behring-Ins.
Mittel-
Europa,
Italien
- Japan
- Tasmanien
West-Afrika
- Europa,
Mittelmeer-
gebiet
- West-Afrika
Florida
- Mexiko
- Neu-
Kaledonien
Japan
- Bolivien
Deutsch-Ost-
Afrika
Abessinien
Gabun
Melbourne
- Sikkim,
Bengalen
Mexiko
- Gabun

- curtus** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 219 (*Anotylus*). Neu-Holland
- densus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 393. Texas,
Maryland
- dentifer** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 218. Neu-Guinea
- dentifrons** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 107. Amaz.,
Antillen
- depauperatus** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 254. Cap Verd.
- derasus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689. Mittel-
Amerika
- dilutipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 101 (*Anotylus*). Gabun,
Kongo,
Kiliman-
djaru
- discipennis** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 197 (*Anotylus*). Tasmanien,
N. S. Wales.
- dispar** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 209. Tasmanien
- emeritus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 (*Anotylus*). Guatemala
- exaratus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 693. „
- exasperatus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 175. Ceylon
- exiguus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 798. Nord-
Amerika
— Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 397 (*Anotylus*).
- parvulus* Melsh. Proc. Ac. Philad. II, 1846, p. 41.
- pygmaeus* Melsh. l. c. p. 41.
- extensicornis** Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 79. Java
- externus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 694. Panama
- Fairmairei** Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 175. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*). Mittel-
Europa,
Pyrenäen
- transversalis* Czwal. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 419.
- fallax** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 215. Molukken
- Fauveli** nom. nov. Madagaskar,
Gabun
- bicolor* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104 (nec Walker).
- ferrugineus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 173. Hawai
— Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 71. — Sharp, Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 543 (*Caccoporus*).
- bledioides* Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 125. Ceylon,
Ostindien,
Sunda-Ins.,
Japan,
Hawai,
Seychellen,
Mada-
gaskar,
Comoren,
Zanzibar,
Kolumbien,
Panama,
Antillen
- laevior* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 92.
- laxipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 527.

- flavior** Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. XXVI, 1902, p. 24.
- flavipennis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 172.
- flavipes** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.
- foraminosus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 118.
- fragilis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 (*Anotylus*).
- fulgidus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 123.
- fulvipes** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 590; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 187. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 852. — Thoms. Skand. Col. IX, 1861, p. 293. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 167. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 638 (*Oxytelus* s. st.).
- tarandus** Motsch. Etud. Ent. I, 1852, p. 18; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 554.
- funebri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 376 (*Anotylus*).
- fusciceps** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 179 (*Cacoporus*).
- fusicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 120.
- gabonensis** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 238 (*Anotylus*).
- galla** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 121.
- Ganglbaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 (*Anotylus*).
- gibbulus** Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 122, t. 1, f. 9 (*Anotylus*).
- gigantulus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 99.
- glareosus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 610. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 66 (*Anotylus*).
- grandis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 136 (*Tanycraerus*).
- gregarius** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 414.
- hamacenus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 122.
- hamatus** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 863. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 102. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*).
- affinis** Czw. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 420. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 371. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 248. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176 nota. — J. Sahlb. En. Col. brach. Feun. 1876, p. 177.
- hamuliger** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127.
- heterocerus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104 (*Anotylus*).

Australien

Ost-Indien

König-

Georgs-

Sund

Senegal,

Ost-Afrika

Guatemala,

Panama

Ost-Afrika

Nord- und

Mittel-

Europa

Japan

Madagaskar

Zambesi

Kamerun,

Gabun,

Usambara

Abessinien

Japan

Kaukasus

Siam

Madeira,

Canar. Ins.,

Antillen,

Mauritius,

Java

West-Afrika,

Usambara

Japan

Abessinien

Mittel-

Europa,

Italien,

Finnland

Guyana

Gabun

- heterophthalmus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 101. N. S. Wales
- hirtulus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 68. Ost-Indien
- hybridus** Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 121 (Anotylus). Kaukasus
- Jelskyi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 126. Peru
- jessoensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 378 (Tanycraerus). Japan
- impennis** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 198; l. c. XIII, 1878, p. 493. Victoria
- impressifrons** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 200 nota (Anotylus). Australien
- inaequalis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127. Argentinien
- incilis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 693. Guatemala, Panama
- incisicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 103. Deutsch-Ost-Afrika
- incisus** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504. Ost-Indien
- incolumis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 791. Nord-Amerika,
— J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. Süd-
— Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 391 staaten
(Anotylus).
- inconstans** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 210. West-Australien
- iners** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 94 Japan
(Caccoporus).
- insecatus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 189. — Er. Europa
Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 589;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 787. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 852. —
Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 127. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 166. — Muls. et
Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 51. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (Oxytelus s. str.).
carinatus var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 453.
nitidus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 318.
- insignitus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 188. — Er. Amerika,
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 793. — J. Lec. Mauritius,
Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236. — Réunion,
Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Tahiti,
p. 689. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, Madeira
p. 384 (Anotylus).
americanus Mannh. Brach. 1830, p. 48.
pumilio Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Fauv.
Rev. d'Ent. X, 1891, p. 91.
- intricatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 794. Mittel-
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, europa,
p. 859. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 172. Mittel-
— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 82. meergebiet
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642
(Anotylus).
scaber Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 82.
- inustus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 188. — Er. „
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 593;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 791. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 856. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 170. — Muls.

- et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 69. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 640 (*Anotylus*).
- maxillosus* Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 154.
- invenustus* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 389.
- Kraatz** nom. nov.
- pulcher* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 173 (nec Grav.).
- laevissimus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 128.
- laqueatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 513. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 167. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 638 (*Tanycraerus*).
- fuscipennis* Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 233. — Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1869, p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 387.
- luteipennis* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 593; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 792. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 854. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 129. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 65. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 688.
- nitens* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 316.
- plagiatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 554.
- plagifer* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 649.
- lateralis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 207.
- laticornis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 95 (*Anotylus*).
- latifrons* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 692.
- latiusculus* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 176. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 67.
- sulcifrons* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. XI.
- Lewisius** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 95 (*Anotylus*).
- lividus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 503. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 171 (*Caccoporus*).
- lobatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.
- longicornis* Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 80.
- lucens* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 34 (*Tanycraerus*).
- lucidus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689.
- madagascariensis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 793 (*Caccoporus*).
- Magdalenae** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 132.
- mammillatus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 53.
- marginatus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 96.

Maryland
Ost-Indien

Amazon.
Paläarkt.
Gebiet,
Nord- und
Mittel-
Amerika,
Brasilien

Australien

Japan

Panama

Indomalay.
Gebiet,
Mada-
gaskar,
Gabun,
Süd-Afrika,
Australien,
Syrien,
Ägypten

Japan

Ost-Indien,
Ceylon,
Shanghai

Madagaskar

Java

Sumatra,

Java

Guatemala,

Panama

Madagaskar

Kolumbien,
Ecuador

Daurien

Japan

- megacephalus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 99. Ost-Indien
megaceros Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 201 (*Tany-
 craerus*). Ost-Indien,
 Sumatra
megalomerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 123. Gabun
melas Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 196; l. c. Tasmanien
 XIII, 1878, p. 492.
m-elevatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, Australien
 1906, p. 206.
micans Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 175 (*Tany-
 craerus*). Ceylon,
 Ost-Indien,
 Mada-
 gaskar,
 Abessinien,
 Kapland
puncticeps Kraatz (♀), l. c. p. 176. Tasmanien
- micropterus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, Siam,
 1906, p. 203, t. 18, f. 4. Sunda-Ins.
migrator Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 100. Japan
- mimulus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94
 (*Anotylus*). Kolumbien
minimus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 798. Amani
miriceps Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 96. Bolivien
monodon Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 130. Kalifornien
montanus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 388. Pennsyl-
munitus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 385. vanien
 Australien
- myops** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199. Nord-
nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 797. Amerika
 — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1903, p. 384. Kalifornien,
niger J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. Brit.
 — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 392. Kolumbien
- nigriceps** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 171
 (*Caccoporus*). Ost-Indien,
 Sunda-I.,
 Ceylon,
 Süd-China
- nimius** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 388. Pennsyl-
 vanien
- nitens** Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. XXIV. La Plata,
 Montevideo
- nitidifrons** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, Afrik. Inseln,
 p. 411. Hawai,
advena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 50; Gabun,
 Trans. Roy. Soc. Dublin III, 1885, p. 223; Fn. Zanzibar,
 Haw. III, V, 1908, p. 543. — Fauv. Rev. d'Ent. Birma,
 XXI, 1902, p. 65. Philippinen
- nitidipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 102. Madagaskar
nitidulus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 107. — Er. Paläarkt.
 Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 594; Gebiet,
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 795. — Kraatz, Nord-
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 860. — Amerika
 Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 171. — Muls. et
 Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 76. — Cas. Ann.
 N. York Ac. VII, 1893, p. 394. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 (*Anotylus*).
angustatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 320.
asper Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 78.

- flavipes* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 318.
pedicellus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 102.
piceus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 236.
piceus var. Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 384.
punctatus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236.
ruficrus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 320.
 var. *luridipennis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 84.
subnitidus Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 171, nota.
obscorellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 131.
obscurifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.
occidentalis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199.
occipitalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 116.
ocularis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 198.
opacicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 217.
opacifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 93.
opacinus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 221 (*Anotylus*).
opacus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 851. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus* s. st.).
paradoxus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 177 (*Tanycraerus*).
parasitus Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 69.
parumpunctatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 25.
parcepunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 121.
pennsylvanicus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 792. — J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, p. 390 (*Anotylus*).
Perrisi Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. VI, 1861, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Bull. p. 34; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 169. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 640 (*Anotylus*).
maritimus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 131.
 var. *oceanus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 292.
fulvipes Hardy et Bold, Murray Cat. —
piceicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 495 (*Anotylus*).
piceus L. Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 686. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 590; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 788. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 853. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 168. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 60. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639 (*Caccoporus*).
humilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 204.
japonicus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 10.
rugosus Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 648.

Turkestan,
Kaukasus

Franz.

Guyana
Australien

„
Java

Australien
Neu-Guinea
Japan
Brasilien

N.-Öster-
reich,
Ungarn,
Süd-
Russland
Bolivien

Ceylon
Australien

Kongo
Östliches
Nord-
Amerika

West-Europa,
Nördl.
Mittel-
Europa,
Tunis,
England,
Schweden

N. S. Wales

Palä-
arktisches
Gebiet,
Japan

- sulcatus* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97. —
 Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 79.
- picticornis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 249. Neu-Kaledonien, Washington
- placusinus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 392.
- plagiatus* Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 81. Spanien
- planus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 102. Abessinien, Sa. Leone, Natal
- plumbeus* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 218. Neu-Guinea
- politus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 794. Österreich, Siebenbürgen, Süd-Ungarn
- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 859. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 641 (*Anotylus*).
- bisulcatus* Petri, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Nat. XLI, 1891, p. 16.
- principalis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 688. Guatemala
- pubiventris* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 119. Gabun
- pumilus* Er. Käf. Mk. Brandb. I, 1837—1839 (1839), p. 596; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 797. Mittel- u. Süd-Europa, Russland, Persien, Westl. Nord-Afrika
- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 861. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 173. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*).
- spiniventris* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 307.
- punctipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 113. Sikkim
- pusillus* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 296. Kapland
- pygmaeus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 176. Ceylon, Hawaii, Ost-Indien, Aden
- Sharp, Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 543 (*Anotylus*).
- pusillimus* Kraatz, l. c. p. 177.
- tenuis* Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 70.
- quinesulcatus* Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 291 (*Anotylus*). Brasilien
- Raffrayi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 117. Java, Ost-Indien
- reductus* Fauv. l. c. p. 124. Deutsch-Ost-Afrika
- rhopalocerus* Fauv. l. c. p. 132. Bolivien
- robusticornis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 82. Turkestan
- robustus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 383 (*Tanycraerus*). Kaschmir
- rubeculus* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 497.
- rufinodis* Fauv. l. c. p. 493. Victoria
- rufus* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 174 (*Anotylus*). Australien
- rugicollis* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 220 (*Anotylus*). Ceylon
- rugifrons* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus* s. st.). Neu-Holland
- elegans* Meinert, Ent. Medd. 1890, p. 257 (veris). Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus

- Eppelsheimi* Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 307. — Kellner, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 358. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 165. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 50.
- rugosus** F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 588; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 786. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 850. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 102. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 165. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 47. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 391. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 636 (*Oxytelus*).
- basalis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 41.
- carinatus* Panz. Fn. Germ. LVII, 1798, nr. 24.
- crenatulus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 119 (*Omalium*).
- piceus* Ol. Entom. III, 1789—1808, nr. 42, p. 20, t. 3, f. 30.
- picipennis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 316.
- pulcher* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 107.
- striatus* Ström, Act. Nidros. IV, p. 35.
- sulcatus* Fourcr. Entom. Paris I, 1785, p. 168.
- terrestris* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 462.
- rugulosus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, p. 460.
- carbonellus* Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1867, p. 266.
- ruptus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 100 (*Cacoporus*).
- Saulcyi** Pandellé, Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 423. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 175. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 99. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*).
- Sauteri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 (*Anotylus*).
- scabrellus** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 496.
- scabripennis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 216.
- scorpio** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 107.
- sculptiventris** Fauv. l. c. p. 105.
- sculpturatus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 187. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 592; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 790. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 857. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 171. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 72. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 641 (*Anotylus*).
- flavipes* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 464.
- montivagus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 574.
- terrestris* Heer, l. c. p. 205. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 409.
- sculptus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 191. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 591;

Paläarktisches
Gebiet,
Nord-
Amerika

Nord-
Amerika,
Mexiko
Java

Deutschland,
Frankreich,
Italien,
Österreich,
Ungarn

Japan

Australien
Molukken
S. Domingo
Madagaskar
Paläarkt.

Gebiet,
Süd-Afrika,
Kapland

Kosmopolit

- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 788. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 855. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 103. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 169; Ann. Mus. Genova 1877, p. 32. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 57. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639 (*Epomotylus*).
antennatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 317.
longicornis Mannh. Brach. 1830, p. 48.
moerens Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 42.
testaceipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 446.
- semirufus** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 202; l. c. XIII, 1878, p. 493 (*Anotylus*). West-Australien
sericeiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 119. Transvaal
sexualis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 342. Turkestan
Sharpi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 (*Anotylus*). Brasilien
sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 115. Sikkim
simplex Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 70. Ceylon
simulator Eppelsh. Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 212 (*Epomotylus*). Gallas
sobrinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237. Kalifornien
— Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 396.
sparsus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 203; l. c. XIII, 1878, p. 493. Java, Victoria
speculiceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 133. Bolivien, Venezuela, Kolumbien
speculifrons Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 862 nota. — Pandellé, Mat. Cat. Gren. 1867, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 173. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 643 (*Anotylus*). Mittelmeer-gebiet
speculum Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 106. Peru, Amaz.
spinifer Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 216. Neu-Guinea
spinifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 (*Anotylus*). Nicaragua
spinosus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 13 (*Anotylus*). Brasilien
stipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 692. Panama
striatellus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 497. West-Australien
strigiceps Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 204. Australien
strigicollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 178. Madagaskar
strigifrons Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 187 (*Oxytelus* s. st.). Kaukasus
strigosulus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 690 (*Anotylus*). Mexiko, Guatemala
striolicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 129. Brasilien
subaeneus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199. West-Australien
subnitidus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 291 (*Anotylus*). Brasilien

- subtilis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 343. Turkestan
sulcicollis Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 650. Chile
sulcatus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 329, t. 6, f. 11 (nec Müll., Gebl.). — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128.
sulcifer Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 90 (*Anotylus*). Venezuela
suspectus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 395. Nord-Amerika
nitidulus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237 (nec Grav.).
syriacus Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 377 Syrien,
(*Anotylus*). Turkestan
excellens Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 81. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 595.
tenuicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 116. Java
tetracarinatus Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. 1799, Paläarkt.
p. 116, f. 5. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Gebiet,
p. 176. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, Nord-Amerika
p. 398. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 644 (*Anotylus*).
depressus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 103.
— Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 595; Gen. Spec. Staph. 1840, p. 796. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 862.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 104.
opacus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 321.
pusillus Mannh. Brach. 1830, p. 48.
tetratoma Czwal. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 421. Deutschland,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 177. — Muls. Frankreich,
et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 107. — Ganglb. Kroatien,
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 645 (*Anotylus*). Bosnien,
simplex Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 171 Siebenbürgen
(nec Motsch.). Ost-Indien,
Sunda-Ins.
thoracicus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504 Ost-Indien
(*Anotylus*).
tibialis Schub. Deutsche Ent. Zeit. 1908, p. 624 (*Anotylus*).
trisulcicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, Australien
1906, p. 204.
tuberculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, „
1906, p. 204.
uncifer Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 115. Java
varipennis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 172. Ceylon,
Ost-Indien
varius Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 201 (*Anotylus*). Victoria
vegrandis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 396. Kalifornien
v-elevatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, Tasmanien
1906, p. 205.
vermicularis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 185 Gabun
(*Oxytelus* s. st.).
viator Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 125. Abessinien,
Zambesi
vicinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94. Japan
vilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 690 Mexiko,
(*Anotylus*). Guatemala
3*

- vulcanus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 129. Bolivien
vulneratus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 197; Victoria
 l. c. XIII, 1878, p. 492.
wattsensis Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XXVI, 1902, Australien
 p. 23.
 256

Platystethus Mannh.

Mannh. Brachél. 1830, p. 46. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 781. — Lacord.
 Gen. Col. II, 1854, p. 116. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 55.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 838. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 178. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip.
 Oxytel. 1879, p. 13. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
 (1887), p. 686. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 627.

Subgen. *Pyctocraerus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 125.

Subgen. *Platystethus* Thoms. s. st. l. c. p. 122.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. —
 Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 181; Moeurs
 VI, p. 123. — Schiødte, Nat. Tidskr. III, 1864, p. 210, t. 11,
 f. 15—22; t. 12, f. 3. — Bouché, Naturg. Ins. Deutschl. 1834,
 p. 182, t. 8, f. 14—21.

alutaceus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 123. — Muls. Europa,
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 26. — Ganglb. Mittel-
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631. meergebiet

cornutus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 450. — Er.
 Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 596;
 Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 782 (ex parte).
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858,
 p. 841 (ex parte). — Woll. Ann. Mag. Nat.
 Hist. X, 1862, p. 340. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 180 (ex parte).

tristis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 172.

americanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), Pennsylvanien,
 p. 784. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 Virginien,
 (1887), p. 687. Mexiko

arenarius Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 172. — Fauv. Fn. Paläarktisches
 gallo-rhén. III, 1872, p. 179. — Ganglb. Käf. Gebiet
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 630 (*Pyctocraerus*).

brunnipennis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 313.

caliginosus Steph. l. c. p. 314.

foveatus Steph. l. c. p. 313.

immunis Steph. l. c. p. 313.

mordax Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 411.

morsitans Payk. Mon. Curcul. App. 1792, p. 145.

— Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839),

p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 182. —

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,

p. 842. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126.

— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 16.

pallidipennis Panz. Fn. Germ. XXVII, 1796,
 nr. 16.

striolatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835,
 p. 460.

sulcatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 507.

trilobus Ol. Ent. III, 1794, nr. 42, p. 20, t. 5, f. 48.

armatus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 146.
brevipennis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 112.

Kapland
 Sardinien,
 Kleinasien,
 Attika,
 Cypern
 West-Alpen,
 Spanien,
 Italien

Burlei Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 597. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1873, p. 184. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 40. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 633.

constrictus Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868,
 p. 157.

var. *Luzei* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 XLIX, 1899, p. 27.

Neusiedler
 See
 Europa,
 Mittel-
 meergeb.

capito Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 208. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 843. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 182. — J.
 Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 174. —
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 30. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631.

cribricollis Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 145.

pilosellus Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX,
 1869, p. 419. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII,
 1880, nr. 4, p. 98.

(**cornutus**) Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 109. —
 Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 586;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 782. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 841. —
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21,
 f. 101. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 122.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180. —
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 23. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631.

Paläark-
 tisches
 Gebiet,
 Ost-Indien

degener Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip.
 Oxypt. Oxyt. 1879, p. 26.

maxillosus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858,
 p. 432.

scybalarius Runde, Brach. Hal. 1835, p. 19.

var. *pallidipennis* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr.
 III, 1908, p. 124.

Transkaspien

crassicornis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506.

debilis Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 161.

Ost-Indien
 Südrussland,
 Preussen,
 Trans-
 kaspien

depravatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 341.

exiguus Jacq. du Val, Hist. Cuba IV, 1857, p. 506.

fallax Lynch, Estaf. Buen. Air. in Bol. Ac. Nat. Cordoba
 VII, 1884, p. 360.

Turkestan
 Kuba
 Argentinien,
 Uruguay
 Alpen,
 Kaukasus,
 Appen-
 ninen,
 Korsika

laevis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 325. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 846. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 19. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 630.

cephalotes Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877,
 p. 120, t. 1, f. 8 (*Pyctocraerus*).

nitens Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 413. — Kraatz, Naturg.
 Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 845. — Thoms.
 Skand. Col. III, 1861, p. 124. — Fauv. Fn. gallo-
 rhén. III, 1872, p. 184. — Muls. et Rey, Col.

Europa,
 Mittelmeer-
 gebiet, Cana-
 rische Inseln

- Fr. Brévip. 1879, p. 38. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.
- aegyptiacus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506.
- angustipennis* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 158.
- longicornis* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 126, t. 13, f. 7.
- nodifrons* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 783 (ex parte).
- splendens* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 208.
- striatulus* Heer, l. c. p. 218. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 35.
- nodifrons** Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 412. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 783 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 844. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 124. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 183. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.
- asphaltinus* Walzl, Isis IV, 1838, p. 267.
- obscurus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687. Nord- und Mittel-Europa
- operosus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 91. Japan
- oxytelinus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XI nota (*Pycnocraerus*). Süds Spanien, Nord-Afrika
- excavatus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 503 (veris).
- longipennis* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 367.
- macropterus* Weise, Deutsche Ent. Zeit. XIX, 1875, p. 368.
- pallidipes** Lynch, Estaf. Buen. Air. in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 362. Argentinien
- praetermissus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeit. 1893, p. 58. Baikalg., Mongolei
- Quedenfeldti** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 147. Japan
- rufospinus** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 51. Armenien, Griechenland, Sardinien, Kleinasien
- rugifrons** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 55. Kleinasien
- spectabilis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 170. Ost-Indien
- spiculus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 784. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), t. 18, f. 9. Kolumbien, Mittel-Amerika
- spiniornis** Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 85. Turkestan
- spinosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 784. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 841 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 182. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 33. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632. Frankreich, Ungarn, Mittelmeergebiet, Turkestan,
- fossor* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 603. Madeira, Persien
- flavipennis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 86. Syrien
- strigosulus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota.

- testaceus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506. Ost-Indien
 volgensis Csiki, Zichy's Reise II, 1901, p. 105. Südrussland
 Wankowiczi Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 162. „

32

Bledius Mannh.

Mannh. Brach. 1830, p. 44. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 578; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 760. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 134. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 816. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 54. — J. Lec. Col. North Am. in Smiths. Misc. Coll. III, 1862, p. 69. — Fauv. Not. ent. V, 1, 1867, p. 21; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 185. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 109. — Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 351. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685. — Casey, Ann. N. York Ac. V, 1889—91 (1889), p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 610. — Blackb. Trans. Roy. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.

Bledius + *Hesperophilus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 307, 309.

Bledius + *Hesperophilus* + *Astycops* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118, 120, 121.

Bledius + *Tadunus* + *Bargus* + *Astycops* + *Hesperophilus* Schiødte, Naturh. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 144—145, 164—165.

Subgen. *Astycops* Muls. et Rey, l. c. p. 195.

Subgen. *Belidus* Muls. et Rey, l. c. p. 215.

Subgen. *Blediodes* Muls. et Rey, l. c. p. 134.

Subgen. *Bledius* s. st. Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 113.

Subgen. *Elbidus* Muls. et Rey, l. c. p. 130.

Subgen. *Hesperophilus* Muls. et Rey, l. c. p. 189.

Subgen. *Pucerus* Muls. et Rey, l. c. p. 212.

Biologie: Schiødte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 211—214, t. 12, f. 4—32. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 18. — Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1880, p. 125.

aculeatus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69.

addendus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 394.

adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 49.

adustus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 62.

affinis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 556. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 87.

agonus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 48.

Akinini Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 65 (*Blediodes*).

albidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 393.

albonotatus Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 193.

amplicollis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 185.

analisis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.

angustus Muls. et Rey, Opusc. ent. XII, 1861, p. 168 (*Belidus*).

annularis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.

arcticus J. Sahlb. Medd. Fn. Fl. Fenn. 1890, p. 12. — Popp. Medd. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 112 (*Blediodes*).

Kongo

Amazon.

Süd-Australien

Colorado

Kirgisien

Utah

Turkestan

Amazon.

Russ.

Amerika

Neu-Seeland

Illinois

Westl.

Mittelmeergebiet

Nord-

Amerika

Skandinavien,

Nord-

Russland

- arenarius** Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 382. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 778. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 826. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 121. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1866, p. 150. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 (*Hesperophilus*).
minor Muls. et Rey, l. c. p. 192.
var. subniger Schneider, Thiere Bork. 1898, p. 62.
- arenicola** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 112.
- armatus** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 155. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779. — J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 43 (*Blediodes*).
- assimilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 55.
- aterrimus** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204; l. c. XIII, 1878, p. 499.
- atratus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII nota (*Blediodes*).
- atricapillus** Germ. Fn. Ins. Eur. XI, 1835, nr. 4. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 832. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 203 (ex parte). — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 160. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 (*Blediodes*).
var. nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204, Obs. 1. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620.
- basalis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.
- Baudii** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 47; Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 205. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 164. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 (*Blediodes*).
agricultor Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 837 (nec Heer).
neuter Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 166.
- Bedeli** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 99 (*Hesperophilus*).
- bellicosus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 111.
- bicolor** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 64.
- bicornis** Germ. Fn. Ins. Eur. VI, 1822, nr. 15. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 762. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 819. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 191. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 131. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 617 (*Elbidus*).
dama Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507.
- bifasciatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686.
- bipustulatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 (*Blediodes*).
- Nord-Deutsch-land, Französische Meeresküsten, Marokko, Tunis
- Borkum
Malabar
Nordamerika
- Illinois,
Jowa
N. S. Wales
- Sardinien
- Mittel-Europa, Mittelmeerg., Transkaspien
- Mittel-Europa
- New York
Mittel-europa
- Algier,
Oran
Sumatra
Kalifornien
Mittel-Europa, Mittelmeergeb., Transkaspien, Turkestan, Buchara
Guatemala
West-Afrika

- bispinus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169.
bos Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 20; Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 41; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 190. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 360 (*Bledius* s. st.).
atramentarius Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 35. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 361.
bosnicus Bernh. Verh. zool-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700 (*Blediodes*).
brevidens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 219.
brunnipennis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 596. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 779. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 168 nota. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151 (*Bledius* s. st.).
productus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205 (*Oxytelus*).
rudis Walker l. c. p. 205 (*Oxytelus*).
Campi Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 24.
capra Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 97; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 69 (*Bledius* s. st.).
giraffa Costa, Atti Accad. Sc. Phys. Mat. Napoli VII, 1875, p. 21. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 24.
carinicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 97.
Caroli Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 13.
cavus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 143.
circularis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 251.
clarus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 228.
clavatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 60.
claviventris Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 445.
cognatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 231.
confusus J. Lec. l. c. p. 228.
conicicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 111.
convexifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 498.
cordatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 461. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 780.
cordicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 555. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 90.
corniger Rosh. Thiere And. 1856, p. 77. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 70 (*Bledius* s. st.).
cornutissimus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 594.
Cowleyi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 22.

Ost-Indien
 Italien,
 Sardinien,
 Sizilien,
 Algier,
 Oran,
 Tunis
 Süd-Oesterreich,
 Korsika
 New York
 Ost-Indien,
 Ceylon
 Belgien,
 Holland
 Aegypten
 Algier,
 Tunis
 Süd-Australien
 Goldküste
 Neu-Kaledonien
 Süd-Kalifornien
 Baikal
 Chile
 Texas,
 Carolina
 Oberer See
 Tonkin
 West-Australien
 Virginia
 Daurien
 Andalusien,
 Corfu,
 Algier,
 Sizilien,
 Canar. Ins.
 Australien

- crassicollis** Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 456. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—38 (1839), p. 580; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 770. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 835. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 120. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 208. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 178. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 (*Blediodes*).
filum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 211.
- cribratus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413. Japan
- cribricollis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 209. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 172. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 (*Blediodes*).
rufipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 770. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 834. Mittel-Europa, Mittelmeergeb.
- curticornis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 68. Kongo
- curvicornis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 412. Japan
- cuspidatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 394. Dakota
- debilis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 778. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 625 (*Hesperophilus*).
Mulsanti Rosh. Thiere And. 1856, p. 80. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 827 nota. Deutschland, Süd-Russland, Westliches Mittelmeergebiet
- deceptivus** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 227. Süd-Kalifornien
- defensus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 54; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 212. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 368. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 141. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618 (*Blediodes*). Frankreich, Belgien, Hessen, Kroatien
- denticollis** Fauv. Bull. Norm. (2) VI, 1870, p. 44; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 202. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 365. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618 (*Blediodes*). Mittel-Europa, Finnland, Kaukasus, Sibirien
- obscurus* Muls. et Rey, Op. ent. XIV, 1870, p. 111; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 87.
- subsINUATUS* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 109.
- derasus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 800. Mexiko
- diagonalis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52. Kalifornien
- diffinis** Baudi, Berl. Ent. Zeit. XIII, 1869, p. 398. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 362. Cypern
- dilutipennis** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 170. Ost-Indien
- dimidiatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 232. Florida
- dissimilis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 769. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 835. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 210. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 175. Mittel-Europa, Kaukasus, Spanien

- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 622 (*Blediodes*).
 var. *nigricans* Er. l. c. p. 769.
- distans** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 304 (*Pucerus*).
divisus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.
emarginatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 461. —
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780 (*Blediodes*).
trogodytes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840),
 p. 774 (veris).
- ensifer** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 96.
erraticus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—38 (1839), p. 582;
 Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 772. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 836. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 203. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 181. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 622 (*Blediodes*).
- eximius** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 47.
externus Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac.
 Cordoba VII, 1884, p. 353 (*Blediodes*).
fasciatus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 156. — Er.
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780.
- Fauveli** nom. nov.
phytosinus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII,
 1878, p. 499 (nec Lec.).
- femoralis** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 497. — Er. Gen.
 Spec. Staph. 1839—40, p. 768. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 830. —
 Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 211. — Muls. et Rey,
 Col. Fr. Brévip. 1879, p. 151. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620 (*Blediodes*).
sus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 320.
- Fenyési** nom. nov.
Lecontei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905,
 p. 14 (nec Sharp).
cribricollis J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877,
 p. 221 (nec Heer).
- ferratus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 220.
flavipennis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.
flexicornis Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1906, p. 638
 (*Hesperophilus*).
- foraminosus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 53.
forcipatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.
fortis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 219.
fossiventris Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252.
- fossor** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 211. — Kraatz,
 Natg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 826 nota. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 208. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 (*Hesperophilus*).
 ? *grandicollis* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857,
 IV, p. 507.
opacus var. b Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854,
 p. 603.
triangulum Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 143.
 var. *funestus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883,
 p. 271.

Madagaskar
 Kanada
 Indiana

Algier, Oran
 Mittel-
 Europa

Kalifornien
 Argentinien,
 Uruguay
 Missouri

Australien

Nord- und
 Mittel-
 Europa

Kalifornien

„
 „
 Bosnien

Kalifornien

„
 Texas
 Neu-Kale-
 donien
 Mittelmeer-
 gebiet,
 Schweiz,
 Ungarn

Balkan-
 Halbinsel

- fracticornis** Payk. Mon. Carab. App. 1790, p. 135. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 579; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 767. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 829. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 210. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 148. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620 (*Blediodes*).
Europa, Mittelmeergebiet, Transkaspien, Turkestan
- alpestris** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 210.
erythropterus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 831; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 220 (Monstr.).
laetior Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 151.
pallipes Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 458.
pallipes gallicus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 198.
var. **elongatus** Mannh. Brachél. 1830, p. 45. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 88. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 72.
- fragilis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 90.
fratellus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 144 (*Belidus*).
frater Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 827. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 211.
Fiorii Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 60.
fumatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.
Japan Goldküste, Togo
- furcatus** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 616. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 615. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 68 (*Bledius* s. st.).
taurus Germ. Fn. Ins. Eur. XII, 1825, nr. 2. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 760. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 818. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 98. — Fauv. Fn. gallo-rhén. 1872, p. 190. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 114.
var. **haedus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 110.
var. **Skrimshiri** Curt. Ent. Brit. III, t. 143.
Ruddi Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 308, t. 27, f. 3.
Stephensi Westw. Zool. Journ. III, 1828, p. 61, nota, t. 2, f. 4 A, B.
Süd-Frankreich, Italien
- furtivus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 45.
gabonensis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 68.
Ganglbaueri Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 103 (*Pucerus*).
Nord-Amerika
- gemellus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 140 (*Bledius* s. st.).
Mittel-Europa, Mittelmeergebiet, Kaukasus
- gentilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 59.
Glasunovi Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 87 (*Blediodes*).
Kalifornien
- gracilicornis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169 (*Pucerus*).
Turkestan, Transkaspien
- gracilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 60.
Ceylon, Ostindien, Kalifornien

- Graëllsi** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 309; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 194. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 120. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616 (*Bledius* s. st.).
 ♀ *antilope* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 431.
tricornis var. B. Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 600.
- gravidus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 54.
- gregarius** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.
- gularis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 218.
- hamifer** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 499.
- Hauseri** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 40.
- Helferi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 112.
- heterocerus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 180 (*Blediodes*).
- hinnulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 762 (*Elbidus*).
- honestus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 66.
- hoplites** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 146.
- Husseini** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 377 (*Hesperophilus*).
- jacobinus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 220.
- ignavus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 67.
- ignobilis** Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508.
- immaturus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 345.
- ineptus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 48.
- infans** Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 36. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 366 (*Belidus*).
- infantilis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686.
- injucundus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 14.
- inornatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.
- insignicornis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 75.
- languidus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 63.
- lateralis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 766.
- laticollis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 227.
- Lecontei** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.
- lectus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 49.
- limbatus** Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 158 (*Hesperophilus*).
- litoralis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 136. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 617 (*Blediodes*).

Westl.

Mittel-
meergebiet,
Italien,
IstrienNeu-Mexiko
Guatemala

Nord-

Amerika

West-

Australien

Buchara

Birma

Kroatien

Südrussland

New York

Ostindien,

Philippinen

Marokko,

Algier,

Senegal,

Gabun

Kalifornien

Rhode

Island

Kaukasus

Turkestan

Neu-Mexiko,

Texas

Sizilien,

Algier,

Tunis

Mexiko

Süd-

Australien

Costa Rica,

Panama

Victoria

Oregon

Kolumbien

Kalifornien

Mexiko

Kalifornien

Süd-Russland

Pyrenäen,

Alpen,

Ost-Sibirien

- aquarius* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 766. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 822.
- lividipes* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 445. Chile
- longipennis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 318. Russ.
Amerika
- longulus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 579; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 830. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 207. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 146. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 (*Blediodes*).
Mittel-Europa,
Dalmatien
- ruficornis* Muls. et Rey, l. c. p. 155.
- var. *nigripennis* Bernh. Entom. Bl. VI, 1910, p. 256.
- lucidus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 90 (*Hesperophilus*). Japan,
China,
Ostindien,
Sunda-Ins.,
Madagaskar,
Australien
- capitalis* Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204.
- Fischeri* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 35.
- lugubris* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 305. Madagaskar
- luteipennis* J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 227. Kalifornien
- maculipennis* Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 332. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit. III, 1859, p. 7 (*Tero-
palpus*). Chile
- irroratus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 127.
- madagascariensis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 169 (*Hesperophilus*). Madagaskar
- magniceps* Reitt. Wien Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 186 Transkaspien
(*Belidus*).
- Maindroni* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151. Ostindien
- mandibularis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204 nota. Australien
- melanocephalus* Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 156. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780. Missouri
- microcephalus* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Kolumbien
- miles* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 232. Argentinien
- minax* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 14. Süd-Australien
- minusculus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 144. Ceylon
- misellus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 68. Texas
- modestus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 396. Amazon.
- monstratus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 46. Kalifornien
- monticola* Cas. l. c. p. 58.
- morio* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 211. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 161; l. c. XXI, 1902, p. 72. Schweiz,
Frankreich,
- hispidulus* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 825 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 199. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 625 (*Hesperophilus*). Spanien,
Portugal,
Algier,
Tunis

muticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 395.
nebulosus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 57.
neglectus Cas. l. c. p. 69.

niloticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 776. —
 Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 71.

nitidicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr.
 XXIX, 1885, f. 142.

nitidiceps J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 224.

nitidicollis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.

obscurus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 556.
 — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 85
 (*Blediodes*).

obsoletus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870,
 p. 49; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 207. — Mars.
 Ab. VIII, 1871, p. 367 (*Blediodes*).

obtusus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413.
occidentalis Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p.
 245.

opacicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 59.

opacifrons J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 224.

opaculus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.

opacus Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. 1799, p. 117,
 f. 7. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839),
 I, p. 581; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 771.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858,
 p. 828. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 157. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 619 (*Blediodes*).

castaneipennis Mannh. Brach. 1830, p. 45.

divisus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510.

haemopterus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 310.

var. *extensus* Motsch. Bull. Mosc. 1860, II, p. 555,
 — Hochh. l. c. 1862, III, p. 87.

var. *sinuatocollis* Gerhardt, Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1899, p. 218.

orientalis nom. nov.

lividipes Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 90
 (nec Fairm. et Germ.).

ornatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53; Trans.
 Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 230.

orphanus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 91.

ovensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891,
 p. 76.

palliatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 203.

pallipennis Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 155. —
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779.

mandibularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40
 (1840), p. 765.

pallipes Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 197. — Er. Gen.
 Spec. Staph. 1839—40, p. 772. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 824. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén., III, 1872, p. 201. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 143. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618.

Amazon.

Jowa

Rhode

Island

Aegypten,

Algier,

Syrien,

West-

afrika,

Madagaskar

Kalifornien

New York

Mongolei,

Mand-

schurei

Pyrenäen

Japan

Holland,

Belgien

Baikal

Kalifornien

Maine

Europa,

Algier,

Oran,

Nord-

Amerika

Obock,

Ostafrika

Kalifornien

Japan

Victoria

Birma

Nord-

Amerika

Nord- und

Mittel-

europa,

Ostsibirien

- fuscipes* Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1865, p. 154.
rastellus Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 291.
terebrans Schiødte, Nat. Tidskrift 1866, p. 149.
vilis Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 22; Sv. Akad. Handl. XVIII, 1881, p. 38.
 — J. Sahlb. l. c. XVI, 1880, p. 98.
- parvicollis* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 65. Kalifornien
parvulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 775. Kolumbien
Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 305. Madagaskar
Petzi Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, Deutsch-Ostafrika
 1908, p. 104 (*Pucerus*).
phytosinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 231.
Lecontei Duvivier, Cat. 1883, p. 187.
- picipennis* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 182. Kaukasus
pilicollis Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, Angola
 1908, p. 103 (*Bledius* s. st.).
pleuralis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 229.
- politus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 766. Carolina
pontilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, Australien
 p. 22.
- Poppiusi* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 248. — Nord-Russ-
 Popp. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 111 land
 (*Blediodes*).
- procerulus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), Mitteleuropa
 p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 832. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 208. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 (*Blediodes*).
- pueches* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 23. Chile
pulchellus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169. Ceylon
pumilio Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 775. Kolumbien
punctatissimus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 226.
- pusillus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Deutschland,
 p. 583; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 773. Österreich,
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Frank-
 p. 833. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, reich
 p. 623 (*Blediodes*).
- pygmaeus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 205.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 167.
- pygmaeus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Österreich,
 p. 583; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 774. — Deutsch-
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 838. land,
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 Frank-
 (*Blediodes*). reich,
agricultor Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 576. — Piemont
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 837.
- pusillus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 206. —
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 186.
- rarus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 394. Amazon.
rectangulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, Baikal
 p. 61 (*Hesperophilus*).
- relictus* Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 228. Süd-Kali-
 fornien

rossicus nom. nov.

gracilicornis Popp. Ann. Mus. Petersb. 1905, p. 313 (nec Kraatz).

rotundicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 223.

rubiginosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 765.

ruficornis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.

rufipes Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 390.

rugosicollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 43.

rugosulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 61.

rusticus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 229.

sellatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413.

semiferrugineus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.

similis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 396.

simplex Sharp, l. c. p. 395.

simpliciventris Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 638 (*Blediodes*).

simulator Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 344 (*Bledius* s. st.).

sinuatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 228.

spectabilis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 821 nota; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 126; l. c. XII, 1868, p. 347. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 195. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616 (*Bledius* s. st.).

tricornis Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 600. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 319.

stabilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 61.

strenuus Cas. l. c. p. 44.

strictus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 53; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 211 nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 368. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 (*Blediodes*).

subopacus Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 104 (*Pucerus*).

subterraneus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 584; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 177. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 823. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 200. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 (*Hesperophilus*).

pallipes Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119; IX, p. 291.

rastellus Schiødte, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 149.

suturalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.

talpa Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 448. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 777. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 823. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 122. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 200. — Muls. et Rey,

Nord-
Russland

Nebraska

Carolina

Kalifornien

Chile

Ceylon

Baikal

Süd-Kali-
fornien

Japan

Nord-
Amerika
Amazon.

„
Bosnien,
Kleinasien
Turkestan

Canada,
Illinois
Mitteleuropa,
östl. Mittel-
meergebiet,
Tunis,
Oran,
Trans-
kaspien,
Buchara,
Turkestan

Pennsyl-
vanien
Kalifornien
Schweiz,
Piemont,
Syrien,
Tirol
Deutsch-Süd-
westafrika
Mitteleuropa,
Skandi-
navien,
Finnland

Kalifornien
Nördl.
Mittel-
europa,
Skandi-
navien,

- Col. Fr. Brévip. 1879, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 (*Hesperophilus*).
- tau** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 230.
- tenuis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 50.
- testaceipennis** Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cord. VII, 1884, p. 353.
- tibialis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 212. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 825. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 199. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 (*Hesperophilus*).
pubescens Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 25.
- tricornis** Herbst in Fuessly, Arch. Insekteng. V, 1784, p. 149, t. 30, f. 8. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 821; Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 347. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 193. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 122. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 615 (*Bledius* s. st.).
armatus Panz. Fn. Germ. 66, 1799, p. 17.
diota Schiødte, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 146.
nuchicornis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 165.
- tristis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 92. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 198. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 192. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895 p. 626 (*Hesperophilus*).
brevicollis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 170. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 399 nota.
- tuberculatus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 181. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 168. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151 (*Pucerus*).
- turbulentus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 70.
- turgidus** Cas. l. c. p. 52.
- unicornis** Germ. Fn. Ins. Eur. XII, 1825, nr. 3. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 764. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 820. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 99. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 192. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 128. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 70 (*Bledius* s. st.).
hispidus Parfitt, Zoologist 1857, p. 5409.
juvencus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 763.
monoceros Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 78.
var. *galeatus* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 594.
crenulatus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 222.
Winkleri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 588.
- Finnland,
Russland
New York
Nevada
Argentinien
Mittel-
Europa,
Italien,
Kaukasus,
Norwegen
Europa,
Kaukasus,
Trans-
kaspien,
Turkestan,
Klein-
asien,
China
Provence,
Italien,
Sizilien,
Algier,
Korsika,
Ägypten,
Tunis
Ost-Indien,
Ceylon,
Ägypten,
Betschua-
naland
Florida
Colorado
Mittel-
Europa,
Mittel-
meergebiet,
Kaukasus

- verres** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 776. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 819, nota. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 100. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 196. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 627. (*Pucerus*).
cinctus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 555. — Hochh. l. c. XXXIV, 1862, III, p. 84.
- victoriae** nom. nov. Victoria
infans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 76 (nec Rottb.).
- villosus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 57. Kalifornien
- vitulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 761 Arabien,
 (*Bledius* s. st.). Spanien,
januvianus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 593. Canar.
 Inseln,
 Nordafrika,
 Senegal

229

Typhlobledius Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 200.

- cylindricus** Lea, l. c. p. 200. Tasmanien
 1

5. Subtribus: **Thinobii**.**Sciotrogus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 1882—87 (1887), p. 707.

- opacus** Sharp, l. c. p. 707. Panama
 1

Thinobius Kiesw.

Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 355. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 147. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 57. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 881. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 134; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83—89. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705. — Casey, Ann. N. York Ac. V, 1889—91 (1889), p. 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 659.

Thinophilus + *Thinobius* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 322, 342.

Subgen. **Thinophilus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 322. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 660.

- algericus** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. Algier
- allocerus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 64. Baikal
- angusticeps** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83, 84. — Bayern,
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661. England,

- major* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 327. Savoyen
- antennarius* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 261. Texas
- Apfelbecki* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 580. Bosnien
- brevicornis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 581. Bosnien
- brunneipennis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 884. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 334. Thüringen, Österreich
- crassicornis* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 87. Texas
- delicatulus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 884 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 136; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 86. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663. Mittel-Europa, Kaukasus, Algier, Kalifornien
- var. *Bernhaueri* Ramb. Act. Soc. Ent. Boh. VII, 1910, p. 98. Ost-Rumelien
- dissimilis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 707. Panama
- diversicornis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 86. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661. Frankreich, Böhmen
- Ernesti* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 322. Österreich
- heterocerus* Fauv. Not. Ent. IX, 1886, p. 10; Rev. d'Ent. V, 1889, p. 86; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 58. Algier
- heterogaster* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 87. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662. Spanien, Böhmen, Korfu, Rumelien, Bosnien
- Klimai* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700. Österreich, Mähren
- ligeris* Pyot, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, IV, 1874, p. 79, t. 2, f. 21. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 31. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1878, p. 402. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 336. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663. Frankreich, Böhmen, Mähren, Kärnthen
- linearis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 135; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83, 85. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 330. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662. Mittel-Europa, Italien, Algier, Tunis, Kaukasus, Bosnien
- longicornis* J. Sahlbg. Not. Sällsk. Fn. Flor. Fenn. XIII, 1871—74, p. 488; Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 181.
- luteipennis* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 329.
- major* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661. Frankreich, Tirol, Bayern, Kaukasus, Norwegen
- brevicollis* Muls. et Rey, Opusc. Entom. XIV, 1870, p. 114; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 325.
- micros* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 163; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 137; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 87. — Mars. Ab. VIII, 1871, Süd-Frankreich, Italien

- p. 380. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 332. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.
- minor** Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 116; l. c. XVIII, p. 92; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 338. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 136 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 85. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664. Süd-Frankreich
- nitens** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 163; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 137, t. 2, f. 3; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 88. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 380. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 340. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664. Süd-Frankreich
- nodicornis** Eppelsh. in Radde, Fauna und Flora Caspi-Geb. (Verh. Nat. Ver. Brünn) 1886, p. 196; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 206. Lenkoran
- obscurus** Eppelsh. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 208. Kaukasus, Süd-Frankreich
- Petzi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 321. Österreich
- procerus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 63. Baikal
- quadricollis** Eppelsh. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 207. Kaukasus
- silvaticus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 436. Steiermark, Österreich
- validus** Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 88. Kalifornien

Subgen. *Thinobius* s. str.

- appendiculatus** Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 100, t. 1, f. 16. Ost-Sibirien
- atomus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 165; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139, t. 2, f. 4. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 381. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 349. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665. Mittel-Europa, Kaukasus, Oran, Mittel-Russland
- bacillus** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 288. Paraguay
- brevipennis** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 432. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 885. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665. Deutschland, England, Ungarn
- curtellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 706. Guatemala
- fimbriatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 263. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 84. Michigan
- flavicornis** J. Lec. l. c. p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 263. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 81. New York
- gilvus** Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 71. Korfu, Nord-Afrika
- gracilicornis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 87. Kalifornien

- grossulus* Cas. l. c. p. 81. New York
hesperius Cas. l. c. p. 84. Kalifornien
iridipennis Fauv. Bull. Soc. Ent. Norm. (2) I, 1868, p. 43. Chile
longipennis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 595. — Europa,
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, Mittel-
 p. 885. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, meergebiet
 t. 22, f. 107. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
 p. 138; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 88. —
 J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 181.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 345. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664.
ciliatus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1884, p. 355.
opacus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 847.
Wenkeri Fauv. Mat. Cat. Grenier 1863, p. 41.
 var. *pusillimus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 347.
 — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr., V, 1861, p. 411.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 138 nota.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 347.
 — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 88. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.
macropterus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. Kalifornien
 p. 241. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II,
 1877—78, p. 262. — Cas. Ann. N. York Ac. V,
 1889, p. 82.
minutissimus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 14; Frankreich,
 Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Ganglb. Österreich,
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665. Korsika
nigricans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 706.
nitidulus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 11. Antillen
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 179. Algier
oxytelinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II,
 1877—78, p. 262. — Cas. Ann. N. York Ac. V,
 1889, p. 79.
pallidicornis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 80. Texas
pallidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 86. „
perpusillus Rambous. Vestn. česk. spol. Nauk II, 1909, Bulgarien
 p. 20.
pygmaeus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 85. Nevada
seminiger Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Chile
 p. 451.
sonomae Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 83. Kalifornien
speciosus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 352.
tenuis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 705.
thripsoides Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), „
 p. 705. Mexiko

Subgen. *Thinobiellus* Bernh.

Bernh. Entom. Blätter V, 1909, p. 198.

rossicus Bernh. Ent. Bl. V, 1909, p. 198.

Süd-Russland

10. Tribus: Osoriini.

- Oxytelini* Subtribus *Osorini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 753.
Oxytelides Sous-tribu *Osoriides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 111.
Osorii Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 213 nota.
Oxytelini Group *Osorii* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.
Oxitelini I, *Osoraria* Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 344.
Oxytelinae Group *Osoriina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677.

1. Subtribus: Osorii.

Cylindropsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 182.

Cylindrogaster Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 213.

- africana** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 186.
balearica Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 60.
corsica Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 213, t. 2, f. 17. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 361. — Sauley, Bull. Soc. Hist. nat. Metz XV, 1878, p. 122.
sardoa Sauley, Bull. Soc. Hist. Metz XV, 1878, p. 123.

Algier
Mallorka

Korsika

3

Paragonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 197.

- acuticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134.
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 197.
heterocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134.

Sumatra,
Ost-Indien
Birma
Sumatra,
Java

3

Mimogonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 261.

- fumator** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 246; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 261. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359.
microps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 412.
rufipennis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508.

Sunda-Inseln,
Neu-Kale-
donien,
Mada-
gaskar,
Guade-
loupe,
Mexiko
Japan
Ost-Indien

3

Craspedus Bernh.

Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 296.

Jheringi Bernh. l. c. p. 296.

Brasilien

1

Holotrochus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 757. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 113. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 807. — Fauv. Not. Ent. V, 1867, p. 46. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 387; Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682.

- anophthalmus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 188. Neu-Seeland
brachypterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 136. Florida,
minor J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Carolina
p. 216 (nec Fauv.).
brasiliensis nom. nov. Brasilien
brevipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 15.
brevipennis Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1034. Neu-Seeland
caledoniae Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 245. Neu-Kaledonien
centralis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala,
p. 684. Nicaragua
coriaceus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 306. Madagaskar
crassicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758. „
curticollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115. „
cylindrus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758. Portorico
durus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 388. Amazon.
Fairmairei Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. Madagaskar
ferrugineus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1034. Neu-Seeland
— Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 186.
glaber Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 301. Venezuela
Helmsi Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 187. Neu-Seeland
laevicauda J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 376; Trans. Illinois,
Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 216. — Fauv. Rev. Neu-Mexiko,
d'Ent. XXIV, 1905, p. 136. Louisiana
laticollis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 295. Brasilien
marginatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
p. 684.
marginicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 308. Madagaskar
microphthalmus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 188. Neu-Seeland
minor Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 437; Venezuela
Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 135.
minusculus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 79. Mysol,
Borneo
nigrita Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 307. Madagaskar
nitescens Fauv. l. c. p. 307. „
picescens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
p. 683.
politus Sharp, l. c. p. 683. Mexiko
pubescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 390. Amazon.
pubiventris Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 73. Venezuela
punctulatus Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 301. „
rufopygus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
p. 683.
simplex Sharp, l. c. p. 683. „

- specularis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 308. Madagaskar
subtilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 391. Amazon.
syntheticus Sharp, l. c. p. 389. "
uniformis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 684.
vagepunctus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 187. Neu-Seeland
volvulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758, t. 2, f. 4. Portorico

37

Oephronistus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 20.

- australicus** Blackb. l. c. p. 21. Victoria
 1

Anoncosorius Bernh.

Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 292.

- Klimschi** Bernh. l. c. p. 293. Brasilien
 1

Osorius Latr.

Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 438. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 753. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 112. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 806. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 381; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677. — Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VI, 1884, p. 345.

Molosoma Say, Trans. Am. Phil. Soc. (n. s.) IV, p. 462.

Biologie: Lacord. Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, p. 65. — Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 180, t. 7, nr. 4, f. 3a. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 167. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège 1861, p. 331, t. 1, f. 3.

- affinis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 385. Amazon.
alutaceus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Madagaskar
 p. 17.
angustulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 89. Japan
assiniensis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 238. West-Afrika
asymmetricus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Venezuela,
canaliculatus Sharp, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 91 Kolumbien,
 (nec Solsky). Panama
ater Perty, Del. anim. 1834, p. 30, t. 7, f. 1. — Er. Gen. Brasilien
 Spec. Staph. 1839—40, p. 754.
cornutus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 395.
bicornis Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, 1898, nr. 3, p. 4. Celebes
boops Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 679.
brasiliensis Guér. Ic. Ins. 1829—44, t. 9, f. 11a—d. — Brasilien
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 755.
calvus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 406. Himalaya
canaliculatus Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1869, p. 265. Mexiko
 — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 678, t. 18, f. 3. — Fauv. Rev. d'Ent. XX,
 1901, p. 73.

- cariniellus* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 211. Neu-Guinea
celebesus Heller, Abh. Mus. Dresd. VI, 1897, p. 2. Celebes
constrictus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196. Birma
cordicollis Fauv. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 58 nota. Sumatra
cordovens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 360.
crassus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Mexiko,
 p. 681. Guatemala
cylindricus Latr. Nouv. Ann. Mus. Paris I, 1832, p. 86. Mexiko
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 756. —
 Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 680.
debilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 681.
dentatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294. Bolivien
discicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 78. Neu-Guinea
dubius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 679.
Eggersi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 19. St. Thomas
Eppelsheimi Bernh. l. c. p. 18. Sunda-Ins.
frater Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Argentinien
 Cordoba VII, 1884, p. 345.
frontalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134. Sumatra,
 Java
germanus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 680.
hamatensis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 267. Neu-Guinea
hirtulus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 92. Venezuela
hirtus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 211. Neu-Guinea
impennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 306. Madagaskar
incisicrurus Latr. Nouv. Ann. Mus. Paris I, 1832, p. 85. „
 — Klug, Ins. Madag. 1832—34, p. 139, t. 1, f. 13.
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 755.
incisifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 195. West-Afrika
 (Mts. de
 Cristal)
integer Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 384. Amazon.
intermedius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 754. Kolumbien
Kraatz nom. nov. Ost-Indien
rugiceps Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I,
 p. 166.
laevicollis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294. Bolivien
laevigatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 679.
latimargo Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294. Peru
latipes Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 198. — Er. Gen. Nord-
 Spec. Staph. 1839—40, p. 757. — Say, Trans. Amerika
 Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 462.
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 360.
micros Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala,
 p. 682. Honduras,
 Panama
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 432; Mexiko
 Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.
neotropicus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 295. Brasilien
nilgiriensis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 152. Ost-Indien
nitens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 382. Amazon.
oculatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 386. „

- opacifrons** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680. Mexiko
- opaculus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 134. West-Afrika
- parcus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Mittel-amerika, Kolumbien, Venezuela, Ecuador, Paraguay
- parvulus** Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 300. Venezuela
- pectinifrons** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196. Birma
- peruvianus** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 293. Peru
- piceus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 755. — Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 349. Brasilien, Argentinien
- pilosus** Fauv. Ann. Mus. Genova 1878, XII, p. 212. Neu-Guinea
- planifrons** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. Nord-Amerika
- politus** J. Lec. l. c. p. 215. Florida
- puncticeps** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678. Mexiko
- puncticollis** Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, I, p. 168. Ost-Indien
- punctipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 195. Birma
- punctulatus** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508. Ost-Indien
- pygmaeus** Cast. Etud. ent. VI, 1835, p. 130. Cayenne
- regularis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194. West-Afrika
- rufipes** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508. Ost-Indien,
- compactus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. Ceylon, Sumatra, Mauritius, Réunion, Ägypten
- syriacus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. VIII; Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 160.
- rugiceps** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 294. Kapland
- rugicollis** Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, I, p. 167. Ceylon
- rugifrons** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 756. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 166. Java
- rugipennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 361. Mexiko
- Salvini** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682. Guatemala
- sanguinipennis** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 192. Australien
- scolytinus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 195. Birma
- simplex** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 383. Amazon.
- Smithi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 361. Mexiko
- solidus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 384. Amazon.
- sparsior** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 291. Deutsch-Ost-Afrika
- stipes** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 382. Amazon.
- strangulatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 47. Ost-Indien
- stricticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196. Birma
- strigifrons** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 122. West-Afrika
- striola** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 210. Neu-Guinea
- taurus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 411. Japan
- truncorum** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 17. Zanzibar
- vicinus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678. Panama

2. Subtribus: **Parosorii.****Parosorius** Bernh.

Bernh. Stett. Ent. Zeit. 1904, p. 222.

Foersteri Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 36 Sumatra
(*Ancaeus*).

1

Mesotrochus Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 317.

paradoxus Wasm. l. c. p. 317.

Brasilien

1

Teiros Eichelb.Eichelb. Katal. Staph. Gatt. in Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 126
(nom. mut.).*Teras* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 15 (nec Treitschke).**mirabile** Bernh. l. c. p. 16.

Engano

1

II. Subfam. **Leptotyphlinae.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.

Stenini Section I, *Leptotyphli* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1874,
2. Suppl. p. 35, 60.*Euesthétiens* 2e branche *Leptotyphlaires* Muls. et Rey, Ann.
Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 325.1. Tribus: **Leptotyphlini.**Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 606. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr.
III, 1908, p. 332.**Leptotyphlus** Fauv.Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. p. 36. — Muls. et Rey, Ann.
Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 328. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat.
Metz XV, 1878, p. 122. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Péd.
Euest. 1878, p. 328. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 606. — Bernh.
Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Doderò, Ann. Mus. Genova
XLIII, 1908, p. 631.

Biologie: Mocsarski, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 313.

Entomoculia Croissandeau, Le Coléoptériste X, 1891, p. 150.**carniolicus** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, Krain
p. 331. — Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII,
1908, p. 638, t. 1, f. 3.

- cribratus** Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 356. — Croiss. Nizza
 Le Coléoptériste X, 1891, p. 151 (*cribrosus*).
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 607.
 — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908,
 p. 640.
- cribriceps** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 331. Korsika
laticeps Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908,
 p. 639, t. 1, f. 9.
- exilis** Muls. et Rey, Opusc. Entom. XVI, 1875, p. 131. Ost-Pyre-
 — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, näen,
 p. 121. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, Ariège
 p. 150. — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII,
 1908, p. 639, t. 1, f. 7.
- sublaevis* Muls. et Rey (nec. Fauv.), Hist. Nat.
 Col. Fr. Brévipennes Péd. Euésth. 1878, p. 330.
- foveiceps** Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639. Ligurien
- Grouvellei** Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 356. — Croiss. Süd-
 Le Coléoptériste X, 1891, p. 151. — Ganglb. Käf. Frankreich,
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 607. — Dodero, Ann. Ligurien,
 Mus. Genova XLIII, 1908, p. 637. Toskana,
Mayeti Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 122. Algier
 var. *alutaceus* Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, Nizza
 1908, p. 637.
- Omessae** Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639. Korsika
- perpusillus** Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 573. Italien
- Revelierei** Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, Korsika
 p. 120. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, p. 150.
 — Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908,
 p. 637.
- sublaevis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl., „
 p. 36, 61, t. 6, f. 2. — Sauley, Bull. Soc. Hist.
 Nat. Metz XV, 1878, p. 119. — Dodero, Ann.
 Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638.
- tyrrhenius** Dodero, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638. Toskana

11

Mayetia Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. entom. XVI, 1875, p. 87. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
 III, 1874, 2. Suppl. p. 60. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878,
 p. 117. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332.

atomus Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, Sardinien
 p. 118.

corsica Sauley, l. c. p. 118. Korsika

sphaerifer Muls. et Rey, Opusc. Entom. XVI, 1875, Ost-Pyre-
 p. 88; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 10. näen
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl.
 p. 61, t. 6, f. 3. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat.
 Metz XV, 1878, p. 117.

3

Cyrtotyphlus Dodero.

Dodero, Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 401.

convexus Dodero, l. c. p. 402.

Ligurien

1

III. Subfam. Oxyporinae.

Oxyporina Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 143.

Oxytelini Group I, *Oxypori* J. Leconte, Classif. Col. North Amer. I, 1, 1861—62, p. 68.

Oxytelini Section II, *Oxypori* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 212.

Oxyporiens Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 208; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 1.

Oxytelini Group II, *Oxypori* J. Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 162.

Oxyporinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 601. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 162.

1. Tribus: Oxyporini.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 602.

Oxyporus F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 150. — Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 283. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 497; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 555. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 87. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 810. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 40. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 144. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 214. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 2. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 602.

Biologie; Schiödt, Nat. Tidskrift 1864, p. 208, t. 11, f. 1—14. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124.

- | | |
|---|---------------------|
| austrinus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 135. | Georgien
(Amer.) |
| bicolor Fauv. Ab. I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. | Carolina |
| biguttatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 411. | Japan |
| borneensis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 204. | Sarawak |
| bucephalus Fauv. l. c. p. 204. | Birma |
| crocatus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 2. | Japan |
| Dybowskii Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 242. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota. | Ost-Sibirien |
| elegans J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. | Louisiana |
| fasciatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1885, p. 135. | Br.
Kolumbien |
| femoralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 196. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 558.
var. <i>pulcher</i> Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 43. | Nord-
Amerika |
| Fenyesi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 362. | Mexiko |
| flavicornis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 623. | Himalaya |
| Flohri Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677. | Mexiko |

- germanus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 409. Japan
- gnatho** Sharp, l. c. p. 411.
- guerreroanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 362. Mexiko
- hoplites** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 410. Japan
- humeralis** Sharp, l. c. p. 410. „
- japonicus** Sharp, l. c. p. 407. „
- lateralis** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 195. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 559. Nord-Amerika
var. *brevis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 39.
- lepidus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. New York
- longipes** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 409. Japan
- maculiventris** Sharp, l. c. p. 408. „
- major** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 234. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 557. Nord-Amerika
- Mannerheimi** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 495. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 557. — Wankow. Nord-Europa, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 254. Süd-Ungarn
- maxillosus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792—98, p. 531. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 498; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 556. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 815. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 216. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brevip. 1879, p. 7. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien
var. *amurensis* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.
var. *angularis* Gebl. in Ledeb. Reise App. III, 1832, p. 69.
var. *apicalis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 181.
var. *Schönherrri* Mann. Brach. 1830, p. 19.
- mexicanus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 21. Mexiko
- niger** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 407. Japan
- occipitalis** Fauv. Ab. I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. Carolina
- parcus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 408. Japan
- procerus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 122, t. 2, f. 3. Amur
- quinquemaculatus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51. Pennsylvanien
- rufipennis** J. Lec. l. c. p. 51. Nord-Amerika
- rufus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 498; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 556. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 814. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 16, f. 78. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 145. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 215. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 4. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605. Europa
- nigrofulvus* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 173.
- octavus* Schaeff. Icon. I, 1769, t. 85, f. 3.
- Smithi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 361. Mexiko
- stigma** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 203. Birma
- stygicus** Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 459. Nord-Amerika

- triangulum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 407. Japan
vittatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 195. — Er. Pennsylvanien
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 558.
 var. *cinctus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 196. „
 var. *dimidiatus* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, „
 p. 39.
 39

IV. Subfam. Megalopinae.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668.
Oxytelini Subtrib. *Megalopini* Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 750.
Oxytelides Sous-tribu I *Mégaloïdes* Lacordaire, Gen. Col. II, 1855, p. 110.
Mégaloïdes Motschulsky, Bull. Mosc. XXX, 1857, II, p. 509.
Oxytelini Group I *Megalopes* J. Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.

1. Tribus: Megalopini.

Megalops Er.

- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 751. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 111. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 378; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668.

- acutangulus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1883, p. 336. Java
adjectus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 669. Guatemala,
 Panama
angulicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 92. Venezuela
armatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 670. Panama
basalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674, t. 17, f. 23. „
bifenestratus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. Madagascar
bolivianus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 235. Bolivien
brevipennis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 222. Brasilien
caelatus Grav. Col. Micr. 1802, p. 197. — Er. Gen. Spec. Nord-Amerika
 Staph. 1839—40, p. 751.
cephalotes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 752, t. 2, f. 3. Kolumbien
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 672. Panama
cribriceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 310. Madagascar
cruciger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668, t. 17, f. 18. Mittel-Amerika
denticollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 500. Australien
elegans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 672, t. 17, f. 20. Panama
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673, t. 17, f. 22. Guatemala
Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 235. Bolivien
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. Madagascar

<i>impressus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 380; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676.	Amazonas, Panama
<i>incultus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 675.	Mexiko, Panama
<i>ineptus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	Guatemala
<i>integer</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	„
<i>laevipennis</i> Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 234.	Bolivien
<i>mexicanus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 669.	Mexiko
<i>modestus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	Panama
<i>morosus</i> Sharp, l. c. p. 670.	Guatemala, Panama
<i>nodipennis</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 206.	Australien
<i>obscurus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674.	Guatemala
<i>ornatus</i> Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1883, p. 335.	Peru
<i>panamensis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673.	Panama
<i>peplodes</i> Sharp, l. c. p. 675, t. 17, f. 24.	Panama
<i>plicatus</i> Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 293.	Natal
<i>politus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673.	Panama
<i>porcatus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 675.	Guatemala
<i>praeditus</i> Sharp, l. c. p. 672, t. 17, f. 21.	Panama
<i>pulcherrimus</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 363.	Mexiko
<i>punctatus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 752. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 4.	Kolumbien
<i>puncticeps</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676, t. 17, f. 25.	Guatemala
<i>quadrinaculatus</i> Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 236.	Brasilien, Bolivien
<i>robustus</i> Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 509.	Kolumbien
<i>rufipes</i> J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51.	Georgien (Amer.)
<i>spinosus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 379.	Amazonas
<i>vulneratus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674.	Panama

V. Subfam. Steninae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 546. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153.

Stenini Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 526; Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 687 (excl. *Euaesthetus*). — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 732 (excl. *Euaesthetus*).
— J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 97. —
Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Soc. Ac. Nac. Cordoba VII,

- 1884, p. 331. — Casey, Rev. Stenini Amer. North of Mexico 1884, p. 3.
Sténides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 106 (excl. *Euaesthetus*).
Stenites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 50 (excl. *Euaesthetus*).
Stenina Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 210.
Stenini sect. II *Steni* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224.
Stenides Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 205.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 175.

1. Tribus: Stenini.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 548.

Stenus Latr.

Latr. Préc. Caract. gén. Ins. 1796, p. 77. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 528; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 689. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 740. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 51. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Rye, Ent. Monthly Mag. I, 1864—65, p. 6. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 180. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 332. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640, 798. — Meinert, Vidensk. Medd. math. For. Kopenh. 1884—86, p. 180—207, t. 15, 16; Zool. Anz. X, p. 136—139. — Cas. Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 711. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 549.

✓ Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 3, VIII, 1872—73, p. 548—552, t. 18, f. 1—9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 547, 551.

Subgen. Stenus s. st.

Stenus s. st. Rey + *Nestus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 552.

- | | |
|---|---|
| abscondens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 798. | Mexiko |
| adelops Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 80. | Kalifornien |
| adspector Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 316.
— Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 127. | Sitkha |
| aereus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 163;
— Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota. | Samarkand |
| affaber Baudi, Stud. ent. 1848, p. 140. | Syrien |
| agilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 711. | Kolumbien,
Venezuela |
| alienus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 81. | Japan |
| alpicola Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 236. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 228.
— Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 571. | Alpen,
Sieben-
bürgen,
Sibirien,
Nord-
Amerika |
| sibiricus J. Sahlb. Bidrag Nordv. Sib. Insf. 1880 (K. Svensk. Ak. Handl. XVII, nr. 4), p. 79. | |

- altifrons** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1886, p. 302.
alveolatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 78. Nord-Italien
 Nevada,
 Kalifornien
 Finnland
- ampliventris** J. Sahlb. Medd. Fn. Flor. Fenn. XVII, 1890, p. 7.
- amurensis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 43. Amur
- angustus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 40. Massa-
 chusetts
 Oberer See
 Ost-Indien,
 Ceylon
 Japan
- anthracinus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 326.
- Argus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 231. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 552; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 714. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 770. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 224; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 262. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 312. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 580 (*Nestus*). Paläarkt.
 Gebiet,
 Nord-
 Amerika
- ageus** Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 116.
- decipiens** Leprieur, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 201.
- opticus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 504.
- rigidus** Casey, l. c. p. 119.
- var. **austriacus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 26. Österreich
- arizonae** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 93. Arizona,
 Texas
 Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Sardinien
- asphaltinus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 695. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 748. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 236. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 569.
- socius** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 208.
- ater** Mannh. Brach. 1830, p. 42. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 534; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 696. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 749. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 247. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 561. Paläarkt.
 Gebiet
- ? **adjectus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 214.
- maurus** Mannh. Brach. 1830, p. 41.
- punctipennis** Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 214.
- aterrimus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 549; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 712. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 767. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 235. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, Nord- und
 Mittel-
 Europa

- 1883, p. 226. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570.
- atratus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 540; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 701. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 759. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 221. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 256. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 575 (*Nesius*).
- externus* Rey, l. c. p. 272.
- longipennis* Rey, l. c. p. 268.
- propinquus* Rey, l. c. p. 272.
- tenuis* Rey, l. c. p. 272.
- atrovirens** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 503.
- augur** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 709.
- auliensis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 247; Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XV, 1905, p. 596.
- parilis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 88.
- aureolus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVII, nota.
- auropubescens** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 296 (*Nesius*).
- Austini** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 28.
- azeganus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 137.
- Bernhaueri** Poppius, Medd. Soc. Fn. Flor. Fenn. XXXIII, 1907, p. 106.
- biguttatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 529; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 690. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 742. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 227. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 231. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 184. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 557.
- bipustulatus* Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 63. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 527.
- var. *bipustulatus* Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1857, p. 220.
- bilentigatus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 19.
- bilineatus** J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 412; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 61; Sv. Ak. Vet. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 79. — Fauv. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota.
- bimaculatus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 466. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 532; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 692. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 746. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 241. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 201. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 560.
- biguttatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 526.
- Juno* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 154.
- maculipes* Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.

Paläarkt.
Gebiet

Queensland
Kolumbien,
Venezuela
Turkestan

Baikal

Mexiko

Nord-
Amerika
Abessinien
Lappland

Paläarkt.
Gebiet

Virginia
Lappland,
Finnland,
Ost-
Sibirien

Europa

- bimaculosus** Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 409. — Patria?
Waterh. et Jans. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.)
III, 1855, p. 145.
- binotatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 303.
- bipunctatus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Europa,
p. 530; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 691. Nord-
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Amerika,
p. 743. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 227. Oran (?)
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 232. —
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 187.
— Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 558.
- biguttatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 302.
- bipustulatus* Steph. l. c. p. 303.
- comma* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50.
- boreellus** Poppius, Act. Fn. Flor. Fenn. XXXI, 1908—09, Nord-
p. 10. Russland
- bosnicus** Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 198. Bosnien,
Türkei
- brevipennis** Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1851, p. 133. Schweden
- buphthalmus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 156. Europa
— Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839),
p. 536; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 699.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—
1858, p. 752. — Thoms. Skand. Col. II, 1860,
p. 220. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 253. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
1883, p. 253. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 572 (*Nestus*).
angustatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 299.
- boops* Ljungh in Web. und Mohr, Beitr. II, 1804,
p. 158.
- canaliculatus* Boisd. et Lacord. Fn. Paris I,
1835, p. 449.
- clavicornis* Panz. Fn. Germ. XXVII, 1795, nr. 11. see Scap
- foveiventris* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854,
p. 578.
- notatus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883,
p. 255.
- sulcatulus* Muls. et Rey, Op. Ent. XIV, 1870,
p. 108; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870,
p. 84; XXX, 1883, p. 255.
- calcaratus** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 380. Deutschland,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 245. — Holland,
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 220. Russland,
nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Sibirien
p. 563.
- ♀ *inspector* Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII,
p. 82.
- canaliculatus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 501. — Er. Europa,
Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 542; Nord-
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 704. — Kraatz, Amerika
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 754. —
Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222; IX, p. 194. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 255. — Rey,
Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 273. —
Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 573 (*Nestus*).

- affinis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298.
congener Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 192. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 114.
- capitatus** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 421. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 102; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76 (*Nestus*).
- carbonarius** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 505. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 218. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 581 (*Nestus*).
- debilis* Rye, Entom. Monthly Mag. I, 1864, p. 42.
- niger* Mannh. Brach. 1830, p. 43. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 753.
- opacus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 543; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 705. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 294.
 var. *calidus* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 141.
- carinicollis** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 101.
- carolinae** Cas. l. c. p. 116.
- cautus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 553; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 715. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 770. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 (*Nestus*).
- macrocephalus* Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 298.
- sublobatus* Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 160.
- certatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 365.
- Championi** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 642.
- circularis** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 556; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 717. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 774. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 219. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 249. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 578 (*Nestus*).
- clavicornis** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 100. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 564.
- atricornis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 294.
- boops* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 469. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 234.
- brunnipes* Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.
- bupthalmus* Schrank, Beytr. Naturgesch. 1776, p. 72.
- canaliculatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 294.
- cicindeloides* Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 62.
- nigricornis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 293.
- punctatissimus* Steph. l. c. p. 293.
- simplex* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 236 nota.

Sizilien,
AlgierNord- und
Mittel-
Europa,
Griechen-
landMichigan
Nordamerik.
Südstaaten
Mittel-
EuropaAmazonas
Mittel-
Amerika
Europa,
Mittelmeer-
gebiet

Europa

- speculator* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 445. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 545; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 706. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 761.
- collium* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.
- colon* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 693. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 15.
- colonus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 699. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 96.
- comes* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.
- confusus* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 58.
- convictor* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 62.
- cordaticollis* Leinberg, Medd. Fn. Flor. Fenn. XXVI, p. 187 (*Nestus*).
- cordicollis* Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 40; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 102; Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 350.
- corrosus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645.
- corvus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 72.
- costalis* Cas. l. c. p. 77.
- crenicollis* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 65.
- croceipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 710.
- cupreipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; XIII, 1878, p. 502.
- deductor* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 204.
confusus Cas. l. c. p. 63.
- delawarensis* Cas. l. c. p. 30.
- denticulatus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 225.
- dissociatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 54.
- distans* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 327.
- dives* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 127.
- dolosus* Cas. l. c. p. 108.
- egenus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 698. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 105.
- ellipticus* Cas. l. c. p. 79.
- eriensis* Cas. l. c. p. 67.
- erythrocnemus* Eppelsh. in Radde, Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, p. 6; Fn. Fl. Casp. 1886, p. 195.
- erythropus* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 40. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 46. — Blanch. Ent. Am. 1887, p. 85.
- excellens* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 303.
- Birma
Washington,
Virginia,
Michigan,
Südstaaten
Nord-
Amerika
Birma
Finnland,
Norwegen
Washington
Finnland
Algier, Oran
Panama
Brit.-
Kolumbien
Nevada,
Kalifornien
Ost-Indien
Kolumbien,
Venezuela
Australien
Michigan
Nordamerik.
Mittel-
Staaten
Kaukasus
Baikal
Japan
Kalifornien
Colorado
Pennsylvanien,
Michigan,
Kansas
Kalifornien
Michigan
Kaukasus
Pennsylvanien
Michigan,
Massachusetts
Dalmatien

- excubitor** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 551; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 714. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 769. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 568. Deutschland, Österreich
- exiguus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 706. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 250. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 (*Nestus*). Rheinprovinz, Grossbritannien, Frankreich
- fasciculatus** J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 341; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 47; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 76. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV nota. Skandinavien, Ost-Sibirien, Nord-Rußland
- femoratus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 459. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 713. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 33. Östl. Nord-Amerika
- fenestralis** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 94. Venezuela
- flavitarsis** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 510. Ägypten
- floridanus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 95. Florida
- foraminosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 703. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 755. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576 (*Nestus*). Deutschland, Österreich, Frankreich
- cribrellus* Rey, l. c. p. 261.
- fortis** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 230. Süd-Frankreich
- fossulatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 711. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 767. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 223. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570. Mittel-Europa, Italien
- fuscipes** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 555; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 716. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 772. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 225; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 (*Nestus*). Europa, Ost-Indien
- argyrostoma* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288.
- cariniger* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 513.
- curvipes* Steph. l. c. p. 285.
- femorellus* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 71.
- fulvipes* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 446.
- vilis* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 162.
- gallicus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 248. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 563. Deutschland, Österreich, Süd-Frankreich
- gayndahensis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota. Australien
- gemmeus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 18. Georgien (Amer.)

- gibbicollis** J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 80. Ost-Sibirien
- gracilipes** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570. ab. *Wankai* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 110. Sudeten, Alpen, Bosnien
- graciliventris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 643. Guatemala, Panama
- gravidus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 98. Massa-chusetts
- gutta** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 93. Venezuela
- guttula** Müll. Germ. Mag. IV, 1816, p. 225. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 531; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 691. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 744. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 228. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 234. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 195. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 558. Paläarkt. Gebiet
- geminus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 93.
- Kirbyi** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 499.
- Guynemeri** Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 51; Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 94. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 237. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 221. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 569. Alpen, Mittel-meergebiet, Ungarn
- rugosus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220.
- tylocephalus** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 761 nota.
- hispanicus** Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 85. Spanien
- hostilis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 643. Mittel-Amerika
- humilis** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 554; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 716. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 773. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 218; IX, 1867, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 263. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 580 (*Nestus*). Europa, Nord-Amerika
- Argus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 503.
- fuscipes** Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 159.
- mammops** Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 97.
- picipes** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 513.
- synonymus** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 640.
- var. **Netolitzkyi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33. Steiermark
- hyperboreus** J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 50. Finnland
- idoneus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 799. Mexiko
- incanus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 538; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 700. Mittel-Europa,

- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 758. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 239. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 292. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 (*Nestus*).
- pygmaeus* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 506.
- incertus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 120. Nordam.
Seen,
Rocky Mts.
Europa
- incrassatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 541; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 702. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 752. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 220. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 573 (*Nestus*).
- incultus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 71. Arizona
- indagator* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 428. Amurgeb.
- indigens* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 55. Massa-
chusetts
Australien
- indistinctus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543.
- inermis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 642. Guatemala
- ingratus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 58. Michigan
- innuptus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 55. Baikal
- inornatus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 64. Massa-
chusetts,
Nordam.
Seen
Kalifornien
- insignis* Cas. l. c. p. 102. Kalifornien
- integer* Cas. l. c. p. 94. Massa-
chusetts
Westl.
Mittel-
meergebiet,
Ungarn,
Herze-
gowina,
Kroatien,
Margelan
Östl. Nord-
Amerika
- intrusus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 44. Paläarkt.
- Juno** F. Syst. El. II, 1801, p. 602. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 533; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 694. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 747. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 246. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 208. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 560. Gebiet,
Nord-
Amerika
- boops* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 226.
- bupthalmus* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1802—05, p. 353, t. 80, f. 2.

- calabrus* Fiori, Nat. Sic. VIII, 1894, p. 95.
clavicornis F. Gen. Ins. 1776, p. 242.
inspector Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—80, p. 82; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 37.
lineatulus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 296.
Mäklini Duviv. Kat. 1883, p. 182.
- jacuticus** Popp. Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 16. Ost-Sibirien
- japonicus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 84. Japan
- juvencus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 123. Michigan
- kamtschaticus** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 355. — J. Sahlb. Svensk Ak. Handl. XVII, nr. 4, p. 76. Kamtschatka
- labilis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 697 (*Nestus*).
aemulus Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 223.
canaliculatus Sahlb. Ins. Fenn. I, p. 428.
lapponicus J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 56; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78. Finnland,
 Schweden,
 Norwegen,
 Lappland
- laccophilus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 23. Nordam.
 Seen
- laevigatus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 136; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 152.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 234 nota.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 197.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 559. Piemont,
 Korsika,
 Sardinien,
 Italien
- lateralis** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 510. Kolumbien
- latipennis** J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78. Ost-Sibirien
- lentus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 326. Japan
- Lewisius** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 82. „
- longipennis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 64. Turcmenien
- longipes** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 214. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 743 nota.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 233. —
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 190.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 558. Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Klein-
 Asien
- aeneiceps* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 192.
- longitarsis** Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 222; Skand. Col. II, 1860, p. 213. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 747 nota. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 247. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 562. Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Spanien,
 Italien
- Barnevillei* Bedel, Abeille VII, 1870, p. 92.
- luctuosus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 81. Kalifornien
- luculentus** Cas. l. c. p. 122. „
- lustrator** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 548; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 712. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 764. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 191. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 244. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 566. Nord- und
 Mittel-
 Europa,
- Lysholmi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59. Norwegen
- macellus** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 504. Australien

- macies** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 83.
- maculiger** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 559.
- maritimus** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 356. — Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 316. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 73.
- melanarius** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 299. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 575 (*Nestus*).
- cinerascens** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 539; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 701. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 759. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 265.
- foveifrons** Rey, l. c. p. 272.
- gracilentus** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 578. — Rey, l. c. p. 283.
- nigripalpis** Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 221; IX, 1867, p. 194.
- rugulosus** Rey, l. c. p. 268.
- melanopus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 528. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 256. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576 (*Nestus*).
- cribrellus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261.
- discretus** Rey, l. c. p. 261.
- nitidus** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 450. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 703. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 756. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 256.
- mendax** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 66.
- mendicus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 702. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 17 (*Nestus*).
- oreophilus** Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 290.
- relucens** Rey, l. c. p. 292.
- tythus** Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 621.
- metallicus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 709.
- mexicanus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644.
- micros** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV, nota.
- militaris** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 69.
- minor** Cas. l. c. p. 117.
- minutissimus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 81.
- mongolicus** Eppelsh. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 183.
- montanus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 74.
- Japan
Balkanhalbinsel,
Ungarn,
Kroatien
Alaska,
Vancouver
Europa,
Japan
Europa,
Mittelmeergebiet
Massachusetts
Mittelmeergebiet,
Kaukasus,
Senegal,
Süd-Afrika,
Br. Ost-Afrika
Kolumbien,
Venezuela
Mexiko
Samarkand
Nordamerik.
Seen
Michigan
Daurien
Mongolei
New-Hampshire

- morio** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 230. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 537; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 700. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 757. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 278. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 574 (*Nestus*).
aequalis Muls. et Rey, Op. Ent. XII, 1861, p. 154. — Rey, l. c. p. 281.
albipilis Rey, l. c. p. 275.
arcuatus Rey, l. c. p. 282.
enodis Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 126 (veris).
haplus Casey, l. c. p. 125.
inaequalis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 140.
indistinctus Casey, l. c. p. 130.
subgriseus Casey, l. c. p. 127.
transfuga Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 282 (veris).
trivialis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 760.
- mucronatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644. Paläarkt.
Gebiet,
Nord-
Amerika
- mundulus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 129. Kalifornien
- nanulus** Cas. l. c. p. 83. Brit.
Kolumbien
- nanus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 301. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 578 (*Nestus*). Paläarkt.
Gebiet,
Nord-
Amerika
- assequens* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 309.
- circularis* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 233.
- declaratus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 557; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 717. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 774. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229; IX, 1867, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 307.
- laticus* Rey, l. c. p. 309.
- pusio* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 82.
- nigrovirens** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 206. Birma
- nimborum** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644. Guatemala
- neglectus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 59. Östl. Nord-
Amerika
- neglectus** Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 220; Zeitschr. Ent. Breslau XXIV, p. 20*). Schlesien
- nitens** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 300. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 58. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 255 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 574 (*Nestus*). Mittel-
Europa,
Nord-
Europa
- aemulus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 541; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 704.

*) Ob eigene Art? Bernhauer.

- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 756.
- noctivagus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 121. New-Hampshire
- notipennis** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 94. Venezuela
- obstrusus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 92. New-York, New-Jersey
- occidentalis** Cas. l. c. p. 90. Brit. Kolumbien
- ocellatus** Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 305. Pyrenäen, Spanien
- olivaceus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; l. c. XIII, 1878, p. 503. Australien
- pacificus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 91. Kalifornien
- palpalis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 710. Kolumbien, Venezuela
- palposus** Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 70. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 251. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 571 (*Nestus*). Nord- und Mittel-Europa
- argentellus** Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222; IX, 1867, p. 194.
- argenteus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1854, p. 149.
- buphthalmus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 475.
- carbonarius** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 535; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 696. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750 (nec Gyll.).
- parallelopipedus** Motsch. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 317. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 149. Sitkha
- parallelus** Cas. l. c. p. 121. Massachusetts
- pauper** Cas. l. c. p. 53. "
- pauperculus** Cas. l. c. p. 124. Michigan
- brumalis** Cas. l. c. p. 131.
- Pettiti** Cas. l. c. p. 42. Nordam. Seen
- pekinensis** Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 104. China
- perpulcher** Solsky, Horae Ross. XI, 1875, p. 24. Peru
- phyllobates** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 14. Ost-Alpen, Siebenbürgen
- piscator** Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 655. Syrien, Kaukasus, Cypern
- Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75 (*Nestus*).
- arctulus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 171.
- ignotus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 226.
- morulus** Baudi, Berl. Ent. Zeit. XIII, 1869, p. 395. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 348.
- sulcifrons** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1878, p. 116.
- placidus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 65. Michigan
- tumicollis** Cas. l. c. p. 100; Ann. N. York Ac. VI, p. 711.
- pluto** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 70. Massachusetts
- posticalis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 340. Taschkent

- prismalis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 222, t. 1, f. 19. Neu-Guinea
- proditor** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 550; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 713. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 768. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 192. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244 nota. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 568. Nord- und Mittel-Europa
- grandiceps* Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1857, p. 222.
- ripaecola* J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. XI, 1870, p. 414.
- protector** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 311. Madagaskar, Senegal
- providus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 546; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 707. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 763. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 243. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 237. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 565. Europa, Nord-Afrika, Madeira
- obscurus* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 124, t. 13, f. 6.
- puberulus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 83. Japan
- pudicus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 117. Nordam. Seen
- pumilio** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 558; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 718. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 775. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 219. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 578 (*Nestus*). Nord- und Mittel-Europa, Östl. Nord-Amerika, Sibirien
- atomarius* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 84. Australien
- puncticollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; l. c. XIII, 1878, p. 502.
- punctiger** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 13. Colorado
- punctiventris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645. Panama
- pusillus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 301. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 544; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 705. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 761. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 250. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 286. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 (*Nestus*). Europa, Mittel-meergebiet
- coniciventris* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 579.
- exiguus* Rey, Brévip. 1884, p. 137.
- ranops** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 29. Nordam. Südstaaten
- renifer** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 16. Kalifornien, Texas, Arizona

- repletus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 646. Guatemala
- Rogeri** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 764. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 93. — Thoms. Opusc. Entom. IV, p. 369. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 565. Mittel-Europa, Süd-Schweden
- novator* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Catalogue 1868, p. 74.
- subrugosus* Rey, l. c. p. 243.
- rossicus** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 188. Süd-Russland
- rotundatus** Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 67. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 745. Schweden
- rufomaculatus** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59. Turkestan
- rugicollis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 162. Ost-Indien
- rugifer** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 47. Colorado
- anastomozans* Cas. l. c. p. 48; Ann. N. York Ac. VI, p. 711.
- rugosulus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota. Baikal-See
- ruralis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 697. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 751. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 55. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 (*Nestus*). Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Kaukasus
- alpestris* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 577.
- Shepherdi* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67, p. 441.
- var. *frigidus* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78.
- Sallaei** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 641. Mexiko
- Sauteri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 379. Japan
- scabiosus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 60. Nordam. Seen
- Schwarzi** Cas. l. c. p. 52. Massachusetts
- scrupeus** Cas. l. c. p. 43. Nordam. Seen
- scrutator** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 708. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 765. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 242 nota. Nord- und Mittel-Europa
- Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 566.
- femoralis* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 547.
- coxalis* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 49.
- sculptilis** Cas. l. c. p. 22. Kalifornien, Nevada, Washingt.
- sectator** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 31. Washington

- sectilifer* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 110.
milleporus Cas. l. c. p. 111; Ann. N. York Ac. IV, 1892, p. 711. Östl. Nord-Amerika
- Semenowi* Eppelsh. Horae Ross. XXIII, 1889, p. 181. China
- semicolon* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Cas. Rev. Sten. Amer. North. of Mex. 1884, p. 17. Östl. Nord-Amerika
- sexualis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 84. Japan
- shoshonis* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 49. Washington
- similis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota*). Australien
- simplex* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 56. Oregon
- simpliciventris* Poppius, Öfv. Finska Ver. Förh. LI, 1908—1909, nr. 4, p. 13. Ost-Sibirien
- sphaerops* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 68. Massa-chusetts
- stigmula* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 693. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 745. — Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 370. Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 240. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, p. 559.
- Kirbyi* Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 442 (nec Gyll.).
- maculipes* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 215.
- strangulatus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 39. — Blanch. Ent. Am. 1887, p. 85. New York, Michigan
- strigosus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 239 nota. Korsika
- stygius* Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458. Nord-Amerika
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 698.
 — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 104.
- subarcticus* Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXXIII, 1907, p. 106. Lappland
- subdepressus* Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 158. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, p. 575. Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Ungarn
- explorator* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 254. Nord-Afrika, Spanien, Canar. Ins.
- subglaber* Thoms. Opusc. ent. III, 1870, p. 329. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota. — J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 52. Skandinavien, Finnland
- glabellus* Thoms. Opusc. Ent. II, 1870, p. 127. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota.
- subnudus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 53. Baikal
- subtilis* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 54. Michigan
- sylvester* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 547; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 708. Nord- und Mittel-Europa
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,

*) Ob eigene Art? Bernhauer.

- p. 766. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 217.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244,
 Suppl. 1874, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXX, 1883, p. 240. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 567.
- tacomae** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 34. Washington
taigae Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, Ost-Sibirien
 nr. 4, p. 11.
- tenuipes** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 80. Japan
tenuis Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 40. Nordam.
difficilis Cas. l. c. p. 41. Mittel-
 staaten
 Nevada
- terricola** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Texas
 p. 128. Neu-
texanus Cas. l. c. p. 88. Kaledonien
- Thioni** Montrouz. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 89. Amazonas
 — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1874, p. 433; Kalifornien
 Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252. Florida
Traili Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 366. Italien,
tristis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 27. Schweiz,
tuberculatus Cas. l. c. p. 129. Türkei
- umbricus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 395.
 — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 346. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 252 nota. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 (*Nestus*).
- undulatus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 599. Madeira
vafellus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Nord- und
 p. 554; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 715. Mittel-
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Europa
 p. 771. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 224;
 IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 258. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
 1883, p. 300. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
 1895, p. 579 (*Nestus*).
- ? *submarginatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 295.
- venator** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 208. Birma
venustus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 89. Nord-
 Amerika
- verecundus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 81. Japan
verticosus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Vancouver,
 p. 25. Washington
vespertinus Cas. l. c. p. 61. Washington
vexatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 51. „
insularis Cas. l. c. p. 50; Ann. N. York Ac.
 IV, 1892, p. 711 (nec J. Sahlb.).
- vicinus** Cas. l. c. p. 57. Östl. Nord-
 Amerika
- villosus** Cas. l. c. p. 109. Kalifornien,
jejunus Cas. l. c. p. 112; Ann. N. York Ac. IV, Brit.-
 1892, p. 711. Kolumbien
vinnulus Cas. l. c. p. 112. Massa-
 chusetts,
 Nordam.
 Seen
- virginiae** Cas. l. c. p. 87. Virginia
viridans Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109. Lombardei
viridiaeneus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Australien
 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X,
 1877, p. 209 nota.

- zunicus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 32. Arizona
zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
 p. 645.

Subgen. **Tesnus** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

Mutinus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 146.

- alacer** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 135. Nord- und
 — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74. Mittel-
Fauvelianus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882— Amerika,
 1887 (1886), p. 646, t. 17, f. 6. Kolumbien
amicus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 142. Colorado
anthrax Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Chile
 p. 444.
australicus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, Victoria
 p. 788.
brunnipes Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 285. — Fauv. Europa
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.
cribiventer Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854,
 p. 584.
gracilis Steph. l. c. p. 288.
laticollis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1851, p. 133.
Marshami Steph. l. c. p. 284.
 — *unicolor* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 720.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
 p. 777. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 230;
 IX, 1867, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XXX, 1883, p. 324.
buccalis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Nikaragua
 p. 648.
californicus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, Kalifornien
 p. 145.
cariniceps Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 317. Sitkha
 — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 149.
caviceps Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 207; l. c. Neu-Guinea,
 XII, 1878, p. 223. Nord-
 Australien
chalcites Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 721. Kolumbien
cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 361. Amazonas
crassus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. — Fauv. Fn. Europa
 gallo-rhén. III, 1872, p. 260 (ex parte). —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582.
atratus var. b Heer, Fn. Helv. I, 1838—42,
 p. 220.
crassiventris Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857,
 p. 229; Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey,
 Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 316.
minutus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 176.
nigritulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
 p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
 1856—58, p. 775 (ex parte).
eurator nom. nov. Amazonas
inspector Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876,
 p. 358.

- cursitor** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 362. Amazonas
curtus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 135. Nordam. Seen
dauricus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557. Daurien
— Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 82.
dispar Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 147. Nord-
Amerika
eumerus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220; Ann. Pyrenäen,
Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 425. — Kraatz, Alpen,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 777. Karpathen,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 261. — Finnland
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 321.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 581.
fallax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 364. Amazonas
formicetorum Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 83. Nord- und
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582. Mittel-
crassus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 260 Europa,
(ex parte). Sibirien
borealis Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—
1880, p. 83; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4,
p. 37.
intermedius Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
1883, p. 318.
litoralis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 229;
Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXX, 1883, p. 318.
nigritulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
(1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 775 (ex parte).
fraternus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Brit.-Kolum-
p. 155. bien,
umbratilis Cas. l. c. p. 156. Wyoming,
Oberer See
gilae Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 146 Arizona
(*Mutinus*).
gratiosus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, Michigan
p. 133.
hirsutus Cas. l. c. p. 137; Ann. N. York Ac. IV,
1892, p. 711.
Heeri Woll. Ins. Mader. 1854, p. 600. — Fauv. Rev. Madeira
d'Ent. XX, 1901, p. 76.
var. *Wollastoni* Gemm. et Har. Cat. Col. II,
1868, p. 641.
fulvescens Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 198
(nec Motsch.).
hirtiventris Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 328.
immarginatus Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, Russ.
p. 192. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Amerika
Mex. 1884, p. 150.
laborator Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 327.
macilentus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 647.
monticola Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 134. New-
Hampshire
nasutus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
p. 648.

- nigritulus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 502. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 264. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 323. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.
campestris Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 776.
 — *unicolor* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.
 var. *lepidus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194.
- nimbosus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 139.
- obductus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 359.
- opticus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 231. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 560; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 720. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 778. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 261. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 319. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582.
- pugetensis** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 140.
- retrusus** Cas. l. c. p. 154.
- scabriculus** J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 53.
- simulator** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 364.
- sobrinus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 647.
- solitarius** Sharp, l. c. p. 647.
- tahoensis** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 139.
- tinctus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 360.
- vacillator** Sharp, l. c. 1876, p. 362. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74.
- vacuus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 141.
- vestalis** Cas. l. c. p. 138.
- Europa,
 Nord-
 Afrika
- Griechenland
- Colorado
- Amazonas
 Nord- und
 Mittel-
 Europa
- Washington
- Brit.
 Kolumbien
 Finnland,
 Norwegen
- Amazonas
 Panama
- Guatemala
 Nevada
- Amazonas
 Amazonas,
 Kolumbien,
 Venezuela,
 Brasilien
 Kalifornien
- „

Subgen. **Hypostenus** Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

Areus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150 (ex parte).

Astenus Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 341.

Hemistenus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557 (ex parte).

Stenosidotus Lynch, l. c. p. 338.

- aculeatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 661.
- acuminatus** Kr. Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 165.
- addendus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 654.
- Guatemala,
 Mexiko
 Ceylon
 Guatemala,
 Panama

- advena** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 158. Oberer See
- aenescens** Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 338. Argentinien
- agnatus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 163. Brit.-
- albipes** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Kolumbien
p. 664. Mittel-
- Alluaudi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 314. Amerika
- alticola** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Madagaskar
p. 652. Guatemala
- alumnus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko,
p. 654. Guatemala
- angulipennis** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 297. Paraguay
- amabilis** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 166. Delaware
- ambulator** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 657.
- Andrewesi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49. Ost-Indien
- anguinus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 740. Guyana
- angusticollis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, Ost-Indien
p. 405.
- annularis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 735. — Östl. u. südl.
Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 168. Nord-
- arachnipes** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 42. Amerika
- arculus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Ceylon
Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 188. Östl. Nord-
- armatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Amerika,
p. 661. Texas,
Brit.
- artus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 182. Kolumbien
- ascendens** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 18. Panama
- asperatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), New York
p. 659. Deutsch-
- assimilis** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. Ost-Afrika
- attenuatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 738. Guatemala
- bajulus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), England
p. 653. Madagaskar
- Bakeri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Kuba
p. 364.
- barbatus** Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. 1857, p. 381. — Ceylon
Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 163.
- Barbiellinii** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 298. Brasilien
- basicornis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 163. Ceylon
- Batesi** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 375. Amazonas
- bifrons** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 25. Ost-Afrika,
Kongo
- birmanus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 213. Birma
- bispinus** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 514. Ost-Indien,
Sunda-Ins.
- bivulneratus** Motsch. l. c. p. 514. Ost-Indien
- brachypterus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 164. Ceylon
- callosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737. — Pennsyl-
vanien,
Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 145. Florida
- canadensis** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Nordam. Seen
p. 175.

- capucinus** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 42; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76.
eremitus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655.
varipes Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 76.
- cephalotes** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 331.
- cerritus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 374.
- ceylonicus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 41.
- chalybeus** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 33. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 197.
- chiriquensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663.
- chloropterus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.
- chontalenus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666.
- cicindela** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 85.
- cicindeloides** Schall. Abh. Hall. Nat. Ges. I, 1783, p. 324.
 — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 570; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 734. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 795. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 231. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 268. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 393. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 77.
- biguttatus* var. Ol. Ent. III, 1794, nr. 44, 5, t. 1, f. 3d.
- buphthalmus* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 252.
- clavicornis* Rossi, Mant. Ins. Etr. I, 1792—94, p. 98.
- hydropathicus* Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 197.
- scabrior* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 282.
- similis* var. β Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 66.
- coelestis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 224, t. 1, f. 20.
- coeruleus** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 24.
 — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209; XIII, 1878, p. 506.
- collaris** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 376.
- colubrinus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737.
- concinus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 332.
- conductor** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 19.
- confertus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 331.
- consimilis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 651.
- consors** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49.
- creberrimus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.
- cribellatus** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515.
- cribriceps** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 662.
- cubensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 364.
- cupreus** Cast. Étud. ent. I, 1835, p. 124.
ariolus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742.
jugalis Er. l. c. p. 736 (sec. Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74).
- Tahiti,
 Venezuela,
 Brasilien,
 Mexiko,
 Östl. Nord-Amerika
- Japan
 Amazonas
 Ceylon
 Kalifornien
- Panama
- Madagaskar
 Nicaragua
- China, Japan
 Europa,
 Sibirien,
 Madeira
- Neu-Guinea
- N. S. Wales
- Amazonas
 Madagaskar
 Japan
 Deutsch-Ost-Afrika
- Japan
 Mexiko
- Ost-Indien
 Madagaskar
 Ost-Indien
 Nikaragua,
 Panama
 Kuba
 Trop. Süd-Amerika,
 Nikaragua,
 Panama

- currax* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 88. Japan
curtipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 233. Brasilien
cylindricollis Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. Malakka
cylindricus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Mittel-
 p. 663. Amerika
deceptor Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
 p. 666.
decoloripes Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75, t. 1, f. 3. Venezuela,
 Kolumbien
delphinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 317. Madagaskar
denticollis Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75, t. 1, f. 4. Kolumbien,
 Venezuela
detector Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 665.
dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 315. Madagaskar
dissentiens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Oberer See
 p. 190.
dissimilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 87. Japan
docilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 653. Guatemala
elongatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 741. Brasilien
europs Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 160. Maryland,
 Virginia
excisus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 372. Amazonas
exilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 143. Kalifornien
extensus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 368. Amazonas
exulans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
 p. 660.
flavicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 733. — Östl. Nord-
 Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 167. Amerika
geniculatus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834,
 p. 458.
flavidulus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
 p. 334.
Flohri Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko
 p. 666.
fornicatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. — Europa,
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 269. — Ganglb. Marokko
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 586.
contractus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
 (1839), p. 573; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
 p. 744. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 797. — Jacq. du Val, Gen. Col.
 d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 95. — Thoms. Skand.
 Col. IX, 1867, p. 198. — Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXX, 1883, p. 406.
basalis Curtis, Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840,
 p. 277.
frontalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737. Kolumbien
fulvescens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515. Ost-Indien
fulvicornis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 284. — Europa,
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 584. Nord-
paganus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Afrika
 p. 571; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
 p. 796. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 231;
 IX, 1867, p. 198. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 266. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XXX, 1883, p. 403.

- gastralis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214.
genalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 369.
gentilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 657.
Godmani Sharp, l. c. p. 662.
- Goudoti* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 315.
gracilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739.
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.
guttalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 212.
heres Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 374.
hirtellus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 86.
Hubbardi Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 191.
simiolus Cas. l. c. p. 194.
- imitator* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 56.
inanis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 656.
incognitus Sharp, l. c. p. 652.
indubius Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 330.
irroreus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 311.
janthinipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 544.
junceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 741.
Kiesenwetteri Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 76 nota.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 793. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 269. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 392. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 586.
- kwaiensis* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 376.
- laceratus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.
- lacertoides* Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. 1857, p. 382.
— Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 165.
- laetipes* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.
- laetulus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 192.
- laticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 372.
- latifrons* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 572; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 743. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 797. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 230. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 404. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.
- Leai* nom. nov.
longiventris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 542.
- leucopus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 651.
- leviceps* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 193.
lucidus Cas. l. c. p. 196.
politus Cas. l. c. p. 193.
- Birma
Amazonas
Guatemala
- Mexiko,
Guatemala
Madagaskar
„
Guatemala
- Birma
Amazonas
Japan
Nordam. Seen
- Baikal
Panama
- Guatemala
Japan
Madagaskar
Australien
- Kolumbien
Bayern,
Frankreich,
England
- Deutsch-Ost-Afrika
Mexiko
- Ceylon
- Mexiko
- Kalifornien
Amazonas
Europa
- Australien
- Mexiko,
Guatemala
Kalifornien,
Vancouver,
Brit.
Kolumbien

<i>lubricus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739.	Brasilien
<i>lugens</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 161.	Massachusetts
<i>madecassa</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1898, p. 179.	Madagaskar
<i>megalops</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 161.	Florida
<i>megops</i> Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.	Panama
<i>mercator</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333.	Japan
<i>meridionalis</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 185.	Florida
<i>micans</i> Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 656.	Guatemala
<i>millepunctus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49.	Ost-Indien
<i>mirus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 313.	Madagaskar
<i>monomerus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214.	Birma
<i>Moritzi</i> Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 297.	Venezuela
<i>mysticus</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 330.	Japan
<i>nairobiensis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 19.	Brit. Ost-Afrika
<i>nigricans</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 371.	Amazonas
<i>nitescens</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 170.	Florida
<i>obconicus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 313.	Madagaskar
<i>oblitus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 87; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 332.	Japan
<i>operosus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 736.	Brasilien
<i>oscillator</i> Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 7; Ent. Ann. 1871, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265 nota.	England
<i>papagonis</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 180.	Arizona
<i>parae</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 370.	Amazonas
<i>parviceps</i> Sharp, l. c. p. 377.	"
<i>pauloensis</i> Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 299.	Brasilien
<i>peregrinus</i> Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 656.	Panama
<i>perforatus</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 169.	Arizona
<i>pertinax</i> Cas. l. c. p. 195.	Rocky Mts.
<i>pertusus</i> Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 444.	Chile
<i>peruvianus</i> Bernh. Arch. f. Natg. 1908, p. 299.	Peru
<i>pictus</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515.	Ost-Indien
<i>piliferus</i> Motsch. l. c. p. 514.	"
<i>pinguis</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 177.	Westl. Nord-Amerika
<i>placidus</i> Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663.	Panama
<i>planiceps</i> Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 149.	Bolivien
<i>planifrons</i> Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 253; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 262.	Neu-Kaledonien, Celebes, Northwest-Australien
<i>plicipennis</i> Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 162.	Vancouver
<i>pluripunctus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.	Madagaskar

- podagricus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 667.
- pollens* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 171.
- patens* Cas. l. c. p. 172.
- prolixus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 738.
- prospector* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 18.
- proximus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 378.
- pueblanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LX, 1910, p. 365.
- pulcher* Motsch. Étud. ent. 1859, p. 71.
- punctatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 189.
- dilutus* Cas. l. c. p. 184.
- obsoletus* Cas. l. c. p. 181.
- Quedenfeldti* Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 155.
- remotus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 659.
- repandus* Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 19.
- rorellus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 17.
- rufescens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 88.
- sagax* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.
- Salvini* Sharp, l. c. p. 659.
- Sayi* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 164.
- scutiger* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 660.
- sedatus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333.
- segnis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655.
- Sicardi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 314.
- signifer* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 213.
- similis* Herbst in Füessly's Archiv V, 1784, p. 151. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 267. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585.
- cognatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 283.
- modestus* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 124 nota, t. 13, f. 5.
- oculatus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 155. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 569; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 733. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 795. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 397.
- siculus* Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 221.
- solutus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 734. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 268. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585.
- Nicaragua
- Washington,
Kalifornien,
Colorado
- Madagaskar
Brit.
Ostafrika
Amazonas
Mexiko
- Ceylon, Java,
Ost-Indien
Östl. Nord-
Amerika
- Zanzibar
- Guatemala
- Ost-Sibirien,
Nord-
Rußland
Brit.
Ost-Afrika,
Abessinien,
Süd-Afrika
- Japan
Guatemala,
Panama
Panama
Kalifornien
Panama
- Japan
Panama
- Madagaskar
Birma
- Europa,
Mittelmeer-
gebiet
- Westl.
Mittel-
Europa

- speculifrons* Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, Bull. p. XXV. Pampas, Montevideo
- suaveolus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 667. Guatemala
- subopacus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20. Brit. Ost-Afrika
- tabascensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 366. Mexiko
- tarsalis* Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 157. Europa, Nord-Amerika
 — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 569; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 732. —
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 794. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 267. —
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 400.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 584.
- buphthalmus* Ljungh, l. c. p. 67.
- clavicornis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 156.
- flavitaris* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.
- insidiosus* Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 449.
- nigriclavus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 285.
- propinquus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 174.
- reconditus* Cas. l. c. p. 173.
- riparius* Runde, Brach. Hal. 1835, p. 16.
- roscidus* Voll. Bowst. Fn. Nederl. II, p. 71.
- rufitaris* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.
- teres* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 740. Brasilien
- titicacanus* Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 299. Peru
- trepidus* Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 25. Zambesi
- tricarinatus* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 164. Ost-Indien, Java
- tricolor* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 373. Amazonas
- troile* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 317. Madagaskar
- tumidulus* Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, II, p. 199. Turkestan
- turkestanicus* nom. nov. Turkestan
- indubius* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583.
- uniformis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 312. Madagaskar
- velocipes* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 146; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179. Philippinen
- velox* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333. Japan
- ventralis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 368. Amazonas
- ventricosus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 48. Ost-Indien
- vestigialis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 732. Mexiko
- villosiventris* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543. Australien
- violaceus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 194. Brasilien
- volvulus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 312. Madagaskar
- Wasmanni* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214. Birma

Subgen. *Hemistenus* Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557 (ex parte).

Areus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150 (ex parte).

Mesostenus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

Parastenus Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 262.

- abdominalis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.
- aceris** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 292. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 25. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 595.
- aerosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 727. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 282. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 337.
- annulatus** Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67, p. 442.
- elegans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 163.
- aeneotinctus** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 592.
- audax** J. Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. XIX, 1900, nr. 3, p. 16.
- auriger** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 57.
- Belli** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 47.
- bicolon** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 328.
- bifoveolatus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 500. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 781. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 234. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 275. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.
- nitidus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 300.
- phaeopus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288.
- plancus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 723.
- binotatus** Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1, 1804, p. 66. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 561; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 721. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 779. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 272. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 370. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 588.
- carens** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 371.
- pilosulus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298.
- canescens** Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 74. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 270. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 587.
- arabicus** Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 657.
- major** Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 163.
- circumflexus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 211.
- clavulus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 174. — *Lederi* Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 117, t. 1, f. 6.
- conformis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 44.
- coarcticollis** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 170.
- cordatus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 198. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 726. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 278. — Rey, Ann.

Birma

Westl.

Mittel-
Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
EnglandCanar. Inseln
FinnlandBaikal
Ost-Indien
JapanNord- und
Mittel-
Europa

Europa

Mittelmeer-
gebiet,
EnglandBirma
Kaukasus

Amur

Kaukasus,
Mittel-
Europa
Westl. Mittel-
meergebiet,
Kroatien,

- Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 328. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 592.
- aeneus* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 123, t. 13, f. 4.
- Monticellii* Costa, Atti Nap. IV, p. 59.
- princeps* Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 349.
- cribratus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.
- gracilicornis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 396.
- hespericus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 334.
- politus* Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 279. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 332.
- serpentinus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 21.
- croceatus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 158.
- cyaneus** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 142. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 123. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 396. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.
- rutilans* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 656.
- splendens* Sauley, l. c. p. 656.
- densipennis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650.
- elegans** Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 75. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 280. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 338. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 595.
- Fauveli* Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 128.
- ochropus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 125.
- Erichsoni** Rye, Entom. Monthly Mag. I, 1864, p. 108. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 598.
- flavipes* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 566; Gen. Spec. Staph. VI, 1839—40, p. 729. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 789. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 237. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 356.
- var. *longelytratus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 48.
- var. *Ludyi* Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 280. — Ganglb. Ann. Hofm. Wien XI, 2, 1896, p. 173.
- Feae** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 211.
- flavipes** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 289. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 278 (nec Er., Kr.). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.
- Dobberti* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183.
- filum* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—38 (1839), p. 568; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 731. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 792. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 235.

Turkestan,
Süd-
Europa

Provence,
Korsika,
Italien,
Dalmatien,
Griechen-
land,
Türkei,
Österreich

Östl. Nord-
Amerika
Syrien

Panama

Süd-Europa,
Westl.
Mittel-
meergebiet

Europa

Österreich,
Tirol
Frankreich,
Kroatien,
Schlesien

Birma

Europa,
Algier,
Marokko,
Tunis

- Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 388.
 var. *Payeri* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 204. Steiermark
- flavipalpis** Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 237; IX, 1867, p. 200. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597. Nördl.
 Europa,
 Tirol
- flavipennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 64.
- foveicollis** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 782. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 275. Nord- und
 Mittel-
 Europa
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 383. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.
- bifoveolatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 723 (nec Gyll.).
- brevicollis* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 231; Skand. Col. II, 1860, p. 234; IX, 1867, p. 199.
- fuscicornis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 730. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 791. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 287. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 342. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. Mittel-
 Europa,
 Algier,
 Tunis
- Ganglbaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583. Dalmatien,
 Türkei,
 Klein-
 Asien
 Chile
- Gayi** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 306, t. 5, f. 10. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 443.
- geniculatus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 228 (*oculatus* var.). — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 564; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 728. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 788. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 236; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 285. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Sardinien,
 Kaukasus
- proboscideus* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 476.
- Gestroi** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 212. Birma
- glacialis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 224. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 787. Mittel-
 Europa
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 281. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.
- muscorum* Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 42.
- ab. *densatus* Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 416.
- grossepunctatus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 264. Kaukasus
- guttulifer** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 24. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209. N. S. Wales
- Holmbergi** Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 335. Argentinien

- Hopffgarteni** Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 601. Kroatien, Bosnien, Krain, Piemont
- hospes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 726. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 279. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 331. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 592. Piemont, östl. Mittelmeergebiet
- longicornis* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 657.
- pulchripes* Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 31.
- hypsidromus** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 104. Krain
- impressus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 564; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 728. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 788. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 236; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 283. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 353. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597. Europa, Algier, Kaukasus
- aceris* Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 445 (nec Steph.).
- angustulus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 226.
- annulipes* Heer, l. c. p. 225.
- carinifrons* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 512.
- gilvipes* Motsch. l. c. p. 512.
- proboscideus* Germ. Fn. Ins. Eur. XV, 1831, p. 1.
- subrugosus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290.
- tenuicornis* Steph. l. c. p. 291.
- insularis** J. Sahlb. Vega-Exp. Vet. IV, 1885, p. 53. Japan
- Kolbei** Gerh. Zeitschr. Entom. Breslau (n. F.) XVIII, 1893, p. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 359. Schlesien, Steiermark, Ungarn
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 600.
- latitarsis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 329. Japan
- languidus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 725. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 276 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 377. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591. Süd-Europa, westl. Mittelmeergebiet
- Leprieuri** Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. XXIX. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 783. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 274. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 386. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589. Frankreich, Rheinprovinz, Spanien
- sculptus* Rey, l. c. p. 388.
- Liechtensteini** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 47. Tirol
- lineola** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 20. Kaukasus
- longiventris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650. Panama
- maculatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 208 nota; l. c. XIII, 1878, p. 504. Australien
- micropterus** Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 465. Kaukasus
- monachus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 582. Griechenland

- montivagus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 791 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 284. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 358. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599.
var. *carpathicus* Ganglb. Ann. Hofmus. Wien 1896, p. 173.
- nitidiusculus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 292. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 277. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.
juncorum Steph. l. c. p. 292.
obliquus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 224.
tempestivus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 563; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 724. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 784. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 234. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 375.
- niveus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 307; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 273. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589.
cavifrons Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 110; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 86. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 353.
- obesulus** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 506.
- obscuripes** Ganglb. Ann. Hofmus. Wien, XI, 2, 1896, p. 174. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 26.
- ornativentris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650.
- ossium** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 284. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 594.
carinifrons Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 589.
elevatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 511.
impressipennis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 701. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 339.
sardous Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 786 nota.
var. *insularis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 5.
- pallipes** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 567; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 731. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 790. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 238. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 286. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599.
immunis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290.
- pallitarsis** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 273. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639.
binotatus var. b Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 500.

Jura,
Westalpen,
Sudeten,
Karpathen

Nord- und
Mittel-
Europa

Harz,
Thüringen
Frankreich,
Schottland

Queensland
Siebenbürgen

Panama

Mittelmeer-
gebiet,
westl.
Mittel-
Europa

Gross-
britannien
Europa,
Algier

Europa,
westl.
Mittelmeer-
gebiet

- plantaris* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 562; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 722.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 781. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 233; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 372.
- paludicola** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 124.
- palustris** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 565; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 729. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 790. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 238; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 287. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597.
- proboscideus* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 225 (nec Gyll.).
- pedator** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 367.
- peraffinis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 209.
- picipennis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 725. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 785. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 276. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 378. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.
- picipes** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589.
- rufimanus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 577.
- rusticus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 724. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 783. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 233; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 380.
- spretus* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 590.
- testaceicornis* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 121.
- pilicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 208.
- posticus** Fauv. l. c. p. 209.
- pteroabrachys** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 639. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 72. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 102.
- brevipennis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 318 (nec Thoms.).
- pubescens** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 297. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 587.
- laevior* Steph. l. c. p. 297.
- laevis* Steph. l. c. p. 297.
- subimpressus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 561; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 722. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 780. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 368.
- pustulifer** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 505.
- Reitteri** Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 356. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 600.

Griechenland
Nord- und
Mittel-
Europa

Amazonas
Birma
Deutschland,
Frankreich,
England,
Korsika,
Nord-
Afrika
Europa,
östl.
Mittelmeer-
gebiet

Birma
"Alaska

Nord- und
Mittel-
Europa

N. S. Wales
Ungarn

- rugipennis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 85.
salinus Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 39. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 271. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 369. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 588.
subconvexus Rey, l. c. p. 370.
scaber Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 21; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 285. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 357. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 346. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596.
italicus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 367.
bituberculatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 511 (veris).
scabripennis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 649.
scabrosus Sharp, l. c. p. 648.
Sharpi nom. nov.
palpalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 329 (nec Er.).
sparsus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 39 nota.
speculifer Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 288.
stigmaticus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.
subaeneus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 727. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 786. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 281. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 594.
geniculatus Mannh. Brach. 1830, p. 43.
gonymelas Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 291 (veris).
subcylindricus Scriba in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 83. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 359. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 288 nota.
subnotatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 95.
sulcicollis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 295. — Waterh. et Jans. Trans. Ent. Soc. Lond. 1854, p. 148.
suramensis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1879, p. 466.
var. *confrater* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 227.
trajectus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 179.
transsilvanicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 48.
trochanterinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 649.
utenis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 178.
virgula Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.

Japan
Westl. Mittel-
Europa,
westl.
Mittelmeer-
gebiet
Provence,
Italien,
Korsika,
Algier,
Dalmatien

Mittel-
Amerika
Mexiko,
Guatemala
Japan

Korsika,
Spanien
Pyrenäen
Birma
Westl. Mittel-
Europa,
westl.
Mittelmeer-
gebiet,
Süd-
Europa
Spanien

Venezuela
England

Kaukasus,
Algier,
Tunis

Colorado
Siebenbürgen

Panama

Colorado
Birma

Dianous Sam.

Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 173. — Curtis, Brit. Entom. III, 1826, p. 107. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 527; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 688. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 102. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 738. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 51. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Fauv.

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224. — Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon XXX*, 1883, p. 175. — *Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex.* 1884, p. 8. — *Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.* II, 1895, p. 548.

- coerulescens* Gyll. *Ins. Suec.* II, 1810, p. 463. — Er. Nord- und
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 528. Mittel-
— *Gen. Spec. Staph.* 1840, p. 689. — Kraatz, Europa,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 739. — Nord-
Jacq. du Val, *Gen. Col. d'Eur.* II, 1858, t. 20, Amerika
f. 96. — Thoms. *Skand. Col.* II, 1860, p. 211.
— *Fauv. Fn. gallo-rhén.* III, 1872, p. 225. —
Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon XXX*, 1883, p. 177.
— *Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.* II, 1895, p. 549.
biguttatus Ljungh in Web. und Mohr, *Arch.* I,
1804, p. 62.
bisetosus Dufour, *Bull. Soc. Pau* 1843, p. 36.
chalybaeus J. Lec. *New spec. Col.* I, 1863, p. 49.
nitidulus J. Lec. *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* XVI, 1874, Nord-
p. 272. — *Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex.* Amerika
1884, p. 9.
zephyrus Cas. l. c. p. 11.
verticosus Eppelsh. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1895, p. 404. Pegu
3

VI. Subfam. Euaesthetinae.

Sharp, *Biol. Centr.-Amer.* I, 2, 1882—87 (1886), p. 639. — *Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.* II, 1895, p. 542. — Reitt. *Faun. Germ.* II, 1909, p. 153.

- Euaesthetina* Thoms. *Skand. Col.* III, 1861, p. 114.
Euaestheti J. Lec. (*Stenini* Group II) *Classif. Col. North Amer.*
I, I, 1861—62, p. 67. — *Fauv. (Stenini* Section I) *Fn. gallo-*
rhén. III, 1872, p. 218, *Suppl.* 1875, p. 36 (excl. *Leptotyphli*). —
J. Lec. et Horn (*Paederini* Group I), *Classif. Col. North Amer.*
1883, p. 98.
Evesthétiens Muls. et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV*, 1877,
p. 299 (excl. *Leptotyphlares*).
Euaesthetini Casey, *Trans. Amer. Ent. Soc.* 1884, p. 18.

1. Tribus: Nordenskioeldiini.

Nordenskioeldia J. Sahlb.

J. Sahlb. *Sv. Vet. Ak. Handl.* XVII, 1880, nr. 4, p. 96.

glacialis J. Sahlb. l. c. t. 1, f. 15.

Ost-Sibirien

1

2. Tribus: Stenaesthetini.

Stenaesthetus Sharp.

Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1874, p. 79.

illatus Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1876, p. 357.

Kraatzi Bernh. *Arch. Natg.* 1908, p. 300.

sunioides Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1874, p. 80.

Amazonas
Paraguay
China, Japan

3

Stictocranium J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 374.

puncticeps J, Lec. l. c. p. 374.

Washington

1

3. Tribus: Euaesthetini.**Turellus Sharp.**

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 423. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766.

Batesi Sharp, l. c. p. 424.

Amazonas

1

Octavius Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220.

crenicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 59.
grandiceps Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 39; Opusc. Ent. II, p. 52. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220 nota.Pyrenäen
See-Alpen,
Italien**insularis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220 nota.
— Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 1878, p. 123.

Korsika

italus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 105.

Italien

pyrenaeus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220, t. 3, f. 2.

Pyrenäen

Raimondi Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 1878, p. 124.

Sardinien

Vitalei Bernh. Soc. Ent. XXIII, 1908, p. 25.

Sizilien

7

Edaphus J. Lec.

J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861, p. 67. — Smithson. Miscell. Coll. VI, 1867, p. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 301. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 30. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98. — Horn, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1885, p. 121. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 110—113. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 543.

Tetratarsus Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 460; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882—83, p. 166—172 (*Tetrameres* emend).
— Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 138; l. c. XIV, 1895, p. 205;
l. c. XXI, 1902, p. 38.**africanus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 139.West-Afrika,
Abessinien**carinicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 380.

Japan

cribricollis Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 109.

Sumatra

densatus Fauv. Mitt. Nat. Hist. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 81.

Java

- dentiventris** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 137. Ost-Indien,
Java
- dilutus** Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 109. Sumatra
- dissimilis** Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 37. — Fauv. Süd-
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218. — Muls. et Frankreich,
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 301. Korsika,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 543. Italien,
Dalmatien
- euplectoides** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 640.
- japonicus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 325.
- Kaufmanni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, Kroatien
p. 303.
- Lederi** Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 118, Kaukasus
t. 1, f. 7.
- major** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 205. Birma
- nitidus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. Östl. Nord-
carinatus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 30. Amerika
— Horn, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1885, p. 121.
- luculentus* Cas. l. c. p. 31.
- punctatus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 206. Birma
- sumatrensis** Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 110. Sumatra

15

Edaphellus Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 220.

- novae-guineae** Fauv. l. c. p. 220, t. 1, f. 18. Neu-Guinea
1

Tamotus Schauf.

Schauf. Pselaph. Siams 1877, p. 24; Nunq. Otios. II, 1872, p. 460; Ann.
Mus. Genova XVIII, 1882, p. 170. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.

- femoratus** Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 289; Ann. Kuba
Mus. Genova XVIII, 1882, p. 170, f. a, b, c, d.
— Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.

1

Euaesthetus Grav.

Grav. Mon. Micr. 1806, p. 201. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
(1839), p. 574; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 746. — Lacord. Gen. Col.
II, 1855, p. 109. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 734.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 53. — Thoms. Skand. Col.
III, 1860, p. 115. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 221. — Muls. et
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 303. — Cas. Trans. Amer.
Ent. Soc. 1884, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 544.

Eristhetus Mannerh. Brach. 1830, p. 41. — Boisd. et Lacord.
Faun. Ent. Paris I, 1835, p. 438.

- americanus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 747. — Östl. Nord-
Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 27. Amerika

- atomus** Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 28.
- bipunctatus** Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1, 1804, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 222. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 308. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 545.
- brevipennis* Muls. et Rey, l. c. p. 308.
- Mariae* Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 308.
- ruficollis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 558.
- scaber* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 202. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 574; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 746. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 736. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 115. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 306.
- brevipennis** Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 20.
- elongatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557.
- floridae** Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 24.
- frigidus** Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 21.
- fulvus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 558. — Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 265.
- granulipennis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 429.
- immarginatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 748.
- iripennis** Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 25.
- japonicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 380.
- laeviusculus** Mannh. Bull. Mosc. XVII, 1844, p. 195. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 736. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 286. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 546.
- ruficollis* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 116.
- mundulus** Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 23.
- neomexicanus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 219.
- nitidulus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 78.
- punctatus** Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 24.
- robustus** Cas. l. c. p. 23.
- ruficapillus** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 439. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 575; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 747. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 737. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 97. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 223. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 311. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. III, 1895, p. 545.
- Lespesi* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 48.
- Florida
Nord-,
Mittel-
Europa,
Sibirien
- Michigan
Daurien
Florida
Ost-Sibirien
- Kirgisen-
Steppe,
Kaukasus
Amurgebiet
- Kolumbien
Ohio
Japan
- Nord- und
Mittel-
Europa
- Massachusetts
Neu-Mexiko
- Japan
Florida
Massachusetts
Nord- und
Mittel-
Europa,
Italien,
Kaukasus

- pullus* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 235;
 Skand. Col. III, 1861, p. 116.
similis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 22. Florida
texanus Cas. l. c. p. 26. Texas

21

Ctenomastax Kraatz.

- Kraatz in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 84, t. 2, f. 4. — Sharp, Biol.
 Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640.

Ctenomax Duvivier, Kat. Staph. 1883, p. 177.

- Kiesenwetteri** Kraatz, l. c. t. 2, f. 4. — Mars. Ab. VIII, Spanien
 1871, p. 341. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
 p. 291, t. 3, f. 13.
pharaonum J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Förh. 1907—08, Ägypten
 nr. 7, p. 32.
varicolor Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 57. Andalusien,
 Tunis

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae I.
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
(Mark 21.75) Mk. 14.50
-

- Jacobs**, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica“.
1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.) Mk. 2.50
W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd.
Mk. 5.—
K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bis-
her beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetter-
linge). 1910. 358 p. Mk. 10.—
O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p.
mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—
O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p.
mit 49 Fig. Mk. 5.—
O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p.
mit Fig. Mk. 2.50
C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in
tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50
Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie.
Herausg. von **F. W. Konow**. 8 Jahrgänge (soviel er-
schienenen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark)
Mk. 45.—

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 40:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae III.

Einzel-Preis: Mark 9.25

Subscriptions-Preis: Mark 6.15

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

28. III. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

 Soeben erschien:

W. Junk

Bibliographia Coleopterologica.

Ein Leinenband von XVI und 146 Seiten mit 1 Tafel.

Preis 1 Mark.

Mit einer Einleitung „Die Coleopterologische Literatur“, in welcher zum ersten Male der Versuch gemacht ist, den wissenschaftlichen Wert aller irgendwie wichtigen coleopterologischen Werke für den Forscher und Sammler zu charakterisieren.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a Chr. Aurivillius et H. Wagner.

- Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p.
(Mark 0.40) Mk. 0.25
- 2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p.
(Mark 1.35) Mk. 0.90
- 3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p.
(Mark 1,10) Mk. 0.75
- 4: H. Wagner, Hepialidae. 1911. 26 p.
(Mark 2.50) Mk. 1.65
- 5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p.
(Mark 7.75) Mk. 5.15

14 MAY 1912



VII. Subfam. Paederinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 493. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

Paederini Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 499.

— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 662. — Fauv.

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290 (excl. *Ctenomastax*). — J. Lec. &

Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 97 (excl. *Euaestheti*).

Paederini + *Pinophilini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 560, 668.

Pédérides + *Pinophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 88, 101.

Pédérites + *Pinophilites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 41, 49.

Pédériens Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 208; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 1.

Paederinae + *Pinophilinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 506, 618.

1. Tribus: Pinophilini.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 668. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in; Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 302. — Brèthes, An. Mus. Nac. Buen. Aires (3), I, 1903, p. 305—318.

Pinophilides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 101.

Pinophilites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 49.

Pinophili Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 99.

Pinophilinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.

1. Subtribus: Pinophili.

Pinophilus Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 201. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 121.

— Nordm. Symb. 1836, p. 154, t. 2, f. 6. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—

1840, p. 669 (+ *Araeocerus* Nordm.). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 102.

— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Lynch, Estaf.

Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 305. — Sharp, Biol.

Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 193.

Lathrobium Fam. I. Grav. Mon. Micr. 1806, p. 129.

Pityophilus Brullé, Hist. Nat. Ins. III, 1835, p. 75.

Lycidius Leach in Dej. Catal. ed. 3, 1837, p. 73 (*Lyeidius*).

Subgen. *Heteroleucus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 629.

abax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 335 (*Heteroleucus*). Amazonas

aberrans Sharp, l. c. p. 330.

aegyptius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 673.

rufipes Kraatz (*ruficeps* err. typ.), Arch. Naturg.

XXV, 1859, I, p. 155. — Fauv. Rev. d'Ent.

XXIII, 1904, p. 50.

Ägypten,

Ceylon,

Java,

Abessinien,

Zanzibar

var. <i>punctatulus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150.	Madagaskar
<i>aeneiventris</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 214; XIII, 1878, p. 511.	Australien
<i>affinis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 334.	Amazonas
<i>agilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 626.	Panama
<i>albipes</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 675. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621.	Mexiko
<i>angustus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 326.	Amazonas
<i>aridus</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196.	Arizona
<i>arizonicus</i> Casey, l. c. p. 195.	"
<i>armiger</i> Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 99.	Venezuela
<i>australis</i> Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 630. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 45.	Sydney
<i>opacus</i> Redtb. Reise Novara, Zool. 1867, p. 30.	
<i>basiventris</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 625.	Brit.- Honduras, Guatemala
<i>Batesi</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 331.	Amazonas
<i>Beccarii</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 220.	Birma
<i>Bergi</i> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 324.	Argentinien, Uruguay
<i>bicolor</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 331.	Amazonas
<i>Blanchardi</i> Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.	Montevideo
<i>fulvipes</i> (<i>Lathrobium</i>) Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1837—43, p. 85.	
<i>Bomfordi</i> Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 279.	Ostindien
<i>borneensis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 221.	Sarawak
<i>Bouchi</i> Brèthes, An. Mus. Nac. Buen. Aires (3) I, 1903, p. 306.	Argentinien
<i>brachycerus</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 135.	Westafrika
<i>brachypterus</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 161.	Ceylon
<i>brevicollis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 679 (<i>Heteroleucus</i>).	Ägypten, Deutsch- Ostafrika
<i>brevis</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 159.	Ceylon, Ostindien
<i>brunneus</i> Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 122. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 678.	Kolumbien
<i>caliginosus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 671.	
<i>capensis</i> Er. l. c. p. 673.	Kapland
<i>cayennensis</i> Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 122.	Franz.- Guyana
<i>complanatus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 155.	Ostindien
<i>morio</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 517.	
<i>crassicollis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 678 (<i>Heteroleucus</i>).	Kolumbien
<i>cribricollis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 627.	Guatemala
<i>curticornis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 215.	Queensland
<i>debilis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 332.	Amazonas
<i>densus</i> J. Lec. New spec. Col. 1863, p. 48.	Kalifornien
<i>denticeps</i> Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 239.	Montevideo, Corrientes
<i>depressus</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 157.	Ostindien
<i>verticalis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 219.	

diffidens Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196.
distans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 324.
duplex Sharp, l. c. p. 328.
egens Sharp, l. c. p. 334 (*Heteroleucus*).
Eppelsheimi Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 223.
erythropterus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621.
extremus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 327.
Fairmairei Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 151.
Fauveli Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 408.
femoratus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 8.
ferrugineus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 40.
flavipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 674.
fragilicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624.
fraternus nom. nov.
 proximus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 238.
funestus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 40.
fuscipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 797.
genalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 219.
geniculatus Redtb. Reise Novara II, 1867, p. 30.
 robustus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 321. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 164.
gracilicornis nom. nov.
 longicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 627.
grandiceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 212.
grandis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 237.
guatemalenus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 623.
iners Sharp, l. c. p. 623.
infans Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 137.
javanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 156. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 68.
 pallipes Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 156.
 insignis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 77.
jejunus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 541.
Klimai Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 306.
Klimshi Bernh. l. c. p. 304.
Kraatzi Bernh. l. c. p. 303.
latebricola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 10.
latipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1806, p. 202. — Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 456. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 674. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 7. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194.
laxus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 329.
leucopus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 158.

Texas
Amazonas
"
"
Sumatra,
Borneo
Zentral-
amerika
Amazonas
Madagaskar
Natal
Südchina
Ceylon
Portorico
Panama,
Venezuela,
Kolumbien
Brasilien,
Argentinien

Ceylon
Mexiko

Birma
Brasilien,
Argentinien

Panama

Queensland

Bucharā
Guatemala,
Panama
Panama
Westafrika
Sundainseln,
Ceylon,
Ostindien,
China,
Japan

Australien

Brasilien
"
Paraguay
Südastralien

Nordamerika

Amazonas
Ostindien
1*

- Lewisius** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 77. Japan
lineaticollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama
 (1886), p. 624.
longicornis Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 139. Syrien
Mac-Leayi Duviv. Enum. Staph. 1883, p. 177. Australien
brevis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II,
 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova
 X, 1877, p. 213 nota.
marginatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala
 (1886), p. 629 (*Heteroleucus*).
marginellus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, Victoria
 p. 511.
Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, Australien
 p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877,
 p. 212 nota.
melanocephalus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, Ostindien
 p. 516. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
 I, p. 159.
melanomerus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 160. „
mesocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150. Madagaskar
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko
 p. 630.
minor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 333. Amazonas
monachus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 305. Brasilien
obesus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194. Texas
oblatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 326. Amazonas
obscurus Blanch. Voy. d'Orb. Col. VI, 2, 1843, p. 87. Argentinien,
 — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 319. Brasilien,
 ? *incultus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, Paraguay
 p. 325.
opacicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama
 (1886), p. 624.
opacus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49. Georgia
 (Amer.)
palmatus Nordm. Symbol. 1836, p. 155. — Er. Gen. Brasilien
 Spec. Staph. 1839—40, p. 677.
panamensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama
 (1886), p. 622.
parcus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 48. — Sharp, Südl. Nord-
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621. Amerika,
 — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194. Mexiko
parviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko
 p. 622.
parvicornis Sharp, l. c. p. 627. Panama
parvipennis Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196. Iowa
penetrans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama,
 p. 624. Mexiko
piceus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 51. Ostindien
picifrons Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko
 p. 797.
picticornis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 158. Ceylon
pilicollis Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 516. Ostindien
planus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 157. „
proximus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 325. Amazonas
punctatissimus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, Japan
 1889, p. 323.
punctatus Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 291. Kapland
quadraticollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Australien
 1899, p. 540.

- reflexus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 625. Panama
- reticulatus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 136. Westafrika
- rotundicollis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 160. Ceylon
- rubripennis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 511. N. S. Wales
- rufipennis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 78. China,
Japan
- rufitarsis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 214; XIII, 1878, p. 510. Tasmanien
- rufoniger** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 306. Brasilien
- scaber** Bernh. l. c. p. 304. „
- Schuberti** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 149. Madagaskar
- sejunctus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 622. Guatemala
- Sharpi** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 307. Brasilien
- siculus** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 80. Sicilien,
Sardinien,
Kap Verde-
Inseln,
Algier,
Marokko,
Kaukasus
- erythrostomus** Costa, Atti Ac. Napoli (2) I, nr. 2, 1883, p. 86. Deutsch-
Ostafrika
- fossor** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 252. Madagaskar
Zentralafrika
- Sjöstedti** Eichelb. Ergebn. Schwed. Exped. 1908, p. 84. Venezuela,
Argen-
tinien,
Paraguay,
Uruguay
- speculifrons** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150. Amazonas
- Stuhlmanni** Bernh. Erg. Deutschen Ztr.-Afr.-Exp. 1911, p. 470. Kolumbien
- suffusus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 676. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 316. „
- Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 164. Texas
- lividipennis** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 87. Birma
- sulcatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 328. Texas
- sulphuripes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 675. Arizona
- terminatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 677. Kolumbien
- texanus** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 195. Victoria
- thoracicus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 220. Mexiko,
Guatemala,
Nicaragua
- trajectus** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 195. Birma
- subsp. **pimalis** Casey, l. c.
- trapezicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76.
- trapezus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 510.
- validus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 626.
- variipes** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 218.

Lathropinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.

- aequalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 321. Amazonas
- ater** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 320. „
- Drakei** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 305. Paraguay
- dux** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 319. Ega
- fulvipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 676. — Kolumbien
- Burm. Reise d. La Plata-Staaten I, 1865, p. 484.

- Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 25. —
 Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 311.
major Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 86, t. 5, f. 9. Argentinien
 — Burm. Reise d. La Plata-Staaten I, 1865,
 p. 484. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,
 p. 308.
 ? *rectus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 320. Amazonas
mimus Sharp, l. c. p. 322.
parallelus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko
 (1886), p. 628.
modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 323. Amazonas
picipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 671. — Cas. Östl. Nord-
 Mem. Col. I, 1910, p. 193. amerika
subtilis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 313. Argentinien,
Sivorii Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, Uruguay,
 p. 239. Paraguay
tenebrosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 670. Kolumbien,
 Ecuador
tenuis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 323. Amazonas
torosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 670. Kolumbien

14

Araecerus Nordm.

Nordmann, Symbol. 1836, p. 7. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672.
 — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.

Araecerus Nordm. l. c. p. 157.

- cribratus** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 86. Brasilien
niger Nordm. Symb. 1836, p. 157. — Er. Gen. Spec. Brasilien,
 Staph. 1839—40, p. 672. — Blanch. Voy. d'Orb. Uruguay,
 Col. 1843, p. 87. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba Argen-
 VII, 1884, p. 326. tinien
obsidianus Cas. Mem. Col. I, 1910, p. 193 (Gen. dub.). Texas

3

Taenodema Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 120. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 679.
 — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 103. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl.
 II, 1856—58, p. 667. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 618.

Gymnurus Nordm. Symbol. 1836, p. 158.

- aeneum** Ol. Ent. III, 42, 1794, p. 10, t. 2, f. 11. — Lacord. Surinam
 Gen. Col. Atl. t. 15, f. 3. — Er. Gen. Spec. Staph.
 1839—40, p. 681.
africanum Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IV, 1873, Abessinien
 p. 357.
aureipilis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98. Venezuela
Bang-Haasi Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 300. Peru
bellum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 310. Amazonas
cinctum Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 205. Brasilien
cinereum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 311. Amazonas
eyanescens Nordm. Symbol. 1836, p. 159, t. 2, f. 7. — Brasilien
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 680.
dubium Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 309. Amazonas

<i>elegans</i> Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 310.	Peru
<i>filiforme</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620.	Panama
<i>filum</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 314.	Amazonas
<i>haemorrhoidale</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 619.	Panama
<i>hemichlora</i> Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 23.	Peru
<i>laeve</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 306.	Amazonas
<i>laevipenne</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 302.	Brasilien
<i>laticorne</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 315.	Amazonas
<i>lentum</i> Sharp, l. c. p. 308.	"
<i>luridum</i> Sharp, l. c. p. 318.	"
<i>nigripes</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 619.	Mexiko,
<i>ornatum</i> Sharp, l. c. p. 619.	Guatemala
<i>peruvianum</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 302.	Mexiko
<i>planum</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 305.	Peru
<i>productum</i> Sharp, l. c. p. 315.	Amazonas
<i>quadratum</i> Sharp, l. c. p. 309.	"
<i>rectum</i> Sharp, l. c. p. 307.	"
<i>rude</i> Sharp, l. c. p. 313.	"
<i>semicyaneum</i> Perty, Del. anim. 1830—34, p. 33, t. 7, f. 8. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 121. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681. — Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 797.	Brasilien
<i>serpens</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 316.	Amazonas
<i>simile</i> Sharp, l. c. p. 313.	"
<i>stigmaticum</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.	Guatemala
<i>tarsale</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 310.	Amazonas
<i>tectum</i> Sharp, l. c. p. 317.	"
<i>tibiale</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620.	Nicaragua
<i>vestitum</i> Nordm. Symbol. 1836, p. 160. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 680.	Brasilien
<i>vicinum</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 312.	Amazonas
<i>villosum</i> Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 795.	Brasilien
<i>Walteri</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 301.	"

2. Subtribus: **Procirri.****Procirrus** Latr.

Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 436. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 685. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 125. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667.

<i>aristidis</i> Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 33.	Ägypten
<i>Castelnaui</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 509.	Australien
<i>Feae</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215.	Birma
<i>fuscus</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 324.	Japan
<i>Lefebvrei</i> Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 436 nota. — Guér. Ic. Ins. 1842—49, t. 9, f. 6a—d. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 686. — Jacq. du Val, Gen. Staph. 1858, t. 19, f. 92. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 80.	Sizilien, Südtalien, Nordafrika

Sharp type labelled
Ind. or Dacca

Lewisi Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 324.
Saulcyi Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 291 nota.
victoriae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 509.

Japan
 Palästina
 Victoria

8

Eucirrus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215.

miricornis Fauv. l. c. p. 216.

Ostindien

1

Oedodactylus Fairm. et Germ.

Fairm. et Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 441. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 336.

anceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 338.
aper Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 798.
errans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 337.
Fauveli Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 630.
fuscobrunneus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 441. — Fauv. Bull. Soc. Normand. (2) I, 1868, p. 22.

Amazonas
 Mexiko
 Amazonas
 Mexiko

Chile

5

Palaminus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 104. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 340. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 57. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 327. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 95. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 197.

allocerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321.
amplipennis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 221.
anceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 349.
apicalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 347.
apicipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 636.
australiae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XVII, 1878, p. 508.
Balzani Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 238.
Barbiellinii Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 303.
biguttatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.
bolivianus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 237.
bonariensis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 329.
breviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 344.
brevicollis Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 800.
brunneus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321.
ceylanensis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 636.
circumflexus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321.
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 632.

Madagaskar
 Neumexiko

Amazonas
 „
 Guatemala

Queensland

Bolivien
 Brasilien
 Venezuela
 Bolivien
 Argentinien
 Amazonas
 Brasilien
 Madagaskar
 Ceylon
 Panama

Madagaskar
 Panama

compressiventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 368.	Mexiko
concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635.	Guatemala
contortus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 197.	Florida
crassus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 343.	Amazonas
crenatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 633.	Guatemala
cribratus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397.	Florida
debilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 638.	Nicaragua
decussatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 250.	Kap Verde- Inseln
deformis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 637.	Mexiko, Guatemala
densicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 367.	Mexiko
diffinis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 639.	Nicaragua
discretus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 345.	Amazonas
distans Sharp, l. c. p. 355.	"
Erichsoni Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 178.	Bolivien
ferrugineus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 798.	Brasilien
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 638.	Britisch- Honduras, Nicaragua
flavipennis J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 396.	Florida
fragilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 348.	Amazonas
fraternus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Texas
fuscipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 352.	Amazonas
fusciventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634.	Nicaragua
gracilipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634.	Panama
gracilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 354.	Amazonas
heraldicus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.	Venezuela
hudsonicus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	New York
indicus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.	Ostindien
infuscatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 366.	Mexiko
insignis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 633.	Panama
invidus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Nicaragua
isthmianus Casey, l. c. p. 199.	Panama
lacertinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631.	Guatemala
lancifer Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98.	Venezuela
larvalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Nordamerika
limbifer Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 82.	Neuguinea
lividus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Kalifornien
longicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 632.	Panama
longicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 341.	Amazonas
luteus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Östl. Nord- amerika

madecassa Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320.	Madagaskar
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635.	Mexiko
minor Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 368.	Mexiko
modestus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 342.	Amazonas
niger Sharp, l. c. p. 348.	Brasilien, Kolumbien, Bolivien
normalis J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397.	Carolina, Georgia
nossibianus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320.	Madagaskar
novae-guineae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 225.	Neuguinea
opaculus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 179.	Bolivien
pallidus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 799.	Brasilien, Venezuela, Mexiko
pallipes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.	Nordamerika
palmatius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 636.	Panama
parcus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 351.	Amazonas
parviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631.	Mexiko
parvulus Sharp, l. c. p. 637.	„
pellax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 352.	Amazonas
pennifer Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320.	Madagaskar, Java, Philippinen
piceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 682.	Kolumbien
pilosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 682.	„
plagiatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 96.	Venezuela
productus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 376.	Deutsch- Ostafrika
pumilus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 398.	Florida
puncticeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 350.	Amazonas
quadriguttatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.	Venezuela
robustus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 343.	Amazonas
rubripennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635.	Guatemala
rugicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98.	Venezuela
sellatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 354.	Amazonas
Sharpi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 178.	Peru
signifer Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 200.	Nicaragua
Simoni Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 50.	Ostindien
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 341.	Amazonas
sinuatus Sharp, l. c. p. 346.	„
sobrinus Sharp, l. c. p. 350.	„
sordidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634.	Mexiko
stipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 353.	Amazonas
suturalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 319.	Madagaskar
tegulatus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 200.	Nicaragua
testaceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 683. — Casey, Mem. Col. I, 1901, p. 197.	Östl. Nord- amerika
timidus Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198.	Texas
tortilis Casey, l. c. p. 200.	Nicaragua
transmarinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 322.	Zanzibar, Madagaskar

- truncatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 142.
validus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 632.
variabilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 683, t. 1, f. 8.
vitiensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 507.
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 252.
vittatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 639. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97.
 var. *humeralis* Sharp, l. c.
 103
- Ostindien
 Panama
 Mittel-
 amerika,
 Antillen,
 Venezuela
 Fidjiinseln
 Nicaragua,
 Brasilien,
 Venezuela
 Mexiko

Oedichirus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 684. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,
 p. 104. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666. — Sharp,
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 338.

Elytrobaeus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 801.

Subgen. *Oedichiranus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 263.

- abdominalis* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 292.
alatus Nietner, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857,
 p. 247. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
 I, p. 154.
Andersoni Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888,
 p. 10.
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 217.
dimidiatus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 280.
foveicollis Quedf. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 117.
geniculatus Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 802.
Idae Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 76.
intricatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 211.
Kolbei Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 319.
Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 76.
longipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 154.
melanurus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 138.
Oneili Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 297.
optatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 339.
paederinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 685, t. 1,
 f. 9. — Jacq. du Val, Gen. Staph. 1858, t. 19,
 f. 91. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.
Quedenfeldti Schauf. Ent. Nachr. XIV, 1888,
 p. 314.
paederoides M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II,
 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova
 X, 1877, p. 211 nota.
Reitteri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908,
 p. 33 (*Oedichiranus*).
dimidiatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906,
 p. 263.
rubricollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878,
 p. 508.
- Kapland
 Ceylon
 Südastralien
 Birma
 Ostindien
 Madagaskar
 Brasilien
 Japan
 Nord-
 australien
 Madagaskar
 Japan
 Nördl. Indien
 Westafrika,
 Kap Verde-
 Inseln,
 Abessinien
 Südafrika
 Amazonas
 Sizilien,
 Süditalien,
 Algier,
 Marokko
 Australien
 Zentralasien
 Australien

- ruficeps* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 155.
rufitarsis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 318.
rufotestaceus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 39.
Schultheissi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 217.
Sedilloti Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 254.
senegalensis Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.
terminatus Woll. Col. Hesp. 1867, p. 249.
Simoni Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 179.
terminalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 62.
terminatus Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 223.
 var. *Oedipus* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 34. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 343.
 — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.
Walkeri Fauv. l. c.
 var. *rubronotatus* Pic, Echange 1903, p. 145.
 var. *stilicinus* Gerst. Beitr. Ins. Zanzibar 1866, p. 30. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.
tricolor Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 61, t. 4, f. 1.
unicolor Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 91.
ventralis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 318.
- Ostindien
 Madagaskar
 Ceylon
 Birma
 Neu-
 kaledonien
 Senegal,
 Kap Verde-
 Inseln,
 Ägypten
 Syrien
 Nordwest-
 australien
 Angola
 Sizilien,
 Marokko
 Kreta
 Zanzibar
 Australien,
 Tasmanien
 Spanien,
 Marokko
 Madagaskar

31

2. Tribus: Paederini.

- Paederini* Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 560. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 197. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 494. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 17.
Pédérides Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 88. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 41.
Paederina Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 194.
Paederini Sectio I, *Paederi* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290. — Sectio II *Paederi* J. Leconte & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98.
Pédériens Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 1.
Paederinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 506. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

Lindus Sharp.

- Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 281.
religans Sharp, l. c. p. 283. Amazon.

1

Gnathymenus Sol.

- Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 326. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 153. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 7. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 440. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 17.
apterus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 327, t. 6, f. 10. Chile
obesus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 18. Chillan

- quadripartitus** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. (4) I, 1861, p. 440. Chiloe
rufoniger Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 100. Venezuela
 4

Paederus F.

F. Syst. Entom. 1775, p. 268. — Steph. Ill. Brit. V, 1837, p. 279. — Er. Käf. Mark Brand. 1837—39, p. 517; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 649. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 724. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 48. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195 (*Poederus*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 242. — Reitt. Ent. Nachr. XV, p. 169—171. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 368. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIII, p. 22. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 534. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 58, 60.

Poederomorphus Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 75.

Leucopaederus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 59, 67.

Paederillus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 59, 62.

Subgen. *Paederidus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 245.

Subgen. *Paederus* s. st. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 242.

Biologie: Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195. — Candèze, Mém. Soc. R. Sc. Liège XVI, 1861, p. 329, t. 1, f. 2. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 124.

- adelaidae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 10. Südaustralien
agnatus Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 180. China
Albertisi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 236, t. 1, f. 21. Neuguinea
albipilis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 163; in Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 193. Turkestan
alternans Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205. Ceylon,
ruficoxis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 151. Ostindien
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 609. Guatemala
altivagans Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 95. Deutsch-
alticola Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20. Ostafrika
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 287. Amazonas
amplicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150. Ceylon
amplipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 23. Abessinien
Andrewesi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 53. Ostindien
anguinus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 309. Kolumbien
angulicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 224 nota. Australien
annexus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 133. Westafrika
antipodum nom. nov. Südwest-
Erichsoni Bernh. Fn. Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 16. australien
antiquus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 615. Mexiko

- antoniensis** Sharp, l. c. p. 615. Mexiko,
Guatemala
- apicalis** Sharp, l. c. Mexiko,
Nicaragua,
Guatemala
Madagaskar
- apterus** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.
var. *rufipes* Fauv. l. c.
- arduus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 615. Panama
- argentinus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 407. Argentinien
- australis** Guér. Voy. Coq. Zool. II, 1826, p. 63, t. 1, f. 23. Neuholland
- basipes** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 21. Deutsch-
Ostafrika
Mittel- und
Südeuropa
- Baudii** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIV.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 329. —
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 250.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.
- lusitanicus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857,
p. 107 (nec Aubé).
- Schönherrri* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr.
1889, p. 368, f. 3.
- ventricosus* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II,
1862, p. 77.
- Bernieri** Cast. Hist. Nat. I, p. 183. Madagaskar
- birmanus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233. Birma
- bolivianus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 180. Peru,
Bolivien
- bonariensis** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 294. Argentinien
- brasiliensis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 658. —
Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 85. — Lucas
in Cast. Anim. nouv. Am. Sud, Ent. 1857, p. 51.
— Burm. Reise II, 1865, p. 165. — Fauv. Bull.
Soc. Ent. Belg. XXVI, 1877, p. 12. — Lynch,
Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 290. Brasilien,
Argen-
tinien,
Uruguay
- brevipennis** Lacord. in Boisd. Faune Ent. Paris I, 1835,
p. 430. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
p. 727. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 330.
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877,
p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 538. Mitteleuropa
- geniculatus* Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855,
p. 201.
- Bruchi** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 406. Argentinien
- caffer** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 290. Kapland
- caligatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 652. —
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
p. 729. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II,
1857—59, t. 18, f. 90. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
III, 1872, p. 333. — Muls. et Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon 1877, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitt.-
Eur. II, 1895, p. 537. Mitteleuropa,
Mittelmeer-
gebiet
- paludosus* Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855,
p. 202.
- canonicus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 67. New York
- capensis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651. Kapland
- capillaris** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 231. Birma
- carolinae** Casey, l. c. p. 63. Nordcarolina

- ceylonicus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 37.
chalybaeus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.
chilensis Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1867, p. 20; Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148.
- coarctatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 666.
coerulescens Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.
collaris Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 289.
columbinus Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 123. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 617.
aequinoctialis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 657.
protensus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 287.
- combustus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 88.
compotens J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 48. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.
conicollis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 73.
conspicuus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 73.
eordovens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 616.
coriaceus Fauv. Tijdschr. voor Ent. XI, 1869, p. 57, t. 8, f. 1.
costaricensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 616.
eoxalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232.
crassus Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 288.
crebrepunctatus Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 210.
eruenticollis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 174.
 var. **cingulatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 265.
eurrax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.
curticeps Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 369.
curticollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 182.
- cyanellus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 88.
cyanipennis Guér. Voy. Coq. Zool. II, p. 62, t. 1, f. 22.
coeruleipennis Boh. Resa Eugen. 1858, p. 33.
cynocephalus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 662.
 — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152.
indicus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 634.
- debilior** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 339.
dilutipes Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152.
Doriae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 89.
duplex Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 211.
erythroderus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663.
 — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.
eximius Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847, p. 281, t. 17, f. 1.

Ceylon
 Madagaskar
 Philippinen,
 Sunda-
 inseln
 Brasilien
 Madagaskar
 Port Natal
 Kolumbien,
 Guyana,
 Amazonas,
 Venezuela

Neuguinea

Kalifornien

Ostindien
 Kolumbien
 Mexiko

Celebes

Costa Rica,
 Nicaragua
 Birma
 Kapland
 Trop.
 Ostafrika
 Australien,
 Tasmanien,
 Neu-
 kaledonien

Mexiko

„

Peru.
 Bolivien
 Neuguinea

Peru, Hawaii

Ostindien

Turkestan
 Madagaskar
 Neuguinea
 Gallaland

Mexiko

Abessinien

- extraneus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1818, p. 133. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 661. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152. Bengalen
- fastuosus** Klug, Ins. Madag. 1832—33, p. 140. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 665. Madagaskar
- Fauveli** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 292. Marokko,
Abessinien,
Senegal,
Ostafrika
- Feae** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232. Birma
- femoralis** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 62. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61. Kalifornien
- ferus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 659. — Burm. Reise I, 1865, p. 484. — Solsky, Nat. Ent. Am. Sud III, 1872, p. 21. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 293. Brasilien,
Argentinien,
Bolivien,
Ecuador,
Neugranada
- filicornis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612. Mexiko
- flavocaudatus** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241. Bolivien
- floridanus** Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 62. Florida
- forficularius** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152. Madagaskar
- fulvicornis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 665. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150. Java
- fuscipes** Curt. Ent. Brit. III, 1823—40, p. 108. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537. Europa,
Asien,
Afrika,
Neuguinea,
Australien
- aestuans** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 655.
- angolensis** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 222.
- corsicus** Gaut. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 393.
- Erichsoni** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 247.
- jennicus** J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 38.
- Idae** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 75.
- longipennis** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 517; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 728. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 261.
- riparius** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 62.
- var. **peregrinus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 656. — Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, p. 55, t. 4, f. 10. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 151. Ostindien,
Ceylon,
Sunda-inseln
- breviceps** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 37.
- Gestroi** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 237, t. 1, f. 23. Neuguinea
- gigas** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 17. Peru
- globulicollis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 283. Brasilien
- Gottschei** Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, I, p. 179. Korea
- Goudoti** Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 183. Madagaskar
- grandis** Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 60. Arizona

- gratiosus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 54.
Horni Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 38.
javanus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123.
Iheringi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 407.
impressipennis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.
indicus Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 61.
intermedius Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 147.
jowensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 66.
Klugi Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 183.
Koebelei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1900, p. 23.
Kraepelini Fauv. Mitteil. Mus. Hamb. XXII, 1905, p. 82.
Lacordairei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 88. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1874, p. 433; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 265.
laetipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.
laetus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 660. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 613.
limnophilus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 653. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 729. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 334. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.
minutus Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 76.
lingualis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 286.
Listeri Gahan, Mon. Christmas Isl. 1900, p. 89.
litoralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 61. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 519; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 650. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 726. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 255. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.
♂ *cephalotes* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 86. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 725.
confinis Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 69.
finisterrae Ill. Mag. VI, 1807, p. 356.
geniculatus Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 430.
gregarius Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 331 (nec Scop.).
Moses Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 654.
peduncularius Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 75.
riparius Ol. Ent. III, 1794, nr. 4, p. 44, t. 1, f. 2.
strictus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 394.
vulgaris Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1852, p. 27.

Ostindien
 Ceylon
 Java
 Brasilien
 Madagaskar
 Himalaya
 Manila

 Iowa
 Madagaskar
 Australien

Java
 Neu-
 kaledonien

Mexiko

„

Mitteleuropa

Amazonas
 Cristmas-
 inseln
 Europa,
 Mittelmeer-
 gebiet

- littorarius** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 142. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 656. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 66.
littoralis Oliv. Encycl. méth. VIII, p. 627.
- littoreus** Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.
- longiceps** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 247.
- luctuosus** Klug, Monatsber. Berl. Ac. 1855, p. 644; Peters' Reise 1862, p. 178, t. 10, f. 16.
- luridiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.
- lusitanicus** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 236.
- macellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.
- madagascariensis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 652.
- magniceps** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1905, p. 181.
- magnificus** Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 474.
- mandibularis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 659. — Luc. in Cast. Anim. nouv. Am. Sud 1857, p. 51. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 292.
- margelanicus** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 187.
- melampus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 660. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.
- melanocephalus** Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, nr. 3, 1898, p. 4.
- melanogaster** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20.
- melanurus** Aragona, De quib. Col. 1830, p. 13. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.
ruficeps var. *melanurus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332 nota.
 var. *ruficeps* Baudi, Studi Entom. 1848, I, p. 138. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332 nota.
- memnonius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.
- meridionalis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 331 nota. — Reitt. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.
- mesopotamicus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 178.
syriacus Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 14.
- metallicus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 151.
- Methneri** Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 472.
- mexicanus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 657. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 617.
- Meyricki** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 72.
- morio** Mannerh. Brachél. 1830, p. 39.

Östl. Nord-
amerika

Florida,
Georgien
Margelan
Mozambique,
Kapland
Panama

Spanien
Kilimandjaro
Madagaskar
Peru,
Bolivien
Deutsch-
Ostafrika
Brasilien,
Argen-
tinien

Turkestan
Ostindien

Celebes

Britisch-
Ostafrika
Tirol,
Piemont,
Sardinien,
Sizilien

Norditalien

Ägypten,
Nubien,
Abessinien

Westliches
und
mittleres
Mittel-
meergebiet

Mesopo-
tamien,
Syrien
Madagaskar
Deutsch-
Ostafrika
Mexiko

West-
australien
St. Domingo

- mutans* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 286.
- nakurensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 24.
- neotropicus* nom. nov.
thoracicus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.
- nepalensis* Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 60.
- nevadensis* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.
- nigricornis* Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 61.
- nobilis* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475.
- obliteratus* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 395. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 65.
- opacipennis* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 105.
- opacus* Bernh. l. c. p. 105.
- ornaticornis* Sharp in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 41.
- ovaliceps* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 180.
- pallidus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.
- palustris* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.
- parallelus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 368.
- pauloensis* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 309.
- pedestris* Gerstäck. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 29; Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 82. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 21.
- Pelikani* Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 44.
- Perrieri* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.
- piceus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.
- pilifer* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.
- plagiator* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 18.
- politus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1878, p. 237, t. 1, f. 22.
- Poweri* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 74.
- puberulus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.
- pugetensis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 66.
- puncticollis* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 471.
- punctiger* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 288.
- punctiventris* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 310.
- riftensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 24.
- riparius* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 518; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 653. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 727. — Thoms.

Amazonas,
Bolivien
Britisch-
Ostafrika
Mexiko

Nepal
Neumexiko,
Utah,
Wyoming
Nepal
Deutsch-
Ostafrika
New York

Kapland

Deutsch-Süd-
westafrika
Ecuador

Peru,
Bolivien
Guatemala

Iowa

Japan

Brasilien
Kilimandjaro,
Britisch-
Ostafrika
Griechenland,
Korfu
Madagaskar
Kilimandjaro
Ostindien
Kap Verde-
Inseln
Neuguinea

Japan
Ostindien
Washington
Rhodesia,
Deutsch-
Ostafrika
Amazonas
Brasilien
Britisch-
Ostafrika

Europa,
Oran,
Sibirien,
Texas

- Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.
- gregarius* Scop. Entom. Carn. 1763, p. 102.
- longicollis* Gaut. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 393.
- septimus* Schaeff. Icon. Ins. 1766—79, I, t. 71, f. 3.
- rubrothoracicus** Goeze, Entom. Beytr. I, 1777, p. 730. — Deville, Fn. Bass. Seine II, 1907, p. 134 (*Paederidus*).
- algiricus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.
- carbonarius* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 394.
- haematoderus* Gemm. & Har. Cat. Col. II, 1868, p. 627.
- longicornis* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 319. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730.
- ruficollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 662. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 731. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 335. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536.
- sanguinicollis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 281. — Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 559. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536.
- thoracicus* Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 170.
- ruficollis** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 339. — Deville, Fn. Bass. Seine II, 1907, p. 134 nota (*Paederidus*).
- gemellus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 731. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536 (*Paederidus*).
- rufitarsis** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866—67, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 611.
- rufocyaneus** Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475.
- rutilicornis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 666.
- lugubris* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.
- sabaeus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 655.
- aestuans* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 291.
- longicornis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 634.
- saginat** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 63.
- texanus* Casey, l. c. p. 65.
- Salvini** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 431; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.

Mitteleuropa,
Kaukasus,
Westl.
Mittel-
meergebiet

Mittel- und
Südeuropa

Mexiko

Deutsch-
Ostafrika
Kolumbien,
Brasilien

Arabien,
Ägypten,
Tropisches
und
südliches
Afrika,
Mada-
gaskar
Texas

Mittel-
amerika

- scabripennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.
 var. *usticollis* Fauv. l. c.
Schultheissi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233.
Schusteri Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 310.
senegalensis Cast. Etud. Ent. 1834, p. 123.
signaticornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 613.
Simsoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 92.
solidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 284.
sondaicus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232.
 javanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 654 (nec Cast.). — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150.
sparsus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 516.
subnitidus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 181.
superbus Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 474.
tamulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 661. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.
 dubius Kraatz, l. c. p. 151.
 mixtus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 75.
 rugipennis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.
tempestivus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 658.

tenuicornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 224; XIII, 1878, p. 517.
testaceitarsis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.
tricolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663.
tridens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 285.
trimerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 294.
tropicus Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 473.
tumidicollis Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 28.
tweedensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1900, p. 22.
ugandae Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 473.

usagarae Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 105.
usambarae Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 290.
usambaricus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 375.
ustus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 62. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 67 (*Leucopaederus*).
variceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152.
variicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 154.
velox Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.
vitiensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 517; Journ. Mus. Godeff. XIV, 1879, p. 84.
 samoensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 224.

Kilimandjaro

Sumatra

Brasilien

Senegal

Mittel-

amerika

Tasmanien

Amazonas

Sunda-Ins.,

Ostindien

N. S. Wales

Peru,

Bolivien

Kilima-

ndscharo

Ostindien,

China,

Japan,

Ceylon,

Sunda-Ins.

Kolumbien,

Venezuela,

Brasilien

Australien

Mexiko

Antillen,

Guatemala

Amazonas,

Peru

Neuguinea

Deutsch-

Ostafrika

Zanzibar

Australien

Deutsch-

Ostafrika,

Kilima-

ndscharo

Deutsch-

Ostafrika

„

„

Kalifornien,

Arizona

Ceylon

Ostindien

Guatemala

Fidjiinseln

- Weisei** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 375. Deutsch-Ostafrika
xanthocerus Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 210. Somaliland,
yucateca Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 614. Abessinien
 Mittelamerika
tempestivus Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 658 nota.
 199

Nazeris Fauv.

- Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 nota. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 234.
Mesunius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 68. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 275.
ammonita Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 654. Syrien
optatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 322. Japan
pallidipes Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 149. Kaukasus
pulcher Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 317. Spanien,
 — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 84. Algier,
cribellatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 162. Marokko
Wollastoni Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 68. Japan
 5

Dihelonetes Sahlb.

- Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1844, p. 791. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 601. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 235.
Sunides Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 638, t. 1, f. c.
Sunius (spuri) Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645 (ex parte).
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152. Madagaskar
bidens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 300. Amazonas
biplagiatus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1847, p. 792. Brasilien
bipunctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645. Kolumbien
boreaphiloides Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 638. Kolumbien,
 Venezuela
catena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 298. Amazonas
celatus Sharp, l. c. p. 303. „
confinis Sharp, l. c. p. 297. „
fragilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 602. Panama,
 Venezuela,
 Brasilien
hybridus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 646. Kolumbien,
 Venezuela
latemarginatus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. Brasilien
laticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 603. Panama
latitans Sharp, l. c. p. 606. Guatemala,
 Nicaragua,
 Panama
monachus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. Brasilien
naevius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 647. Kolumbien
occultus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605. Guatemala

- pallipes* Sharp, l. c. p. 603. Guatemala,
Nicaragua
- palpalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 299. Amazonas
- panamensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 604. Panama
- peltatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 299. Amazonas
- pictipes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605. Panama
- posticalis* Sharp, l. c. p. 605. Guatemala
- robustus* Sharp, l. c. p. 603. Chile
- sculptilis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 440. Amazonas
- Sharpi* nom. nov.
- bispinus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 301.
- spinifer* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 302. Amazonas
- stigma* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 646. — Fauv. Kolumbien,
Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78 (*Stilicopsis*). Venezuela,
Caracas
- tristigma* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605, t. 15, f. 22. Guatemala

28

Astenus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 275. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 435. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 539.

Sunius Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 523; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 99. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 720. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 48. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 292; Rev. d'Ent. XVII, 1897, p. 49, 272. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 269. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 289; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596. — Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 297. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 235.

Subgen. *Astenognathus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150.

Subgen. *Astenus* s. str. Reitt. l. c. p. 151.

Subgen. *Eurysunius* Reitt. l. c. p. 149.

Subgen. *Mecognathus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 595, t. 13, f. 8. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666.

Suniogaster Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151.

Subgen. *Neognathus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 69. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 69.

aequalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 9. Südaustralien

aequivocus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 104. Madeira

americanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237. New York,
Virginia

amicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 290. Amazonas

ampliventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228 (Buchar). Buchar

angulatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 70 (Japan). Japan

angustatus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 524; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 640. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 723. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 89. Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Azoren,
Madeira

- Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. —
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,
p. 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 541.
gracilis Payk. Mon. Staph. 1789, p. 38. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 (ex parte).
var. *lyonessius* Joy, Ent. Month. Mag. XLII,
1908, p. 177.
- apiciflavus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904,
p. 68. Australien
- arizonianus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241. Arizona,
Neumexiko
- attenuatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. Kolumbien
- australasiae** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 216;
l. c. XIII, 1878, p. 513. Neusüdwest
- australicus** Bernh. Fauna Südwest-Austr. II, 2, 1908,
p. 17. Südwest-
australien
- bicinctus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,
p. 84. Neuguinea
- bicolor** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 72. China, Japan
- bimaculatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 641. —
Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 723
nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 296.
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
1877, p. 288. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 541. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902,
p. 83 (*Astenognathus*). Frankreich,
Mittel-
meergebiet,
Madeira
- biguttatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857,
p. 106 (ex parte).
- immaculatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,
II, p. 561.
- binotatus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. III, 1823, p. 154. Iowa
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 238.
- biplagiatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 636. Ostindien
- birmanus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222. Birma
- bisignatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 642. Caracas
- bispinus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 636. Ostindien,
major Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 146. Ceylon
- bivittatus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,
p. 122. Westafrika
- brasilianus** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. Brasilien
- brevicollis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX,
1904, p. 70, t. 4, f. 13. Australien
- brevipennis** Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876,
p. 6. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 240. Iowa
- brevipes** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 71. Japan
- bucharensis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 246. Buchara,
Turkestan
- californicus** Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876,
p. 6. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 244. Kalifornien
- capitalis** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 254. Neu-
kaledonien
- centralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 599. Mexiko
- chimaera** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 595, t. 12, f. 8. Madeira
- chloroticus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 74. Japan

- cinctiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 601. Mexiko,
Guatemala,
Panama
- cinctus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 238. New York
bis Iowa
- coarctatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 644. Kolumbien
- cognatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596. Panama
- collaris** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 294; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 105. Spanien,
Westl.
latus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164, t. 6, f. 11 (*Eurysunius*). Nordafrika
- concolor** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 149. Ostindien
- cribrellus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 394. Italien,
Sizilien,
Frankreich,
Dalmatien,
Kleinasien
- nota*; Mars. Ab. VIII, 1871, p. 336. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 294 *nota*; Cat. syst. Staph. 1875, p. 40. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 (*Astenognathus*).
- curtulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645 (*Eurysunius*). Korsika,
Sardinien
- cylindricus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 216 *nota*; l. c. XIII, 1878, p. 513. Australien
- dimidiatus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 591. Kanar. Inseln
- discopunctatus** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241. Rhode Island,
Nebraska,
Iowa,
Texas
- centralis* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 7.
- elevator** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 26. Britisch-
Ostafrika
- Eppelsheimi** nom. nov. Goldküste
- pictus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 124.
- fallax** Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 652. Syrien
- fasciatus** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 182; Explor. Turkest. 1874, II, V, p. 190. Turkestan
- Fauveli** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 63. Taschkent
- favosus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 199. Australien
- filiformis** Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806—07, p. 293. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 525; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 638. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 721. Europa,
Nordafrika
- Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 88. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 295. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 540 (*Astenognathus*).
- extensus* Mannh. Brach. 1830, p. 39.
- filum* Walzl, Isis 1838, II, p. 267.
- procerus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 141.
- sericatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 561. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 76.
- serpentinus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.

- var. *abbreviatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.
 ? var. *anguinus* Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 137; Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.
unicolor Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 276.
 ab. *humeralis* Gredl. Käf. Tirols 1863, p. 110.
 ? var. *subditus* Muls. et Rey, l. c. p. 278.
- filiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 597. Panama
- filum** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 317. Spanien,
asper Aubé, l. c. Sardinien,
rutilipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, Algier,
 1860, p. 410. Marokko
setulosus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 304.
- fimetarius** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25. Britisch-Ostafrika
- fusciceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240. Virginia
gracilentus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, Ostindien
 p. 83.
gracilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 147.
- gracilicornis** Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, Turkestan
 1906, p. 89.
- graecus** Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 150 nota (*Eury-sunius*). Griechenland
- gratellus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, Ceylon,
 p. 83 (*Neognathus*). Ostindien,
pulchellus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, Sunda-inseln
 I, p. 147. Britisch-Ostafrika
- guttipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25. N. S. Wales
- guttula** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 217; XIII, 1878, p. 514.
- Hackeri** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, Australien
 p. 200.
- histrio** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 71. Japan
immaculatus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 276. Europa,
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542. Mittelmeergebiet
dalmatinus Küst. Käf. Eur. XXVI, p. 73.
- intermedius* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 524; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 640. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 722. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 297. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 294.
- inconstans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 239. Texas
indicus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 148 Ostindien,
 (*Astenognathus*). Kan. Inseln,
oculatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 72. Sizilien,
pallidulus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 591. Sardinien,
parviceps Ragusa, Nat. Sic. X, 1891, p. 239. Sundainseln,
 Philippinen,
 Japan,
 China,
 Madagaskar,
 Abessinien,
 Kongo

- Kraatzi** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 36.
lateralis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 642.
- latifrons** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 70.
latus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 72 (*Eurysunius*).
- leptocerus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 64.
limbatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 641.
linearis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 639. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.
lithocharoides Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 189. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 17 nota.
 var. *quadrimaculatus* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 90.
- longiceps** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 794.
longicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 124.
longinasus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596, t. 15, f. 17.
longiusculus Mannh. Brachél. 1830, p. 39. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 243.
 (?) *trisignatus* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32.
maculipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 148.
marginatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 294.
megacephalus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 590.
 var. *gomerensis* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 510 nota.
- melanopygus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 42.
melanurus Küst. Käf. Eur. XXVI, 1853, p. 76. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 67. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 296 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 (*Astenognathus*).
aemulus Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 33.
apicalis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 560. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 78.
 var. *subnotatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 51.
- microthorax** Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 18 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 107.
- myrmecophilus** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 590 (*Eurysunius*).
- neglectus** Märkel in Germ. Zeitschr. V, 1845, p. 239. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 722. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 415. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542.
gracilis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 (ex parte).
misellus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 416.
- nigromaculatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637. — Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 246 (*Astenognathus*).

Ceylon
 Kolumbien,
 Venezuela
 Japan
 Spanien,
 Korsika
 Ostindien
 Kolumbien
 New York

Samarkand

Brasilien
 Westafrika

Panama,
 Venezuela
 Nevada,
 Kalifornien

Ceylon
 Amazon.
 Kanar. Inseln

Amur

Mittel-
 meergebiet,
 Kanar.
 Inseln

Ostindien,
 Java,
 Südafrika
 Algier,
 Marokko,
 Tunis
 Kanar. Inseln

Mitteleuropa

Ägypten,
 Syrien,
 Abessinien,

- simillimus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 123 — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1887, p. 27. Westafrika, Kanar. Inseln
- notatellus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 26. Britisch-Ostafrika
- notatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 225. Persien
- notula* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 181. Madagaskar
- opaculus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600. Guatemala
- ophis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222. Birma
- ornatellus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240. Mississippi
- paradoxus* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 114 (*Eurysunius*). Kaukasus
- paranensis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 299. Argentinien
- pectinatus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 513. N. S. Wales
- perangustus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 153. Madagaskar
- Perrieri* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 154. „
- pictipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 225. Persien
- Pilatei* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 599. Mexiko
- porosus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 322. Japan
- productor* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25. Britisch-Ostafrika
- prolixus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 639. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237. Virginia, Pennsylvanien
- psilographus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 155. Madagaskar
- pulchellus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 230. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 295. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 (*Astenognathus*). Mittel-europa, England, Frankreich, Schweiz, Ostindien, Kaukasus
- diversus* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 285.
- fasciatus* Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 560; l. c. XXXV, 1862, III, p. 77.
- flavus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 149.
- punctipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 154. Madagaskar
- reticollis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 255. Neu-kaledonien
- robustus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 243. Nevada, Kalifornien
- rufopacus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150 (*Astenognathus*). Kaukasus
- rufus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 85. Neuguinea
- rutilipennis* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 151 nota. Ungarn, Kaukasus
- sanctus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600. Guatemala
- sectator* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242. Montana
- serpens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 292. Amazonas, Caracas
- setiger* Vauloger, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 368 (*Eurysunius*). Spanien
- siculus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 224 (*Eurysunius*). Sizilien
- signatellus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 598. Mexiko

- signatus* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 793.
similis Aust. Proc. Boston Nat. Hist. 1876, p. 7. —
 Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.
Simsoni Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906,
 p. 198.
simulans Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 239.
spectrum Casey, l. c. p. 238.
strictus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 293.
strigiceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,
 p. 84.
strigilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.
substrictus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 598.
subtilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 598.
suffusus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 73.
tenuis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 600.
tenuiventris Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.
testaceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 643.

Thaboris Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 653.
thoracicus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 105.
 subnitidus Kraatz, l. c. II, 1858, p. 66.
trilineatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1904, p. 69.
tristis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 644 (*Eury-*
 sunius).
 diversicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2)
 V, 1869, p. 21.
 Martinezi Uhagon, An. Soc. Esp. Hist. Nat. V,
 p. 73, t. 1, f. 1.
 platynotus Sauley, Ann. Soc. Ent. France (4) IV,
 1864, p. 653.
uniformis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852,
 p. 700. — Fauv. Fn. gallo-rhén. Suppl. 1874,
 p. 40. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XXIV, 1877, p. 275. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.
 II, 1895, p. 540 (*Astenognathus*).
 anguinus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 293.
 vestitus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
 1877, p. 273.
 ab. *diversicollis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr.
 XIII, 1869, p. 393.
 ab. *humeralis* Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV,
 1870, p. 34.
variegatus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68,
 p. 114.
velebiticus Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 150 nota
 (*Eurysunius*).
ventralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 293.
vilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 597.
vittatus Sharp, Trans. Ent. Soc. 1876, p. 291.
Walkeri Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 224.
zuni Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241.

Brasilien
 Texas,
 Arizona
 Tasmanien

 Iowa
 Rhode Island
 Amazon.
 Neuguinea

 Texas
 Panama

 Mexiko

 Japan
 Guatemala

 Kalifornien,
 Arizona
 Kolumbien,
 Neu-
 granada,
 Brasilien
 Syrien
 Griechenland,
 Cypern
 Australien
 Sardinien,
 Korsika,
 Spanien,
 Sizilien,
 Syrien

 Mittel-
 meergebiet

 Nordamerika

 Kroatien,
 Dalmatien
 Amazon.
 Guatemala

 Amazon.
 Malta
 Neumexiko

Stilicopsis Sachse.

Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 144. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 665. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—87 (1886), p. 606. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 231.

breviceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 138.	Java, Borneo
brevis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 295, fig.; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), t. 15, f. 23.	Amazonas
crassa Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.	"
exigua Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 647.	Portoriko
modesta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.	Amazonas
paradoxa Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 145. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 232.	Nordcarolina, Florida
picta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.	Amazonas
plagiata Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Birma
punctiventris Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 182.	Madagaskar
setigera Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 323.	Japan
strigella Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Birma
subtropica Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 191.	Florida
trinotata Kraatz, Arch. Naturg. 1859, I, p. 149.	Ceylon
umbilicata Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.	Birma

14

Stamnoderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 231, 232.	
carolinae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233.	Nordcarolina
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607, t. 15, f. 24.	Guatemala
Delauneyi Fleutiaux et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 380.	Guadeloupe
Godmani Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 608.	Panama
gracilis Sharp, l. c. p. 608.	Guatemala
insignis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 303.	Amazonas
labeo Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 648.	Amerika
monstrosus J. Lec. New spec. North Amer. Col. I, 1863, p. 48. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233.	Louisiana, Virginia
optatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 608.	Guatemala
pallidus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233.	Florida
Sallaei Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607.	Guatemala

11

Myrmecosaurus Wasm.

Wasm. Zool. Anz. XXXIV, 1909, p. 766.

myrmecophilus Holmgr. Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344. — Wasm. l. c. XXXIV, 1909, p. 767.	Bolivien
solenopsidis Wasm. l. c. p. 767.	Brasilien

2

Echiaster Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 636. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 98. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 274. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 277. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 246.

Subgen. *Leptogenius* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 6, 1886, p. 214; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 247.

Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 280.	Amazonas
boops Sharp, l. c. p. 275.	"
brevicornis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 6, 1886, p. 214, 248.	Texas, Nord- carolina
earinatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 276.	Amazonas, Venezuela
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala
curtus Sharp, l. c. p. 594.	
depressus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1836, p. 310. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 4.	Chile"
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Guatemala, Nicaragua
fumatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 275.	Amazonas
funebis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala
latifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 277.	Amazonas
lativentris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 594.	Guatemala, Brasilien
longicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637, t. 2, f. 2.	Kolumbien, Venezuela
ludovicianus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 247.	Mississippi, Louisiana
mamillatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 278.	Amazonas
melanurus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637.	Kolumbien
minus Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 370.	Mexiko
minutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala, Nicaragua
muticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 279.	Amazonas
myrmecophilus Holmgren, Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344.	Bolivien
orbifer Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Panama
pictus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637.	Kolumbien
rugosulus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 281.	Argentinien
scissus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 281.	Amazonas
signatus Sharp, l. c. p. 276.	"
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Panama, Venezuela
tibialis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 279.	Amazonas
virginicus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 304 (<i>Leptogenius</i>).	Nordamerika

28

Zonaster Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 595.

optatus Sharp, l. c. p. 595, t. 15, f. 16.

Panama

1

Sclerochiton Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 133.

Saurellus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 71.*indicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637; Ostindien
Etud. Ent. VIII, 1859, p. 71.*ochraceus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I,
p. 134, t. 2, f. 8a—c.

1

Stiliderus Motsch.Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 639. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba
VII, 1884, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.*Styliderus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 623.*eicatricosus* Motsch. l. c. t. 1, f. d. Ostindien

1

Monista Sharp.Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 271. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba
VII, 1884, p. 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 589.*eerta* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 272 nota. Amazonas
eonecolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala,
p. 589. Panama*diffinis* Sharp, l. c. p. 591. Panama*divisa* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 273. Amazonas*Fenyesi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
p. 370.*ferruginea* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 804. Brasilien*typica* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 272
nota. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,
p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.*longula* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 273. Amazonas*mexicana* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
p. 369.*picturata* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
p. 591.*plagiata* Sharp, l. c. p. 590.*pusio* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 649. — Fauv. Kolumbien,
Rev. d'Ent. X, 1891, p. 102. Venezuela*similis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 590.*strigicollis* Sharp, l. c. p. 590. Panama*troglodytes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 648. Kolumbien,
Venezuela,
Brasilien,
Bolivien,
Mexiko

14

Suniotrichus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587.

capillaris Sharp, l. c. p. 588. Guatemala*puncticollis* Sharp, l. c. p. 588. Panama*sordidus* Sharp, l. c. p. 588. Guatemala

3

Suniocharis Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586.

- dilutipes* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 156. Madagaskar
fragilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587. Mexiko
guttula Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 155. Madagaskar
modesta Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586. Mexiko,
 Panama
nigrescens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587. Guatemala
orbicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 242. Argentinien

6

Stilicus Latr.

Latr. Encycl. méth. X, 1825, p. 495; Règne anim. IV, 1829, p. 436. —
 Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 519; Gen. Spec. Staph. 1839—
 1840, p. 629. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 96. — Kraatz, Naturg. Ins.
 Deutschl. II, 1856—58, p. 696. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—
 1859, p. 47. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-
 rhén. III, 1872, p. 298. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
 1877, p. 215. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 272. — Sharp,
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 581. — Ganglb. Käf. Mitt.-
 Eur. II, 1895, p. 530. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 220.

Rugilus Curtis, Brit. Ent. IV, 1827, p. 168. — Steph. Ill. Brit.
 Ent. Mand. V, 1832, p. 277. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris
 1835, p. 433.

Biologie: Riley, Ins. Life III, nr. 7, 8, p. 330—332. — Ruperts-
 berger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126.
 Subgen. *Stilicosoma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 219.

- abbreviellus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224. New York
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 270. Amazonas
angularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 634. — Carolina
 Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 223.
angustatus Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 172. — Ganglb. Mitteleuropa,
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 532. Sardinien
fragilis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 140. —
 Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 520; Gen.
 Spec. Staph. 1839—1840, p. 630. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 697. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 304. — Muls.
 et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 221.
scutellatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II,
 p. 640.
anommatophilus Wasm. Zool. Jahrb. VII, 1904, p. 658. Kongo
apicalis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222. Rhode-Island
arabs Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 651. Syrien
arduus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 30. Kilima-
 ndscharo
biarmatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224. Massachusetts
bidens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 585. Guatemala

- bimaculatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 287. Südafrika,
Deutsch-
Ostafrika,
Gabun
- bonariensis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 408. Argentinien
- capicola** Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 145. Kapland
- capitalis** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 617. Kirgisen-
steppe
- bimaculatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,
II, p. 562. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 74.
- carinatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 635. Kolumbien
- ceylanensis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126. Ceylon
- chilensis** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1836, p. 309, t. 5, f. 11. Chile
- anthracinus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr.
1911, p. 9.
- apicipennis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr.
(4) 1, 1861, p. 436.
- chiriquensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. Panama
- cribratus** Sharp, l. c. p. 582. Mexiko,
Panama
- cribripennis** Sharp, l. c. p. 583. Mexiko,
Guatemala
- dentatus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. Nordamerika
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.
- dilutipes** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, Griechenland
p. 46.
- dissimilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 586.
- elegans** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 275. Buenos Aires
- Erichsoni** Fauv. Not. ent. V, 1867, p. 114; Fn. gallo- Nord- und
rhén. III, 1872, p. 302. — Ganglb. Käf. Mitt.- Mittel-
Eur. II, 1895, p. 534. europa,
Italien
- orbiculatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39
(1839), p. 523; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 634. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 700. — Thoms. Skand. Col. II, 1860,
p. 204. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXIV, 1877, p. 238.
- femoratus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 583.
- festivus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 68; Südfrank-
Opusc. Entom. II, p. 81. — Jacq. du Val, Gen. reich,
Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 87. — Fauv. Korsika,
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 305. — Muls. et Rey, Algier
Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 219. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 532.
- formicarius** Cast. Hist. Nat. I, 1850, p. 184. Kolumbien
- geniculatus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), Mitteleuropa,
p. 522; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 632. — Tunis
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
p. 699. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 303.
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
1877, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 534.
- punctipennis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V,
1832, p. 278.
- gracilis** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 63. Ostindien
- guatemalensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 582. Guatemala

- hieroglyphicus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—1880, p. 86.
- jugalıs* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 635.
- Korbi* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 226.
- lacustrinus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224.
- latiusculus* Casey, Contr. descr. syst. Col. Amer. II, 1884, p. 139; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222.
- longicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 226.
- longipennis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 321.
- luculentus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.
- luteipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126.
- melancholicus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 10.
- mexicanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 371.
- minusculus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 226.
- muticus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 1882—87 (1886), p. 585.
- nigripes* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 371.
- nigrolucens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.
- nimborum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 583.
- oblitus* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 221.
- occiduus* Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 223.
- ocularis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226.
- opacicollis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 168.
- opaculus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 221.
- orbiculatus* Payk. Monogr. Staph. 1789, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. VI, 1895, p. 534.
- affinis* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 522; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 633. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 700. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 203. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 232.
- fuscipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 633.
- ruficornis* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 119, t. 13, f. 2.
- var. *flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 75.
- var. *pictipennis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149.
- oregonus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 221.
- prolongatus* Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 187. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 18 nota.
- punctatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 271.
- pygmaeus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126.
- quadrinaculatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 289.
- Neuguinea
- Kolumbien,
Venezuela,
Mexiko
- Lenkoran
- Oberer See,
Iowa
- Long-Island
- Persien
- Japan
- Rhode Island
- Ceylon
- Ostindien
- Mexiko
- Rhode Island
- Panama
- Mexiko
- Mississippi
- Guatemala
- Neumexiko
- Süd-
kalifornien
- Birma
- Madagaskar
- Brit.
Kolumbien
- Europa,
Mittel-
meergebiet,
Kanar.
Inseln
- Daghestan
- Griechenland
- Oregon
- Turkestan
- Amazonas
- Ceylon
- Deutsch-
Ostafrika

- rudis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222. Pennsylvanien, New York
- rufescens** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 61. Japan, Westafrika
rubellus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 121.
- rufipes** Germ. Fn. Ins. Eur. 1836, 18, 4. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 521; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 631. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 698. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 301. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus, Italien
orbiculatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538 (nec Payk.).
immunis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 278.
- rugicollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. Panama
- Schimperi** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 31. Brit. Ostafrika
- sericeus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 640. Ostindien
- similis** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 521; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 632. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 699. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 302. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. Nord- und Mitteleuropa
orbiculatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 63.
- simplex** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. Guatemala
- subtilis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 631. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 698. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 301. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. Mitteleuropa, Italien
- velutinus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226. Birma

68

Pachystilicus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 226.

- Hanhami** Wickham, Psyche VIII, 1898, p. 220. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227. Winnipeg
- quadriceps** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227. Kalifornien

2

Megastilicus Casey.

Casey, Ent. Amer. V, 1889, p. 183; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227.

- formicarius** Casey, Ent. Amer. V, 1889, p. 183; Trans. St. Louis Ac. XV, 1905, p. 227. Massachusetts

1

Stilicoderus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 320. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226.

- discalis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 225. Ostindien
subseriatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 403.
Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 224. Birma
fenestratus Fauv. l. c. p. 225. ”
signatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 321. Japan
umbratus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 52. Ostindien

5

Psilotrachelus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 124.

- crassus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 124. Ceylon
sculptipennis Kraatz, l. c. p. 125. Ostindien

2

Stilicolina Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 228.

- tristis** Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 40. — Casey, Pennsylvanien
 l. c. p. 129.

1

Omostilicus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 229.

- sonorinus** Casey, l. c. p. 230. Arizona

1

Trochoderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 580.

- dubius** Sharp, l. c. p. 581. Guatemala
Godmani Sharp, l. c. p. 581. ”
ovaticeps Sharp, l. c. p. 796. Mexiko

3

Eustilicus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 579. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 219.

- crassidens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
 p. 579.
gracilis Sharp, l. c. p. 580.
mexicanus Sharp, l. c. p. 580. Mexiko
orbifer Sharp, l. c. p. 579. Panama

4

Deroderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 577.

difficilis Sharp, l. c. p. 578.

Mexiko

latipes Sharp, l. c.

Guatemala

punctipennis Sharp, l. c.

„

vestitus Sharp, l. c. p. 577.

Panama

4

Stilocharis Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 576.

longula Sharp, l. c. p. 577.

Guatemala

1

Euselerus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.

rugifrons Sharp, l. c. p. 576.

Guatemala

sordidus Sharp, l. c. p. 576.

„

2

Thinocharis Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 142.

Subgen. *Sciiocharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 260. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 157.

Subgen. *Medonella* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 154, 180.

Subgen. *Sciiocharella* Casey, l. c. p. 151, 158.

acuta Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 182.

Madagaskar

Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 166.

„

aptera Fauv. l. c. p. 166.

„

arduus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 265.

Amazonas

Arribalzagae Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 570.

Guatemala

Bakeri Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188.

Kuba

basicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 63;

Japan

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 263.

boops Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 574.

Panama

brevicornis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 228.

Neuguinea

brevigenis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 166.

Madagaskar

brunnea Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 12.

Deutsch-

Neuguinea

capitata Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 571.

Panama

carinicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 143.

Ceylon

carolinensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 157.

Nordcarolina

castanoptera Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 263.

Buenos Aires

Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 573.

Guatemala

cognata Sharp, l. c. p. 570.

„

congruens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 158.

Mississippi

<i>curticollis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 165.	Madagaskar
<i>delicatula</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 158, 159 (<i>Sciocharella</i>).	Alabama
<i>densicollis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 573.	Guatemala
<i>diegana</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 167.	Madagaskar
<i>exilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 627.	Kolumbien,
<i>atrátula</i> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 265. — Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 25.	Argentinien
<i>flavipennis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.	Panama
<i>fragilis</i> Sharp, l. c. p. 574.	Guatemala
<i>gregaria</i> Sharp, l. c. p. 573.	"
<i>humilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 626.	Kolumbien
<i>japonica</i> Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 199.	Japan
<i>brevicornis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 381.	
<i>impressa</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 165.	Madagaskar
<i>inermis</i> Fauv. l. c. p. 164.	"
<i>Juno</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 574.	Panama
<i>minuta</i> Sharp, l. c. p. 574.	"
<i>minuta</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 180 (<i>Medonella</i>).	Florida
<i>nigrella</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 227.	Neuguinea
<i>nigriceps</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 570.	Guatemala,
<i>nitidicollis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 572.	Panama
<i>nubipennis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 157.	Panama
<i>oculata</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 263.	Texas
<i>perdita</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.	Amazonas
<i>pertenuis</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188 (<i>Sciocharella</i>).	Panama
<i>pygmaea</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 143, t. 2, f. 9a—c.	Kuba
<i>quadrata</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 263. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78.	Ceylon
<i>Raffrayi</i> Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 183.	Amazonas,
<i>Sharpi</i> Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78.	Venezuela
<i>humilis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 264.	Madagaskar
<i>signata</i> Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 102.	Amazonas
<i>similaris</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 571.	Venezuela
<i>sordida</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 626.	Panama
<i>subnitens</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 572.	Kolumbien
<i>testacea</i> Sharp, l. c. p. 572.	Panama
	Guatemala,
	Nicaragua

Monocharis Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569.

<i>vestita</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 259; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569.	Amazonas,
	Caracas,
	Panama

Ophiomedon Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 567; Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.

- compressus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 261. Amazonas
incomptus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 124; Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545. Hawaii
integer Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 260. Amazonas
longiceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 568. Panama
longulus Sharp, l. c. p. 568.
Sharpi nom. nov. „
subtilis Sharp, Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545. Hawaii
stipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 567. Guatemala,
Nicaragua
subtilis Sharp, l. c. p. 568. Panama
8

Stilomedon Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 565.

- biseriatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 617. - Kolumbien,
Venezuela,
Brasilien,
Mexiko
connexus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 254; Amazonas,
Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 566. Mexiko,
convexus Sharp, l. c. p. 262 (err. typ.). Panama,
Kuba,
Guade-
loupe,
Venezuela
discedens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 261. Amazonas
strigicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 566. Mexiko,
Panama
triseriatus Sharp, l. c. p. 565. Panama
verticalis Sharp, l. c. p. 567. „
6

Acanthoglossa Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 144. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 250; l. c. XXI, 1902, p. 87. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 606.

Cephisus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 299 nota. nec 5622. 186
Eomedon Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 319.

- Abeillei** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 245. Syrien
brachycera Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 145, t. 2, f. 10a—c. Ceylon
Eppelsheimi Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 305. Westafrika
Simoni Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 133 (nec Quedf.).
hirta Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 144. Ceylon
hirtella Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 320. Japan
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 158. Madagaskar

<i>intermixtus</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 134.	Westafrika
<i>longiceps</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 158.	Madagaskar
<i>longipennis</i> J. Sahlb. Öfvers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 32.	Ägypten
<i>orientis</i> Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 300, t. 4, f. 1.	Syrien
<i>pennata</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 27.	Brit.- Ostafrika
<i>punica</i> Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 250.	Tunis
<i>rufa</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 146.	Ceylon
<i>testaceipennis</i> Kraatz, l. c. p. 145.	Ostindien
<i>uniformis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28.	Brit.- Ostafrika

15

Medon Steph. *)

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 273. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 205. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 119. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 153, 161.

Lithocharis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 511; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 610. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 710. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 46. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 315 (ex parte). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549.

Sunius Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 274.

Achenomorphus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647.

Subgen. *Aderocharis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 148.

Subgen. *Caloderma* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 5; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Charichirus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 262. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Chloëcharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 259.

Subgen. *Cryptoporus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 654. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Isocheilus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 263.

Isochilus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Hypomedon* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1877, p. 122. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152.

Subgen. *Hemimedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152, 160.

Subgen. *Lena* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 189.

Subgen. *Lithocharis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 431. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 11. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 254. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 172. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 149.

Metaxyodonta Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 29; l. c. p. 232.

Subgen. *Medon* s. str. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 122.

*) Da eine genaue Übersicht der hierher gehörigen Arten bei dem derzeitigen Stande der Wissenschaft nicht möglich ist, wurden die meisten Casey'schen und eine Anzahl Sharp'scher Genera mit *Medon* als Subgenera vereinigt und bezüglich der Subgenera *Medon* und *Lithocharis* bei zweifelhaften Arten die Namen der Originalbeschreibungen der Einreihung in diese Untergattungen zu Grunde gelegt.

- Subgen. *Medonodonta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 176.
 Subgen. *Mespalerus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 560.
 Subgen. *Micromedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 153, 155.
 Subgen. *Neomedon* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 557.
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 155.
 Subgen. *Oligopterus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 12; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 154, 181. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.
 Subgen. *Oxymedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.
 Subgen. *Panscopaeus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 262.
 — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.
 Subgen. *Paramedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 166.
 Subgen. *Platymedon* Casey, Entom. Amer. V, 1889, p. 184; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.
 Subgen. *Polymedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 156.
 Subgen. *Pseudomedon* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 122. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 155, 187.
Ramona Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 213.
 Subgen. *Scioporus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 561.
 — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 79.
 Subgen. *Tetramedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.
 Subgen. *Trachysectus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 32, 38; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152, 159.
 Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 123, 124.

Subgen. *Scioporus* Sharp.

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>apicipennis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 563. | Panama |
| <i>breviceps</i> Sharp, l. c. p. 564. | Rio de Janeiro |
| <i>brunneus</i> Sharp, l. c. p. 561. | Guatemala,
Nicaragua |
| <i>chontalenus</i> Sharp, l. c. p. 563. | Nicaragua |
| <i>crassulus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 259. | Amazonas |
| <i>fulvescens</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 562. | Panama |
| <i>latifrons</i> Sharp, l. c. p. 563, t. 14, f. 19. | " |
| <i>nitellus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 79. | Kolumbien,
Venezuela |
| <i>obsoletus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 563. | Panama |
| <i>parvidens</i> Sharp, l. c. p. 564. | Guatemala |
| <i>sellatus</i> Sharp, l. c. p. 562. | " |
| <i>signatus</i> Sharp, l. c. p. 562. | " |

Subgen. *Mespalerus* Sharp.

- | | |
|--|-----------|
| <i>debilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 560. | Guatemala |
| <i>flavipennis</i> Sharp, l. c. | " |
| <i>piesticulus</i> Sharp, l. c. p. 561. | " |
| <i>praeustus</i> Sharp, l. c. p. 560. | " |

Subgen. *Neomedon* Sharp.

- | | |
|---|---------|
| <i>arizonensis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 156. | Arizona |
| <i>densus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 559. | Mexiko |

Flohri Sharp, l. c. p. 559.	Mexico
mexicanus Sharp, l. c. p. 558.	„
mollis Sharp, l. c. p. 558.	„
nigricans Sharp, l. c. p. 559.	Guatemala
nitens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 373.	Mexiko
piciventris Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 220.	Neumexiko
princeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 557.	Guatemala
puncticeps Sharp, l. c. p. 559.	Mexiko, Guatemala
rufipennis Sharp, l. c. p. 557.	Mexiko
Sallaei Sharp, l. c. p. 558.	„

Subgen. **Polymedon** Casey.

tabacinus Casey, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1884, p. 65; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 156.	Arizona
---	---------

Subgen. **Trachysectus** Casey.

confluens Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 615. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 159.	Östl. Nord- amerika
confluentus Say, Trans. Amer. Phil. IV, 1834, p. 456.	

Subgen. **Hemimedon** Casey.

angustus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 161.	Virginia
---	----------

Subgen. **Medon** s. str.

americanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164.	Pennsylvanien
angulipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 132.	Westafrika
apicalis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 715. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 320. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 146. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.	Mittel-europa, Mittelmeergebiet, Madeira, Azoren
fuscus Woll. Ins. Mad. 1854, p. 589.	
maronita Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 650.	
sericellus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 159.	
aspericollis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 229.	Birma
aterrimus nom. nov.	Brasilien
nigerrimus Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 311.	
augur Deville, Cat. Col. Corse in Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 89.	Korsika
auripilis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 228.	Birma
basalis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 282.	Ordubad
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 228.	Birma
brunneus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 513; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 713. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867,	Nord- und Mittel-europa, Kaukasus

- p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 322. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 129. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.
- megacephalus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 238.
- monticola* Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 372.
- bucharicus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 244.
- castaneus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 60. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 512; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 610. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 711. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 205. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1877, p. 317. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 123. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 519.
- ? *brevicornis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 342.
- procerus* Perez, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 114.
- quadratus* Beck, Beitr. 1817, p. 25, t. 7, f. 39.
- Ruddii* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 273, t. 27, f. 2.
- celebensis* Sharp, Fn. Hawaiens. V, III, 1908, p. 545.
- confertus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 265.
- convergens* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 15; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 163.
- delphinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 163.
- despectus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 160.
- dieganus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 160.
- dilutus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 514; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 712. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 319. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.
- oppidanus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 711.
- quadriceps* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 586.
- spelaeus* Scriba, Heyd. Reise Spanien 1870, p. 82.
- discedens* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 266.
- discipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230.
- explicans* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188.
- Fauveli* nom. nov.
- luctuosus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 229.
- ferrugineus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 714. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.
- Brancsiki* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1880, p. 287.
- nitidus* Petri, Verh. Mitthlg. Siebenb. Ver. Hermannst. XLI, 1891, p. 14.
- flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 655, t. 1, f. j (*Cryptoporus*).

Buchara
Nord- und
Mittel-
europa

Hawaii,
Celebes
Japan
Kalifornien

Madagaskar
Algier,
Marokko,
Tunis
Madagaskar
Mittel-
europa,
Mittel-
meergebiet,
Kanar.
Inseln

Japan
Birma
Colorado
Birma

Österreich,
Ungarn,
Sieben-
bürgen

Ostindien

- fortepunctatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 34.
fuscus Mannh. Brach. 1830, p. 40. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 513; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 611. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 713. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.
auraniticus Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 649.
fuscus var. *infuscatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1869, p. 392.
rufus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 66; Opusc. Entom. II, p. 79.
testaceus Boisd. et Lacord. Fn. Entom. Paris I, 1835, p. 432.
graecus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 717 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 324 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523.
granulicollis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 32.
Helenae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.
heterogenus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 162.
hova Fauv. l. c. p. 163.
indigena Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 193. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 88.
inquilinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164.
insularis Casey, l. c. p. 163.
kanak Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 256.
lacustris Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 163.
lepidus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 16; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.
Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 65.
Lindi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 48.
lutrellus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.
maculipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 162.
madecassa Fauv. l. c. p. 161.
mandibularis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114.
Meuseli Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1905, p. 584.
microthorax Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 116.
Kraatzi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 168.
nigritulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 625. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 324. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 149. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.
castanopterus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 716.
minutus Luc. Expl. Alg. Entom. 1849, p. 119, t. 13, f. 1.
var. *cephalicus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 177.
var. *macropeplus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 220.
var. *siculus* Kraatz, l. c.

Ceylon
Mittel-
europa,
Mittel-
meergebiet

Östl. Süd-
europa,
Italien,
Kleinasien,
Persien

Sumatra
Idaho
Madagaskar

„
Madeira

Colorado
Vancouver-
insel

Neu-
kaledonien

Kalifornien

„

Japan
Australien
Syrien
Madagaskar

„
Neuseeland
Transkaspien

Seychellen,
Mada-
gaskar
Mitteleuropa,
Mittel-
meergebiet

Südrussland

Sizilien

Südeuropa

- nitidulus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.
opacellus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 231.
opaculus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.
piceus Kraatz, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 191.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 318. —
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,
 p. 126. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.
musculicola Muls. et Rey, l. c. p. 128.
picipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230.
pocoferus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 718.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 323. —
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,
 p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.
maritimus Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 36.
praeustus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 138.
prolixus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 65.
puberulus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 17; Trans. Ac.
 St. Louis XV, 1905, p. 164.
pythonissa Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 649.
ripicola Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 127;
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 715. —
 Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 206. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 319. — Muls. et
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 141.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.
fuscus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
 1853, p. 68; Opusc. Entom. II, p. 81.
Kellneri Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,
 1875, p. 123. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
 p. 19 nota.
rossicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 322.
rubeculus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 264.
ruber J. Sahlb. Öfvers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 33.
rufipes Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 160.
rufiventris Nordm. Symbol. 1836, p. 147. — Er. Käf.
 Mk. Brandenb. 1837—39, p. 514; Gen. Spec.
 Staph. 1839—40, p. 613. — Kraatz, Naturg. Ins.
 Deutschl. II, 1856—58, p. 714. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 323. — Muls. et Rey,
 Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 135. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.
africanus Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. XV,
 1869, p. 38; Fn. gallo-rhén. Cat. 1875, p. 20 nota.
incertus Muls. et Rey, l. c. p. 137.
scolytinus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 219;
 Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 83.
semiobscurus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph.
 1875, p. 20 nota.
sinuatocollis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 14; Trans.
 Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.
spadiceus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 265.
sparsiventris Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889,
 p. 176.
subcoriaceus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 586.
submaculatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889,
 p. 266.

Neumexiko
 Birma
 Kalifornien
 Mitteleuropa,
 Mittel-
 meergebiet

Birma
 Frankreich,
 Italien,
 Algier,
 Tunis,
 England
 Java,
 Ostindien
 Japan
 Kalifornien

Syrien
 Europa,
 Madeira,
 Azoren,
 Marokko,
 Algier,
 Tunis,
 Oran

Kaukasus
 Japan
 Syrien
 Nordcarolina,
 Virginia
 Mitteleuropa,
 Algier,
 Tunis

Fidjiinseln

Syrien

Kalifornien

Japan
 Lenkoran

Kanar.
 Inseln

Japan

<i>sulcifrons</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 383.	Japan
<i>texanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.	Texas
<i>ventralis</i> Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 115.	Neuseeland
<i>zeelandicus</i> Redtenb. Reise Novara II, 1867, p. 29. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114.	„

Subgen. *Paramedon* Casey.

<i>apacheanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 171.	Kalifornien
<i>arizonicus</i> Casey, l. c. p. 175.	Arizona
<i>borealis</i> Casey, l. c. p. 175.	Idaho
<i>conformis</i> Casey, l. c. p. 173.	Kalifornien
<i>consanguineus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 21; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	„
<i>contiguus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 22; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	„
<i>debilis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 174.	„
<i>difformis</i> Casey, l. c. p. 170.	„
<i>gregalis</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 26; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 173.	„
<i>mimulus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 27; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 173; Mem. Col. I, 1910, p. 184.	„
<i>gularis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172. var. <i>distans</i> Casey, l. c. p. 172.	„
<i>Humboldti</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	„
<i>kernianus</i> Casey, l. c. p. 169.	„
<i>languidus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 28; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 171.	„
<i>latiusculus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 19; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	„
<i>luctuosus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 24; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	„
<i>malacus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 18; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	„
<i>montanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 175.	„
<i>oriens</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 189.	Neumexiko
<i>pallescent</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	Kalifornien
<i>pallidipennis</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 189.	„
<i>pinalicus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 176.	Arizona
<i>retrusus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 25; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 170.	Kalifornien
<i>shastanicus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 167.	„
<i>sublestus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 21; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 170.	„
<i>subsimilis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	„
<i>tahoensis</i> Casey, l. c. p. 174.	„
<i>vancouveri</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 167.	Vancouver

Subgen. *Medonodonta* Casey.

<i>alutaceus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.	Neumexiko
--	-----------

Subgen. *Oxymedon* Casey.

<i>ruber</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.	Kalifornien
--	-------------

Subgen. **Tetramedon** Casey.**rufipenne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.

New York

Subgen. **Hypomedon** Casey.**aveyronensis** Mathan, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 244. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 161.Frankreich,
Pyrenäen,
Syrien**brachypterus** Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 620.**brevipennis** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1868, p. 156.**gracilis** Muls. et Rey, Opusc. Entom. XIV, 1870, p. 107; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1871, p. 83.**Plasoni** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 366. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68.**bicolor** Ol. Entom. III, 1794, p. 44, t. 1, f. 4. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 155. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523.Europa,
Kaukasus**melanocephalus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), I, p. 515; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 614. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207.**? rubricollis** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 275.**ruficollis** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 717. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 325.var. **nigrinus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 337.**brevipennis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 589. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 90.Kanar.
Inseln**melanocephalus** Woll. l. c. p. 588.**cinctus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 222; XII, 1878, p. 235.Australien,
Neuguinea
Turkestan**claviceps** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 17 (*Chloëcharis*).**debilicornis** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 523, t. 4, f. 8; Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 515. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1877, p. 164. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523. — Sharp, Fn. Haw. III, V, 1908, p. 545 (*Chloëcharis*).Frankreich,
Mittel-
meergebiet,
Madeira,
Argen-
tinien,
Peru,
Brasilien,
Afrika,
Persien,
Ostindien,
Japan,
Mexiko,
Antillen,
Süd-
carolina,
Texas,
Australien
u. Inseln,
Hawaii**aegyptiacus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.**brevicornis** Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 747, t. 14, f. 11.**occultus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 108; Trans. Phil.R. Soc. Lond. CLXVIII, p. 515.**rufulus** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 259. — Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 25.

- hypogaeus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.
ignitus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 221.
latecinctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139.
melanocephalus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538. —
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
 p. 718. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 326.
 — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
 1877, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
 1895, p. 523.
affinis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 142.
fuscipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858,
 II, p. 643.
tricolor Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 516.
minutissimus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 35
 (*Chloëcharis*).
ovaliceps Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78,
 p. 110.
nitens Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 170.
nitidus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881,
 p. 291.
politus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883,
 p. 151 nota (nec Sharp). — Fauv. Rev. d'Ent.
 V, 1886, p. 38.
Quedenfeldti Eppelsh. Cat. Eur. 1883, p. 210.
peregrinus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 39.
viator Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 99 nota.

picinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 245.
propinquus Ch. Bris. Col. Hefte II, 1867, p. 116. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 325. —
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,
 p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 523. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 89.
laetus Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 186.
melanocephalus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.
 II, 1857—59, t. 17, f. 85.
ruficollis Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871,
 p. 309.
vicinus Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859,
 p. 233.
seminiger Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860,
 p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 524 (*Micromedon*).

Simoni Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291.
- Syrien
 Australien
 Java
 Mitteleuropa,
 Mittel-
 meergebiet,
 England

 Ceylon

 Algier,
 Ins.
 Rodriguez,
 Marokko,
 Oran,
 Spanien

 Algier,
 Taschkent,
 Arabien,
 Ägypten
 Turkestan
 Europa,
 Algier,
 Azoren,
 Kanar.
 Inseln
 Madeira

 Süd-
 frankreich,
 Italien,
 Algier,
 Tunis
 Andalusien,
 Marokko

Subgen. *Platymedon* Casey.

- laticollis* Casey, Entom. Amer. V, 1889, p. 184; Trans.
 Ac. St. Louis XV, 1905, p. 179. Nebraska
nevadicus Casey, Trans. Ae. St. Louis XV, 1905, p. 179. Nevada

Subgen. *Oligopterus* Casey.

- ovineicollis* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 13; Trans.
 Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182. Kalifornien

filum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Kalifornien
flexilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Montana
remotus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 181.	Kalifornien

Subgen. **Caloderma** Casey.

angulatus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 7; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 183.	Kalifornien
brevipennis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	„
conjux Casey, l. c. p. 185.	Nevada
continens Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 6; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 184.	Kalifornien
contractus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 9; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	„
discolor Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	Washington
exilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	Kalifornien
luculentus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 10; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	„
mobilis Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 8; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 144.	„
mollis Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	„
peregrinus Casey, l. c. p. 185.	Nevada, Was- hington, Idaho
pollens Casey, l. c. p. 184.	Kalifornien
quadripennis Casey, l. c. p. 186.	Brit.- Kolumbien
reductus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 11; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 184.	Kalifornien
rugosus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 5; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 183.	„
var. <i>semibrunneus</i> Casey, l. c. p. 183.	
tantillus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 12; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	„

Subgen. **Pseudomedon** Muls. et Rey.

alabamae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 189.	Alabama
capitulus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 213; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 188.	Nevada, Kali- fornien, Oregon
fulvus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69.	Kongo
obsoletus Nordm. Symb. 1836, p. 416. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 516; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 623. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 719. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 321 (ex parte). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 166. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524.	Europa, Mittel- meergebiet, Syrien, Australien
aterrimus Sauley, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 36.	
brevipes Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 104.	
Dido Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 651.	

- marginalis* Steph. Man. Brit. Col. p. 407.
unicolor Curt. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 277.
 var. *obscorellus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 624. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 719. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524.
opacus Ferrari in Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987.
obsoletus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 321 (ex parte).
thoracicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 188.
 var. *clarescens* Casey, l. c.
 var. *ruficollis* Casey, l. c.
tristis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 221 nota.

Massa-
chusetts,
Rhode
Island
Oestl.
Nord-
amerika
Australien

Subgen. *Lena* Casey.

- testaceus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 190. Texas,
Florida

Subgen. *Lithocharis* Boisd. et Lacord.

- alticola* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. Guatemala
annulosus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 220; XII, 1878, p. 232. Tahiti,
Neuguinea
apicipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241. Brasilien
atricapillus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 255. Argentinien
brevicollis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 286. Port Natal
breviusculus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 137. Ceylon
californicus nom. nov. Süd-
kalifornien
simplex Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 149.
cinnamomeus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 620. Kolumbien
cinnamopterus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141. Ostindien
coecus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1889, p. 424. Neuseeland
comes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 257. Amazonas
conditus Sharp, l. c. p. 262.
curtus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136. Ceylon
curtulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 618. Kolumbien,
Venezuela,
Trinidad
curviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 796. Mexiko
debilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 625. Kolumbien
depressus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 616. „
diffinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 257. Amazonas
discoidalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 551. Panama

- dissimilis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 66.
dorsalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 616.
egenus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 264.
flavescens Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 643.
fumatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 622.
fuscipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 138.
giganteus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 230.
infuscatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 622. —
 Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 552.
hilaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 551.
hirtus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 231.
humeralis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.
immanis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,
 p. 87.
lanigerus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 231.
limbatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 621. —
 Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 550.
mendax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 550.
Mülleri Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887,
 p. 415.
mutatus nom. nov.
sulcifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28
 (nec Bernh.).
nanus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139.
nigerrimus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141.
nitidus Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 90.
oblitus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 618.
obscuriventer Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4)
 I, 1861, p. 437.
fusciventris Fairm. et Germ. l. c. p. 438.
ochraceus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 59. — Er.
 Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 516;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 623. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 716.
 — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 320. — Muls. et
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 174.
 — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878,
 p. 66. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 525.
alutacea Casey, Bull. Calif. II, 1880, p. 29.
brunniceps Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290.
fastidiosus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr.
 (4) I, 1861, p. 438.

Japan
 Portorico
 Amazonas
 Ostindien
 Brasilien
 Ceylon
 Aruinseln,
 Sundainseln
 Kolumbien,
 Mittel-
 amerika,
 Antillen,
 Brasilien,
 Peru,
 Bolivien
 Guatemala,
 Mexiko,
 Panama,
 Grenada,
 Kolumbien
 Neuguinea
 Ostindien
 Neuguinea
 „
 Kolumbien,
 Antillen,
 Mittel-
 amerika
 Nicaragua,
 Kolumbien,
 Venezuela,
 Peru
 Brasilien
 Brit.-
 Ostafrika,
 Natal
 Java,
 Borneo
 Ceylon
 Peru
 Kolumbien
 Chile
 Europa,
 Mittel-
 meergebiet,
 Ostindien,
 Sunda-
 inseln,
 China,
 Japan,
 Neuguinea,
 Nord-,
 Mittel- und
 Südamerika,
 Australien
 Tahiti

- nigriceps* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139.
quadricollis Casey, Bull. Calif. II, 1886, p. 30.
rubricollis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 138.
oculifer Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28.
- pallidus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.
parviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 66.
parvicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 232.
parvistria Fauv. l. c. p. 233.
planus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136.
posticatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 619.
rufulus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140.
sexualis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 161.
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 256.
sobrinus Sharp, l. c. p. 258.
sonoricus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 150.
subopacus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 382.
- sunioides* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 233.
uvidus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 138.
varicornis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 72.
- vicinus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 137.
vilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139. — Sharp, Fn. Hawaiens. 1908, III, 5, p. 544.
erythropterus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 621.
fuscipennis Sharp, Trans. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 223 (nec Kraatz).
sororculus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140.
- vittatipennis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 439.

Subgen. *Isocheilus* Sharp.

- duplicatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 160.
staphylinoides Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 134.

Subgen. *Charichirus* Sharp.

- chinensis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32.
dimidiatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 645.
obliquus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52.
spectabilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 135. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 227.
- megalops* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 159.
mimeticus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 224.
prognathus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 159.
robustus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 33.

Brit.-
 Ostafrika
 Ostindien
 Japan
 Neuguinea
 „
 Ostindien
 Portorico
 Ostindien
 Madagaskar
 Amazonas
 „
 Arizona
 Japan
 Neuguinea
 Ceylon
 Australien
 Ostindien
 Ostindien,
 Ceylon,
 Hawaii,
 Sunda-
 inseln,
 Mada-
 gaskar,
 Kanar.
 Inseln,
 Peru,
 Brasilien,
 Guadeloupe
 Chile

Madagaskar
 Ceylon,
 Ostindien,
 Japan

China,
 Ostindien,
 Ceylon,
 Sunda-
 inseln,
 Japan

Madagaskar
 „
 „
 Ceylon

Subgen. **Aderocharis** Sharp.

- corticinus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 184. — Pennsylvanien,
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 619. — Virginia,
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 148. Nordcarolina
millepunctatus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 456.
rufescens Nordm. Symbol. 1836, p. 148.
furtivus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 553. Mittelamerika
hepaticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 620. Kolumbien
columbicus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647, t. 1, f. g.
latro Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 255; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. Brasilien,
Kolumbien,
Panama,
Guatemala,
Mexiko,
Guyana,
Bolivien
princeps Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227. Birma
sagax Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 553. Guatemala

Subgen. **Panscopaeus** Sharp.

- lithocharoides** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 63. Japan
256

Nesomedon Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 546.

- brunnescens** Sharp, l. c. p. 546. Hawaii
oahuensis Sharp, l. c. p. 547. „
quadratus Sharp, l. c. p. 547. „
3

Lypeticus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 556.

- celatus** Sharp, l. c. p. 556. Guatemala
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 266. Amazonas
2

Lithocaon Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 555.

- Fenyési** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 374. Mexiko
sparsus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 555. Panama
2

Acalophaena Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 76, 145.
Calophaena Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 267 (nec Klug 1821).

angularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 614.

Kolumbien,
Mexiko,
Venezuela,
Guatemala,
Nicaragua

basalis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 270.

Buenos Aires

compacta Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 146.

Arizona

germana Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 268.

Amazonas

horridula Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 146.

Mexiko

laevipennis Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 311.

Argentinien

pagana Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 268.

Amazonas

picta Sharp, l. c. p. 269.

„

polita Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 267.

„

9

Dacnochilus J. Lec.

J. Leconte, New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 142, t. 4. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 76, 144.

laetus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554.

Louisiana,
Texas

— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 145.

macularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 615.

Venezuela

2

Scopaeus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 604. — Lacord. Gen. Col. VII, 1854, p. 5. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 701. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 46. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 307. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 179. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 248; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 540, 795. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 526. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 203.

Leptorus Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217, 220.

Polyodontus Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 310.

— Muls. et Rey, l. c. p. 194.

Scoponaeus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 641.

Subgen. *Leucorus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 192.

Subgen. *Orus* Casey, Contr. Col. North Amer. 1884, p. 604; Bull. Calif. Ac. I, 1884—86, p. 315; l. c. II, 1886, p. 36, 226; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 196. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549.

Subgen. *Pycnorus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 194.

Subgen. *Scopaeodera* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217, 220; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 192, 217.

Subgen. *Scopaeopsis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 214.

Subgen. *Scopaeoma* Casey, l. c. p. 191, 211.

aliiceps Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 89.

Obock

angustatus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 312, t. 6, f. 1. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 4.

Chile

angusticeps Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 213
(*Scopaeoma*).

Nevada

- angustissimus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 208.
antoniensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.
apicicornis Sharp, l. c. p. 542.
arizonae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206.
armiger Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 195 (*Pycnorus*).
bicolor Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 135; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 102. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 308 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 527.
mutatus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 619.
pusillus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 162.
bicuspis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 129.
Blackburni nom. nov.
femoralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 22 (nec Sharp).
boreellus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 197 (*Orus*).
brachycerus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 70.
brachypterus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.
brevipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 544.
brunnipes J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 179. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 211 (*Scopaeoma*).
californicus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 224. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.
carissimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.
carolinae Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.
cervicula Casey, l. c. p. 202 (*Pseudorus*).
chloroticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 251.
coecus Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 56 (*Polyodontus*).
complex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 61.
concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 542.
crassipes Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 242.
crassulus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.
currax Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 261.
curtipennis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 295.
debilis Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528.
filiformis Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 243.
scitulus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 309. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 189.
deceptor Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 200 (*Orus*).
degener Casey, l. c. p. 208.
delicatulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548 (*Scopaeodera*).

Nordcarolina
Guatemala,
Panama
Guatemala
Arizona,
Texas
Süd-
kalifornien
Kroatien,
Italien,
Kaukasus,
Österreich
Ostindien
Neusüdwailes
Idaho
Kongo
Kalifornien
Guatemala
Vancouver-
insel
Süd-
kalifornien
Guatemala,
Panama
Carolina
Kalifornien
Amazonas
Tunis
Japan
Guatemala
Kap Verde-
inseln,
Ägypten,
Ostafrika
Alabama
Japan
Mexiko
Italien,
Mittel-
meergebiet,
Kaukasus,
Kap Verde
Kalifornien
New York
Guatemala,
Panama

- delicatus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209. New York,
Virginia,
Mississippi
Massachu-
setts
- dentiger** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
p. 179. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 195 (*Pycnorus*).
- didymus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 606. —
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
p. 704. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. VI, 1855,
p. 62, t. 2, f. 1—3. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
III, 1872, p. 311. — Muls. et Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 201. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529. Südl. Mittel-
europa,
Mittel-
meergebiet
- digitalis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 515. Victoria
- dilutus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien,
Ceylon,
Philippi-
nen,
Sundainseln
- suturalis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I,
p. 130. Guatemala,
Nicaragua
- discoidalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 546 (*Scopaeodera*). Panama
- dissimilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 544.
- distans** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 252. Amazonas
- distinctus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201
(*Orus*). Kalifornien
- dubius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 73. Victoria
- Duryi** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 216
(*Scopaeopsis*). Ohio
- elaboratus** Casey, l. c. p. 215 (*Scopaeopsis*). Texas
- elegans** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 394. Libanon
- exiguus** Er. Gen. et Spec. Staph. 1839—40, p. 608. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 208. Pennsylvanien,
New York,
Rhode
Island
- fasciatellus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 609. Portorico
- femoralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 795. Mexiko
- femoratus** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 202
(*Orus*). Süd-
kalifornien
- ferrugineus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905,
p. 193 (*Leucorus*). Arizona
- filitarsis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 547 (*Scopaeodera*). Mexiko,
Guatemala
- filius** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 200 (*Orus*). Kalifornien
- filum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 542. Guatemala
- fossiceps** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,
p. 126. Westafrika
- frater** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 250. Argentinien
- fraternus** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201
(*Orus*). Süd-
kalifornien
- fulvescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien
- fuscus** Motsch. l. c. p. 641, t. 1, f. e. ”
- gilensis** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205. Arizona

- gracilis** Sperm., Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 152. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 308. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 527. Mitteleuropa; Mittelmeergebiet, Kanar. Inseln
- apicalis** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 165; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 53.
- breviventer** Sperm., Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 153.
- Erichsoni** Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 23, t. 12, f. 1. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 702. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 186.
- laevigatus** Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 237.
- trossulus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 585. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 85.
- grandicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 372. Mexiko
- guatemalensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549 (*Orus*). Guatemala
- hova** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 156. Madagaskar
- hudsonicus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 207. New York
- illustris** Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 436. Kolumbien
- infirmus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 607. Ägypten, Algier, Kaukasus
- iowanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 196 (*Pycnorus*). Iowa
- laetus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 129. Goldküste
- laevigatus** Gyllh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 483. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 510; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 605. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 703. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 208. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 310. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 182. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528. Europa, Mittelmeergebiet
- exiguus** Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 233.
- var. **Schneideri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1900, p. 202. Korsika
- laevis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 253. Amazonas
- latebricola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 71. Südastralien
- latitarsis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 541. Panama
- laxus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 252. Amazonas
- ligulifer** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 540. Panama
- limbatus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 130. Ostindien
- longiceps** Casey, Bull. Ac. Calif. II, 1886, p. 224; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206. Texas
- longicollis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 311; Cat. syst. Staph. 1875, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528. Südfrankreich, Spanien, Deutschland, Italien, Marokko, Algier, Tunis

- longicollis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 197
(*Orus*).
- longicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 157.
- longipennis* Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206.
- lugubris* Lynch, Bol. Ac. Córdoba VII, 1884, p. 248.
- luridus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 193
(*Leucorus*).
- macilentus* Casey, l. c. p. 208.
- major* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,
p. 125.
- microphthalmus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,
p. 409.
- micropterus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 313 nota;
Cat. syst. Staph. 1875, p. 19.
- micros* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132.
- minimus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 511;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 607. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 709.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 312. —
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
1877, p. 213. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 530.
- nigellus* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 585.
- minutus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 606. —
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 708.
— Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 208. — Muls.
et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 209.
- chalcodactylus* Kolen. Melet. Entom. III, 1846,
p. 23.
- pumilus* Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 236.
- Ryei* Woll. Ent. Monthl. Mag. IX, 1872, p. 34.
- sulcicollis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 314.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.
- ? var. *anxius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
Lyon 1861, p. 133; Opusc. Ent. XII, p. 149;
Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 198. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.
- var. *debilis* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
(2) II, 1854, p. 184; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 71.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.
- var. *intermedius* Muls. et Rey, l. c. p. 184; l. c.
p. 71. — Ganglb. l. c.
- var. *pusillus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843,
p. 309. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 708. — Muls. et Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 206. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530.
- abbreviatus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
(2) II, 1855, p. 177; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 65.
- mollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
p. 545.
- montanus* Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198
(*Orus*).
- nitidulus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 643.
- subfasciatus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
p. 129. — Fauv. Mitth. Nat. Mus. Hamburg
1905, p. 82.

Kalifornien

Madagaskar
KalifornienBuenos Aires
Süd-
kalifornien
Nordcarolina
GoldküsteGriechenland,
Syrien
ToskanaCeylon
Mittel-
europa,
Mittel-
meergebiet,
Kanar.
Inseln

Europa

Guatemala,
Panama
Süd-
kalifornienOstindien,
Sunda-
inseln,
Philippinen

- nitidus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 218 (*Scopaeodera*). Louisiana, Texas
- notangulus** Casey, l. c. p. 207. Iowa
- obscuripennis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 73. Victoria
- obscurus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. Guatemala, Panama
- ochrinus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 193 (*Leucorus*). Colorado
- opacus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. St. Louis Ac. XV, 1905, p. 215 (*Scopaeopsis*). Nordcarolina, Mississippi
- ornatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 249. Amazonas
- ovicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 217. Australien
- ruficollis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 218. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1895, p. 203.
- pallens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 215 (*Scopaeopsis*). Texas
- pallidulus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 131. Ceylon
- pallidus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 199 (*Orus*). Kalifornien
- parallelus** Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 227; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 197 (*Orus*). „
- parvicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69. Kongo
- pauper** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 250. Amazonas
- peregrinus** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 30. Brit.-Ostafrika
- piceolus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. Guatemala
- picipes** Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 137; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 206 (*Orus*). New Jersey, Texas
- pilicornis** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 392. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 327. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 19 nota. Cyprien
- pinalinus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 199 (*Orus*). Arizona
- planiusculus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132. Ostindien
- politus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 546 (*Scopaeodera*). Guatemala, Panama
- Portai** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 393. Italien
- procerus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 127. Ostindien
- procerus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 213 (*Scopaeoma*). Colorado
- prolixipennis** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 191 (*Pseudorus*). Kalifornien
- provensis** Casey, l. c. p. 190 (*Orus*). Utah
- pruinotulus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 127. Westafrika
- puberulus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 128. Ostindien
- pugetanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 (*Orus*). Washington
- pulchellus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 609. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103 (*Scopaeodera*). Kolumbien, Venezuela, Panama, Guatemala, Mexiko
- apicipennis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 547, t. 14, f. 7.

- punctatellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 157. Madagaskar,
Brit.-
Ostafrika
- punctatus** Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 138;
Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 200 (*Orus*). Kalifornien,
Nevada,
Oregon,
Washington
- puncticeps** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132. Ostindien
- puritanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 212. Massa-
chusetts
- pygmaeus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 608. Portorico
- quadripennis** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 210. Texas
- robustus** Casey, l. c. p. 199 (*Orus*). Kalifornien
- rotundiceps** Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217;
Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 212 (*Scopaeoma*). „
- rotundicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 218. Queensland
- rubens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 194 (*Leucorus*). Iowa
- rubidus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 171; Opusc. Entom. VI, 1855, p. 59. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 706. Süddeutsch-
land,
Süd-
frankreich,
Spanien,
Italien
- Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 86. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 313. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529.
- subcylindricus** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 156.
- rudis** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103. Venezuela
- saginellus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209. Alabama
- Salvini** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. Guatemala,
Panama
- sericans** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 168; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 56. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 706. Westl. Mittel-
meergebiet,
Piemont,
Süd-
frankreich,
Kanar.
Inseln
- nota**. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 310. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 191. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528.
- shastanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 (*Orus*). Kalifornien
- signifer** Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 72. Tunis, Algier
- similis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 337. Taschkent
- sonomae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 (*Orus*). Kalifornien
- sonoricus** Casey, l. c. p. 218 (*Scopaeodera*). „
- spectralis** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 190 (*Pseudorus*). Utah
- subopacus** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 103. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 86. Madeira
- sulcicollis** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 277. Europa
- cognatus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 180; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 68, t. 2, f. 6—8. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 707. — Fauv. Fn. gallo-rhén.

- III, 1872, p. 314. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 204. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529.
- suspectus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 29. Brit.-Ostafrika
- tarsalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 249. Amazonas
- tenuis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 128. Goldküste
- testaceus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien,
rubrotestaceus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, Ceylon,
II, p. 128 (♂). Sumatra,
semifuscus Kraatz, l. c. p. 128 (♀). Java
- texanus* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 221; Trans. Texas,
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 204. Neumexiko
- thoracicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 641. Ostindien
- triangularis* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, Turkestan
p. 90.
- truncaticeps* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 219; Trans. Kalifornien
Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 213 (*Scopaeoma*).
- umbra* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 544.
- unifasciatus* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 256. Neu-
kaledonien
- velutinus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien,
decipiens Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, Ceylon,
p. 131. Borneo
- ventralis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 216 New York,
(*Scopaeopsis*). Nord-
carolina
- versicolor* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 224; Trans. Texas
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 207.
- bicolor* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 222.
- vilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
p. 541.
- virilis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 62. Japan

160

Euscopaeus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548.
- crassitarsis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 548.
- gracilicornis* Sharp, l. c. p. 548. „

2

Scopaeomerus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 538.
- chiriquensis* Sharp, l. c. p. 538. Panama
- guatemalensis* Sharp, l. c. p. 539. Guatemala
- mexicanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
p. 373.
- obscurus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
p. 540.
- palmatius* Sharp, l. c. p. 539. „

5

Domene Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 305, t. 4, f. 4. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 517. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 69.

- aciculata* Hopffg. Ent. Nachr. IV, 1878, p. 269. — Reitt. Kroatien,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 40. Bosnien
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518.
- australiae* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, Queensland
p. 514.
- crassicornis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 59. Japan
- curtipennis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, „
p. 261.
- daimio* Sharp, l. c. p. 260. „
- lithocharina* Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 19 nota; Algier
Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 108.
- orbiculata* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 260.
- procera* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 41. Amur
- scabricollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 603. — Alpen,
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Deutsch-
p. 688. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306. land
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
1877, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 517.
- scopaeella* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306 nota. Portugal,
Italien
- stilicina* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932. — Fauv. Italien,
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306 nota. — Muls. östl.
et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, Mittel-
p. 99 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, meergebiet
p. 518.
- ♀ *arabica* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 648.
- ♂ *galilaea* Sauley, l. c. p. 647.
- punctatissima* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 417.
- torrensensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, Südastralien
1891, p. 75 (Gen. dub.).

12

Phanophilus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 380.

- comptus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114 Neuseeland
(*Lithocharis*).

1

Lathrobium Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 51. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 588 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 93. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 670 (ex parte). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 44 (ex parte). — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 338 (ex parte). — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 230. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,

p. 235. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 28—34. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 337—355; op. cit. 1889, p. 367—368. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 501. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 71, 80.

Lathrobium + *Throbalium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 26, 99.

Subgen. *Abletobium* Casey, l. c. p. 70, 79.

Subgen. *Apteralium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 70, 77.

Subgen. *Deratopeus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73, 112.

Subgen. *Eulathrobium* Casey, l. c. p. 73, 115.

Subgen. *Glyptomerus* Müller, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 308. — Casey, l. c. p. 70.

Typhlobium Kraatz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VI, 1856, p. 625.

Subgen. *Heterosoma* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 33.

Subgen. *Lathrobiella* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 133.

Subgen. *Lathrobioma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72, 98.

Subgen. *Lathrobiopsis* Casey, l. c. p. 72, 97.

Subgen. *Lathrobium* s. str. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 29.

Centrocnemis Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1868, p. 365.

Subgen. *Lathrolepta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72, 103.

Subgen. *Lathrotaxis* Casey, l. c. p. 74, 122.

Subgen. *Lathrotropis* Casey, l. c. p. 74, 115.

Subgen. *Linolathra* Casey, l. c. p. 75, 131.

Subgen. *Litolathra* Casey, l. c. p. 71, 93.

Subgen. *Lobrathium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 29, 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 506. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 74, 119.

Bathrolium Gozis, Rech. 1886, p. 14.

Subgen. *Microlatha* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 142.

Subgen. *Notobium* Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 443. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 226.

Subgen. *Paralathra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 130.

Subgen. *Platydomene* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 507.

Subgen. *Pseudolathra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 74, 129.

Subgen. *Tetartopeus* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 508. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73, 104.

Subgen. *Throbalium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 99. — Casey, l. c. p. 71.

Biologie: Kraatz, Berl. Ent. Zeit. III, 1859, p. 310, t. 4, f. 4a—d. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124, 125. — Xamheu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 25.

acom anum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 126
(*Lathrotaxis*).

Texas,
Neumexiko

Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 8.

Südaustralien

aemulum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 138
(*Lathrobiella*).

Nordcarolina

albipes Luc. Explor. Alg. Ent. 1849, p. 118, t. 12, f. 10.

Algier, Tunis

ambiguum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
p. 177. — Cas. Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 140 (*Lathrobiella*).

Iowa,
Oberer See

amazonicum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 237.

Amazonas

americanum Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 161 (*Pseudo-
lathra*).

Kalifornien,
Louisiana,

anale J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 129.

Texas,
Iowa

- amplipenne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 81. New York
deceptivum Casey, l. c. p. 83.
- amputans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 95 Iowa
(Litolathra).
- anale** Luc. Explor. Alg. Ent. 1849, p. 117, t. 12, f. 9 Westl. Nord-
(Lobrathium). afrika,
concinnum Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Kanar.
Bull. p. 238. Inseln
- angulare** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Massachu-
Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 108 (*Tetar- setts,*
topeus). Rhode
Island
- anguinum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 57. Japan
- angustatum** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, Mitteleuropa,
p. 424. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596. Italien,
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Marokko,
p. 678. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 351. Algier,
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 75. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 352. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 94 (*Tetartopeus*).
- angusticeps** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, Queensland
p. 522.
- angusticollis** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, Mittel-
p. 425. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 593. europa,
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, England,
p. 685. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Marokko
p. 357. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 507 (*Platydomene*).
- longicornis* Redtb. Quaed. Gen. Spec. 1842, p. 8.
- carinatum* Bold, Trans. Tyneside Club III, 1855, p. 46; Zoologist p. 4527.
- angustulum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 141 Nordcarolina
(Lathrobiella).
- angustum** Casey, l. c. p. 125 (*Lathrotaxis*). Neumexiko
- apenninum** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Italien
p. 390. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355
nota (*Glyptomerus*).
- etruscum* Piccioli, Bull. Soc. Ent. Ital. II, 1870, p. 310.
- apicale** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 102 (*Lobra- Griechenland,*
thium). Türkei,
Kaukasus
- argentanicum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 313. Argentinien
- armatum** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 453. Illinois
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 84.
var. *procerum* Casey, l. c. p. 82. New York,
Ontario
- atriventris** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 186 (*Lathrobiella*). Rhode Island
- atronitens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 128 Kalifornien
(Lathrotaxis).
- australicum** Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, Australien
p. 447 (*Notobium*).
- Bang-Haasi** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 243. Turkestan
- bardum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 135 Pennsylvanien
(Lathrobiella).

- Batesi** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 239.
- bicolor** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 593. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 686. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 84. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 356. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508 (*Platydomene*).
angusticollis Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 32.
- bicoloratum** nom. nov.
bicolor J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 92.
- bipartitum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 122 (*Lobrathium?*).
- Bodemeyeri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 593.
- bonariense** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 242.
- bosnicum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 420. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 (*Glyptomerus*).
- Boyadjiani** Rambousek, Acta Soc. Entom. Boh. 1907, p. 16.
- brachypterum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255.
- breviceps** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 521.
- brevipenne** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 78 (*Apteralium*).
- brunnipes** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 537. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, I, p. 503; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 588. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 672. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513.
dentatum Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 515.
punctatum Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 341 (nec Zetterst.).
var. *luteipes* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 342.
- cafrum** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 285.
pulchellum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 116. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 154.
- californicum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127 (*Lathrotaxis*).
- callidum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 107 (*Tetartopeus*).
- canorum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 183 (*Lathrotaxis*).
- captiosum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 106 (*Tetratopeus*).
- Amazonas
Südl. Mittel-
europa,
Italien,
Algier
- Michigan
- Washington
(Staat)
Kleinasien
- Buenos Aires
Bosnien
- Kleinasien
- Japan
- Queensland
Illinois,
Iowa,
Missouri
- Nord- und
Mittel-
europa,
Sibirien
- Tropisches
Afrika,
Ceylon,
Ostindien,
Sunda-
inseln,
Philippinen
- Kalifornien
- Indiana?
- Arizona
Montana

- carinicolle** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255. Japan
- carolinae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 78 (Apteralium). Nordcarolina
- Caseyi** Blaisdell, Ent. News XVII, 1906, p. 71 (*Lathrotropis*). Kalifornien
- castaneipenne** Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 22. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512. Mittel-europa, Kaukasus, Kleinasien, Sibirien
- lineatocolle** Scriba, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 414. Madagaskar
- catenulatum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 167. Krain
- cavicola** Müll. Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 309. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 669. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355 nota; Suppl. 1874, p. 68. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 (*Glyptomerus*). *stagophilum* Kraatz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VI, 1856, p. 625.
- centurio** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 123 (*Lathrotaxis*). Arizona
- certum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 235. Amazonas
- chilense** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 610. Chile, Argentinien
- assimile** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 240. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.
- castaneipenne** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 442.
- chloroticum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240. Amazonas
- clandestinum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 537. Guatemala
- coecum** Friv. Term. Füz. VII, 1883, p. 11 (*Glyptomerus*). Ungarn, Siebenbürgen, Serbien
- anophthalmum** Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 33. Japan
- cognatum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 257.
- collare** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 599. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 137 (*Lathrobiella*). Östl. Nordamerika
- coloradense** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 121 (*Lobrathium?*). Colorado
- concolor** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 73. Mongolei
- concolor** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 (*Litolathra*). Canada, Indiana
- confusum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 96 (*Litolathra*). Massachusetts
- contractum** Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 11. Deutsch-Neuguinea
- convictor** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 95 (*Litolathra*). Iowa
- crassipes** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510. Südfrankreich, Italien, Dalmatien
- cribricolle** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 256. Japan

- cribrum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 523.
var. *rufiventre* Fauv. l. c. p. 524. Victoria
Queensland,
Victoria
- crurale** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94
(*Litolathra*). New Jersey,
Ohio,
Iowa
- cupidum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 186 (*Lathrobiella*). Massa-
chusetts
Syrien
- Czwalinai** nom. nov.
decipiens Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,
p. 353 (nec Reiche).
- dakotatum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 100
(*Lathrobioma*). Dakota
- debile** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176.
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 103
(*Lathrolepta*). Michigan,
New York,
Massa-
chusetts,
Iowa
- decisum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 232. Amazonas
- deletum** Sharp, l. c. p. 241. "
- depressulum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 (*Lathro-
biella*). New York
- Diecki** Saulcy, Bull. Soc. Metz I, 1878, p. 115 (*Glypto-
merus*). Sizilien
- dignum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 55. Japan
- dilutum** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 509;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 602. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 648. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 348. — J.
Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 41. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514. Mittel-
europa,
Finnland
- agile* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 237.
- var. *maurianense* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm.
IX, 1865, p. 300.
- dimidiatipenne** Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 73. Ostsibirien
- dimidiatum** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 455. Nordamerika,
Chile,
Argen-
tinien
- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 598. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 132
(*Linolathra*).
- rufopartitum* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent.
Fr. (4) I, 1861, p. 436.
- discolor** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 598. Südamerika
- dividuum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 348. — Muls. et
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 101. Provence,
Mittel-
meergebiet,
Kanar.
Inseln
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514
(*Throbalium*).
- pallidipenne* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II,
1867, p. 220.
- divisum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. Brit.-
Kolumbien
- Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 84.
- Doderoi** Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 204, 282 (*Glypto-
merus*). Oberitalien
- Dohrni** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 33 (*Hetero-
soma*). Sumatra
- duplicatum** nom. nov. Goldküste
- subseriatum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr.
XXIX, 1885, p. 116.

- durangoense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794. Mexiko
- elegantulum** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 680. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512. Steiermark, Krain, Kroatien, Dalmatien, Ungarn
- var. *xanthomerum* Kraatz, l. c. p. 681. Italien
- elongatum** L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 685. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), I, p. 504; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 589. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. I, 1856—58, p. 672. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 342. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 34. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510. Nord- und Mitteleuropa
- ochraceum** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 268.
- variegatum** Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 172.
- var. *fraudentulum* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.
- nigrum** Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 271. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 209. Kaukasus
- Eppelsheimi** Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 341, 348; Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 33. Südaustralien
- exiguum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1888, p. 66. Arizona
- expressum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 183 (*Lathrotaxis*). Texas
- fallaciosum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 (*Lathrotaxis*).
- fallax** Casey, l. c. p. 136 (*Lathrobiella*).
- famelicum** Casey, l. c. p. 140 (*Lathrobiella*).
- Fauveli** Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 75. Tennessee
- var. *simplex* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 90. Iowa
- ferreum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 288. Oberer See, Wisconsin
- filicorne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 131 (*Paralathra*). Australien
- filiforme** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 134. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 508; Gen. et Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 681. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201; IX, 1867, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 347. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513. Colorado
- var. *impressum* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 580.
- lineare** Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 370.
- var. *suturale* Wenck. Cat. Col. Alsace 1866, p. 127. — Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 42. Nord- und Mitteleuropa
- lilitarse** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 133 (*Linolathra*). Virginia, Tennessee, Mississippi, Texas
- finitimum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 110 (*Tetartopeus*). Brit.-Kolumbien

- flavidulum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794. Mexiko
- flavipes** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 48. Ostsibirien
var. *fallax* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 343.
- floridae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127 (*Lathrotaxis*). Florida
- floridanum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 108 (*Tetartopeus*). „
- fovulum** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 270. — Europa
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 354. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513. —
Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180.
lineare Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 426.
punctatum Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 508; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 600.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 679. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 199; IX, 1867, p. 183. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1887, p. 54.
rufipes Mäklin, Bull. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 546.
var. *heteropterum* Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 43.
- fragile** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 258. Japan
- fragile** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 139 (*Lathrobiella*). New York
- franciscanum** Casey, l. c. p. 85. Kalifornien
- fulvipenne** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 104. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 505; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 590. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 674. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 344. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 45. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512. Nord- und Mittel-europa, Sibirien
- alpestre* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 239.
- elongatum* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 423.
- punctulatum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 269.
- var. *Letzneri* Gerh. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 257. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512.
- fulvum** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 357. Kamtschatka
- funebre** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 256. Japan
- furcatum** Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 346. Südosteuroopa
- furvulum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 109 (*Tetartopeus*). Massa-chusetts
- galvestonicum** Casey, l. c. p. 128 (*Lathrotaxis*). Texas
- gaudens** Casey, l. c. p. 132 (*Linolathra*). „
- geminum** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 673. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 343. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 37. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. Europa, Kaukasus
- bicolor* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 240.

- boreale* Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182 (nec Hochh.).
pallidipenne Hochh. l. c. p. 44.
 var. *volgense* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 42.
- glabrum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 245. Amazonas
gnoma Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 117 Kalifornien
 (*Lathrotropis*).
- gracile* Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 371. — Kroatien,
 Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 353. Deutsch-
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 land
 (*Tetartopeus*).
- gracilentum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 115. Ceylon
gracilicorne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 136 Iowa,
 (*Lathrobiella*). Nebraska
- grande* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Kanada,
 Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 114 (*Eula- Rhode*
throbium). Island,
 New Jersey,
 Pennsylvanien,
 Michigan
- grandiceps* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 312 Brasilien
 (*Heterosoma*).
- gratellum* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 229; Neusüdwaless
 XIII, 1878, p. 522.
- gravidulum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 90. Massachusetts
guatemalense Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala
 (1886), p. 536.
- guttula* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 234. Birma
habile Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 137 Nevada
 (*Lathrobiella*).
- hebes* Casey, l. c. p. 106 (*Tetartopeus*). Idaho
hesperum Casey, l. c. p. 100 (*Lathrobioma*). Brit.-
 Kolumbien
- hilare* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 243. Amazonas
Horni Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 162. Nordamerika
dimidiatum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177 (nec Say).
- jacobinum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Kalifornien,
 Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 116 (*Lathro- Nevada*
tropis).
- var. *relictum* Casey, l. c. p. 116. Kalifornien
- japonicum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, Japan
 p. 384.
- Jenseni* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 313. Argentinien
illini Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86. Illinois
incertum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Goldküste
 p. 117.
- indubium* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 52 Baikal
 (*Lobrathium*).
- innocens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89. Michigan
inornatum Casey, l. c. p. 96 (*Litolathra*). Nordamerika
- integrum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 242. Amazonas
integrum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 141 Indiana?
 (*Lathrobiella*).
- kobense* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 57. Japan

- krniense** Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 (*Centrocnemis*). Julische Alpen
- lacustre** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 112 (*Tetartopeus*). Canada
- laevipenne** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 240. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 675. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 346. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 55. *dentatum* Kelln. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 414. var. *impressifrons* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 15; in Radde, Fn. Casp. 1886, p. 192. Talysch
- Lecontei** Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 76 (*Lathrotropis*). *puncticeps* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175 (nec Sharp). — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 116. Kalifornien
- Lederi** Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 15; in Radde, Fn. Flor. Casp. 1886, p. 194 (*Lobra-thium*). Talysch
- Lethierryi** Reiche, Mém. Soc. Linn. Norm. XV, p. 37 nota. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 22 nota. Algier, Tunis
- leviceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 130 (*Pseudolathra*). Mississippi, Indiana
- limbatum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 524. Queensland
- limitatum** Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 22; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 37. Krasnogarsk
- lineiforme** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 (*Microlathra*). Iowa
- lituarium** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 133 (*Linolathra*). Texas, Arizona
- longiusculum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 181. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 597. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 (*Lathro-taxis*). Östl. Nord-amerika, Texas
- var. *castaneum* Grav. l. c. p. 52.
- var. *politum* Grav. l. c. p. 180. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127.
- longiventre** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 85. Wisconsin, Montana, Idaho
- longulum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 53. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 510; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 602. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 681. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201; IX, 1867, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 349. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514. Nord- und Mittel-europa, Kaukasus
- var. *hamatum* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 343.
- var. *minutum* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1830, p. 341.
- var. *nanum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 270.
- var. *longipenne* Fairm. et Laboulb. Fn. Ent. France I, 1854—56, p. 555.

- lusitanicum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 597. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 83. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 358. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 (*Lobrathium*).
decipiens Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 205.
erythrurum Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 31.
longiusculum var. Grav. Col. Micropt. Brunsv. 1802, p. 181.
Sisara Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 647.
- Manueli** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 (*Lobrathium*).
Ludyi Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 175.
- macrocephalum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 230.
- margipallens** Jacq. du Val, in Sagra, Hist. Cuba 1857, p. 41.
- mendax** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 234.
- merens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 138 (*Lathrobiella*).
- mexicanum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 537.
- Michaelseni** Bernh. Fauna Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 17 (*Notobium*).
- micros** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 523.
- mimeticum** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 97.
- minor** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 239.
- modestum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 139 (*Lathrobiella*).
- monilicorne** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 259.
- montanicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 121 (*Lobrathium?*).
- monticola** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255.
- Muelleri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 435.
- multipunctum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 52. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 506; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 591. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 676. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 350. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 (*Lobrathium*).
lineare Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 54.
punctatostriatum Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 268.
testaceum Ol. Entom. III, 1789—1808, p. 44, 5, t. 1, f. 6.
var. *canariense* Woll. Col. Atl. 1865, p. 502 nota.
- Westl.
Mittel-
meergebiet,
Syrien
- Seealpen,
Apennin,
- Illyrien,
Algier
- Amazonas
- Kuba
- Amazonas
Virginia
- Mexiko
- Südwest-
australien
Queensland
Tunis
- Amazonas
Mississippi
- Japan
- Montana
- Japan
- Tirol
- Europa,
Madeira

- var. *pyrenaicum* Fairm. Cat. Gren. 1863, p. 34.
 var. *striatopunctatum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit.
 XI, 1850, p. 220; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX,
 1851, p. 422. — Motsch. Bull. Mosc. XXXI,
 1858, II, p. 646.
differens Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 610.
mutator Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 525.
 var. *bipartitum* Fauv. l. c.
nanulum Casey, l. c. p. 100 (*Lathrobioma*).
nanum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 244.
necatum Sharp, l. c. p. 241.
neglectum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89.
nigrescens Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 109
 (*Tetartopeus*).
 var. *agitans* Casey, l. c. p. 110.
 var. *tetricum* Casey, l. c. p. 110.
nigricans Casey, l. c. p. 134 (*Lathrobiella*).
nigrolinea Casey, l. c. p. 102 (*Lathrobioma*).
nigrolucens Casey, l. c. p. 83.
nigrum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey,
 Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 111 (*Tetartopeus*).
nitidulum J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
 p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
 p. 113 (*Deratopeus*).
nitidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 599.
notaticolle Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 229;
 XIII, 1878, p. 523.
novum nom. nov.
cognatum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892,
 p. 335 (*Lobrathium*).
nudum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 55.
obtusum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86.
opalescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 231.
oregonense Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 136
 (*Lathrobiella*).
oregonum Casey, l. c. p. 102 (*Lathrobioma*).
othioides J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
 p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
 p. 101 (*Lathrobioma*).
inops Casey, l. c. p. 135.
oviceps Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 181 (*Lobra-
 thium*).

Victoria,
 Australien
 Massa-
 chusetts
 Amazonas
 „
 Rhode Island
 Pennsyl-
 vanien
 New York
 Texas
 „
 Manitoba
 Massa-
 chusetts,
 New York,
 New Jersey
 Kanada,
 Massa-
 chusetts,
 Michigan,
 Wisconsin
 Florida,
 Michigan
 Kolumbien,
 Argen-
 tinien,
 Uruguay
 Queensland
 Turkmenien
 Japan
 Massa-
 chusetts,
 Canada
 Amazonas
 Oregon
 „
 Massa-
 chusetts,
 Rhode
 Island,
 New
 Jersey,
 Iowa,
 Oberer See
 Kanar. Inseln

- pallescens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 79 (*Abletobium*).
- pallidulum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 143 (*Microlothra*).
- pallidum** Nordm. Symb. 1837, p. 142. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 509; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1856—58, p. 683. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 354. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.
var. *Jansoni* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67 (1866), p. 441.
- pallipes** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 257.
- Pandellei** Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 367.
- parallelum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 233.
- parcum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176.
- partitum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 56.
- parvipenne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 113 (*Deratopeus*).
- pectorale** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596.
- pedale** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43.
- pennatum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 522.
- picescens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 85.
- piceum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, II, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228 nota.
- picipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 594. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 687. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 357. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 91. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508 (*Platydomene*).
- pictum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 243.
- Pinkeri** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 390. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33 (*Glyptomerus*).
- politulum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 288 nota.
- politum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 245.
- pollens** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 254.
- postremum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 88.
- praeceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 125 (*Lathrotaxis*).
- praelongum** Casey, l. c. p. 82.
- prolatum** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 180.
- proximum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 236.
- pumilum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 246.
- punctatum** Zett. Fauna Lapp. I, 1828, p. 84. — Czwalina in Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 402. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180 (*Tetartopeus*).
- Massachusetts
Massachusetts,
New York
Nord- und
Mittel-
europa

Japan
Pyrenäen
Amazonas
Florida
Japan
Massachusetts
Insel St.
Thomas
Mississippi
Queensland
New
Hampshire
Australien

Südl. Mittel-
europa,
Italien,
Sizilien,
Kreta,
Algier
Amazonas
Südtirol

Australien

Amazonas
Japan
Rhode Island
Arizona

New Jersey
Philippinen

Amazonas
"
Ostpreussen,
Finnland,
Lappland,
Sibirien

- baicalicum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 424.
- foveatum* Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 406.
- sibiricum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 433.
- Zetterstedti* Rye, Entom. Ann. 1872, p. 25.
- var. *gracile* Popp. Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, 4, p. 22. Ostsibirien
- puncticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 232. Amazonas
- puncticollis* Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 86. Nordamerika
- pusillum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794. Mexiko
- quadratum* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 29. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 507; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 595. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 678. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200; IX, 1867, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 352. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 68. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 195. — Czwalina, op. cit. 1888, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 (*Tetartopeus*). Europa, Sibirien
- filiforme* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538.
- pilosum* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 56.
- ab. *rufopacum* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142.
- var. *rufonitidum* Reitt. l. c. nota. Turkestan, Lenkoran
- quadricollis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 22 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, p. 114. Kleinasien, Algier
- regulare* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 258. Japan
- Reitteri* Czwalina, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 34 (*Lobrathium*). Kaukasus
- relictum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 538. Mexiko, Guatemala
- rhodeanum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 (*Litolathra*). Rhode Island, Massachusetts, New York
- rigidum* Casey, l. c. p. 88. Rhode Island
- ripicola* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. Nord- und Mitteleuropa
- boreale* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 39.
- robustum* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 (*Lathrobiella*). Indiana
- Rodti* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 699. Kaukasus
- rubidum* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 436. Kuba
- rubidum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 140 (*Lathrobiella*). Pennsylvanien, Indiana, Mississippi
- rubricollis* Casey, l. c. p. 126 (*Lathrotaxis*). Montana, Utah, Arizona
- rubripenne* Casey, l. c. p. 107 (*Tetartopeus*). Massachusetts, Iowa

- rufescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563.
 — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 72.
 var. *obscuriceps* Motsch. l. c. p. 564.
- rufipenne** Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 704. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1839, p. 505; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 591. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 675. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 190; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 345. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.
- rufulum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 235.
- rugipenne** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 46.
- rutilans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 144 (*Microlathra*).
- Sahlbergi** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.
- scabripenne** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 58.
- scolopaceum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 103 (*Lathrobioma*).
- scutellare** Nordm. Symb. 1837, p. 143. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 677. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 351 nota. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 352. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510 (*Tetartopeus*).
gracile Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866, p. 82 (nec Hampe).
Solskyi Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 33.
- seminigrum** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 117.
- semirubidum** Casey, Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 (*Litolathra*).
- semirubrum** Casey, l. c. p. 107 (*Tetartopeus*).
- semirufulum** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 242.
 var. *macropterum* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 58.
- seriatum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 91.
- shoshonicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 99 (*Lathrobioma*).
- sibiricum** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 31 nota. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, nr. 4, 1880, p. 75.
abbreviatum Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1876, p. 273.
- simile** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89.
- simplex** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240.
- sinaicum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 71.
- sodale** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 687.
 — Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 507 (*Platydomene*).
 ab. *obscuripenne* Ramb. Ent. Bl. 1910, p. 227.

Armenien.

Kirgisen-
steppe
Nord- und
Mittel-
europaAmazonas
Armenien
Pennsyl-
vanien

Turkestan

Japan

Massachu-
settsÖstl. Mittel-
europa,
Kaukasus

Ceylon

Rhode Island

Iowa

Turkestan

Nordcarolina

Oregon

Ostsibirien

Massachu-
setts,

Rhode

Island,

New York,

New Jersey

Amazonas

Sinai

Bayern,

Österreich,

Ungarn,

Sieben-
bürgen

- soror* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 (*Lathrotaxis*). Texas
- spadiceum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 592. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 684. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 62. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515. Alpengebiet, Frankreich
- Tarnieri* Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 83.
- var. *balcanicum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 435. Balkan
- sparsellum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 87. Nordamerika
- spissicorne* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 83. Massachusetts, Michigan, Montana
- stibium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 111 (*Tetartopeus*).
- stilicioides* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 58. Japan
- styliferum* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 143 nota. Kaukasus
- subaequale* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 82. New Jersey
- subgracile* Casey, l. c. p. 96 (*Litolathra*). New York
- sublaeve* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647. Ostindien
- subseriatum* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 118 (*Lathrotropis*). Kalifornien, Vancouver
- sumatrense* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 31. Sumatra
- suspectum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 97 (*Litolathra*). New York
- tacomae* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 120 (*Lobrathium?*). Washington (Staat)
- tardum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 237. Amazonas
- Taxi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 58. Südungarn
- tenue* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 10 (*Lathrobioma*). New York
- tenuicorne* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 238. Amazonas
- terminatum* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 55. — Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 350. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 679. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200; IX, 1867, p. 183. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 71. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 195. — Weise, op. cit. XXVII, 1883, p. 333. — Czwalina, op. cit. 1888, p. 350. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 (*Tetartopeus*). Europa, Östl. Nordamerika
- punctulatum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 106.
- quadratum* var. b Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), p. 507; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 595. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 352.
- var. *atripalpe* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 415. — Fauv. Rev. d'Ent. 1884, p. 243. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 88. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180.
- posticum* Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 144.
- terminatum* var. b Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 72.

- testaceum** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 682. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.
- texanum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 98 (*Lathrobiopsis*).
- unicolor** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 117.
- pallens* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 611.
- seriatum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 259. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 69 (veris).
- testaceum* Mtsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646.
- ustulatum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 118 (*Lathrotropis*).
- vafrum** Casey, l. c. p. 118 (*Lathrotropis*).
- vagans** Casey, l. c. p. 137 (*Lathrobiella*).
- validiceps** Casey, l. c. p. 117 (*Lathrotropis*).
- vancouveri** Casey, l. c. p. 86.
- ventrale** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 135 (*Lathrobiella*).
- tricolor* Casey, Trans. Amer. Philad. 1884, p. 133.
- victoriense** Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 71.
- Victoris** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 111.
- viduum** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 51.
- virginicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 99 (*Lathrobioma*).
- Washingtoni** Casey, l. c. p. 87.
- Wingelmülleri** Breit, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 29 (*Glyptomerus*).
- 291
- Ostalpen
- Texas
- Ostindien,
Sunda-
inseln,
Philippi-
nen,
Japan
- Brit.-
Kolumbien
Kalifornien
North Dakota
Kalifornien
Brit.-
Kolumbien
Kansas,
Florida,
New Jersey
- Südaustralien
- Herzegowina
- Baikal
Virginia
- New
Hampshire
Norditalien

Pseudobium Muls et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72.

- labile** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 594. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 428. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 350. — Muls. et Rey, l. c. p. 106. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500.
- Mittelmeer-
gebiet,
Rhein-
provinz,
Kanar.
Inseln

1

Hyperomma Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 531. — Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 70.

- abnorme** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 22.
- dispersum** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1408.
- duplicatum** Broun, l. c. p. 1409.
- lacertinum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 532.
- Victoria
- Neuseeland
- „
Australien

- mandibulare** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1409. Neuseeland
nigrum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 197. West-
 australien
pictipes Lea, l. c. p. 196, t. 18, f. 2. Tasmanien
sanguineum Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 425. Neuseeland

8

Scimbalium Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 579. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 359. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 499. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 249.

Scymbalium Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 92. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667.

Lathrobiomorphus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 612. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.

Lathrobomorphus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 645.

Micrillus Raffray, Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 362. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.

- agreste** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 8. Südastralien
aegyptiacum Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 256. Ägypten
anale Nordm. Symb. 1836, p. 153. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 580. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 499. Österreich,
 Sieben-
 bürgen,
 Mittel-
 meergebiet
planicolle Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 580. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 81. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 359. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 112.
arcuatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 529. Australien
asperiventre Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235. Birma
australe Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 231; XIII, 1878, p. 528. Australien
badium Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646, t. 1, f. f. Ostindien
biskrense Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98. Algier
duplopunctatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 527. Victoria
ferrugineum Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 526. Queensland
hypogaeum Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 248, f. 1, 2. Nordafrika
indicum Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 277. Ostindien
laetum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 9. Südastralien
lathrobioides Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 107. Deutsch-
 Ostafrika
minimum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 408. Türkei,
 Griechen-
 land
nitidiventre Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 131. Westafrika
opaculum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530. Queensland
pallidum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 262. Transkaspien,
 Turkmenien

- peregrinum** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 130. Goldküste
- pubipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 159. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 361. Provence,
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Ent. Fr. XXIV, 1877, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500. Algier,
Cypern,
Marokko,
Tunis
- longipenne* Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 35.
- rufum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 529. Südastralien
- scabrosum** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 114. Tanger
- simplarium** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 528. Südastralien
- sparsicolle** Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 528.
- subterraneum** Raffray, Rev. Mag. Zool. 1873, p. 362, t. 1, f. 14. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 114. Algier "
- testaceum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 581. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 360. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 114. Mittel-
meergebiet
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. III, 1895, p. 499.
- grandiceps* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 699.
- longicolle* Muls. et Rey, Opusc. ent. II, 1853, p. 77.
- Saintpierrei* Allard, Abeille V, 1868—69, p. 465.
- trapezicolle* Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. V, 1875, p. 70.
- Usagarae** Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 256. Deutsch-
Ostafrika
- longicollis* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 106.

28

Scymbalopsis Reitt.

Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 139 nota.

Reitteri nom. nov.*grandiceps* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 68 (nec Jacq. du Val).

1

Margelan,
Turkestan**Euphonus** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 181.

Apfelbecki Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 249.*pallidus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 182.

1

Bosnien,
Schweiz,
Süd-
frankreich,
Algier**Suniopsis** Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530.

polita Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, t. 4, f. 2. West-
australien**singularis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530. "

2

Achenium Curt.

Curtis, Brit. Ent. III, 1826, t. 115. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 265. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 501; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 581. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 92. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 689. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 44. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 361. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 497. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73.

- aequatum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 583. Nordafrika,
Kanar.
Inseln
- basale** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 584. — Muls. Sardinien,
et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, Korsika,
p. 20 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Seealpen
p. 498.
- brevipenne** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291. Marokko
- caucasicum** Cast. Etud. Entom. I, 1835, p. 119. — Hochh. Kaukasus
Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 156.
- ustulatum** J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 4, Ostsibirien
1880, p. 75.
- cribriceps** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 45. Ägypten,
Syrien
- debile** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 585. Mesopo-
tamien
- depressum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 182. — Mittel- und
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, Südeuropa
t. 17, f. 82. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 362. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXIV, 1877, p. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.
- cordatum** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 421.
- var. ephippium** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.
- levantinum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 45. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 97.
- Hartungi** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 587. Madeira,
- rugipenne** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Marokko,
Staph. 1875, p. 23 nota. Spanien
- Hauseri** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 336. Transkaspien,
Turkestan
- humerales** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 648. Ostindien
- humile** Nicolai, Col. Halens. 1822, p. 38. — Er. Käf. Mittel-
Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 501; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 586. — Kraatz, europa,
Naturg. Ins. Deutschl. III, 1856—58, p. 690. Russland
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 363. —
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.
- depressum** Curtis, Brit. Ent. III, 1825, t. 115.
- jejunum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 587. Sardinien,
Algier
- macellum** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98. Algier
- maroccanum** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 182. Marokko

- medeanense** Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 97. Algier
myops Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 45. „
nigriventre Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Tanger,
 p. 372. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Lusitanien
 Staph. 1875, p. 23; Bull. Soc. Linn. Norm. (3)
 II, 1877—78, p. 115. — Mars. Abeille VIII, 1871,
 p. 321.
lusitanicum Skalitzky, Wien. Ent. Zeit. III,
 1884, p. 98.
picinum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. Kaukasus,
 1875, p. 23 nota. Turk-
quadriceps Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. menien
 1889, p. 175.
planum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 583. Südrussland,
 Kaukasus
Reitteri Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498. Dalmatien,
depressum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, Sicilien
 p. 582. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
 1856—58, p. 691. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.
 XXVIII, 1884, p. 46 (nec Grav.).
ruficolle J. Sahlb. Öfvers. Finska Vet. Soc. L, 1907—08, Syrien
 p. 34.
rufulum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 581. Süd-
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 363. — frankreich,
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, Algier
 1877, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
 1895, p. 498.
salinum Woll. Cat. Canar. 1864, p. 582. Kanar. Inseln
Sennacherib Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, Syrien
 p. 646.
striatum Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 341. Süd-
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 585. frankreich,
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 362 nota. Algier,
distinctum Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 117, Marokko,
 t. 12, f. 8. Tunis
haemorrhoidale Luc. l. c. p. 116, t. 12, f. 7.
subcaecum Woll. Cat. Canar. 1864, p. 581. — Fauv. Kanar. Inseln
 Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 97.
tenellum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 587. Sardinien,
 Spanien,
 Italien,
 Griechenland,
 Westl.
 Nordafrika

Platygonium Motsch.

- Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 40; XXXI, 1858, II, p. 649.
sculpticeps Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 649, Sibirien
 t. 1, f. h.

Achenopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 70.

- aequalis** Fauv. l. c. p. 71. Kongo
inaequalis Fauv. l. c. p. 70. Sumatra

Sterecephalus Lynch.

Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 231.

seriatipennis Lynch, l. c. p. 233.

Argentinien

1

Dolicaon Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 119. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 576. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 91. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 692. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 42. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 336. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 247. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 496. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 56.

Adelobium Nordm. Symb. 1836, p. 139.*Leptobium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 57.*Pinobius* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148.

— Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.

Arisi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 205.

biguttulus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 425. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 693. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—59, t. 16, f. 80. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 337. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 12. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 496.

Turkestan
Südl. Mittel-
europa,
Kaukasus,
Palästina,
Oran,
Algier

gracilis Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 228 (nec Er.).*Truquii* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 645.*venustus* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 428.var. *analis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 206.**canariensis** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 97.**cribricollis** Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 37.

Kanar. Inseln
Tanger,
Südspanien

debilipennis Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 73.

densiventris Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 20 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 111.

Gomera
Algier,
Tunis

distans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 247.

elongatulus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota.

Amazonas
Australien

gracilis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 182. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578.

haemorrhous Er. l. c. p. 577.

Südeuropa,
Marokko,
Algier,
Tunis,
Kanar.
Inseln

illyricus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 577. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 11. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 497.

Illyrien,
Sizilien,
örtl.

- syriacus* Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 644. Mittelmeer-
gebiet,
Nordafrika
- var. *nigricollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 188. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 91. Kanarische
Inseln,
Tripolis
- artus* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 45; in Rohlf's Kafa 1881, p. 372.
- ab. *ruficollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 189. Kanarische
Inseln
- indicus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118. Ostindien,
Ceylon,
China,
Madagas-
kar,
Djibouti,
Äthiopien,
Côte-d'Or,
Angola
- angolensis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 294. Andalusien
- castaneus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 114. Kapland
- vicinus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.
- Korbi** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 225.
- lathrobioides* Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 120, t. 4, f. 1. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 576.
- brachypterus* Nordm. Symb. 1836, p. 140.
- limbatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 115. Goldküste
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225. Australien
- melanocephalus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 366. Griechenland,
Syrien
- nigripennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota. Australien
- obesus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota. Syrien
- Paivae** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 73. Salvages-
inseln
- paricolor* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 517. Australien
- parviceps* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 234. Birma
- pullus* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 161; in Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 187. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota. Samarkand
- punctiger* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 42. Marokko
- quadraticollis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota. Australien
- robustus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 117. Ostindien
- rubripennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 138. Turkmenien
- semirufus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota. Damaskus
- sparsiventris* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179. Philippinen
- sparsus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 262. Kaukasus
- Spenceri** Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 263. Inner-
australien
- venustus* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 134. Syrien,
Marokko

Scotonomus Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327 nota. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 57.

etruscus Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (5) I, 1878, p. 116. Italien,
Sardinien
Raymondi Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 328
nota, t. 4, f. 10.

1

Dicax Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 518.

arculus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 520. Victoria
cephalotes Fauv. l. c. p. 519. Östl.
Australien
deserti Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 262. Inner-
australien
longiceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 230. Neusüdwaless
rubripennis Fauv. l. c. p. 519. Victoria
ruficollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, Neusüdwaless
p. 74.
var. *nigriventris* Lea, l. c. p. 75.
ventralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, West-
p. 73. australien

7

Sphaeronum Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 225.

Sphaeronium Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 54.

carinicolle Sharp, l. c. p. 228. Amazonas
carinifrons Sharp, l. c. p. 227. „
depressifrons Sharp, l. c. p. 226. „
elongatum Sharp, l. c. p. 227. „
opacum Sharp, l. c. p. 225. „
pallidum Sharp, l. c. p. 229. „

6

Bolbophites Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 278, t. 1, f. 2.

aspericeps Fauv. l. c. p. 279. Brasilien
pustulosus Fauv. l. c. „

2

Mimophites Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 280.

Bouvieri Fauv. l. c. p. 281. Brasilien
laticeps Fauv. l. c. „

2

Ophites Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 627.

- | | |
|---|-------------|
| Bugnioni Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 80. | Kolumbien |
| Fauveli Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 229. | Argentinien |
| rhaphidioides Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 628. | Carthagena |
| — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 99. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 228. | |
| stilicioides Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 207. | Amazonas |
| velitaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 629. | Kolumbien |
| versatilis Er. l. c. p. 628, t. 2, f. 1. | „ |

6

Ecitonides Wasm.

Wasm. Krit. Verz. Myrm. Term. 1894, p. 212; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLV, 1895, p. 150; Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 247—249; Zoologica, Heft 26, 1899, p. 179.

- | | |
|---|-----------|
| brevicornis Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 249. | Brasilien |
| Fiebrigi Wasm. Zoologica 26, 1909, p. 179. | Paraguay |
| longiceps Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 249. | Brasilien |
| tuberculosis Wasm. Krit. Verz. Myrm. Term. 1894, p. 212. | „ |

4

Calliderma Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 653. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 491; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.

Cephalochetus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 122.

Cephalochaetus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 616.

- | | |
|--|-------------------|
| africanum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475. | Deutsch-Ostafrika |
| aspericolle Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 236. | Birma |
| brunneum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 653, t. 1, f. 1. | Ostindien |
| elegans Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 123, t. 2, f. 7a—d. | Ceylon |
| indicus Kraatz, l. c. p. 124. | Ostindien |
| Kraatzi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235. | Birma |
| obsoletum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 71. | Kongo |

7

Noumea Fauv.

Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 433; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 263.

Numea Harold, Col. Hefte XIII, p. 123 nota.

- | | |
|--|---------------|
| serpens Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 434, t. 10, f. 2; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258. | Neukaledonien |
|--|---------------|

1

Scopaeodes Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 208. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 55.

fuscipes Sharp, l. c. p. 209.

Amazonas

gracilis Sharp, l. c. p. 208.

„

2

Ababactus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 533. — Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 211; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 27, 52.

depressus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 534. Panama

filarius Sharp, l. c. p. 535.

gracilis Sharp, l. c. p. 535.

„

Iheringi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 283.

Guatemala

lepidus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 394. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53.

Brasilien

Texas

nactus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 102. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53 nota.

Arizona

pallidiceps Casey, Bull. Ac. Calif. II, 1886, p. 209; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53.

Kalifornien

pallidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 535.

Guatemala

pennatus Sharp, l. c. p. 534.

Panama

politus Sharp, l. c. p. 536.

Guatemala

10

Cryptobium Mannerh.

Mannerh. Brach. 1830, p. 38. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 500; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 561. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 89. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 694. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 42. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 210; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 506. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 4. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 495. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 27.

Subgen. *Aderobium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 23, 28.

Subgen. *Astenobium* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411.

Subgen. *Biocrypta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 26, 51.

Subgen. *Cryptobiella* Casey, l. c. p. 26, 29.

Subgen. *Eucryptina* Casey, l. c. p. 24, 28.

Subgen. *Gastrolobium* Casey, l. c. p. 23, 31.

Subgen. *Hesperobium* Casey, Bull. Calif. Ac. 1886, p. 33; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 24, 33.

Subgen. *Homoeotarsus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 34. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 90. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 665. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1864—1865, p. 24. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 414, 415. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 490; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 24.

1868, Cat. Col. 2.665

Spirosoma Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 206.

Subgen. *Lissobiops* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 25, 50.

Subgen. *Monocrypta* Casey, l. c. p. 27, 30.

Subgen. *Pycnocrypta* Casey, l. c. p. 25, 28.

Biologie: Wickham, Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Iowa II, p. 341, t. 9, f. 16.

- | | |
|---|---|
| abdominale Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651.
— Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402.
<i>pygiale</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121.
var. <i>acherontium</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402.
var. <i>discoideum</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402.
var. <i>indicum</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121.
var. <i>rufipenne</i> Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651.
<i>suturale</i> Motsch. l. c. p. 652. | Ostindien,
Malayisches
Gebiet,
Ceylon,
Sunda-
inseln,
Philippi-
nen,
Zentral-
afrika |
| aberrans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 533. | Guatemala |
| adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 69. | Südaustralien |
| adversum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 510. | Mexiko |
| aequale Sharp, l. c. p. 513. | Guatemala |
| affine Sharp, l. c. p. 529. | Mexiko,
Nicaragua |
| africanum Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 282. | Brit.-
Ostafrika,
Somali,
S. Rhodesia |
| agile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 575. | Brasilien |
| albipes Er. l. c. p. 566. | Antillen,
Kolumbien,
Mexiko,
Guatemala,
Venezuela |
| Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 168. | Madagaskar |
| alternans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 217. | Amazonas |
| alutaceum Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 11. | Portug.
Ostafrika |
| anale Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12. | Neugranada |
| anceps Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 90.
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 42
(<i>Gastrolobium</i>). | Nordamerika |
| angustifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 221
(<i>Aderobium</i>). | Amazonas |
| angustum Sharp, l. c. p. 220. | |
| antiquum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 567. | Brasilien |
| antoniense Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 522. | Guatemala |
| apicale M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 234; XIII, 1878, p. 534. | Australien |
| apicatum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 49
(<i>Monocrypta</i>). | Japan |

- apicipenne** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 526. Mexiko,
Nicaragua,
Guatemala
- arduum** Sharp, l. c. p. 523. Panama
- argentinum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 211. Argentinien
- arizonense** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 96. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 39 (*Gastrolobium*). Arizona,
Kalifornien
- var. *penninsulare* Casey, l. c. p. 39.
- assimile** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 570. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 521. Mexiko
- atratum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 224. Argentinien
- atriceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 34 Illinois
(*Gastrolobium*).
- atronitens** Casey, l. c. p. 48 (*Hesperobium*). Texas
- badium** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 53. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 562. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 (*Gastrolobium*). New Jersey
- basale** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 84. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 205, 207. Paraná
- var. *bicolor* Burm. Reise Plata Staat. I, 1865, p. 484 (nec Grav.).
- brasilianum** Luc. Voy. Cást. Am. Sud 1857, p. 50. Brasilien
- bicolor** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 179. — Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 454. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 514. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 563. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 (*Gastrolobium*). Östl. Nord-amerika,
Mexiko
- bonariense** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 409 Argentinien
(*Gastrolobium*).
- brevicorne** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 572. Kolumbien
- Bugnioni** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 81. Venezuela,
Brasilien
- californicum** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 45 (*Hesperobium*). Kalifornien,
Brit.-Kolumbien
- var. *pacificum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 44.
- var. *Vancouveri* Casey, l. c. p. 45.
- calviventre** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 315. Bolivien
- capito** Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 127; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 (*Hesperobium*). New York bis
Nordcarol.,
Iowa,
Missouri
- Caroli** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 184. Madagaskar
- carolinum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 563. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 34 (*Gastrolobium*). Nordcarolina,
Maryland
- castaneum** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651. Kolumbien
- celatum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 525. Guatemala
- centrale** Sharp, l. c. p. 528. Mexiko,
Guatemala,
Nicaragua,
Guadeloupe,
Venezuela,
Brasilien

- cephalicum** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 31.
- cephalotes** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 141. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 509.
- certatum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 520.
- ceylanense** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 119.
- Chaudoiri** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 35 (*Homoeotarsus*).
- var. *adanense* Rambousek, Cas. Ceske Spol. Ent. III, 1907, p. 64.
- chontalense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 515.
- cinctum** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 454. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 47 (*Hesperobium*).
- latebricola* Nordm. Symb. 1836, p. 150. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 569.
- cingulatum** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103.
- clavicorne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 47 (*Hesperobium*).
- cognatum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 527.
- collare** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 507.
- ruficolle* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—1868, p. 142 (veris).
- colonicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 29 (*Cryptobiella*).
- coloradense** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 38 (*Gastrolobium*).
- coloratum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 516.
- complectens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 517.
- concolor** Sharp, l. c. p. 514.
- confine** Sharp, l. c. p. 523.
- conforme** Sharp, l. c. p. 514.
- confusum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 221.
- corumbanum** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411.
- crassulum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 520.
- cribratum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 49 (*Hesperobium*).
- cribripenne** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 118.
- cuneatum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 253.
- curticorne** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 572.
- curtipenne** nom. nov.
- brevipenne* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 529 (nec Muls.).
- curtum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 573.
- cuyabanum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 324.
- cylindricum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 220.

Abessinien
Mexiko

Nicaragua

Ceylon
Armenien,
Griechen-
land
Kleinasien

Nicaragua

Östl. Nord-
amerika

Venezuela
Florida

Panama

Guatemala,
Mexiko,
Nicaragua,
Panama

Panama

Arizona,
Colorado
Guatemala

Mexiko

„
Panama
Mexiko
Buenos Aires
Brasilien
Mexiko

Illinois,
Massachu-
setts,
New Jersey
Goldküste

Japan

Brasilien
Guatemala

Brasilien
„
Amazonas

- delicatulum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 9, 69. Südaustralien
- densipenne** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 254. Japan
- derasum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 519. Guatemala
- despectum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 40 (*Gastrolobium*). Louisiana, Florida, Texas
- disjunctum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 226. Argentinien, Uruguay
- dispar** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 568. Kolumbien
- ducale** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 531 (*Pycnocrypta*). Panama
- elegans** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 70. Südaustralien
- elephas** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 54. Ostindien
- Eppelsheimi** nom. nov. Goldküste
- apicale* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 119.
- errans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 522. Panama
- Ertli** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 106. Deutsch-Ostafrika
- erythrothorax** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 85. Rio Janeiro
- excellens** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411 (*Astenobium*). Argentinien
- extraneum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 55. Ostindien
- Fairmairei** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 183. Madagaskar
- fasciatum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 565. Kolumbien, Venezuela
- Fauveli** nom. nov. Venezuela
- densipenne* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 104.
- femorale** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 567. Brasilien
- ferrugineum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 512. Mexiko
- filarium** Sharp, l. c. p. 522. Guatemala
- filum** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 119. Ceylon,
- rugiceps* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 120. Ostindien, Sunda-inseln, Sudan, Kongo-gebiet, Gabun
- flavicorne** J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 (*Hesperobium*). Massa-chusetts, New York
- flavipes** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 89. Peru
- flavoguttatum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314. Paraguay
- Flohri** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 521. Mexiko
- floridanum** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 389. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 33 (*Gastrolobium*). Florida, New Jersey
- convergens* Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 129.
- formosum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 514. Mexiko

fossigerum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 120.

fracticorne Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 430. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 500; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 575. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 695. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 6, f. 79. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 6. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 495.

furcaticorne Grimmer, Steiermark's Col. 1841, p. 33.

glaberrimum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364.

var. *brevipenne* Muls. et Rey, Op. Entom. XII, 1861, p. 147.

var. *collare* Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 84.

var. *Jacquelini* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 466, t. 8, f. 3.

egregium Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 83.

fractum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 534.

fraternum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 478.

Fruhstorferi Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 30.

fulvescens Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, p. 207, t. 1, f. o (*Homoeotarsus*).

testaceum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 120.

fulvipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 566.

fuscipenne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 219.

gastrale Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 237.

geniculatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 569.

Gestroi Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XV, 1895, p. 208.

gigas Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 210 (*Pycnocypta*).

grande Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 (*Pycnocypta*).

grandiceps Sharp, l. c. p. 509.

grandicolle Sharp, l. c. p. 529.

guatemalense Sharp, l. c. p. 518.

hastiventre Bernh. Arch. Naturg. XXV, 1908, I, p. 316.

japonicum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 60.

jejunum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 519.

imperiale Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 375.

inquisitor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 530.

Ostindien,

Ceylon

Europa,

Mittel-

meergebiet

Victoria

Deutsch-

Ostafrika

Annam

Ostindien

Portorico,

Guade-

loupe,

Grenada,

Kolumbien,

Venezuela,

Ecuador

Amazonas

Birma

Cayenne

Gallaland

Amazonas

Mexiko

Guatemala

Mexiko,

Guatemala

Guatemala,

Nicaragua

Argentinien

Japan

Guatemala

Mexiko

Guatemala

- iridescens* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 321. Argentinien
Klimai Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 319. Brasilien
Koltzei Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 40. Amurgebiet
laticolle Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 221. Amazonas
Lecontei Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 94. Iowa
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35
(*Gastrolobium*).
carolinum J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, (nec Er.).
lithocharinum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 531. Panama
longiceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 214. Amazonas
longicorne Sharp, l. c. p. 215.
longipenne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 565. — Mexiko
Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 510.
lucidipes Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 92. Neuguinea
lugubre J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. Florida,
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 41 Louisiana
(*Gastrolobium*).
luridum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 512. Mexiko
Lynchi nom. nov. Argentinien
apicale Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 214.
— Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.
marginatum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 652. Ostindien,
limbatum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, Java
I, p. 121. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 155.
marginellum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 322. St. Vincent
Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, Australien
p. 142. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 233; XIII, 1878, p. 534.
maxillosum Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12 (*Pycnocrypta*). Neugranada
megacephalum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, Brasilien
p. 409 (*Gastrolobium*).
melanocephalum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 564. New York,
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 Virginia
(*Gastrolobium*).
Methneri Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. Deutsch-
1911, p. 477. Ostafrika
mexicanum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 530. Mexiko
microcephalum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, Südaustralien
p. 232; XIII, 1878, p. 527.
minimum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314. Argentinien
mixtum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama
p. 515.
modestum Sharp, l. c. p. 518. Panama
monticola Sharp, l. c. p. 530. Guatemala
Muneti Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 80. Kolumbien
mutator Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 236. Birma
myrmecocephalum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Australien
XXIX, 1904, p. 71, t. 4, f. 3.
nairobiensis nom. nov. Brit.-
mixtum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 32. Ostafrika

- nasutum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 526.
- nigriventre** Sharp, l. c. p. 526.
- nigrobadium** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 278.
- nigrotestaceum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 318.
- Nisus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 239.
- obliquum** J. Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 394. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 41 (*Gastrolobium*).
- parcum** J. Lec. l. c. p. 394.
- obscuratum** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 32.
- obscurum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 573.
- obsoletum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 315.
- ochropus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 571.
- opacifrons** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 213.
- opacinum** nom. nov.
- opacum** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 186.
- opacum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 212 (*Eucryptina*).
- opalescens** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 244.
- ovaticeps** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 524.
- pallipes** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 179. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 568. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 (*Hesperobium*).
- Gravenhorsti** Kirby, Faun. Bor.-Am. 1837, p. 87, t. 2, f. 2.
- palustre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 1882—87 (1885), p. 511.
- parallelum** Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 130; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 38 (*Gastrolobium*).
- proximum** Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 132.
- paranense** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 208.
- paricolor** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 401.
- parviceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 48 (*Hesperobium*).
- patagonicum** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 243.
- pectorale** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 60 (*Monocrypta*).
- phaenomenale** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 410 (*Gastrolobium*).
- piceum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 533.
- pimerianum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 (*Gastrolobium*).
- placidum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 792.
- plagipenne** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 211 (*Pyncocrypta*).
- Nicaragua
- Mexiko,
Guatemala
- Ostindien
Brasilien
- Birma
Florida
- Brit.-
Ostafrika
- Cayenne
Brasilien
- „
Amazonas
Rhodesia
- Amazonas
- Argentinien,
Paraguay
Guatemala,
Panama
Rhode Island
bis Iowa,
Pennsylvanien
- Mexiko
- New York,
New
Jersey,
Nord-
carolina
Buenos Aires
Ostindien
Virginia
- Argentinien
Japan
- Brasilien
- Queensland
Kalifornien,
Arizona,
Indiana,
Iowa,
Texas
- Mexiko
- Amazonas

planatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 (<i>Pycnocrypta</i>).	Panama
politulum Sharp, l. c. p. 516.	Mexiko
princeps Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 324.	Paraguay
prolixum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 564.	Brasilien
properum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 101.	Nordamerika
iprospciens J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 52 (<i>Biocrypta</i>).	Texas, Arizona
pseudoprolixum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 321.	Brasilien
pulchellum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 574.	Kolumbien
puncticeps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 185.	Rhodesia
puncticolle Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 518.	Guatemala
punctipenne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 218.	Amazonas
pusillum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 29.	New York
Quedenfeldti Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 322.	Kolumbien
Richteri Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 408 (<i>Gastrolobium</i>).	Argentinien
Rosti Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 622.	Ostindien
rostratum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 (<i>Cryptobiella</i>).	Guatemala, Panama
rubeculum Sharp, l. c. p. 513.	Mexiko
rubricolle Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 216.	Argentinien
rubripenne Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 49 (<i>Hesperobium</i>).	Dakota
rufescens Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314.	Argentinien
ruficolle Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 649.	Para
ruficorne Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 214.	Amazonas
rufipes Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 219.	Argentinien
rugosipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 523.	Panama
Salvini Sharp, l. c. p. 509.	Guatemala
sanguinolentum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 650.	Ostindien
Schubotzi Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 477.	Zentralafrika
scitum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 574.	Kolumbien
scrobiculatum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 218.	Amazonas
seutigerum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 216.	„
sedatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 792.	Mexiko
sellatum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 48 (<i>Hesperobium</i>).	Illinois, Indiana
semiopacum Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. Juli 1895, p. 402.	Ostindien
biforme Fauv. Rev. d'Ent. XIV, Aug. 1895, p. 237.	
semirufum Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 32.	Ceylon
senegalense Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 119.	Senegal
serpentinum J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 51 (<i>Lissobiops</i>).	Alabama, Nord-carolina
Severini Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 72.	Kongo
Sharpi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 238.	Birma

Sharpianum nom. nov.

Sharpi Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 323
(nec Fauv.).

silvaticum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped.
1911, p. 477.

similipenne Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834,
p. 453. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 570. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1885), p. 520.

sparsum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 323.

spectabile Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.

speculator Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 511.

spinipes Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 318.

spiniventre Bernh. l. c. p. 316.

squalidipes Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,
p. 91.

Steinheili Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 81.

stipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 509.

strenuum Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36
(*Gastrolobium*).

illiniane Casey, l. c. p. 37.

var. *spissiceps* Casey, l. c. p. 37.

striatipenne Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 319.

stygium Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 517.

subatrum Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 185 (*Gastrolobium*).

subfractum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 215.

subgracile Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 525.

sulphuripes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 571.

perforatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—
1887 (1885), p. 527.

suturale Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 39
(*Gastrolobium*).

tenuicorne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 524.

terminatum Sharp, l. c. p. 512.

texanum J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878,
p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 37 (*Gastrolobium*).

tinctipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1885), p. 517.

Traili Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 223.

tricolor Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 222.

triste Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 223 (*Crypto-*
biella).

trochanterinum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908,
p. 317.

tropicum Bernh. l. c. p. 320.

tumidum J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878,
p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,
p. 54 (*Hesperobium*).

Brasilien

Zentralafrika

Mexiko

Bolivien

Ostindien

Mexiko

Brasilien

Argentinien

Neuguinea

Kolumbien

Mexiko

Ohio,

Iowa,

Missouri,

Texas,

Illinois

Texas

Brasilien

Mexiko,

Guatemala

Tennessee

Amazonas

Guatemala

Kolumbien,

Venezuela,

Brasilien,

Nicaragua,

Costarica,

Panama

Texas

Panama

Mexiko

Texas

Guatemala

Amazonas

Angola

Amazonas

Paraguay

Brasilien

Kalifornien

- umbratum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 508. Guatemala
- vagum** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 95. Texas
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 40
(*Gastrolobium*).
- varicorne** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 68. Südaustralien
- ventrale** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 97. Arizona
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 37
(*Gastrolobium*).
- venustum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 516. Mexiko
- virginicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 33 Virginia
(*Gastrolobium*).
- vittatum** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 96. Nordamerika
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 42
(*Gastrolobium*).

253

Baryopsis Fairm. et Germ.

Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 442. — Fauv. Bull.
Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 7.

brevipennis Fairm. et Germ. l. c. p. 443. Chile

1

Latona Guér.

Guérin, Rev. Zool. 1844, p. 13. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 91.

- calcarata** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1874, p. 21. Peru
- Erichsoni** Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada
- montivagans** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 323. Peru
- Spinolae** Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada

4



Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.**
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.**
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.**
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.**
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.**
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.**
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.**
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.**
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.**
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.**
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.**
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.**
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.**
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.**
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.**
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.**
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.** (Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephallidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.**
(Mark 3.30) Mk. 2.15
- 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I. 1910. 86 p.** (Mark 8.10) Mk. 5.40
- 20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.**
(Mark 10.50) Mk. 7.—

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
- 22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: H. Bickhardt, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: K. W. von Dalla Torre, Cebrionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: M. Pic, Scaptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 28: H. Gebien, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
(Mark 21.75) Mk. 14.50
- 29: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae II.
1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
- 30: K. W. von Dalla Torre, Cioidae. 1911. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 31: K. W. von Dalla Torre, Aglycyderidae, Proter-
rhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
- 32: E. Csiki, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.
(Mark 5.75) Mk. 3.90
- 33: K. W. von Dalla Torre, Nosodendridae, Byrrhidae,
Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
- 34: P. Kuhnt, Erotylidae. — C. Ritsema, Helotidae.
1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: J. Weise, Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: M. Pic, Anthicidae. 1911. 102 p.
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 37: H. Gebien, Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-
notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
- 38: J. J. E. Gillet, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911.
100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: Chr. Aurivillius, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912.
574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90

