

- NIETHAMMER, G., H. KRAMER und H. E. WOLTERS (1964): Die Vögel Deutschlands — Artenliste. Frankfurt a. M.
- SCHLENKER, R. (1966): Hochseevögel an der Westküste Schleswig-Holsteins im November 1965. Ornith. Mitt. 18, S. 60  
(1968): Jahresbericht aus der Region West der O. A. G. für 1967.  
Corax 2, Beiheft II, S. 70—74
- SCHMIDT, G. (1968): Jahresbericht aus der Region Ost der O. A. G. für 1967.  
Corax 2, Beiheft II, S. 62
- STRESE, U. P. (1968): Ornithologischer Jahresbericht 1967 für das Hamburger Gebiet. Hamb. Avifaun. Beitr. 6, S. 38

Wilhelm LEMKE  
219 Cuxhaven  
Kapitän-Alexander-Straße 24

Rolf SCHLENKER  
23 Kiel-Mettenhof  
Jütlandring 15

## Kurze Mitteilungen

### Neue Funde der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) an der Untereibe

Im Verlauf ihres stürmischen Vordringens in Richtung Jütland konnte die Bartmeise seit 1966 mehrfach im Gebiet der Niederelbe festgestellt werden; auch war in den Vierlanden/Hamburg im Mai bis Juni 1966 bereits starker Brutverdacht gegeben (NEHLSSEN, STEIN, 1967). Im April und Dezember desselben Jahres wurden einige Exemplare in den Vierlanden sowie am Asseler Sand gefangen und beringt (KLAEHN u. a., 1967). Spätestens im Mai 1966 dürfte die Bartmeise dann auch Schleswig-Holstein erreicht haben (DIEN u. a., 1967).

Wenn aus dem Gebiet der Elbmarschen zwischen Pinnau und Nord-Ostsee-Kanal bis zum Sommer 1968 nur erst ein Nachweis angeführt werden konnte, bei dem es sich zudem um sichtbaren Durchzug aus nördlicher Richtung handelte (vgl. HAACK, 1968), soll nicht verschwiegen werden, daß eine planmäßige Nachsuche in den geeigneten Biotopen bis dato nicht möglich gewesen war. Auch dürfte die Art ebenso wie dem Verfasser noch vielen Beobachtern unbekannt gewesen sein. Seit dem 3. XI. 1968 allerdings glückten uns verschiedene Nachweise an mehreren Stellen im Röhrichtgürtel des Elbufers vor der Seestermarsch. Am 6. I. 1969 überflogen zwei Vögel eine Schneise im Schilf, blieben danach aber unauffindbar. Bei einer planmäßigen Nachsuche am 9. II. 1969 stellten wir nicht weit davon wiederum mindestens zwei Vögel fest.

In der Zwischenzeit konzentrierte sich unsere Aufmerksamkeit auf die Pinnau-mündung, 2 bis 4 km Luftlinie von den oben genannten Beobachtungspunkten entfernt, wo wir erstmals am 17. XI. 1968 die kennzeichnenden Lockrufe gehört hatten. Am 8. I. 1969 konnten mindestens 6 Vögel, darunter 3—4 MM, aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Anwesenheit dieses Trupps notierten wir ohne Ausnahme bei jeder unserer späteren Kontrollen am 9., 12., 13., 19., 22. und 28. Januar. Am 1. II. 1969 konnten unter Mithilfe von R. HEINS 3 MM und 1 W gefangen und mit Helgoländer Ringen gekennzeichnet werden. Gleichzeitig stellten wir fest, daß der anwesende Trupp aus insgesamt 9—11 Ex. bestand.

Die Altröhrichtbestände auf dem südlichen Ufer der Pinnaumündung bedeckten in der genannten Beobachtungsperiode (Januar/Februar 1969) nur eine Fläche von höchstens 2500 Quadratmetern, die infolge von Witterungseinflüssen ohnehin ständig verringert wurde.

Es erscheint bemerkenswert, daß die Bartmeisen über eine Zeitspanne von mindestens 27 Tagen sich ständig auf so engem Raum aufgehalten haben, während das Angebot ausgedehnter Röhrichtwälder in knapp 150 m Entfernung auf dem gegenüberliegenden Ufer der Pinnau ständig vorhanden war. Wir möchten es durchaus für möglich halten, daß die Vögel bereits seit dem November des Vorjahres (1968) an diesem einen Platz verweilt haben. Die von G. SCHMIDT (1968) und SCHLENKER (1968) mitgeteilten Daten lassen gleichfalls eine wochenlange oder gar monatelange Verweildauer an einigen festen Plätzen (z. T. Brutrevieren!) in den Bereich der Wahrscheinlichkeit rücken.

#### SCHRIFTTUM:

- DIEN, J., K. HAARMANN und W. HARMS (1967): Ornithologischer Jahresbericht 1966 für das Hamburger Berichtsgebiet. Hamb. Avif. Beitr. Bd. 5, S. 114
- HAACK, W. (1968): Sammelbericht aus der Region Süd (Holstein) der O. A. G. für die Zeit vom 1. I. 1965 bis 15. IX. 1968. Corax — Beiheft 2, S. 68
- KLAEHN, D., A. RUGER und H. FINDEISEN (1967): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Stade, S. 26
- NEHLSSEN, H. und K. STEIN (1967): Die Bartmeise, ein neuer Brutvogel für Hamburg? Vogel und Heimat 16, S. 117
- SCHLENKER, R. (1968): Jahresbericht aus der Region West der O. A. G. für 1967. Corax — Beiheft 2, S. 76
- SCHMIDT, G. (1967): Jahresbericht aus der Region Ost der O. A. G. für 1967. Corax — Beiheft 2, S. 68

Wolfgang HAACK  
2082 Tornesch, Schule Ahrenlohe

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Haack Wolfgang

Artikel/Article: [Kurze Mitteilungen - Neue Funde der Bartmeise \(\*Panurus biarmicus\*\) an der Unterelbe 200-201](#)