

Bemerkenswerte Beobachtungen im Bereich der schleswig-holsteinischen Nordseeküste aus dem Zeitraum Januar bis September 1967

Von Rolf SCHLENKER, Kiel

Da bis zur Veröffentlichung des endgültigen Jahresberichtes erfahrungsgemäß eine beträchtliche Zeit vergeht, soll schon jetzt auf einige bemerkenswerte Beobachtungen hingewiesen werden. Wir hoffen, hierdurch andere Mitarbeiter zur Bekanntgabe weiterer Beobachtungen zu veranlassen, die in diesen Zusammenhang passen. Vielleicht wird es möglich sein, das Auftreten mancher Arten in einem größeren Zusammenhang zu sehen und eine Erklärung für ihr Erscheinen zu finden.

Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*): 7.VII.-20.VII. Wenningstedt/Sylt ad. (STURM).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): 26.VIII. 2 juv. (KUHLEMANN, TREFFURTH), 27.VIII. Adolfskoog 2 Ex. (DRENCKHAHN, R. HELDT jun.), 30.VIII. St. Peter-Böhl (G.MÜLLER, ROHRBACH).

Rostgans (*Casarca ferruginea*): 22.I. Grüne Insel (R.HELDT jun.), 18.VI. Hauke-Haien-Koog (LOOFT), 18.VI. Schülpersiel (DENKER, P.LENSCH) - Wildvögel?

Rothalsgans (*Branta ruficollis*): 23.-24.III. Grüne Insel (B.PALM, E.HANSEN, S.PETERSEN, Kopenhagen).

Schelladler (*Aquila clanga*): 28.IV. Wesselburener Koog, Totfund (n. BUSCHE).

Schrei-/Schelladler (*Aquila pomarina/clanga*): 6.V. Simonsberg (ROHRMOSER), 14.V. Fieler Moor (GLOE), mehrere Anahlspunkte lassen *A. clanga* vermuten!

Kranich (*Grus grus*): 7.III. Lohe/Hohn 6 Ex. (BERNDT), 1.VI. Kudensee 11 Ex. (WOLTER).

Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*): 31.VII. 1 Ex. Oland (DIEN).

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*): 13.V. Hauke-Haien-Koog 2 Ex. (LOOFT).

Brachschwalbe (*Glaucopis trichoptera*): 1.VI. Meldorf - anscheinend die Phase *pratincola*.

Eine weitere Brachschwalbe, wahrscheinlich der schwarzflügeligen Phase nordmanni, wurde am 27.VIII. am Wardersee von E.THIEME, A.SCHMIDT und K. SCHULZ gesehen (Anm. d. Schriftl.).

- Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*): 1.VI. Meldorf (GLOE),  
20.VIII. Gotteskoogsee (KÜHNAST, R.HELDT jun., SCHLENKER).  
Infolge ungünstiger Witterungsverhältnisse in den skandina-  
vischen Brutgebieten ist nach G. BERGMAN (mdl.) der Bruterfolg  
1967 gering gewesen. Es ist damit zu rechnen, daß der Durchzug  
der Raubseeschwalbe im Spätsommer aus diesem Grunde nicht  
so auffällig war wie in anderen Jahren. (Ann. d. Schriftleitung)
- Blauracke (*Coracias garrulus*): Anfang Juni Totfund bei Sorg-  
brück (n. AXT).
- Bartmeise (*Panurus biarmicus*): Überraschenderweise Brutvogel  
in Norderdithmarschen (LOOFT) und Eiderstedt (R.HELDT jun.).
- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): 28.VIII. Süderstapel  
(SCHNORR).
- Gelbbräunlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*): 17.V. Nord-  
strandischmoordamm (PFEIFER).
- Spornpieper (*Anthus novaeseelandiae*): 9.IX. Königsmoor/Hohn  
(SCHLENKER, AXT, KUNOW u.a.), 17.IX. Westerhever (DRENCK-  
HAHN, R.HELDT jun.).
- Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*): 12.IX. Süderstapel (SCHNORR).
- Englische Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*): 2.VI.  
Rantumbecken/Sylt und 3.VI. Kampener Vogelkoje/Sylt je ein  
Brutpaar (SCHLENKER).
- Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarrellii*): 28.III. - 1.V.  
mehrfach 1 Ex. Uthörn/Sylt (WITT).

Rolf SCHLENKER  
23 Kiel-Mettenhof  
Jütlandring 15

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [2\\_BH\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schlenker Rolf

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Beobachtungen im Bereich der schleswig-holsteinischen Nordseeküste aus dem Zeitraum Januar bis September 1967 39-40](#)