

Jahresbericht aus der Region Ost der O.A.G. für 1968

Vorgetragen auf der Jahresversammlung der O.A.G. am 26.I.1969
in Neumünster.

Von Rolf SCHLENKER, Kiel

Das Jahr 1968 hatte an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste drei ornithologische Höhepunkte: 1) die Brutbestandsaufnahme bei Greifvögeln für das Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 2) die Ende Juli einsetzende Invasion des sibirischen Tannenhäfers (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*), 3) der starke Einflug von Rotfußfalken (*Falco vespertinus*) im August und September. Diese Ereignisse werden in Sammelberichten von V.LOOFT, G. BUSCHE und R. HELDT jun. gesondert bearbeitet.

Neben diesen Feststellungen wurden mir folgende bemerkenswerte Beobachtungen gemeldet. (systematische Reihenfolge nach NIETHAMMER, KRAMER, WOLTERS (1964): Die Vögel Deutschlands - Artenliste):

Prachtaucher (*Gavia arctica*): Ein ♀ vom 22.XII. von Stolpe trug das volle Prachtkleid (RIENOW).

Sterntaucher (*Gavia stellata*): Noch am 5.V. ein Ex. in der Hohwachter Bucht (WINKLER). Dort am 10.VIII. zwei *Gavia spec.* (MENDE, SPARR).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Auf dem Westensee am 20.XI. 1100 Ex. (BERNDT).

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): Auf dem Selenter See 1 Ex. am 16.I. (BOHNSACK); ein Ex. im Kieler Hafen am 22.I. (BERNDT); jeweils ein Totfund am 28.I. am Bottsand (W.THIEME) und Graswarder (MENDE, SPARR). Je ein Ex. am 11.II. bei Strande (BECKMANN); 23.-24.II. Binnenschlei (ZIESEMER); 24.II. Bülk (BERNDT); 16.III. Surendorf (BERNDT) und 4.IV. Binnenschlei (ZIESEMER). Nur eine Feststellung aus dem Herbst: Ein Ex. am 26.X. auf dem Flemhuder See (BERNDT).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Einzelne Brutpaare am Wellsee und Russee bei Kiel, Kasseteich und Kührener Teich. Die einzige starke Kolonie auf den Lebrader Fischteichen. Zur Brutzeit am Methorstteich (DRENCKHAHN). Noch am 24.XI. 1 Ex. auf dem Selenter See bei Fargau (SCHOLL).

Eissturm vogel (*Fulmarus glacialis*): In der Hohwachter Bucht am 25.VIII. ein Ex. (MENDE, SPARR).

Baßtölpel (*Sula bassana*): Ein immat. Ex zeigte sich am 13.X. bei Neustadt (J. HINZ).

Silberreiher (*Casmerodius albus*): An den Wallnauer Fischteichen am 19.VII. ein Ex. (WEISSKÖPPEL, DOHM). Am Wesseker See rastete ein Ex. vom 13.-20.VIII. (MEBS). Möglicherweise war dieses Stück mit dem von Fehmarn identisch.

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Auffällig, daß zu der Zeit, in der der Silberreiher in Schleswig-Holstein auftrat, auch Seidenreiher beobachtet werden konnten. Am 6.VII. stellte BUCHHEIM ein Ex. am Barsbeker See fest. Vom 4.-25.VIII. wurde dann 1 Ex. am Kleinen Binnensee Hohwacht festgestellt (MENDE, SPARR, SCHÜTT, WINKLER). Möglicherweise war dieses Ex. mit dem vom Barsbeker See identisch.

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): Außer Daten von bekannten Brutplätzen im Südosten des Landes wurden nur zwei Beobachtungen bekannt. Jeweils ein Ex. am 25.VII. 1967 Fuhlensee bei Strand (BECKMANN) und 21.V.1968 am Schulensee (BERNDT).

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*): Am Barsbeker See rasteten am 8.XII. drei Ex., vergesellschaftet mit einer *Anser fabalis* (BERNDT, MENDE, SPARR, SCHLENKER), 5 Ex. vergesellschaftet mit 2 *A. fabalis* waren dort am 10.XII. (SCHOLL).

Bläßgans (*Anser albifrons*): Für 1968 liegen 27 Daten aus dem Zeitraum ab 29.IX. (BERNDT: Barsbeker See 9 ad.) bis 25.III. (KIRCHHOFF: Wallnau 60 Ex.) vor. Rastplatz Lanker See - Kührener Teich bis Anfang Januar (1.I. - 2.I. dort 240 Ex.) besetzt. Ab 5.I. geräumt (R.ROHDE). Bliesdorfer Tannen am 7.I. 200 Ex. nach W (ARNDT). Am 29.XII. starke Zugbewegungen im Raum Lübeck, Travemünde, Breitling und Moisling in S-W - Richtung von 1400 Ex. (LUCKMANN, MENDE, SCHÜTT, SPARR, VERMEHREN).

Graugans (*Anser anser*): Am Kleinen Binnensee Hohwacht 1 Ex. am 7.I. (v. WESTERNHAGEN). An einem Brutplatz 40 Paare am 8.IV. anwesend, davon 19 Paare mit Gelege (LEPTHIN).

Streifenzans (*Anser indicus*): An den Lebrader Teichen ein Ex. am 2.VI. (SCHÜTT) - Herkunft?

Kanadagans (*Branta canadensis*): Am 3.III. (WINKLER) und 7.III. (SCHOLL) 3 Ex. am Kleinen Binnensee Hohwacht. An der Trave 2 Ex. am 9.III. (KÜHNERT) sowie 2 Ex. an den Lammershagener Fischteichen (BERG). Am Kleinen Binnensee erneut 1 Ex. am 1.V. (WINKLER). Vor Bülk am 20.X. 1 Ex. (BEHMANN). In der Hohwachter Bucht 5 Ex. am 15., 21. und 29.XII. (v. WESTERNHAGEN).

Nonnengans (*Branta leucopsis*): Am 16.X. Stexwig 11o + 7o Ex. nach W (ZIESEMER), über Kiel am 18.X. 9 Ex. nach SSW (SCHLENKER), am Bottsand zogen am 20.X. 65 Ex. nach WSW (BERNDT, MOMSEN, RADOMSKI) und bei Schleswig 55 + 2o Ex. nach West (ZIESEMER). Ebenfalls am 20.X. 31 Ex. auf Schleimünde (BENTZIEN). Am Hemmelsmarker See ein Ex. am 23.XI. (RADOMSKI). Zwei Daten aus dem Jahre 1967: Am 12.XI. über der Binnenschlei 40 Ex. nach W - dann auf SSW schwenkend (ZIESEMER) und 3o Ex. am Gammelunder See rastend (MANFELDT).

Ringelgans (*Branta bernicla*): Auf dem Bottsand am 25.IX. drei Ex. (BEHMANN) und am 13.X. ein Ex. (AXT, REISER). Bei Bülk ein Ex. am 28.IX. (BUCHHEIM).

Anser spec.-Branta spec.: Zwischen dem 5.X. und 18.X. im Raum Schleswig bis Kiel starker Gänsezug, meist in großer Höhe. *Branta leucopsis* vermutlich stark beteiligt. Insgesamt wurden mehr als 1000 Ex. notiert (MANFELDT, ROHDE, ZIESEMER, SCHLENKER).

Kolbenente (*Netta rufina*): Am Kleinen Binnensee Hohwacht maximal 11o ♂♂ (Mausererpel?) am 3.VI. (WINKLER). An den Wallnauer Teichen ein angeschossenes ♀ am 3.XI. (EICHSTEDT, KIRCHHOFF, H. STOBBE). Am Markelsdorfer Huk am 5.IV. 13 Uhr 5 ♂♂, 4 ♀♀ zügig nach NO über See ziehend (KIRCHHOFF u.a.).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Die ersten Durchzügler zeigten sich 1968 recht früh. Am 25.X. an den Emkendorfer Teichen 4 Ex. (AXT), drei Ex. auf dem Lanker See am 26.X. (KUHN, SCHNEIDER, SCHLÜTER u.a.), 14 Ex. am 31.X. auf dem Kasseteich (HEIN).

Rotmilan (*Milvus milvus*): Jeweils ein Ex. am 19.III. bei Wallnau und am 20.III. bei Gold auf Fehmarn (KIRCHHOFF u.a.).

Ein Ex. bei Löptin am 15.XI. (BAYER) und am 23.XI. bei Warnau (v. WESTERNHAGEN).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): 1968 hatten 6 Paare Brutreviere besetzt. Es flogen 3 Jungvögel aus (NEUMANN, LOOFT). Außerdem halb der Brutzeit zeigten sich, insbesondere immat. Ex., Seeadler am Barsbeker See (BEHMANN, REISER, E.THIEME), an den Lammerhagener Fischteichen (MENDE, SPARR), am Kleinen Binnensee Hohwacht (SCHOLL), Westensee (MOMSEN), Wittensee (ANDRITZKE), Panker (v. WESTERNHAGEN) und Bothkamper See (BEHMANN).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Neben einer Beobachtung aus einem bekannten Brutgebiet östlich Rendsburgs (AXT) wurde nur eine Brutfeststellung bekannt. In Lauenburg wurden am 21.VII. zwei diesjährige Jungvögel ausgemäht (NEUMANN). Als Durchzügler 1 ♂ am 3.V. bei Alt Bockhorst (LOOFT) und 1 ♀ am 4.V. bei Todendorf (v. WESTERNHAGEN).

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*): Einen Durchzügler, 50 m hoch nach NNW ziehend, beobachtete v. WESTERNHAGEN am 25.V. auf Fehmarn.

Fischadler (*Pandion haliaetus*): 20 Daten von Durchzüglern liegen für 1968 vor (ANDRITZKE, AXT, BEHMANN, BOHNSACK, EITEL, HEIN, KIRCHHOFF, LOOFT, MENDE, REISER, SCHOLL, SCHÜTT, SCHWARZE, SPARR, E.THIEME, ZIESEMER, SCHLENKER).

März : I :-	Mai : I :-	August : I : 1(1)
II :-	II : 1(1)	II : 1(1)
III : 1(1)	III :-	III : 1(1)
April : I :-	Juli : I :-	September: I : 5(5)
II : 2(2)	II :-	II : 4(4)
III : 2(2)	III : 2(2)	III :-

(Zahl der Exemplare pro Dekade, in Klammern: die Zahl der Beobachtungen)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Es wurden keine Beobachtungen bekannt, die ein Brutvorkommen vermuten ließen. Als Durchzügler oder Wintergast nur sehr spärlich auftretend. Es wurden 9 Beobachtungen bekannt (AXT, BAYER, KIRCHHOFF, KÖNIG, MENDE, SPARR, TECH, WEIHMANN, WEILAND und ZIESEMER).

März : I :-	September: I:1(1)	Dezember: I:-
II :-	II:1(1)	II:1(1)
III :2 (1)	III:-	III:3(3)
August: I :-	November : I:1(1)	
II :1 (1)	II:-	
III :-	III:-	

(Zahl der Exemplare pro Dekade, in Klammern: die Zahl der Beobachtungen)

Merlin (*Falco columbarius*): Ein Ex., 12.IV. bei Güster, war am 4.VII.63 als ♂ pull. in Finnland beringt worden (BRÜLL).

Wachtel (*Coturnix coturnix*): Am 5.V. bei Lammershagen (BECKMANN), 19.VI. bei Breitenstein (EBER) und 23.VI. bei Klein Wittensee (BECKMANN) je ein rufendes Exemplar. Im Raum Wittenberger Passau an drei verschiedenen Stellen am 29.V., 18.VI. und 19.VI. rufend (BOHNSACK).

Kranich (*Grus grus*): In Holstein 7 Paare in den Brutrevieren. 3 Paare brüteten erfolgreich, drei Paare schritten nicht zur Brut (NEUMANN). Am Fastensee/Fehmarn 2 Ex. am 21.III. (KIRCHHOFF u.a.), über Travemünde am 2.VI. 30 Ex. nach SE (W.THIEME), 1 Ex. bei Gelting am 12.IX. (AXT), am 24.X. bei Lephan 27 Ex. ziehend (WIESE) und bei Seegendorf am 5.XI. 30 Ex. (BECKMANN).

Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*): Auf dem Reesholm ein ♂ am 22.IV. (LOOFT), ein diesj. Stück am 19.VII. auf dem Bottsand (BERNDT, SCHOLL). Am Kleinen Binnensee Hohwacht 1 Ex. am 10.VIII. (MENDE, SPARR) und 3 (!) Ex. am 18.VIII. auf dem Bottsand (DRENCKHAHN).

Mornell (*Eudromias morinellus*): Auf dem Bottsand ein Ex. am 30.VIII. (BERNDT).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Bei Stein am 21.XII. zwei Ex. (BERNDT).

Zwergschnepfe (*Lymnocryptes minimus*): Im Frühjahr bis 22.IV. (LOOFT: 1 Ex. auf dem Reesholm), im Herbst ab 18.IX. (BEHMANN: ein Ex. auf dem Bottsand). Daneben zwei Sommerdaten: 15.VII. Teerhofsinsel Lübeck 1 Ex. (MENDE, SPARR) und 31.VIII. Zuckerfabrik Schleswig 1 Ex. (LOOFT). Am Kasseteich 1 Ex. am 10.XI. (SCHOLL) und am Westensee am 15.XII. (HEIN, MOMSEN).

Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*): Am 29.XII. auf Oehe Schleimünde 4 Ex. (TECH, WEILAND).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): An den Wallnauer Fischteichen ein Ex. am 19.III. (KIRCHHOFF u.a.).

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Aus den Monaten Dezember, Januar und Februar liegen mehrere Daten von Oehe Schleimünde, Schwanseener See, Dänisch-Nienhof, Bülk, Stein, Bottsand, Sehlendorf und Graswarder vor.

Uferläufer (*Tringa hypoleucos*): Noch am 4.XII. ein verletztes (?) Ex. an der Schlei (ZIESEMER).

Knutt (*Calidris canutus*): Noch am 21.XII. ein Ex. am Bottsand (BERNDT).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Diese Art tritt auf dem Heimzug an der Ostseeküste nur spärlich auf. Am Bottsand 2 Ex. am 1.V.; 3 Ex. am 11.V.; 1 Ex. am 15.V. (BEHMANN). Am Kattegat/Lübeck 2 Ex. am 21.V. (MENDE, SPARR). Auf dem Bottsand am 29.VI. drei Ex. und jeweils 1 Ex. am 2. und 6.VII. (BEHMANN).

Meerstrandläufer (*Calidris maritima*): Es wurden 11 Beobachtungen aus dem Zeitraum ab 13.XI. und bis 25.III. von Bülk, Hohwacht, Graswarder, Puttgarden, Niendorf und Priwall gemeldet (BEHMANN, BORGWARDT, EICHSTEDT, LUCKMANN, MENDE, SCHOLL, SCHÜTT, SPARR, H. STOBBE, VERMEHREN, v. WESTERNHAGEN).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Auf dem Bottsand am 20.VII. 1630 Ex. (BERNDT). Für die Ostseeküste eine ungewöhnliche Anzahl! Am 20.I. in der Hohwachter Bucht 120 Ex. (v. WESTERNHAGEN).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): Auf dem Heimzug an der Ostseeküste eine spärliche Erscheinung. Auf dem Bottsand am 24.IV. zwei Ex. (BEHMANN). Auf dem Reesholm am 6.V. und an der Gruber Lacke am 27.V. jeweils 1 Ex. (LCOFT). Noch am 27.X. 1 Ex. auf dem Bottsand (W. THIEME).

Sanderling (*Calidris alba*): Wie bei Zwerg- und Sichelstrandläufer sind Daten vom Heimzug sehr begehrt. Am 4.V. auf dem Bottsand 2 Ex. und am 8.V. ein Ex. (BEHMANN). Am Schönberger Strand ein Ex. am 6.VII. - Wegzug am Bottsand ab 26.VII., an diesem Tag dort 6 Ex. (BEHMANN). Am 8.XII. auf dem Bottsand 5 Ex., am 21.XII. 7 Ex. (BERNDT, MENDE, SPARR, SCHLENKER).

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*): Zahlreiche Beobachtungen gelangen zwischen dem 20.VII. und 2.IX. - Am Bottsand wurde der Durchzug besonders gut registriert. Am 20.VII. dort 1 Ex. (SCHOLL), vom 19.VIII. (2 Ex.) bis 2.IX. (1 Ex.) wurde die Art fast täglich beobachtet. Maximal waren es 5 Ex. am 26.VIII. (BEHMANN, BERNDT, SCHOLL), von diesen waren zwei Exemplare beringt. BEHMANN gelang es, ein Ex. davon zu fangen. Es war am 20.VIII.68 als diesj. bei Skanör (Südschweden) beringt worden.

Auf Oehe-Schleimünde 1 Ex. am 24.VIII. (TECH). Am Kleinen Binnensee Hohwacht 2 Ex. am 18.VIII. (MENDE, SPARR); ein Ex. am 22.VIII. (AXT, JÖNCK). Zwei Ex. waren es wieder am 23.VIII., von denen eines beringt war (SCHOLL). Am 1.IX. dort noch 1 Ex. (BECKMANN).

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*): Einem Frühjahrsfund stehen 5 Herbstbeobachtungen gegenüber. Auf dem Barsbeker See ein Ex. am 8.V. (BECKMANN). Am Kleinen Binnensee Hohwacht am 10.VIII. und am Kattegat bei Lübeck am 30.VIII. jeweils 1 Ex. (MENDE, SPARR). An der Zuckerfabrik/Schleswig rasteten 2 Ex. vom 7.-12.IX. und 1 Ex. vom 20.-30.IX. (LOOFT, AXT). Vor Bülk ein Ex. am 22.IX. (BAYER).

Eismöwe (*Larus hyperboreus*): Bereits am 8.IX. ein immat. Stück in der Hohwachter Bucht (R. HELDT jun., SCHLENKER).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*): An einem geheimgehaltenen Ort seit 1965 vorkommend, Belegaufnahmen vorhanden (MENDE, SPARR).

Zwergmöwe (*Larus minutus*): Ein bemerkenswerter Rastplatz befindet sich am Kattegat/Lübeck. Es liegen aus diesem Gebiet 14 Daten aus dem Zeitraum 4.VII. - 31.VIII. mit maximal 41 Ex. vom 2.VIII. vor (MENDE, SPARR). Aus dem Raum Bottsand-Barsbeker See wurden 7 Daten zwischen dem 18.V. und 5.X. bekannt. Maximal waren es 6 Ex. am 18.V. (BEHMANN, SCHOLL). Zahlreiche Beobachtungen liegen vom Reesholm vor. Dort am 13.V. maximal 2 ad. 51 immat (LOOFT). Am Kleinen Binnensee Hohwacht jeweils 2 ad. am 27.IV. (WINKLER) und 17.VII. (SCHOLL). Über dem Dobersdorfer See am 3.V. 10-15 Ex., vornehmlich ad. (SCHOLL). Am Brodtener Ufer 3 immat. am 13.X. (MENDE, SPARR), bei Flügge 1 immat. am 19.III. (KIRCHHOFF u.a.) und 3 ad. am 10.V. an den Wallnauer Teichen (E.HANSEN).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*): Am 17.XI. auf dem Bottsand 1 diesjähriges Ex. (BEHMANN).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Noch am 2.XI. eine diesj. an der Binnenschlei (ZIESEMER).

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*): Über 50 Daten liegen aus 6 Gebieten vor. Die Hauptrastgebiete sind der Bottsand mit dem benachbarten Barsbeker See sowie der Kleine Binnensee Hohwacht. Bottsand-Barsbeker See: Drei Junidaten deuten auf gelegentliches Übersommern im Bereich der westlichen Ostsee hin. Am 12.VI.

zwei Ex., jeweils 1 Ex. am 21. und 22.VI. (SCHOLL). Am 2.VII. 4 ad. (BEHMANN), am 4.VII. bereits 8 ad. (SCHOLL). Die erste diesjährige wurde am 17.VII. von BEHMANN beobachtet. Bis zum 10.IX. wurden regelmäßig kleine Trupps dieser Art dort beobachtet (u.a. BERG, Dr. KÖNIG, THIEME). Maximal waren es 14 ad. und 4 diesj. am 23.VIII. und 10 ad. und 6 diesj. am 7.IX. (BERNDT). Noch am 2.X. ein einzelnes Ex. (DRENCKHAHN). Kleiner Binnensee Hohwacht: Auch von diesem Rastplatz liegen mehrere Juni-Beobachtungen vor. Jeweils ein Ex. am 4.VI., 12.VI., 16.VI; drei Ex. waren es am 5.VI. (JINKLER). Ferner 1 Ex. am 30.VI. (BUCHHEIM). Bis zum 25.VIII. liegen noch 7 Daten aus diesem Gebiet vor (AXT, BUCHHEIM, MENDE, SCHÜTT, SPARR), maximal waren es 6 Ex. am 25.VIII. (SCHÜTT). Einzelbeobachtungen wurden ferner von folgenden Örtlichkeiten bekannt: Am Postsee bei Preetz ein Ex. am 14.VIII. (JIESE) sowie 1 ad. + 1 diesj. am 18.VIII. (BERNDT). Jeweils ein ad. Ex. wurde am 9.VII. am Russee und am 4.VIII. am Westensee beobachtet (BERNDT). Vom Kattegat/Lübeck liegen zwei Beobachtungen vor. Am 13.VII. 1 Ex. (SCHÜTT) sowie am 29.VII. zwei Ex. (MENDE, SPARR).

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*): Bereits am 11.IV. zwei Ex. auf Schleimünde (SCHOLL).

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*): Auch für diese Art liegen zwei sehr frühe Daten vor. Zwei Ex. am 16.III. auf dem Krummsteert/Fehmarn, 2-3 Ex. am 24.III. vor Wallnau (KIRCHHOFF u.a.).

Tordalk (*Alca torda*): Vor Heidkate am 25.III. 1 ad. (SCHOLL), bei Falkenstein ein Ex. am 26.XI. (REISER) und 1 Ex. bei Dänisch-Nienhof am 15.XII. (BEHMANN). Ferner zwei Totfunde, 17.III. am Bottsand und 15.XII. bei Aschau (BEHMANN).

Trottellumme (*Uria aalge*): Vor Dänisch-Nienhof 1 Ex. am 15.XII., dazu ein Totfund (BEHMANN).

Gryllteiste (*Cephus grylle*): Am Priwall ein Ex. vom 25.II. - 2.III. (SCHÜTT); bei Orth am 22. und 23.III. zwei Ex. im Brutkleid (lediglich am Kopf noch einzelne helle Federn), vom 24.-25.III. dort noch 1 Ex. (KIRCHHOFF u.a.).

Hohltaube (*Columba oenas*): Als Durchzügler im Küstenbereich sehr spärlich geworden. Auf Fehmarn am 20.X. 11 ziehende bei Lemkenhafen (AXT).

Ringeltaube (*Columba palumbus*): Auf einem Rapsfeld bei Oehe am 29.XII. 1000 Ex. (TECH, WEILAND).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): Bei Langenlehsten ein Ex. am 1.V. (NEUMANN), am Bottsand 2 Ex. am 11.V. (E.HANSEN).

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*): Bei Teichhof auf Fehmarn am 1.IV. ein Ex. (C.STOBBE). Im Herbst 1967 eine starke Invasion in Südschweden und Dänemark.

Nachtschwalbe (*Caprimulgus europaeus*): Am 9.VII. bei Kühren ein Ex. (v. WESTERNHAGEN).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*): An der Oppendorfer Mühle am 13.V. (BECKMANN) und im Enkendorfer Holz am 26.V. (BERNDT).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): Im Raum Selk am 29.IV. 1 ♀ (ZIESEMER).

Wendehals (*Jynx torquilla*): Durchzügler wurden bei Oldenburg (PAULIEN), Hohwacht (R.HELDT jun.), Fahrdorf (BIESTERFELD), Heikendorf (SCHOLL) und Marutendorf (BECKMANN) bemerkt.

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): Bemerkenswerter Durchzug konnte wieder am Kleinen Binnensee Hohwacht registriert werden: Am 27.IV. dort 250 Ex., 1.V. und 5.V. etwa 100 Ex., 10.V. 125 Ex. und 25.V. 150 Ex. neben zahlreichen Motacilla f. flava (WINKLER).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*): Auf Fehmarn 1 ♂ am 19.III. an der Sulsdorfer Wiek und am 20.III. auf dem Spitzendorf (KIRCHHOFF u.a.).

Bachstelze (*Motacilla alba*): Am Westensee 1 Ex. noch am 15.XII. (HEIN, MOMSEN).

Spornpieper (*Anthus novaeseelandiae*): Bei Sehlendorf am 20.X. ein Ex. (v. WESTERNHAGEN).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Jeweils 1 Ex. am 24.IV. an der Hager Au bei Laboe (SCHOLL); 2.X. am Bottsand (DRENCKHAHN) und noch am 20.XI. auf dem Graswarder (BORGWARDT, LUCKMANN).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*): Es liegen 7 Beobachtungen zwischen dem 28.IV. und 11.V. vor. Am Flemhuder See 2 Ex. am 28.IV. (BERNDT); auf dem Bottsand je ein Ex. am 1.V., 8.V. und 11.V. sowie 2 Ex. am 4.V. (BEHMANN). Auf dem Reesholm 2 Ex. am 6.V. (LOOFT) und am Grünen Brink ein Ex. am 10.V. (E.HANSEN).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): In dem Beobachtungszeitraum konnte kein stärkerer Einflug bemerkt werden. Daten wurden aus folgenden Gebieten gemeldet: Süderbrarup, Fleckeby, Stexwig, Kiel, Molfsee, Heikendorf, Bottsand, Eutin, Neustadt und Travemünde.

Januar:	I: 8 (1)	Oktober:	I: -	Dezember:	I: -
	II: -		II: 1 (1)		II: 31 (3)
	III: 4 (1)		III: 6 (2)		III: 61 (2)
April:	I: -	November:	I: 26 (4)		
	II: 1 (1)		II: 157 (11)		
	III: -		III: 37 (3)		

(Zahl der Exemplare pro Dekade, in Klammern: die Anzahl der Beobachtungen)

Rohrschwirl (*Locustella lusciniooides*): An der Wakenitz am 27.IV. (ORBAHN) und am 11.V. am Kittlitzer See (LOOFT). Weitere Daten von den bekannten Plätzen im Raum Kiel bis Plön.

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*): Vom 19. - 20.VI. 1 Ex. am Schulensee bei Kiel singend (BERNDT).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): Am 27.XII. und an den Folgetagen 1 ♀ an einem Futterhaus in Flensburg (PAETOW).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): Auf dem Kuhlener Moor 1 ♂ am 12.IV. (BORGWARDT, LUCKMANN).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Am Strander Hafen 1 ♂ am 10.I. (!) (SCHOLL).

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia s. svecica*): Am Bottsand 1 ♂ am 4.V. (REISER).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*): An der Sulsdorfer Wiek 1 ♂ am 25.III. (I.EICHSTEDT, H.STOBBE).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): Am Schulensee ein ♂ am 26.IV. (BERNDT) und an der Hagener Au bei Laboe 1 Ex. am 28.IV. (SCHOLL).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*): An einem Brutplatz im Kreise Oldenburg am 10.V. 3 ♂♂, 1 ♀ (CHRISTOPHERSEN). Am Barsbeker See am 17.VI. 2 ♂♂, 1 ♀ (REISER) und am 30.VII. dort 4 Ex. (THIEME). Bei Altenteil auf Fehmarn am 3.XI. (E. und W.THIEME, K.SCHULZ). Am selben Tag am Salzensee 4 ♂♂ - wenig später am Fastensee 4 Ex., die sicherlich identisch waren mit denen vom Salzensee (KIRCHHOFF u.a.).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Am 14.IV. bei Oldenburg 2 Ex. (PAULIEN).

Ortolan (*Emberiza hortulana*): Bei Heikendorf am 5.V. ein Ex.
(SCHOLL).

Spornammer (*Calcarius lapponicus*): Am Kleinen Binnensee Hohwacht zwei Ex. am 31.III. (WINKLER); 1 ♂ am Barsbeker See am 10.IV. (SCHOLL).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): Bei Hohwacht vom 20.-22.VI. ein ♂ eifrig singend. Ein ♀ wurde nicht bemerkt (SCHLÜTER).

Girlitz (*Serinus serinus*): Durchzug am Bottsand am 20.X. mit 6 Ex. (BERNDT, MOMSEN, RADOMSKI, SCHLENKER) und am 2.XI. mit 4 Ex. (BERNDT).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Am 16.III. am Grünen Brink 1 Ex. (KIRCHHOFF u.a.). Auf dem Eichhof in Kiel am 20.XI. 25 Ex. (HEIN) und mehrere kleine Trupps am 25.XII. (KÖNIG).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): Aus dem Zeitraum vom 23.VI. bis 30.XII. wurden 15 Beobachtungen gemeldet.

Juni	:	II: -	Oktober	:	I: -
		III: -			II: 27 (1)
		III: 100 (1)			III: 4 (1)
Juli	:	I: -	November	:	I: 1 (1)
		II: -			II: 1 (1)
		III: 2 (1)			III: 43 (1)
August	:	I: -	Dezember	:	I: 16 (1)
		II: 5 (1)			II: -
		III: 2 (1)			III: 40 (4)
September	:	I: -			
		II: 6 (1)			
		III: -			

(Zahl der Exemplare pro Dekade, in Klammern die Zahl der Beobachtungen)

Ich bitte um Ergänzung der Daten von 1968.

Rolf SCHLENKER
23 Kiel-Mettenhof
Jütlandring 15

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [3_BH_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schlenker Rolf

Artikel/Article: [Jahresbericht aus der Region Ost der O.A.G. für 1968 29-39](#)