

Jahresbericht aus der Region Ost der OAG für 1969  
=====

Von Rolf SCHLENKER

Das Jahr 1969 brachte neben zahlreichen Arbeitsaufgaben vielerlei ornithologische Ereignisse, die gesonderte Darstellungen notwendig machten. So werden in diesem Bericht nur die restlichen Daten zusammengefaßt. Wir können erkennen, daß die gewohnte Form der Jahresberichte sich wandelt und speziellen Betrachtungen Platz macht.

Daneben wurden uns folgende Beobachtungen zur Verfügung gestellt.

Eistaucher (*Gavia immer*): Nur eine Beobachtung, 15.II. 1 Ex. Dänisch Nienhof (BERNDT).

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): Zahlreiche Nachweise im März/April (s. SCHWARZE und SCHLENKER in Vorbereitung), im Herbst 2 Ex. am 6.X. Grüner Brink (JOHANNSEN), 9.XI. Wittensee 1 Ex. (AXT) und 13.XII. Travemünde 1 Ex. (MENDE).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Brutverdacht am Lanker See (WIESE), noch am 19.X. am Brutplatz Lebrade 6 Ex. (v. WESTERNHAGEN).

Eisturmvogel (*Fulmarus glacialis*): Bei Tonne 3 vor Schlei-  
münde 1 Ex. am 10.II. (REISER).

Baßtölpel (*Sula bassana*): In der Hohwacher Bucht 2 ad. am 2.VI. (WINKLER); vor Laboe ein immat. Ex. am 16.XI. (HEIN, HOFER). Ein Totfund am Einfelder See im Oktober (KUHLEMANN).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): Neben zahlreichen Einzeldaten 3 Beobachtungen von größeren Trupps. 22.III. Stülper Huk 13 Ex. (MENDE), 10.VIII. Wardersee 17 Ex. (MENDE, SPARR) und 11.X. Hohwacht 16 Ex. (M. EICHSTEDT, H. STOBBE).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): An einem Brutplatz bei Lübeck ein Gelege mit 7 Eiern am 12.VI. (MENDE, SPARR). Bei Preetz 1 W. am 21.IX. (WIESE).

Flamingo (*Phoenicopterus ruber*): Am Bottsand 1 Ex. (chilienische Rasse) vom 17.IV. - 8.VI. rastend (BEHMANN).

Zwergschwan (*Cygnus bewickii*): Im Bereich der inneren Schlei ein Ex. übersommernd, anscheinend verletzt. (LOOFT, ZIESEMER, DRENCKHAHN).

Saatgans (*Anser fabalis*): Neben Herbst- und Winterdaten, die von BERNDT gesondert zusammengestellt werden, 5 Daten. Heidkate 18.I. 2 Ex. (BERNDT); 1.II. Bottsand 14 Ex. (SCHOLL, BERNDT); 23.III. Kaseteich 1 Ex. (SCHOLL); 9.IV. bei Lensahn (BECKMANN); 4.IV. Wallnau 11 Ex. (BRÄUNING).

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*): NSG Kleiner Binnensee Hohwacht 9.VI. 1 Ex. (WINKLER); 18.X. Barsbeker See 4 Ex. neben *A. anser* (BERNDT).

Bläßgans (*Anser albifrons*): 6 Daten zwischen dem 5.I. und 9.III. und 23 Daten zwischen dem 12.X. und 30.XII. aus dem Raum Preetz-Plön sowie Wardersee-Lübeck. Einzeldaten ferner vom Dobersdorfer See, Emkendorf, Hohwacht, Surendorf, Strande, Kiel, Fehmarn, Schwansener See.

Graugans (*Anser anser*): Am Wardersee im August/September 1000-2000 Ex. (MENDE, SPARR, K.SCHULZ u.a.); Über Schleswig am 25.X. 650 Ex. nach West (W.THIEME). 3 Winterdaten, 10.XII. Plön (BERNDT), 20.XII. Schwansener See (JÜRGEN), 21.XII. Gr. Binnensee Hohwacht (v. WESTERNHAGEN).

Kanadagans (*Branta canadensis*): 9.I. Neustadt 1 Ex. (J.HINZ); 2.II. Kiel 23 Ex. /11<sup>30</sup>/ E (SCHWARZE); 9.II.-4.IV. Lübeck 1 Ex. (MENDE, SPARR u.a.); 16.III. bei Fleckeby 7 Ex. (LOOFT); 18.III. Plön 5-6 Ex. (LÜTHJE); 22.III. Neustädter Binnenwasser 19 Ex. (J.u.R. HINZ); 23.III. Hohwacht 2 Ex. (FUHRMANN, KAPPES); 15.V. Rixdorfer Teich (SCHOLL, BERNDT, Verf.).

Nonnengans (*Branta leucopsis*): 16.III. Dobersdorfer See 13 Ex. rastend neben *A. anser* und *A. albifrons* (SCHOLL), bereits am 7.IX. Bottsand 1 Ex. (HEIN) - Herkunft?

Schnatterente (*Anas strepera*): Dezember und Januar-Beobachtungen im Raum Kiel und Preetz.

Spießente (*Anas acuta*): Winterdaten weiterhin spärlich! 8.I. Stohl-Bülk 1 ♂ (BEHMANN).

Löffelente (*Anas clypeata*): 14.I. Haddeby 1 Ex. (ZIESEMER).

Kolbenente (*Netta rufina*): Außer Daten aus den Brutgebieten 2 Ex. am 18.III. Aschau (ZWERGEL). 2 Winterdaten, 10.XII. Wakenitz/Lübeck 2♂♂ (SPARR); 16.XII. Plöner See 1♂ (BERNDT).

Moorente (*Aythya nyroca*): 9.III. Lübeck 1♂ (SCHÜTT)- Belegphoto, 3.VIII. Lebrade 1 Ex. (MENDE, SPARR).

Eiderente (*Somateria mollissima*): Schleswig an 9 Tagen zwischen dem 10.VI. und 20.VIII. insgesamt 1470 Ex. nach W durchziehend (ROHDE).

Schrei-, Schelladler (*Ayuila pomarina*, *A. clanga*): 15.V. Mielkendorf (HELDT jun., LOOFT); 31.V. Kleiner Middelburger See (CHRISTOPHERSEN, NIELSEN).

Rotmilan (*Milvus milvus*):Wardersee 2.II. 1 Ex. (KONRAD, SCHÜTT).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): In den Brutrevieren gehören Störungen im Horstbereich zur Tagesordnung. Nur 1 Jungvogel flog aus (NEUMANN).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): An einem Platz im Raum Lübeck vom 24.V. - 2.VI. 1♂♀ (ARNDT); östlich Rendsburg (AXT) und süd-östlich Rendsburg (Verf.) Brutreviere besetzt.

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*): Bei Plön bereits am 23.III. ein Ex. (KAPPES, FUHRMANN)- Steckbrief liegt vor. Zu Frühbeobachtungen siehe KÖNIG, C. (1969) Orn. Mitt. 21 S. 41.

Fischadler (*Pandion haliaetus*): 42 Beobachtungen (es wurde versucht, Daten von längere Zeit rastenden Exemplaren nicht mit zu berücksichtigen) von insges. 64 Ex. wurden von folgenden Beobachtern gemeldet: AXT, BECKMANN, BEHMANN, BRÄUNING, BERNDT, BIESTERFELD, EICHSTEDT, HEIN, KONRAD, KUHLEMANN, LEPHTIN, LEMKE, MANFELDT, MENDE, MOMSEN, RADOMSKI, REISER, SCHNEIDER, SCHOLL, K. SCHULZ, SCHWARZE, SPARR, E. THIEME, WIESE, WEIHMANN, ZIESEMER.

April:	I : 14 (11)	Juli:	I : 1 (1)	September:	I : 7 (6)
	II : - -		II : 1 (1)		II : 5 (4)
	III : 2 ( 2)		III : 2 (2)		III :15 (6)

Mai:	I : 3 (2)	August:	I - -	Oktober:	I : 1 (1)
	II : 3 (3)		II : 3 (1)		II : - -
	III : - -		III : 8 (3)		III : - -

(Zahl der Exemplare pro Dekade, in Klammern: die Zahl der Beobachtungen).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Die wenigen Durchzüglerdaten werden einzeln aufgeführt. 1.I. Stolpe (J. HINZ); 6.I. Gelting (TECH, ERFURT); 2.II. Wardersee (KONRAD); 17.III. Haddebyer Moor (ZIESEMER); 30.III. je 1 Ex. Fehmarnsund und Puttgarden (SPARR, MENDE); 5.IV. Puttgarden (EICHSTEDT); 13.IX.-21.XI. insges. 10 Beobachtungen von einem Ex. am Wardersee (SPARR, K. SCHULZ, MENDE); 6.XII. Barsbeker See 1 Ex. (BERNDT).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): 1969 nur ein geringer Teil der Brutreviere besetzt. Erhebliche Winterverluste (LOOFT, BIESTER-FELD, ZIESEMER u.a.).

Wachtel (*Coturnix coturnix*): Im August am Wilden Moor östlich Rendsburg 1 Ex. rufend (JOHANNSEN).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*): Eine bemerkenswerte Winterbeobachtung gelang ANDRITZKE, 12.I. 1 Ex. am Wittensee. Dort noch am 28.X. 1 Ex. (AXT).

Kranich (*Grus grus*): 12 Daten von Durchzüglern bzw. Übersommerern. 30.III. Hohwacht 4 Ex. (BfV Eutin); 3./4.IV. über Kiel Rufe (W. THIEME); 4.IV. Fehmarn 3 Ex. (n. BRÄUNING); 8.IV. Barkauer See 12-15 Ex. (B. BOHNSACK); 9.IV. Kaseteich 6 Ex. (LOOFT); ab 18.IV. bei Gothendorf 7 Ex. (BOHNSACK) - dort vom 18.IV. - 5.V. ca. 20 Ex. rastend (n. SCHNEIDER); 26.IV. Hohwacht 2 Ex. (v. WESTERNHAGEN); 30.IV. Ostfehmarn an 3 Stellen insges. 15 Ex. (Verf.); 1.VI. Seedorf Schaalsee 1 x 9 Ex. (DAUM, LUNDT, FOKUHL); 22.VI. Bottsand 1 Ex. (BEHMANN); Mitte Oktober Schierensee 1 größerer Trupp durchziehend (n. REISER).

Skua (*Stercorarius skua*): Am Bottsand ein Ex. am 4.XI. (BEHMANN), eine *Stercorarius spec.* über Heikendorf am 4.XII. (SCHOLL).

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*): 30.IV. Fehmarnsund 1 ad dunkle Phase nach E durchziehend (Verf.); 12.VI. Hansdorfer See 1 ad helle Phase und 2 dunkle Stücke nach West; 28.VII. Kieler Innenförde 1 immat (BERNDT).

Eismöwe (*Larus hyperboreus*): 2 Daten, 5.IV. Stein (BERNDT) und 26.XII. Eckernförde (AXT).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*): An dem ostholsteinischen Brutplatz ein Gelege von 3 Eiern (MENDE, SPARR). Auf Schlei-münde ein Ex. am 13.V. (R.HELDT jun.), am Wardersee 1 ad am 6.VIII. (SPARR, MENDE).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*): Im Kieler Hafen am 10.XII. 1 Ex. (REISER).

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*): Im wesentlichen konnten die Befunde aus dem Vorjahr bestätigt werden. Bemerkenswert einige Frühjahrsnachweise; 30.IV. und 25.V. Bottsand 1 Ex. (BEHMANN); dort 2 Ex. am 10.V. (SCHOLL). In diesem Küstenbereich erneut mehrere Juni-Funde, die Übersommerung vermuten lassen (BEHMANN). Dänischburg am 29.V. 1 Ex. (MENDE). Zwischen dem 27.VII. und 19.IX. 7 Daten, max. 2 Ex., am Wardersee (MENDE, K. SCHULZ, SPARR); am Westensee 1 Ex. am 6.VII. (Verf.).

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*): Erstbeobachtungen am 4.IV. Krummsteert (KONRAD); 5.IV. Bottsand (BERNDT); 5.IV. Schwansener See (BENTZIEN); 5.IV. Eckernförde (Verf.). Letztbeobachtung 4.XI. Bottsand (BEHMANN).

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*): Erstbeobachtungen 12.IV. Schönberg (KRUSE) und 13.IV. Geltinger Birk (TECH).

Tordalk (*Alca torda*): 7 Beobachtungen, 26.I. Dänisch-Nienhof (W. THIEME); 10.II. Strande 2 Ex. (REISER); 2.III. Eckernförde Totfund (Verf.); 20.III. Stein (BEHMANN); 2.IV. Dänisch-Nienhof (BEHMANN); 16.IV. Heikendorf (KUHN); 16.VI.(!) bei Flensburg 1 x 4 Ex. (REISER).

Krabbentaucher (*Plautus alle*): 29.X. Karlsgrund Geltinger Bucht 2 Ex. (REISER).

Trottellumme (*Uria aalge*): Noch am 7.V. 1 Ex. bei Eckernförde (ZWERGEL).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): 11.V. NSG Kleiner Binnen-see 2 Ex. (WINKLER).

Waldohreule (*Asio otus*): Erhebliche Winterverluste, besonders im Raum Schleswig festgestellt (ZIESEMER, LOOFT, BIESTERFELD).

Nachtschwalbe (*Caprimulgus europaeus*): Brutzeitvorkommen nur im Raum Lauenburg an zwei Punkten (POLTZ, MENDE). Als Durchzügler im Küstenbereich am 30.VIII. Fuhllensee Strande sowie ein angeflogenes Ex. am 31.VIII. Marienfelde (WEIHMANN).

Eisvogel (*Alcedo atthis*): Bruthinweis Gr. Eutiner See (ZYLSKE) und Brutnachweis Schwentine Opendorf (LOOFT).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*): Brutnachweis Nordufer Seelenter See (SCHOLL); ansonsten Daten aus dem Hauptverbreitungsgebiet im Raum Lübeck-Lauenburg-Segeberg.

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): Im Küstenbereich am 5.IV. Grüner Brink (BRÄUNING) und 14.IX. Noer (Verf.).

Wendehals (*Jynx torquilla*): Mehrere Daten von Durchzüglern. 20.IV. Wittenberg (DRENCKHAHN), 30.IV. Gelting (TECH), 30.IV. Wendtorf (BEHMANN), Anfang Mai Graswarder (REISE), 4.V. Flüge (HEIN, BEHMANN), 4.V. Wallnau 2 Ex. (BERNDT, SCHOLL), 4.V. Grüner Brink (Verf.), 6.V. Haithabu (ZIESEMER), 29.VIII. Bottsand (SCHOLL). Auf Brutvorkommen könnten folgende Beobachtungen hinweisen: 17./18.V. Rosengarten 1 Paar (LEPHTHIN, DRENCKHAHN), 27.V. bei Selk an 2 Stellen je 1 rufendes Ex. (ZIESEMER), 31.V. Garrensee 1 rufendes Ex. (SCHOLL, BERNDT) und 8.VI. Waldzeile am Grünen Brink 1 Ex. (DRENCKHAHN).

Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*): 6 Beobachtungen, 8.III. Bottsand 2 Ex. (BERNDT), 9.III. Marutendorf 1 Ex. (SCHWARZE), 4.XI. Heidkate 2 Ex. (BEHMANN), 9.XI. Stein 1 Ex. (W.THIEME), 29.XI. und 2.XII. Osterrönfeld ein Schwarm von 50 Ex. (ZIESEMER)

Heidelerche (*Lullula arborea*): Brutzeitfunde nur aus dem Raum Bröthen, Gudow, Segrahn und Grambek (POLTZ, FOKUHL, MENDE). Je 1 Ex. am 6. und 20.XII. am Bottsand (BERNDT) sowie 1 Ex. bei Heikendorf am 8.XII. (SCHOLL).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): 6 November-Beobachtungen zwischen dem 1.XI. und 22.XI. vom Arenholzer See (MENFELDT), Flemhuder See (HEIN), Plöner See (BERNDT), Schönberger Strand (KRUSE) und Hohwacht (v. WESTERNHAGEN).

Schafstelze (*Motacilla flava*): Noch am 9.XI. ein Ex. am Bottsand (W. THIEME).

Bachstelze (*Motacilla alba*): 26.I. Schleswig (LOOFT), 29.I. Eckernförde 2 Ex. (AXT).

Spornpieper (*Anthus novaeseelandiae*): Einzige Feststellung: 21.IX. Bottsand 1 Ex. (W. THIEME).

Brachpieper (*Anthus campestris*): 17./18.V. Rosengarten - Brutplatz ? (DRENCKHAHN, LEPHIN).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*): Die Art gehört zu den regelmäßigen Durchzüglern im Küstenbereich der Ostseeküste. 26.IV. Bottsand 3 Ex. (BEHMANN), 30.IV. dort insges. 13 (!) Ex. (BEHMANN), 4.V. Flügger Teich 1 Ex. (HEIN, BEHMANN), 14.IX. Bottsand 2 Ex. (DRENCKHAHN), 20.IX. Bottsand 3 Ex. (KUHN, BERNDT), 28.IX. dort 1 und am 4.X. dort 2 Ex. (BERNDT). Je 1 Ex. am 5.X. am Salzensee, Grünen Brink und Wallnau (SCHOLL, BERNDT).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): Nur einige wenige Beobachtungen wurden gemeldet. 5.I. Kiel 1 Ex. (Verf.), 23.I. Bülk 2 Ex. (BEHMANN), 25.II. Laboe 2 Ex. (BEHMANN), 1.VI. - zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt - 1 Ex. bei Grambeck (POLTZ). 28.X. Rammsee 4 Ex. (GERNHOLZ n. SCHNEIDER), 16.XI. Kiel 5 Ex. (BERNDT).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): Überwinterung im Kieler Raum durch Beringung nachgewiesen (SCHWARZE).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): An den bekannten Plätzen, Hansdorfer See, Flemhuder See, Meimersdorfer Moor, Schulensee, Wellsee, Bothkamper See und Barsbeker See wiederholt festgestellt. Neu: 31.V. Gr. Middelburger See (CHRISTOPHERSEN, NIELSEN).

Schlagschwirl (*Locustella fluvilatilis*): Außer dem Vorkommen bei Wulfshagenerhütten (AXT, 1970) bei Bordesholm 2 singende Ex. (BERNDT, DENKER) am 22.V. sowie 1 singendes ♂ bei Blanke-

nese am 16.VI. (ORBAHN).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): Einige Spätdata, 12.XI. Russee (MOMSEN), 20.X.-23.XI. Sanddornbestände an der Trave 4 Ex., 4.XII. dort noch 1 Ex. (KÜHNERT), 1.XII. totes ♂ Bad Schwartau (VÖGLER-SCHERF) und 28.XII. Kiel-Wik 1 ♀ (SCHNEIDER).

Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*): 3 Funde die auf Brutvorkommen hindeuten, 1.VI. Salemer Moor (BERNDT), 9.VI. Heiligenhafen (DRENCKHAHN) und 13.VI. Ostfeld (DRENCKHAHN).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*): 8.XII. Kiel 1 Ex. (W.THIEME).

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*): 3.V. Dosenmoor 1 ♂ (RADOMSKI). Steckbrief liegt vor.

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): Fehlanzeige!

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochrurus*): An der Steinfurther Mühle 2 Jahresbruten durch Beringung nachgewiesen (SCHWARZE).

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia s. svecica*): 30.IV. Bottsand (BEHMANN), 17.V. Barsbeker See 1 ♀ (BERNDT).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia s. cyanecula*): In einem Moor Südholsteins 1 ♂ am 2.V. singend (KRUSE). Bei Lübeck am 4. und 10.IX. an 2 verschiedenen Punkten je 1 ♂ (KÜHNERT, SCHÜTT).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 26.IV. Pilsen/Selenter See 1 x 10 Ex. (KRUSE).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*): An einem Brutplatz im Kreis Oldenburg am 6.IV. 9 Ex. (BRÄUNING), 4.V. dort 8 Ex., am 5.X. 3 Ex. (BERNDT, SCHOLL). Bei Altentheil am 26.X. 4 ♂♂ (Verf.). An einem neuen Brutplatz im Kreis Oldenburg am 24.VI. fütternde Altvögel (Verf.) - dort am 11.VII. von B. BOHNSACK bestätigt. Am Flemhuder See 2 Ex. am 27.XII. (BERNDT).

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*): Bei Osterrönfeld vom 14. - 29.XI. bis 16 Ex. z.T. neben Ohrenlerchen (ZIESEMER, AXT).

Sporammer (*Calcarius lapponicus*): 15.II. Geltinger Birk 1 Ex. (TECH), 31.III. Fehmarnsund 1 Ex. (LOOFT), 4.XI. Bottsand 1 Ex. (BEHMANN).



Bergfink (*Fringilla montifringilla*): Am Schwansener See am 25.VII. und 3.VIII. 1♂ singend (RADOMSKI) - vorher, 30.VI.-19.VII. 1♂♀ Geltinger Birk (LEMKE).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Kein Invasionsjahr! Nur 4 Einzelbeobachtungen wurden gemeldet. 23. und 30.III. 2 Ex. in Kiel (HEIN), 13.IV. Arenholzer See 20 Ex. (MANFELDT) und 19.XII. Wakenitz/Lübeck 17 Ex. (MENDE).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): Aus allen Landes-  
teilen Einzeldaten - kein stärkerer Einflug.

Februar	I : -	Juli	I : -
	II : 11 (1)		II : - (1)
	III : -		III : -
März	I : -	August	I : -
	II : -		II : 2 (1)
	III : 4 (1)		III : -
April	I : -	September	I : -
	II : 1 (1)		II : 3 (1)
	III : -		III : 5 (1)
Mai	I : -	Oktober	I : -
	II : 3 (2)		II : 30 (1)
	III : 12 (1)		III : -
Juni	I : -	November	I : -
	II : -		II : 10 (4)
	III : 2 (2)		III : -

(Zahl der Exemplare pro Dekade, in Klammern die Anzahl der Beobachtungen).

Rolf Schlenker  
23 Kiel 1  
Jütlandring 15

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [3 BH 2](#)

Autor(en)/Author(s): Schlenker Rolf

Artikel/Article: [Jahresbericht aus der Region Ost der OAG für 1969 85-93](#)