

**Zum Vorkommen des Wiedehopfs (*Upupa epops*) in Schleswig-Holstein
1946 bis 1977**

von G. BUSCHE

Mehreren Autoren zufolge mehren sich die Nachweise der Art in neuerer Zeit (HAFTORN 1971, MORITZ 1977, ROSENDAHL 1977).

Folgende Übersichten ergaben sich aus der Zusammenstellung der zur Verfügung stehenden Daten (1946-1977) aus Schleswig-Holstein.

1. Zur Phänologie (ohne Brutzeitdaten aus bekannten Brutgebieten, Dekaden nach BERTHOLD 1974)

Dekaden	Anzahl Beob. Ost	Anzahl Beob. West	Ex gesamt
22. - 31. März		1	1
1. - 10. April		4	6
11. - 20. April	8	3	16
21. - 30. April	13	5	23
1. - 10. Mai	13	7	21
11. - 20. Mai	5	8	13
21. - 30. Mai			
31. 5. - 9. Juni	3		4
10. - 19. Juni	1	2	3
20. - 29. Juni			
30. 6. - 9. Juli			
10. - 19. Juli	1		1
20. - 29. Juli	2		2
29. 8. - 7. September		2	2
8. - 17. September	1	2	7
18. - 27. September			
28. 9. - 7. Oktober	1	4	5
8. - 17. Oktober		4	5
18. - 27. Oktober			
28.10. - 6. November		1	1
Summen	48	43	110

Zum Wegzug liegen noch zwei Extremdaten vor: 28.11.72. 1 Ex Friedrichstadt (HELDT) und 28.12.74 1 Ex Meldorf (TEICH). Während die erste Beobachtung bekanntermaßen unstrittig ist, wurde im zweiten Fall die Bestimmung des dem Vf. persönlich bekannten Beobachters eingehend überprüft. Es ergaben sich keine Hinweise einer Fehlbestimmung.

Auf dem Durchzug ist eine Bevorzugung der östlichen Landesteile (wie beim Brutvorkommen) nicht erkennbar (unter Einbeziehung einer geringeren Beobachterdichte im Westen). Halligen und Inseln an der Westküste sind in diesem Zusammenhang bemerkenswerte Vorkommensorte. Habitate: u. a. Gartenrasen, Sportplatz, Zeltplatz, Sandstrand, Dünen.

Weit überwiegend trat der Wiedehopf auf dem Durchzug einzeln auf, mehrmals zu zweit und zu dritt sowie zweimal (je einmal auf dem Frühjahrs- und Herbstzug) wurden 4-6 bzw. 5 Ex beobachtet.

2. Zum Vorkommen 1946 - 1977 (ohne Brutzeitdaten aus bekannten Brutgebieten):

Jahr	1946	'47	'48	'49	'50	'51	'52	'53	'54	'55	'56	'57	'58	'59
Beob.	1	1	1		2	2	2	2	3			4	1	2
Brutvork.			1									1	1	1
Brutverd.								1	3	1				

Jahr	1960	'61	'62	'63	'64	'65	'66	'67	'68	'69	'70	'71	'72	'73
Beob.	6	4	8	1	4	5	2	1	4	3	4	1	3	1
Brutvork.	1								1		1			1
Brutverd.	2	2	2										1	

Jahr	1974	'75	'76	'77
Beob.	10	4	3	8

Das in allen Fällen nicht alljährliche Brutvorkommen (einschließlich der Brutverdachte) wurde in 4 Bereichen (Abb.) in aufeinanderfolgenden Jahren festgestellt.

Der Zusammenstellung liegen unveröffentlichte Mitteilungen zugrunde von AXT, BERNDT, BAYER, BJORKJAER, DANNENBURG, DÜRNBERG, EKELÖF, FLOHRSCHÜTZ, GIES, HAUPT, Dr. HELDT, JENSEN, KUHLEMANN, LOOFT, LUNAU, MANFELDT, MEESENBURG, ORBAHN, PESCHEL, REICHEL, ROSENKRANZ, H. SCHULZ, SCHLENKER, SEEHUSEN, STEPHAN, STURM, TEICH, THIES, WESTPHALEN und WINKLER sowie außerdem veröffentlichte Daten (wegen des Charakters dieses Beitrags ohne Titel angeben):

ARFSTEN, R. (1969): Führer Vogelbuch. Boyens, Heide. - BABBE, R.: Jahrb. Heimat. Kr. Oldenburg 1956: 210-232, 1957: 45-81. - BECKMANN, K. O. (1964): Die Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Wachholtz, Neumünster. - BERG, J. (1965): Hamb. avifaun. Beitr. 2: 30-34. - BUSCHE, G. (1971): Corax 3, Beih. II: 80. - BUSCHE, G., u. R. K. BERNDT (1975): Corax 5, Beih. II: 154 f. - DIEN, J. (1965, 1966): Hamb. avifaun. Beitr. 2: 120-194, 3:185-222. - DIEN, J., K. HAARMANN u. W. HARMS (1967): Hamb. avifaun. Beitr. 5:78-135 - GROEBBELS, F. (1958): Mitt. Faun. Arbeitsgem. Schl.-Holst. (FAG) 11: 29f. - GROSSE, A. (1953): Mitt. FAG 6: 57. - MORITZ, D. (1969): CORAX 3, Beih. I: 7 - MÜHE, F. (1950): Mitt. FAG 3: 3. - ORBAHN, D. (1958): Mitt. FAG 11: 35 f. - (1969): Ber. Ver. »Natur und Heimat« u. d. Naturk. Museums zu Lübeck, H. 10. - (1972): l. c. H. 12: 44-52. - ROSSBACH, V. (1961): Brutvögel ... des Raumes Büchen-Ratzeburg... 1960 u. 1961, Ms. - SAGER, H. (1953): Mitt. FAG 6: 2. Heimat. Jahrb. Kr. Segeberg 1956: 153-161; l. c. 1957: 202-212; l. c. 1958: 205-214. - SCHLENKER, R. (1966): Jordsand-Mitt. 2: 49. - Jahresbericht 1965 der Region West OAG, Ms. - (1968): Corax 2, Beih. II: 75. - SCHMIDT, G. A. J. (1954): Mitt. FAG 7: 2.-

(1955): l. c. 8: 3 und Orn. Mitt. 7: 24. - (1956): Mitt. FAG 9:9. - (1958): l. c. 11: 8 f. - (1959): l. c. 12: 8. - (1960): l. c. 13:12. - (1961): l. c. 14:34. - (1962): l. c. 15:16. - (1963): l. c. 16:46 f. - (1969): Jahresheft 1968 zur Vogelkunde Schleswig-Holsteins. Wachholtz, Neumünster. - (1975): Vogelkundl. Tageb. 3: 85. - (1977) l. c. 5: 130-192.- SCHMIDT, G. A. J., u. K. BREHM (1974): Vogelleben zwischen Nord- und Ostsee. Wachholtz, Neumünster. - STURM, M.: Die Vogelwelt der Insel Sylt, Ms. - THEIN, N. (1953): Orn. Mitt. 5: 151. - WENKEL, F. (1948): Mitt. FAG 1: 63.




Abb.: Brutvorkommen des Wiedehopfs 1946-1977

Schrifttum:

- BERTHOLD, P.: (1974): Grafische Darstellungen und Abbildungen. In : BERTHOLD, P., E. BEZZEL u. G. THIELCKE: Praktische Vogelkunde: 108-112. Kilda-Verlag, Greven/Westf.
- HAFTORN, S. (1971): Norges Fugler. Oslo.
- MORITZ, D. (1977): Haerfuglen (*Upupa epops*) som traekgaest pa Helgoland. Danske Fugle 29: 89-91.
- ROSENDAHL, S. (1972): Er Haerfuglen (*Upupa epops*) ved at genindvandre til Danmark. Danske Fugle X: 59-64.

Günther BUSCHE
Hochfelder Weg 49
224 Heide

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1980-81

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Busche Günther

Artikel/Article: [Zum Vorkommen des Wiedehopfs \(*Upupa epops*\) in Schleswig-Holstein 1946 bis 1977 52-54](#)