

Kurze Mitteilungen**Vorjahriger Sterntaucher (*Gavia stellata*) im Juni an der Meldorfer Bucht
von P. GLOE**

In Mitteleuropa ist der Sterntaucher (*Gavia stellata*) ein regelmaiger Durchzugler und uberwinterer. Nachdem vereinzelte Exemplare bereits im August erscheinen, setzt der regulare Wegzug Mitte September ein; im Fruhjahr wird die Art regelmaig bis in den Mai hinein festgestellt, wobei u. U. bereits ab Januar Heimzugsbewegungen stattfinden konnen (BAUER u. GLUTZ 1966, DRENCKHAHN et al. 1974).

Im Juni und Juli werden in Mitteleuropa nur ausnahmsweise an den Kusten Sterntaucher festgestellt. BAUER u. GLUTZ (1966) zitieren zwei Falle von Anfang Juli 1937 bei Kampereiland/NL und 9.7.1938 bei Den Helder/NL. Aus Schleswig-Holstein geben DRENCKHAHN et al. (1974) 6 Juni- (4 Nordsee, 2 Ostsee) und 4 Juli-Beobachtungen (1 Nordsee, dort 1 tot; 2 Ostsee) an. Es wird vermutet, da es sich wenigstens bei den Juli-Feststellungen 16.7.1959 2 Ex. im Schlichtkleid Markelsdorfer Huk/Fehmarn (B. BOHNSACK) und 17.7.1965 1 Ex. frischtot im Spulsaum vor Hallig Oland (KUHNAST) um einjahrige, immature Stucke gehandelt hat.

Es spricht fur diese Annahme, da ein neuer Fall nun auch belegt werden kann: Am 18.6.1979 hielt sich im Speicherkoog Sud an der Meldorfer Bucht auf einem Sugewasser ein (augenscheinlich vollig intakter) immaturer Sterntaucher auf (s. Abb. 1; BAUER u. GLUTZ (1966) nennen in ihrer Aufzahlung keine Abbildung von einjahrigen Sterntauchern).



Abb. 1: Immaturer Sterntaucher (*Gavia stellata*) am 18. Juni 1979 an der Meldorfer Bucht. Foto: P. GLOE

Das vorliegende (Farb-)Foto (Abb. 1), zeigt neben dem Färbungsmuster des »Schlichtkleides« deutlich einige zur Altersbestimmung erforderliche Details: Schnabel blaugrau (bei ad. im Sommer schwarz), Iris dunkelbraun (bei ad. rosa bis weinrot); deutlich wird auch die gegenüber adulten Sterntauchern braunere Oberseite des Jugendkleides mit Resten des Kleingefieders, welche nach der im Februar-März des 2. Kalenderjahres erfolgenden Jugendmauser stehenbleiben können (BAUER u. GLUTZ 1966).

Schrifttum:

BAUER, K. M. u. U. N. GLUTZ v. BLOTZHEIM (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 1. Akadem. Verlagsges. Frankfurt/Main.

DRENCKHAHN, D., P. GLOE u. R. HELDT (1974): Sterntaucher (*Gavia stellata*).

In: BERNDT, R. K. u. D. DRENCKHAHN: Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Bd. 1. Selbstverlag Orn. AG. Schl.-H. u. Hbg., Kiel.

Peter GLOE
Mühlenstraße 10
2223 Meidorf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1980-81

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Gloe Peter

Artikel/Article: [Vorjähriger Sterntaucher \(*Gavia stellata*\) im Juni an der Meldorfer Bucht 208-209](#)