Denisia	29	173-192	17.07.2010
---------	----	---------	------------

Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) der Marchauen bei Drösing, Niederösterreich¹

F. LICHTENBERGER

A b s t r a c t : Appraisal of Lepidoptera in Drösing an der March, Austria inferior. In the wetland of the locality "Drösing an der March", 50 km NE of Vienna, designated by moist to arid terrains, approximately 754 species/taxa of Lepidoptera have been recorded. Many of them are rare, endangered species with solely local distribution in Austria. At present, the region of examination is intact to a certain extent, and a valuable seclusion area of fauna and flora. The investigations were conducted in the years of 1976 to 1993.

K e y w o r d s : Lepidoptera, Austria inferior, Drösing/March, faunistic records.

Einleitung

Wenn von den Donau-Marchauen die Rede ist, so ist meistens nur das Augebiet östlich von Wien bis an die Staatsgrenze zur Slowakei gemeint, einschließlich der Augebiete von Schlosshof, Marchegg und Baumgarten an der March. Dieses Gebiet wurde in der Vergangenheit einigermaßen von Lepidopterologen bearbeitet. Dagegen waren bis zum Jahr 1976 von den nördlich gelegenen Marchauen zwischen Hohenau, Drösing und Sierndorf so gut wie keine Daten in der damaligen ZOODAT (Zoogeografische Datenbank Österreichs, www.zobodat.at) vorhanden. Die dortigen Auen ziehen sich auf österreichischer Seite etwa 14 km lang hin. Die Breite beträgt bis zu 2 km. Die Fläche umfasst mehr als 20 Quadratkilometer. Dieses Gebiet ist Teil der länderübergreifenden March-Thaya-Auen in Südmähren und der Slowakei. Zusammen mit den March-Donau-Auen stellen sie die größte zusammenhängende Auenlandschaft Mitteleuropas dar.

Bei Erkundungsfahrten mit dem Ziel das bisher lepidopterologisch nur ungenügend bekannte nordöstliche Niederösterreich kennen zu lernen, wurden auch die March-Auen bei Drösing besucht. Dieses reich strukturierte Gebiet erwies sich als sehr einladend, nicht zuletzt deshalb, weil eine asphaltierte Straße weit in das Augebiet hineinreicht, und auch die sonstigen Fahrwege mit einem PKW gut befahrbar waren. Entgegen der ursprünglichen Absicht, dort nur gelegentlich zu sammeln, zog sich schließlich die Sammel- und Beobachtungstätigkeit von 1976 bis 1993, also 18 Jahre lang hin! Fallweise nahmen Herbert Brandstetter, Amstetten und Johann Ortner, Hilm-Kematen/Y. an den Exkursionen teil.

¹ Diese Arbeit wird Herrn Prof. Dr. Hans Malicky herzlichst zu seinem 75. Geburtstag gewidmet.

Das Untersuchungsgebiet (Abb. 1)

Ausgehend von der Ortsmitte von Drösing führt die Überfuhrstraße L7 in südöstlicher Richtung an landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbei. Nach etwa 2 km liegen links die ersten ausgedehnten Feuchtwiesen. Anschließend daran breiten sich große Hart- und Weichholzauen aus, darin verstreut Wassertümpel verschiedener Größe. Innerhalb des Hochwasserdammes befinden sich, unter anderen freien Flächen, auch die riesigen Dunawiesen. Etwa 2 Kilometer südwestlich liegen jene trockenen, sandigen Flächen welche als "Sandberge" bezeichnet wer-




Abb. 1: Lageplan der Untersuchungsgebiete von Drösing an der March.

den. Der Baumbestand setzt sich zusammen aus Eichen, Eschen, Ulmen, Silberpappeln, Hybridpappeln, Espen, Ahorn, Linden, leider auch Robinien, und vielem mehr. In Feuchtund Nasswiesen dominieren schmalblättrige Weiden, in den sandigen, trockenen Gebieten die Föhren mit der dort typischen Begleitflora. In Summe ein idealer Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten, besonders aber auch für die in manchen Jahren zur Plage gewordenen Gelsenschwärme. Nachstehend eine kurze Charakterisierung jener zwei gänzlich verschiedenen Lebensräume in denen die Kartierungsarbeiten erfolgten.

1.) Dunawiesen (Abb. 2 und 3)

3 km SO von Drösing befinden sich ausgedehnte, aus mehreren Teilen zusammengesetzte Feucht- und Nasswiesen, die etwa 25 Hektar großen Dunawiesen (48°31'/16°56'). Sie umschließen im Halbkreis den Liliensee, ein Baggersee mit Schottergewinnung. Im Frühjahr, wenn der Grundwasserspiegel stark ansteigt, stehen diese Wiesen unter Wasser. Nach dessen Rückgang verbreitet sich oftmals penetranter Geruch von toten Tieren und anderen verwesenden Substanzen. Die Wiesen werden im Sommer teilweise gemäht und das Mähgut entfernt. Eingefasst, aber auch durchbrochen, sind diese Wiesen von Hart- und Weichholzbeständen und verschiedenartigen Hecken, mit viel Schlehdorn (Prunus spinosa) dazwischen. Unter dem breiten Laubwaldgürtel nahe der March, in dem nicht mehr gemäht wird, sind ausgedehnte Brennnesselbestände (Urtica) von 2 Meter und höher keine Seltenheit. An erwähnenswerten Pflanzen sind auszugsweise zu erwähnen: Wassernuss (Trapa natans), Sommerknotenblume (Leucojum aestivum), Schwanenblume (Butomus umbellatus), Gelbe Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus), Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica), Gelbe Teichrose (Nuphar luteum), Blutweiderich (Lythrum salicaria), Osterluzei (Aristolochia clematitis), Sumpfwolfsmilch (Euphorbia palustris), Sumpfampfer (Rumex palustris), Wasserampfer (Rumex aquaticus), Schilf (*Phragmitides communis*) und Rohrkolben (*Typha*).

An Tieren fiel besonders die Rotbauchunke (*Bombina bombina*) auf, die einmal beim Lichtfang sogar in Anzahl auf das Leuchttuch kletterte.

An besonders erwähnenswerten Faltern ist hier *Monochroa palustrella* DGL. (Gelechiidae) zu nennen, 1 Männchen am Licht, 22.8.1987, der Zweitfund für Österreich (HUEMER, et. al. 1992). Die Raupe lebt in Rhizomen und Stängeln des Sumpfampfers (*Rumex palustris*). Eine ähnliche Lebensweise weist *Ostrinia palustralis* HBN. (Pyralidae) auf. Die Raupe lebt in den

Stängeln des bis zu 2 m hohen Wasserampfers (*Rumex aquaticus*). Beide Arten sind auf Grund ihrer ökologischen Ansprüche in Österreich hochgradig gefährdet. Erwähnenswert auch die beiden Noctuidae Diachrysia zosimi HB. und Hydraecia ultima HOLST, zwei Arten die in Österreich erst von wenigen Fundorten bekannt geworden sind.



Abb. 2: Teilbereich der im Frühjahr zeitweise überschwemmten Dunawiesen.



Abb. 3: Teil der Dunawiesen.

Zwei Arten der FFH-Richtline (Fauna-Flora-Habitat) der EU, Euplagia quadripunctaria PODA (Arctiidae), und Lycaena dispar Hw. (Lycaenidae), sind hier ebenfalls beheimatet. Nach den Bestimmungen dieser FFH-Richtlinie ist dieser Lebensraum unter Schutz zu stellen.

Ein Massenauftreten der Raupen von Parastichtis ypsillon D. & Sch. (Noctuidae) wurde 1979 beobachtet. So waren unter einem handtellergroßen Stück loser Weidenrinde über 30 der nachtaktiven Raupen dicht zusammengedrängt. Auch ein Fischer machte die Beobachtung, dass im Morgengrauen Scharen von solchen Raupen die Äste herab wanderten, und dann unter der Rinde und im Mulm von alten Weiden verschwanden. Tatsächlich kam P. vpsillon, eine sonst nur einzeln zu beobachtende Art, zur Flugzeit häufig zum Licht. An lauen Sommerabenden tummelten sich manchmal viele Hornissen (Vespa crabro) an der Leuchtstelle und behinderten die Arbeit daran doch einigermaßen.

2.) "Sandberge" (Abb. 4)

Die so bezeichneten, aber doch sehr flachen, seinerzeit durch postglazialen Flugsand entstandenen Dünen befinden sich etwa 2,5 km SSO von Drösing (48°31′/16°56′). Sie wurden schon vor Jahrzehnten mit Kiefern, hauptsächlich Pinus nigra, aufgeforstet. Immerhin, ab 2003 er-

möglichten diverse Pflegemaßnamen, an besonders trockenen Stellen, eine teilweise Rodung der Monokultur von Pinus nigra und Abtragung des Oberbodens, um so gefährdeten Pflanzen wie z. B. Silbergras (Corynephorus Phönizische Königskerze (Verbascum canescens). phoeniceum) und Sandthymian (Thymus serpyllum) ein besseres Fortkommen zu ermöglichen.

An besonderen Faltern sind dort die Noctuide Staurophora celsia L., die Psychiden Epichnopterix kovacsi Sieder und Taleporia politella O. zu erwähnen. In den sandigen Vertiefungen der nördlichen Randzone, in der Grundwasser zutage trat, waren viele Tümpel mit verschiedenartigen Wasserpflanzen vorhanden. Hier lebten vor 1993 besonders viele Rotbauchunken (B. bombina). Selten dort auch die



Abb. Leuchtstelle in den Sandbergen.

Wechselkröte (*Bufo viridis*). An tagaktiven Faltern flog in großer Zahl die Pyralide *Synaphe connectalis* HB. und die hübsche Geometride *Lythria cruentaria* HUFN. Diese Nass- und Trockenzellen auf engstem Raum umfassten den ökologisch wertvollsten Teil des Gebietes, mit einer Biodiversität ersten Ranges! – 1993 war davon nichts mehr vorhanden! Völlig zerstört! Die etwa 2 ha große Fläche war abgeschürft zwecks Sandgewinnung! Heute befindet sich dort ein Grundwassersee.

Untersuchungs- bzw. Arbeitsmethoden

Im Wesentlichen kamen folgende Beobachtungsmethoden zur Anwendung: Tagbeobachtung und Registrierung der nachtaktiven Falter am Licht, fallweise auch am Köder.

Bei Tage wurden weite Begehungen unternommen und die festgestellten tagaktiven Falter registriert. Die Vegetation wurde bei Tage außerdem mit einem Kescher abgestreift, um so ruhende Arten erfassen zu können.

Des Nachts wurden Leuchtstellen (keine Lichtfallen!) vorwiegend in der Umgebung des Liliensees, aber auch im trockenen Schwarzföhrenbiotop in der Nähe der Jagdhütte eingerichtet. Bei der Nachtbeobachtung kamen hauptsächlich aggregatbetriebene HNO-Quecksilberdampflampen, 125 Watt, zum Einsatz. Diese wurden in Verbindung mit großen aufgespannten Gazetüchern, etwa 2 x 2 Meter) eingesetzt. Zudem auch batteriegespeiste, blauaktinische Leuchtstoffröhren 15 W, wahlweise gekoppelt mit einer 15 W Schwarzlichtröhre. Seit 1989 befand sich auch ein großer Leuchtturm aus feinem fluoreszierendem Polyestergewebe im Einsatz. Bestückt wurde dieser runde, oben kegelförmig zulaufende 1,8 m hohe, im Durchmesser 1,3 m große Turm, mit 2 x 20 Watt superaktinischen Leuchtstoffröhren. Diese Konstruktion konnte wahlweise mit Wechselstrom 230 V, oder mit Akkus 12 V betrieben werden. Nur im zeitigen Frühjahr, aber auch im Herbst, kam Köder zum Einsatz. Dieser wurde aus stark gezuckertem Wein oder Most hergestellt, mit Zusatz von überreifen Bananen und halbvergorener Marmelade. Mullbinden wurden darin getränkt und als so genannte "Köderschnüre" an Strauch- und Astwerk aufgehängt, eine dickflüssigere Variante wurde auch als Streichköder an Baumstämmen angebracht.

Bis zum Jahr 1986 konzentrierte sich die Arbeit nur auf die so genannten Großschmetterlinge (Makrolepidoptera), also Tagfalter (Diurna), Spinner und Schwärmer (Bombyces et Sphinges sensu classico), Eulen (Noctuidae) und Spanner (Geometridae). Ab 1986 Beginn von Aufsammlungen auch von den so genannten Kleinschmetterlingen (Mikrolepidoptera), wobei Dr. Josef Klimesch, Linz, bei der Determination eine große Hilfe war. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden jährlich, mittels Ablochbeleg, an Univ.-Prof. Dr. E.R. Reichl, dem seinerzeitigen Leiter der Datenbank ZOODAT weitergegeben.

Zur Nomenklatur der behandelten Arten

Bei der seinerzeitigen Abgabe der Artenlisten an die ZOODAT, heute ZOBODAT, fand bei den "Großschmetterlingen" die Nomenklatur und Systematik von FORSTER & WOHLFAHRT (1955-1981) Verwendung, bei den "Kleinschmetterlingen" die Liste LERAUT (1980). Aus wissenschaftlicher, phylogenetischer Sicht ist die Trennung von "Groß"- und "Kleinschmetterlingen" längst nicht mehr haltbar. Deshalb wird für diese Arbeit die Nomenklatur und Systematik von HUEMER & TARMANN (1993) herangezogen, die weitgehend den neuen Erkenntnissen entspricht.

Ergebnis der Untersuchungen - Statistik

Im Zeitraum von 1976 bis 1993 konnten 90 Exkursionen von Waidhofen an der Ybbs nach Drösing durchgeführt werden. In diesen 18 Jahren wurden 37.800 Kilometer zurückgelegt. Insgesamt konnten 754 Arten registriert, und davon 2981 Datensätze erarbeitet werden. Die Anzahl der beobachteten Lepidoptera beläuft sich auf 9088 Exemplare. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Fahrten in das Exkursionsgebiet, ohne eine öffentliche Unterstützung, auf eigene Kosten und Gefahr stattgefunden haben. Ebenso wurden die Kosten für Übernachtung und Verpflegung aus der eigenen Tasche bezahlt.

In obiger Aufstellung fehlen jedoch hunderte Beobachtungsdaten von H. Brandstetter, weil sein Notizbuch, mit sämtlichen handschriftlichen Aufzeichnungen von Großschmetterlingen, verloren ging, noch bevor die Daten gesichert werden konnten. So sind nur seine gesammelten Tiere als Beleg vorhanden. Diese Sammlung befindet sich seit 2005 als Legat im Besitz des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich die einzelnen Daten der "Großschmetterlinge" von Drösing aus dieser Sammlung herauszufiltern. Zusätzlich neue Arten für Drösing sind darin nicht enthalten. Immerhin wurden fallweise Belegstücke von den so genannten "Mikrolepidoptera" an den Verfasser übergeben, so dass wenigsten hier die Daten gesichert sind.

Ein Ausdruck aller Datensätze von Drösing würde etwa 60 A4-Seiten umfassen. Deshalb beschränkt sich vorliegende Artenliste lediglich auf die Anzahl der Nachweise, und auf die Menge der festgestellten Individuen. Es wurde darauf verzichtet die zugehörigen Autorennamen, samt Jahr der Beschreibung vollständig anzugeben. Die diesbezügliche Abkürzung ist in Verbindung mit der verwendeten Nomenklatur (HUEMER & TARMANN 1993) eindeutig und lässt keine Verwechslung zu. So konnte der benötigte Druckplatz auf etwa 25% reduziert werden. Bei Interesse können die genauen Einzelnachweise von der Datenbank des Verfassers abgefragt werden, zudem auch von der ZOBODAT in etwas eingeschränktem Maße.

Danksagung

Allen voran wird, posthum, Dr. Josef Klimesch, Linz, für Rat, sowie für vielfältige Hilfe bei der Determination der Kleinschmetterlinge herzlichst gedankt. Ebenso DI Michael Malicky, ZOBODAT Linz, für die digitale Übermittlung der Daten von Drösing. Besonderer Dank gebührt DI Heinz Habeler, Graz, der die betreffenden Arten in die heute gültige Nomenklatur und Systematik konvertierte. Für die fallweise Mithilfe bei den Exkursionen, aber auch für die Überlassung von gesammelten Kleinschmetterlingen wird Herbert Brandstetter, Amstetten, und Johann Ortner, Hilm/Kematen/Ybbs, gedankt. So auch den Grundbesitzern, Jägern und Fischern von Drösing, welche die entomologische Feldarbeit wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis von Untersuchungen an der Lepidopteren-Fauna von Drösing an der March, 50 km NO von Wien. In den Jahren 1976 bis 1993 konnten in den dortigen mehr oder weniger feuchten, bis sehr trockenen Gebieten 754 Arten/Taxa von Lepidoptera festgestellt werden, darunter viele seltene, gefährdete und lokal verbreitete Spezies. Das Untersuchungsgebiet stellt also ein wertvolles, derzeit noch halbwegs intaktes Rückzugsgebiet für Fauna und Flora dar.

Literatur

- FORSTER W. & T.A. WOHLFAHRT (1955-1981): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Bd. II (1955): Tagfalter, Diurna (Rhopalocera und Hesperiidae): 1-126, 1-41 SW-Abb., 1-28 Farbtafeln. Bd. III (1960): Spinner und Schwärmer (Bombyces & Spingiges): 1-239, SW-Abb. 1-92, Farbtafeln 1-28, SW-Tafeln I-VIII. Bd. IV (1971): Eulen (Noctuidae): 1-329, 1-175 SW-Abb., Farbtafeln 1-32. Bd. V (1981): Spanner (Geometridae): 1-312, 1-265 SW-Abb., Farbtafeln 1-26. Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart.'
- HUEMER P., DEUTSCH H., HABELER H. & F. LICHTENBERGER (1992): Neue und bemerkenswerte Funde von Kleinschmetterlingen in Österreich. Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck **79**: 199-202.
- HUEMER P. & G. TARMANN (1993): Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera) Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die einzelnen Bundesländer. Beilageband 5 zu den Veröff. d. Mus. Ferdinandeum 73, Innsbruck: 1-227.
- LERAUT P. (1980): Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas. Supplement a Alexanor, Bulletin de la Societe entomologique de France: 1-334.

Anschrift des Verfassers: Franz LICHTENBERGER

Schmiedestr. 45

A-3340 Waidhofen/Y., Austria E-Mail: lep.lichtenberger@aon.at

Tab. 1: Systematische Aufstellung aller im Beobachtungszeitraum 1976 bis 1993 festgestellten Arten von Drösing.

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Erio	craniidae			
Nemophora	subpurpurella	Hw.	1	1
Не	pialidae			
Triodia	sylvina	L.	1	12
A	delidae			
Nematopogon	schwarziellus	Z.	1	1
Nemophora	degeerella	L.	1	1
Adela	croesella	Sc.	1	1
P s	ychidae			
Epichnopterix	plumella	D. & Sch.	2	3
Taleporia	politella	O.	2	5
Taleporia	tubulosa	Retzius	1	1
Psyche	casta	PALLAS	1	1
Bijugis	bombycella	D. & Sch.	3	4
Epichnopterix	kovacsi	SIEDER	1	4
Canephora	hirsuta	Poda	2	6
Lepidoscioptera	hirsutella	D. & Sch.	5	29
T	ineidae			
Neurothaumasia	ankerella	Mn.	1	1
Monopis	monachella	Нв.	8	12
Grac	illariidae			
Caloptilia	alchimiella	Sc.	1	3
Phyllonorycter	cavella	Z.	1	4
Ypon	omeutidae			
Scythropia	crataegella	L.	18	25
Yponomeuta	evonymella	L.	7	24
Yponomeuta	malinella	Z.	1	1
Yponomeuta	plumbella	D. & SCH.	4	8
Pseudoswammerdamia	combinella	Нв.	1	1
Swammerdamia	caesiella	Нв.	1	2

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Prays	fraxinella	BJERK.	1	6
Ypsolopha	mucronella	Sc.	1	1
P 1	utellidae			
Plutella	xylostella	L.	8	12
Col	ephoridae			
Coleophora	ornatipennella	Нв.	1	3
Coleophora	vestianella	L.	1	1
	chistidae			
Hypercallia	citrinalis	Sc.	1	1
Ethmia	pusiella	L.	1	1
Ethmia	bipunctella	F.	3	3
Agonopterix	propinquella	Tr.	4	4
Agonopterix	arenella	D. & Sch.	1	1
Agonopterix	ciliella	STAINTON	1	1
Agonopterix	assimilella	TR.	1	1
Depressaria	pulcherrimella	STAINTON	1	1
Semioscopis	steinkellneriana	D. & Sch.	1	
	nabachidae	D. 66 Sen.		<u> </u>
Diurnea	fagella	D. & SCH.	1	1
	ophoridae	B. & Seil.	1	1
Schiffermuelleria	schaefferella	L.	1	1
Batia	unitella	HB.	3	3
	thrididae	IID.	3	<u> </u>
Scythris	productella	Z.	2	5
•	opterigidae	L.	2	
Pyroderces	argyrogrammos	Z.	2	2
Limnaecia	phragmitella	STAINTON	1	1
	l e c h i i d a e	STAINTON	1	1
Teleiopsis	diffinis	Hw.	1	1
Gelechia	turpella	D. & SCH.	1	1
Gelechia	rhombelliformis	STDGR.	4	8
Aroga	velocella	Z.	1	<u></u>
Anacampsis	populella	CL.	1	<u> </u>
Dichomeris	limosella	SCHLÄGER	1	<u> </u>
		H.S.	1	<u>1</u>
Helcystogramma	triannulella	HW.		-
Helcystogramma	rufescens	CL.	3	<u>4</u> 1
Acompsia	cinerella	CL.	I	<u>l</u>
	o s s i i d a e	T _T		0
Cossus	COSSUS	L.	6	9
Dyspessa	ulula	Вкн.	1	1
Phragmataecia	castaneae	Нв.	4	12
Zeuzera	pyrina	L.	4	10
	Sesiidae	G	1	
Sesia	apiformis	CL.	1	1
Chamaesphecia	empiformis	ESP.	1	2
	gaenidae			
Adscita	notata	Z.	1	6
	nacodidae	1		
Apoda	limacodes	HUFN.	5	15
	rtricidae	+		
Agapeta	hamana	L.	7	10
Agapeta	zoegana	L.	2	3
Aethes	cnicana	WESTW.	1	1
Aethes	triangulana	Tr.	4	16
Aethes	smeathmanniana	F.	2	2
Cochylidia	implicitana	Wck.	4	6

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Falseuncaria	ruficiliana	Hw.	1	1
Tortrix	viridana	L.		1
Acleris	sparsana	D. & Sch.	1	2
Acleris	rhombana	D. & Sch.	1	1
Acleris	rufana	D. & Sch.		1
Eana	incanana	STEPHENS	1	3
Cnephasia	incertana	TR.	1	4
Cnephasia	asseclana	D. & SCH.	1	2
Cnephasia	communana	H.S.	1	1
Philedonides	lunana	THNB.	1	1
Archips	podana	Sc.	2	2
Archips	crataegana	Нв.	1	2
Argyrotaenia	ljungiana	THNB.	4	6
Choristoneura	diversana	Нв.	1	1
Choristoneura	hebenstreitella	MÜLL.	1	2
Ptvcholoma	lecheana	L.	2	2
Pandemis	cinnamomeana	TR.	4	14
Pandemis	corylana	F.	2	2
Pandemis	cerasana	Нв.	2	2
Pandemis	heparana	D. & SCH.	10	15
Svndemis	musculana	Нв.	1	1
Aphelia	paleana	Нв.	1	1
Clepsis	rurinana	L.	1	1
Adoxophyes		F.V.R.	2	2
	orana			
Bactra	lancealana	Нв.	1	3
Bactra	furfurana	Hw.	1	
Endothenia	quadrimaculana	Hw.	12	18
Eudemis	profundana	D. & SCH.	1	1
Hedya	salicella	L.	6	18
Hedya	dimidioalba	Retzius	1	1
Hedya	pruniana	Нв.	4	6
Metendothenia	atropunctana	Z.	1	3
Celypha	rufana	Sc.	2	2
Celypha	lacunana	D. & Sch.	13	25
Celypha	rivulana	Sc.	5	7
Celypha	umbrosana	FRR.	2	5
Olethreutes	arcuella	CL.	1	1
Piniphila	bifasciana	Hw.	1	1
Spilonota	ocellana	D. & Sch.	1	1
Spilonota	laricana	HEINEM.	1	1
Epinotia	caprana	F.	2	2
Epinotia	ramella	L.	1	1
Epinotia	nisella	CL.	1	1
Zeiraphera	isertana	F.	3	8
Еисоѕта	cana	Hw.	1	1
Еисоѕта	metzneriana	TR.	1	1
Gypsonoma	dealbana	Fröl.	4	8
Gypsonoma	minutana	Нв.	1	1
Gypsonoma Gypsonoma	oppressana	TR.	3	5
Epiblema	foenella	L.	3	4
Notocelia	cynosbatella	L.	3	15
Notocelia	uddmanniana	L.	2	3
			2	3
Notocelia	rosaecolana	DOUBLED.		
Rhyacionia	pinicolana	DOUBLED.	1	1
Rhyacionia	pinivorana unculana	Lie. & Z.	1 2	1

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Ancylis	mitterbacheriana	D. & Sch.	1	1
Cydia	discretana	Wck.	1	1
Cydia	jungiella	Cl.	1	1
Cydia	penkleriana	D. & Sch.	6	16
Lathronympha	strigana	F.	1	1
Pammene	albuginana	Guenee	1	1
Platyptilia	farfarella	Z.	1	1
Oidematophorus	inulae	Z.	2	7
Oidematophorus	lienigianus	Z.	2	2
	ophoridae		_	-
Pterophorus	pentadactylus	L.	3	6
Emmelina	monodactyla	L.	4	6
	y ralidae	L.	7	0
Galleria	mellonella	L.	4	6
	costalis	F.	5	7
Hypsopygia				
Synaphe	connectalis	Нв.	1	40
Synaphe	punctalis	F.	1	1 2
Orthopygia	glaucinalis	L.	2	3
Pyralis	farinalis	L.	4	6
Endotricha	flammealis	D. & SCH.	3	3
Anerastia	lotella	Нв.	1	2
Cryptoblabes	bistriga	Hw.	1	1
Oncocera	semirubella	Sc.	3	5
Pempelia	formosa	Hw.	1	1
Sciota	rhenella	Z.	1	1
Sciota	adelphella	F.V.R.	1	1
Sciota	fumella	Ev.	1	1
Phycita	roborella	D. & Sch.	2	3
Hypochalcia	ahenella	D. & Sch.	2	3
Pyla	fusca	Hw.	1	2
Etiella	zinckenella	Tr.	1	3
Nephopterix	angustella	Нв.	1	1
Conobathra	tumidana	D. & Sch.	1	1
Conobathra	repandana	F.	2	2
Trachycera	suavella	Z.	2	3
Myelois	circumvoluta	FOURC.	2	2
Gymnancyla	hornigii	LEDERER	1	<u> </u>
Euzophera	pinguis	Hw.	2	3
Euzophera	bigella	Z.	2	2
Nyctegretis	lineana	Sc.	1	1
Ancylosis	oblitella	Z.	2	6
Homoeosoma	sinuellum	F.	2	2
				1
Homoeosoma Phycitodes	nebulella	D. & SCH. HB.	1	2
,	binaevella		1	
Euchromius	ocellea	HW.	1	1 7
Chilo	phragmitella	Нв.	3	7
Calamatropha	paludella	Нв.	3	8
Chrysoteuchia	culmella	L.	7	15
Crambus	pascuella	L.	1	3
Crambus	uliginosella	Z.	1	1
Crambus	pratella	L.	1	1
Crambus	lathoniellus	Z.	3	8
Crambus	perlella	Sc.	5	11
Agriphila	tristella	D. & Sch.	8	27
Agriphila	inquinatella	D. & Sch.	3	7
Agriphila	straminella	D. & Sch.	2	5

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Agriphila	geniculea	Hw.	1	1
Catoptria	pinella	L.	1	1
Catoptria	margaritella	D. & Sch.	1	1
Catoptria	falsella	D. & Sch.	8	15
Thisanotia	chrysonuchella	Sc.	1	4
Pediasia	luteella	D. & Sch.	1	1
Pediasia	aridella caradjaella	REBEL	1	1
Platytes	alpinella	Нв.	2	3
Elophila	nymphaeata	L.	14	30
Cataclysta	lemnata	L.	14	32
Paraponix	stratiotatum	L.	9	14
Nymphula	stagnata	DONOVAN	2	2
Schoenobius	forficella	THNB.	7	12
Scoparia	basistrigalis	KNAGGS	2	5
Scoparia	ambigualis	TR.	1	<u>J</u>
Scoparia	ancipitella	LaH.	1	1
		_	+	
Eudonia	pallida	CURTIS	1	2
Eudonia	mercurella	L.	2	3
Evergestis	aenealis	D. & SCH.	10	37
Evergestis	frumentalis	L.	1	1
Evergestis	forficalis	L.	1	2
Evergestis	pallidata	HUFN.	12	18
Evergestis	extimalis	Sc.	6	10
Orenaia	andereggialis	H.S.	1	1
Cynaeda	dentalis	D. & Sch.	1	1
Pyrausta	aurata	Sc.	5	7
Pyrausta	purpuralis	L.	3	5
Pyrausta	ostrinalis	Нв.	1	1
Pyrausta	despicata	Sc.	3	5
Loxostege	sticticalis	L.	1	11
Ecpyrrhorrhoe	rubiginalis	Нв.	1	1
Sitochroa	verticalis	L.	2	3
Ostrinia	palustralis	Нв.	2	12
Ostrinia	nubilalis	Нв.	6	10
Eurrhypara	hortulata	L.	4	7
Perinephila	lancealis	D. & Sch.	1	1
Phlyctaenia	coronata	HUFN.	4	6
Phlyctaenia	perlucidalis	Нв.	1	1
Phlyctaenia	stachydalis	GERM.	4	5
Anania	verbascalis	D. & Sch.	1	1
Psammotis	pulveralis	Нв.	4	12
Opsibotys	fuscalis	D. & SCH.	1	1
Udea	ferrugalis	НВ.	3	4
Nomophila	noctuella	D. & SCH.	7	41
Diasemia	reticularis	L.	1	1
Diasemia Pleuroptya		Sc.	5	10
	ruralis i o c a m p i d a e	BC.	3	10
Malacosoma	neustrium	ī	3	4
		L. L.	2	3
Eriogaster	catax		l l	
Lasiocampa	trifolii	D. & SCH.	4	7
Macrothylacia	rubi	L.	5	6
Euthrix	potatoria	L.	7	24
Gastropacha	quercifolia	L.	4	6
Gastropacha	populifolia	ESP.	7	30
Odonestis	pruni	L.	1	3
Dendrolimus	pini	L.	3	4

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
	phingidae			
Agrius	convolvuli	L.	1	1
Sphinx	ligustri	L.	8	20
Hyloicus	pinastri	L.	5	8
Smerinthus	ocellatus	L.	7	21
Mimas	tiliae	L.	8	29
Laothoe	populi	L.	10	25
Hemaris	tityus	L.	2	2
Macroglossum	stellatarum	L.	1	1
Hyles	euphorbiae	L.	1	1
Deilephila	elpenor	L.	12	53
Deilephila	porcellus	L.	8	44
S	aturnidae			
Saturnia	pyri	D. & Sch.	4	9
Н	esperiidae	•		
Carterocephalus	palaemon	PALLAS	1	2
Heteropterus	morpheus	PALLAS	2	7
Hesperia	comma	L.	1	3
Ochlodes	venatus	Brem & G	1	1
Carcharodus	alceae	Esp.	1	3
Pyrgus	malvae	L.	1	1
	pilionidae	12.	-	-
Papilio T .	machaon	L.	2	4
phiclides	podalirius	L.	2	_
Zerynthia	polyxena	D. & SCH.	2	3
zeryniniu	Pieridae	D. & SCH.	Z	3
Leptidea	sinapis	L.	5	14
Colias	myrmidone	Esp.	3	14
			1	1
Colias	crocea	Geoffrey	1	1
Colias	hyale	L.	3	8
Gonepteryx	rhamni	L.	5	10
Pieris	brassicae	L.	5	9
Pieris	rapae	L.	6	19
Pieris	napi	L.	15	102
Pontia	daplidice	L.	2	3
Anthocharis	cardamines	L.	5	12
N y	mphalidae	•		
Apatura	ilia	D. & Sch.	1	1
Inachis	io	L.	10	16
Vanessa	atalanta	L.	4	6
Cynthia	cardui	L.	2	3
Aglais	urticae	L.	2	4
Polygonia	c-album	L.	6	11
Araschnia	levana	L.	4	7
Argynnis	paphia	L.	1	1
ssoria	lathonia	L.	1	1
Clossiana	selene	D. & Sch.	2	3
Clossiana	euphrosyne	L.	2	4
Clossiana	dia	L.	2	3
Mellicta	athalia	ROTT.	1	1
	Satyridae	1.011.	1	1
Melanargia .	galathea	L.	1	1
Maniola	jurtina	L.	3	6
	*	L.	1	<u>0</u>
Aphantopus	hyperantus			
Coenonympha	arcania	L.	3	8

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Coenonympha	pamphilus	L.	8	26
Pararge	aegeria	L.	1	1
Lasiommata	megera	L.	3	4
Lasiommata	maera	L.	2	4
Ly	y c a e n i d a e			
Fixsenia	pruni	L.	1	6
Lycaena	phlaeas	L.	6	13
Lycaena	dispar	Hw.	10	18
Lycaena	titvrus	PODA	5	12
Lycaena	hippothoe	L.	1	1
Everes	argiades	PALLAS	1	3
Celastrina	argiolus	L.	3	6
Plebejus	argus	L.	1	1
Lycaeides	argyrognomon	BERGSTR.	1	5
Plebicula	thersites	CANT.	1	1
Meleageria	daphnis	D. & SCH.	1	4
Polyommatus	icarus	ROTT.	3	6
•	repanidae	ROTT.	3	0
Falcaria	lacertinaria	L.	1	1
Watsonalla	binaria	HUFN.	1	5
Drepana Drepana	falcataria	L.	4	7
Sabra			6	9
	harpagula	ESP.		
Cilix	glaucata	Sc.	8	15
Thyatira	batis	L.	15	34
Habrosyne	pyritoides	HUFN.	6	12
Tethea	ocularis	L.	8	21
Tethea	or	Goeze	15	51
Tetheella	fluctuosa	Нв.	1	1
Ochropacha	duplaris	L.	3	7
	o m e t r i d a e	D 0 0	2	10
Alsophila	aescularia	D. & Sch.	3	12
Geometra	papilionaria	L.	1	1
Comibaena	bajularia	D. & Sch.	1	4
Thetidia	smaragdaria	F.	2	2
Hemithea	aestivaria	Нв.	5	25
Chlorissa	viridata	L.	2	3
Chlorissa	cloraria	Нв.	1	2
Hemistola	biliosata	DE VILL.	3	42
Jodis	lactearia	L.	1	1
Scopula	immorata	L.	4	6
Scopula	caricaria	REUTTI	2	22
Scopula	nigropunctata	HUFN.	1	2
Scopula	virgulata	D. & Sch.	4	7
Scopula	rubiginata	Hufn.	2	2
Scopula	ochroleucaria	H.S.	1	1
Scopula	marginepunctata	Goeze	1	1
Scopula	immutata	L.	8	21
Scopula	flaccidaria	Z.	2	2
Idaea	serpentata	HUFN.	6	30
Idaea	muricata	HUFN.	2	2
Idaea	laevigata	Sc.	1	1
Idaea	biselata	HUFN.	9	18
Idaea	humiliata	HUFN.	3	4
Idaea	dimidiata	HUFN.	11	24
Idaea	subsericeata	HW.	1	24 1
IUUEU	เรนบระกเตยนเน	HIW.	i 1 1	1

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Idaea	emarginata	L.	4	6
Idaea	aversata	L.	13	25
Idaea	degeneraria	Нв.	1	1
Idaea	straminata	Вкн.	3	5
Idaea	deversaria	H.S.	1	1
Cyclophora	pendularia	CL.	3	4
Cyclophora	annulata	SCHULZE	9	60
Cyclophora	puppillaria	Нв.	1	1
Cyclophora	quercimontaria	Bastelb.	1	1
Cyclophora	punctaria	L.	6	15
Cyclophora	linearia	Нв.	5	9
Timandra	griseata	PETAGNA	19	63
Lythria	cruentaria	HUFN.	3	8
Phibalapteryx	virgata	HUFN.	1	1
Scotopteryx	moeniata	Sc.	1	1
Scotopteryx	chenopodiata	L.	1	1
Orthonama	vittata	Вкн.	1	1
Xanthorhoe	biriviata	Вкн.	4	6
Xanthorhoe	designata	HUFN.	8	30
Xanthorhoe	spadicearia	D. & SCH.	3	8
Xanthorhoe	ferrugata	L.	13	27
Xanthorhoe Xanthorhoe	fluctuata	L.	6	9
Catarhoe	rubidata	D. & SCH.	1	
Catarhoe Catarhoe	cuculata	HUFN.	4	8
			+	<u>o</u>
Epirrhoe	hastulata	Нв.	1	
Epirrhoe	pupillata	THNB.	1	2
Epirrhoe	tristata	L.	2	2
Epirrhoe	alternata	MÜLL.	15	43
Epirrhoe	rivata	Нв.	3	6
Camptogramma	bilineata	L.	3	5
Mesoleuca	albicillata	L.	3	4
Pelurga	comitata	L.	1	1
Cosmorhoe	ocellata	L.	4	8
Ecliptopera	silaceata	D. & Sch.	1	2
Ecliptopera	capitata	H.S.	4	6
Chloroclysta	citrata	L.	1	1
Chloroclysta	truncata	HUFN.	3	4
Cidaria	fulvata	J. Forst.	1	1
Plemyra	rubiginata	D. & Sch.	1	1
Pennithera	firmata	Нв.	3	5
Thera	obeliscata	Нв.	2	2
Thera	variata	D. & Sch.	1	2
Thera	juniperata	L.	1	2
Electrophaes	corylata	THNB.	2	3
Colostygia	pectinataria	KNOCH	8	14
Hydriomena	impluviata	D. & SCH.	1	1
Melanthia	procellata	D. & SCH.	3	9
Hydria	undulata	L.	1	1
Triphosa	dubitata	L.	1	2
Philereme	vetulata	D. & SCH.	3	5
Philereme	transversata	HUFN.	4	6
Euphyia	unangulata	HW.	1	1
	dilutata	D. & SCH.	1	1
Epirrita Enirrita			1	<u>1</u>
Epirrita Pavizama	autumnata	Вкн.	+	
Perizoma Perizoma	alchemillatum lugdunarium	L. H.S.	3 2	<u>4</u> 2

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Perizoma	bifaciatum	Hw.	3	4
Perizoma	blandiatum	D. & Sch.	1	1
Perizoma	albulatum	D. & Sch.	2	2
Perizoma	flavofasciatum	THNB.	2	2
Perizoma	didymatum	L.	2	5
Eupithecia	linariata	F.	2	3
Eupithecia	centaureata	D. & Sch.	5	7
Eupithecia	succenturiata	L.	7	9
Eupithecia	indigata	Нв.	1	1
Eupithecia	innotata	Hufn.	1	7
Chloroclystis	v-ata	Hw.	2	3
Calliclystis	rectangulata	L.	1	1
Anticollix	sparsatus	TR.	1	1
Aplocera	plagiata	I.	2	2
Lithostege	griseata	D. & SCH.	2	3
Lithostege	farinata	HUFN.	1	<u></u>
Euchoeca	nebulata	SC.	2	3
Hydrelia	flammeolaria	HUFN.	4	6
Hydrelia	testaceata	DONOCAN	1	1 7
Minoa	murinata	Sc.	5	7
Lobophora	halterata	HUFN.	5	12
Trichopteryx	carpinata	Вкн.	1	1
Pterapherapteryx	sexalata	Retzius	14	68
Abraxas	grossulariatus	L.	2	4
Calospilos	sylvatus	Sc.	1	1
Lomaspilis	marginata	L.	17	60
Ligdia	adustata	D. & Sch.	9	37
Stegania	dilectaria	Нв.	7	9
Semiothisa	notata	L.	4	4
Semiothisa	alternata	D. & Sch.	12	34
Semiothisa	liturata	CL.	3	7
Semiothisa	clathrata	L.	19	39
Semiothisa	artesiaria	D. & SCH.	2	2
Itame	brunneata	VILL.	1	1
Tephrina	arenacearia	D. & Sch.	2	5
Cepphis	advenaria	Нв.	1	3
Plagodis	pulveraria	L.	1	1
Plagodis	dolabraria	L.	6	8
Opisthograptis	luteolata	L.	3	9
Epione	repandaria	Hufn.	10	15
Therapis	flavicaria	D. & Sch.	1	1
Apeira	syringaria	L.	3	4
Ennomos	autumnaria	WERNEB.	-	11
Ennomos	fuscantaria	STPH.	8	13
Ennomos	erosaria	НВ.	3	4
Selenia	dentaria	F.	4	8
Selenia	lunularia	нв.	2	2
Selenia	tetralunaria	HUFN.	2	2
	evonymaria	D. & SCH.	3	4
Artiora				
Crocallis	elinguaria	L.	1	1 2
Ourapteryx	sambucaria	L.	1	2
Colotois	pennaria	L.	4	5
Angerona	prunaria	L.	6	16
Lycia	hirtaria	CL.	8	54
Lycia	pomonaria	Нв.	1	1
Biston	stratarius	HUFN.	1	2

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Biston	betularius	L.	9	23
Agriopis	bajaria	D. & Sch.	1	1
Agriopis	marginaria	F.	1	1
Synopsia	sociaria	Нв.	1	3
Peribatodes	rhomboidarius	D. & Sch.	7	13
Peribatodes	secundarius	ESP.	2	4
Cleora	cinctaria	D. & Sch.	1	2
Alcis	repandata	L.	1	2
Boarmia	roboraria	D. & Sch.	4	5
Serraca	punctinalis	Sc.	8	14
Ascotis	selenaria	D. & SCH.	13	36
Paradarisa	consonaria	Нв.	1	1
Parectropis	similaria	HUFN.	1	4
Aethalura	punctulata	D. & SCH.	4	9
Ematurga	atomaria	L.	3	4
Bupalus	piniarius	L.	1	31
	1			
Cabera	pusaria	L.	8	20
Cabera	exanthemata	Sc.	12	24
Lomographa	bimaculata	F.	2	4
Lomographa	temerata	D. & Sch.	6	8
Сатраеа	margaritata	L.	16	69
Hylaea	fasciaria	L.	3	14
Charissa	ambiguata	DUP.	1	1
Siona	lineata	Sc.	5	11
	todontidae			
Phalera	bucephala	L.	2	3
Cerura	erminea	ESP.	4	7
Furcula	bicuspis	Вкн.	2	2
Furcula	furcula	CL.	17	52
Furcula	bifida	Brahm	8	12
Stauropus	fagi	L.	3	7
Peridea	anceps	Goeze	1	1
Notodonta	dromedarius	L.	4	8
Notodonta	ziczac	L.	18	35
Notodonta	tritopha	D. & SCH.	17	42
Drymonia	dodonea	D. & SCH.	6	23
Drymonia	guerna	D. & SCH.	1	3
<i>Harpyia</i>	milhauseri	F.	4	10
Pheosia	tremula	CL.	15	40
		F.	23	41
Pheosia	gnoma	CL.	12	36
Pterostoma Ptilodon	palpinum		10	16
Ptilodon	capucina	L.		
Ptilodontella	cucullina	D. & SCH.	4	10
Spatalia	argentina	D. & SCH.	5	7
Gluphisia	crenata	ESP.	18	101
Clostera	anachoreta	D. & SCH.	4	38
Clostera	curtula	L.	6	12
Clostera	anastomosis	L.	12	142
Clostera	pigra	Hufn.	6	8
Thaumetopoea	processionea	L.	6	69
Calliteara	pudibunda	L.	7	29
Pentophera	morio	L.	1	1
Orgyia	antiqua	L.	4	6
Lymantria	dispar	L.	5	19
Arctornis	l-nigrum	MÜLL.	1	1
Leucoma	salicis	L.	7	125

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Euproctis	chrysorrhoea	L.	5	7
Sphrageidus	similis	FSL.	20	152
	rctiidae			
Thumatha	senex	Нв.	9	35
Miltochrista	miniata	J.Forst.	4	10
Cybosia	mesomella	L.	2	2
Pelosia	muscerda	Hufn.	23	231
Pelosia	obtusa	H.S.	2	6
Lithosia	quadra	L.	1	1
Eilema	deplana	ESP.	2	5
Eilema	griseola	Нв.	14	47
Eilema	lurideola	Z.	1	2
Eilema	complana	L.	6	41
Eilema	lutarella	L.	3	8
Eilema	sororcula	HUFN.	4	29
Coscinia	cribraria	L.	2	3
Phragmatobia	fuliginosa	L.	16	62
Spilosoma	luteum	HUFN.	14	42
Spilosoma	lubricipedum	L.	15	48
Spilosoma	urticae	ESP.	7	22
Diacrisia	sannio	L.	8	12
Arctia	caja	L.	5	8
Arctia	villica	L.	2	4
Euplagia	quadripunctaria	PODA	1	3
Dysauxes	ancilla	L.	2	2
	o c t u i d a e	In .		
Simplicia	rectalis	Ev.	1	1 2
Paracolax	tristalis	F.	2	2
Macrochilo Herminia	cribrumalis	Нв.	3	3 2
Treitschkendia	tarsicrinalis	KNOCH	1	1
	tarsipennalis	TR.	10	30
Quaramia	grisealis tentacularia	D. & SCH.	11	31
Polypogon Rivula		L. Sc.	20	119
Colobochyla	sericealis	SC. D. & SCH.	20	
Schrankia	salicalis costaestrigalis	STEPHENS	1	<u>3</u>
Нурепа	proboscidalis	L.	19	137
71	rostralis	L.	11	14
Hypena Phytometra		CL.	2	
Scoliopteryx	viridaria libatrix	L.	3	<u>2</u> 7
Catocala	sponsa	L.	2	4
Catocala	fraxini	L.	10	11
Catocala	nupta	L.	13	22
Catocala	elocata	ESP.	13	1
Catocala	electa	VIEW.	1	3
Catocala	fulminea	SC.	5	21
Lygephila	pastinum	TR.	3	4
Lygephila Lygephila	viciae	HB.	2	4
Tyta	luctuosa	D. & SCH.	1	2
Callistege	mi	CL.	2	2
Euclidia Euclidia	glyphica	L.	3	6
Laspeyria Laspeyria	flexula	D. & Sch.	2	2
Meganola	strigula	D. & SCH. D. & SCH.	1	1
Meganola Meganola	albula	D. & SCH. D. & SCH.	4	7
Nola	cucullatella	L.	3	4
Nola	aerugula	L.	5	13

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Nola	cristatula	Нв.	1	1
Nycteola	revayana	Sc.	2	2
Nycteola	asiatica	Krul.	1	2
Earias	clorana	L.	14	68
Earias	vernana	F.	3	5
Bena	prasinana	L.	6	16
Colocasia	coryli	L.	9	22
Diloba	caeruleocephala	L.	3	5
Moma	alpium	OSB.	1	4
Acronicta	alni	L.	1	1
Acronicta	psi	L.	2	3
Acronicta	aceris	L.	3	4
Acronicta	leporina	L.	2	2
Acronicta	megacephala	D. & Sch.	13	47
Acronicta	auricoma	D. & SCH.	1	1
Acronicta	rumicis	L.	5	8
Craniophora	ligustri	D. & SCH.	15	91
Simyra	albovenosa	GOEZE	5	14
Cryphia	fraudatricula	Нв.	1	14
Cryphia	algae	F.	3	3
Cryphia	domestica	HUFN.	1	<u></u>
Emmelia	trabealis	SC.	1	<u> </u>
Protodeltode	pygarga	HUFN.	5	18
Deltode	deceptoria	Sc.	3	13
Deltode	uncula	CL.	3	3
Deltode	bankiana	F.	10	14
Pseudeustrotia	candidula	D. & SCH.	10	27
Polychrysia	moneta	F.	1	2
Diachrysia	chrysitis	L.	18	87
Diachrysia	zosimi	Нв.	1	2
Macdunnoughia	confusa	STEPHENS	9	23
Plusia	festucae	L.	9	20
Autographa	gamma	L.	39	113
Autographa	pulchrina	Hw.	1	1
Abrostola	triplasia	L.	1	2
Abrostola	trigemina	WERNEB.	5	9
Abrostola	asclepiadis	D. & Sch.	5	14
Cucullia	absinthii	L.	1	1
Cucullia	lychnitis	RAMBUR	1	2
Calophasia	lunula	Hufn.	2	2
Pyramidcampa	pyramidea	L.	4	44
Amphipyra	tragopoginis	CL.	5	7
Pyrrhia	umbra	HUFN.	2	2
Elaphria	venustula	Нв.	1	3
Acosmetia	caliginosa	Нв.	4	12
Caradrina	morpheus	HUFN.	3	11
Paradrina	clavipalpis	Sc.	2	3
Hoplodrina	octogenaria	Goeze	1	3
Hoplodrina	ambigua	D. & SCH.	12	56
Atypha	pulmonaris	ESP.	1	1
Chilodes	maritima	TAUSCHER	6	8
Athetis	gluteosa	TR.	1	2
Athetis	furvula	HB.	1	1
	*		4	5
Proxenus	lepigone	MÖSCHLER		
Dypterygia	scabriuscula	L. L.	4	5

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Talpophila	matura	Hufn.	3	3
Trachea	atriplicis	L.	2	6
Euplexia	lucipara	L.	9	19
Phlogophora	meticulosa	L.	17	31
Actinotia	polyodon	CL.	2	2
Eucarta	virgo	Tr.	1	1
pimorpha	retusa	L.	6	13
pimorpha	subtusa	D. & Sch.	9	28
Enargia	paleacea	ESP.	3	8
Parastichtis	suspecta	Нв.	2	3
Mesogona	oxalina	Нв.	3	3
Cosmia	diffinis	L.	2	2
Cosmia	affinis	L.	2	2
Cosmia	pyralina	D. & Sch.	5	11
Cosmia	trapezina	L.	9	30
Atethmia	centrago	Hw.	11	145
Kanthia	togata	ESP.	4	5
Kanthia	icteritia	Hufn.	6	42
Kanthia	gilvago	D. & Sch.	2	5
Kanthia	ocellaris	Вкн.	6	47
issipunctia	ypsillon	D. & Sch.	5	30
1grochola	lychnidis	D. & Sch.	3	6
1grochola	circellaris	Hufn.	7	24
1grochola	lota	CL.	6	27
Agrochola	macilenta	Нв.	3	17
Agrochola	helvola	L.	4	10
Agrochola	humilis	D. & Sch.	1	1
Agrochola	litura	L.	1	4
Agrochola	laevis	Нв.	2	4
Eupsilia	transversa	HUFN.	6	29
Conistra	vaccinii	L.	4	7
Conistra	rubiginea	D. & Sch.	1	1
Conistra	erythrocephala	D. & Sch.	1	1
Episema	glaucina	ESP.	1	1
Cleoceris	scoriacea	ESP.	1	1
Lithophane	hepatica	CL.	2	2
Lithophane	ornitopus	Hufn.	1	1
Lithophane	furcifera	Hufn.	1	1
Kylena	vetusta	Нв.	1	2
1llophyes	oxyacanthae	L.	4	6
Valeria Valeria	oleagina	D. & SCH.	1	1
Dichonia	convergens	D. & Sch.	1	1
Intitype	chi	L.	1	1
1mmoconia	caecimacula	D. & SCH.	6	16
Blepharita	satura	D. & Sch.	1	2
Iniotype	adusta	ESP.	1	1
1ратеа	monoglypha	HUFN.	2	3
1ратеа 1ратеа	crenata	HUFN.	6	9
1ратеа 1ратеа	remissa	Нв.	3	5
1ратеа 1ратеа	anceps	D. & Sch.	4	15
1ратеа 1ратеа	sordens	HUFN.	1	2
1ратеа 1ратеа	lateritia	HUFN.	1	1
1ратеа 1ратеа	unanimis	Нв.	2	4
Loscopia	scolopacina	ESP.	2	4
	ophiogramma	ESP.	6	19
Leucapamea Oligia	latruncula	D. & SCH.	4	13

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Mesoligia	furuncula	D. & Sch.	4	14
Mesapamea	secalis /didyma-Aggre.	-	2	3
Luperina	testacea	D. & Sch.	2	2
Rhizedra	lutosa	Нв.	4	7
Amphipoea	oculea	L.	4	19
Amphipoea	fucosa	FRR.	2	11
Hydraecia	micacea	ESP.	17	78
Hydraecia	ultima	Holst	1	1
Gortyna	flavago	D. & Sch.	8	14
Staurophora	celsia	L.	3	9
Celaena	leucostigma	Нв.	6	7
Nonagria	typhae	THNB.	2	2
Archanara	sparganii	ESP.	1	1
Archanara	algae	ESP.	1	1
Sedina	buettneri	HERING	1	2
Arenostola	semicana	ESP.	1	1
Chortodes	extrema	Нв.	1	2
Chortodes	fluxa	Нв.	3	3
Chortodes	рудтіпа	Hw.	3	5
Discestra	trifolii	HUFN.	17	74
Lacanobia	w-latinum	HUFN.	4	6
Lacanobia	oleracea	L.	19	72
Lacanobia Lacanobia	thalassina	HUFN.	7	17
Lacanobia Lacanobia	suasa	D. & SCH.	12	43
Hada		HUFN.	1	1
Hadena	nana bicruris	HUFN.	4	6
нааепа Hadena		+	10	22
	confusa	HUFN.	10	
Hadena	perplexa	D. & SCH.		2
Aneda	rivularis	F.	2	2
Melanchra	persicariae	L.	2	5
Mamestra	brassicae	L.	9	30
Polia	nebulosa	HUFN.	2	2
Leucania	obsoleta	Нв.	4	12
Mythimna	turca	L.	2	2
Mythimna	conigera	D. & Sch.	5	10
Mythimna	ferrago	F.	4	16
Mythimna	albipuncta	D. & Sch.	24	142
Mythimna	impura	Нв.	12	101
Mythimna	pallens	L.	24	147
Mythimna	l-album	L.	8	17
Orthosia	incerta	Hufn.	5	26
Orthosia	gothica	L.	5	23
Orthosia	cruda	D. & Sch.	2	5
Orthosia	opima	Нв.	1	3
Orthosia	populeti	F.	2	3
Orthosia	cerasi	F.	2	3
Orthosia	gracilis	D. & SCH.	1	2
Orthosia	munda	D. & SCH.	1	1
Panolis	flammea	D. & SCH.	3	11
Egira	conspicillaris	L.	2	5
Tholera	cespitis	D. & SCH.	1	33
Neuronia	decimalis	PODA	6	23
Axylia	putris	L.	15	72
Ochropleura	plecta	L.	27	14
Diarsia	mendica	F.	1	2
Diarsia Diarsia	brunnea	Г. D. & Sch.	1	4

Familie / Gattung	Art	Autor	Anzahl Nachweise	Anzahl Individuen
Diarsia	rubi	VIEW.	13	75
Diarsia	florida	SCHMIDT	2	2
Noctua	pronuba	L.	13	27
Noctua	fimbriata	Schreber	8	14
Noctua	orbona	HUFN.	1	1
Noctua	comes	Нв.	1	1
Noctua	interposita	Нв.	1	1
Noctua	janthina	D. & Sch.	13	30
Spaelotis	ravida	D. & Sch.	1	1
Opigena	polygona	D. & SCH.	6	12
Graphiphora	augur	F.	1	3
Eugnorisma	depuncta	L.	1	1
Xestia	c-nigrum	L.	29	295
Xestia	triangulum	Hufn.	2	3
Xestia	baja	D. & Sch.	3	5
Xestia	rhomboidea	ESP.	1	1
Xestia	sexstrigata	Hw.	8	24
Xestia	xanthographa	D. & Sch.	9	58
Cerastis	rubricosa	D. & Sch.	2	8
Anaplectoides	prasina	D. & Sch.	5	7
Еихоа	aquilina	D. & Sch.	1	1
Еихоа	tritici	L.	1	1
Yigoga	nigrescens	Höfner	1	1
Agrotis	ipsilon	Hufn.	14	37
Agrotis	exclamationis	L.	8	29
Agrotis	segetum	D. & Sch.	18	156
Summe			2981	9088

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Denisia

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: 0029

Autor(en)/Author(s): Lichtenberger Franz

Artikel/Article: Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) der Marchauen bei

Drösing, Niederösterreich 173-192