

Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Leverkusen und Umgebung (1974—1976)

Klaus Adolphi, Wolf-Bernhard Dickoré und Uwe Köller

(Eingegangen am 18. 11. 1976)

Unter Leverkusen und Umgebung sind die Gebiete der TK 25 4907 Leverkusen und 4908 Burscheid zu verstehen. Zu jedem Pflanzenfund ist der Quadrant des Meßtischblattes angegeben. — Es bedeuten 1 = NW, 2 = NE, 3 = SW, 4 = SE. — Sofern die Arten in LAVEN & THYSSEN „Die Flora des Köln-Bonner Wandergebietes“ nicht verzeichnet sind, erfolgt eine Seitenangabe, wo diese nachzutragen sind. Die Pflanzen sind in alphabetischer Reihenfolge der Gattungsnamen geordnet, was ein Auffinden erleichtert. Die Nomenklatur richtet sich nach ROTHMALER (1972).

- Acer negundo* L. — 4907/4 Auwald an der Wuppermündung.
Acorus calamus L. — 4907/1 Worringer Hafen; 4908/1 Diepentalssperre.
Allium vineale L. — 4907/2 Am Mühlengraben (Reuschenberg) massenhaft und an anderen Stellen sich auf Bahngelände ausbreitend, wahrscheinlich herbizidresistent.
Amaranthus albus L. — 4907/4 Rheinufer Merkenich und Wiesdorf.
Amaranthus retroflexus L. — 4907/4 Rheinufer Merkenich.
Bromus inermis LEYSER — 4907/2 Hitdorf.
Butomus umbellatus L. — 4907/4 Altwasser Flittard.
Carex strigosa HUDS. — 4908/2 Heidberg (zwischen Niederblecher und Dürscheid).
Carthamus tinctorius L. — 4908/1 Schuttstelle bei Biesenbach. (zu p. 163)
Ceratophyllum demersum L. — 4908/3 Kurtekottenteich.
Chenopodium ambrosioides L. — 4907/4 Kiesgrube an der A1, östl. Heimersdorf.
Chenopodium foliosum ASCHERS. — 4908/3 Kiesgrube Eisholz.
Chenopodium glaucum L. — 4907/4 Rheinufer Merkenich.
Cicuta virosa L. — 4907/1 Kiesgrube Monheim.
Claytonia perfoliata DONN. ex. WILLD. — 4907/2 Felsen an der Bonner Str., Opladen, eingebürgert! (zu p. 61)
Coronilla varia L. — 4907/1 Rheinufer zwischen Hitdorf und Monheim.
Coronopus didymus (L.) SM. — 4908/3 Kiesgrube Eisholz. (zu p. 75)
Coronopus squamatus (FORSKÅL) ASCHERS. — 4907/4 Rheindorf, an der Wuppermündung.
Crepis setosa HALLER fil. — 4907/2 Bonner Str., Opladen und vereinzelt an anderen Stellen. Sich ausbreitend.
Cuscuta gronovii WILLD. — 4907/4 Pappelwald Flittard.
Cynodon dactylon (L.) PERS. — 4907/4 Rheinufer Merkenich; Rheinufer Flittard.
Dianthus armeria L. — 4907/2 Mauer am Mühlengraben (Reuschenberg).
Echinops sphaerocephalus L. — 4907/2 Bonner Str., Opladen.
Epilobium adenocaulon HAUSSKN. — 4907/4 Dhünnufer; auch in Gärten, z.B. 4908/1 Steinbüchel. Sich ausbreitend. (zu P. 112)
Epilobium lamyi F. W. SCHULTZ — 4907/2 Kiesgrube Kalkhecke.
Eschscholtzia californica CHAM. — 4907/4 Kuppersteg auf Schutt.
Euphorbia exigua L. — 4907/1 In der Uferbefestigung am Reuschenberger Weiher.

- Euphorbia palustris* L. — 4907/1 Worringer Bruch.
- Ficus carica* L. — 4907/4 Seit Jahren in einem Kellerschacht des Hauses Küppersteger Str. 2.
- Gymnocarpium robertianum* (HOFFM.) NEWMAN — 4907/2 Mauer am Mühlengraben (Reuschenberg).
- Heracleum mantegazzianum* SOMM. et LEV. — 4907/2 Rhein- und Wupperufer.
- Hyacinthoides hispanica* (MILL.) ROTH. [Syn. *Scilla hispanica* (L.) HOFFMGG. et LINK]. — 4907/2 Reuschenberg. Friedhofflüchtling? (zu p. 43)
- Hydrocotyle vulgaris* L. — 4908/1 Bürgerbusch.
- Legousia speculum-veneris* (L.) CHAIX — 4908/1 Bruchhausen; 4908/3 Ophovener Weiher.
- Lemna trisulca* L. — 4908/1 Bürgerbusch.
- Lepidium graminifolium* L. — 4907/4 Flittard.
- Linum usitatissimum* L. — 4908/3 Fixheide, anscheinend eingeschleppt und unbeständig.
- Lysimachia punctata* L. — 4907/2 Mühlengraben. (zu p. 122)
- Macleaya cordata* R. BR. — 4907/2 Bonner Str., Opladen. (zu p. 71)
- Myrica gale* L. — 4908/4 Buschhorner Bruch, zurückgehend.
- Nicotiana rustica* L. — 4907/2 Reuschenberg, auf Schutt.
- Nicotiana tabacum* L. — 4907/4 Küppersteg, auf Schutt. (zu p. 136)
- Nymphoides peltata* (S. G. GMELIN) O. KUNTZE — 4908/3 Kiesgrube Eisholz, vor Jahren angepflanzt. Hat sich stark ausgebreitet.
- Onopordum acanthium* L. — 4907/1 Monheim, Bleer Str.
- Ophioglossum vulgatum* L. — 4908/1 Hüscheider Wald (wahrscheinlich der gleiche Standort wie bei ROCHE & ROTH, 1975); 4908/1 Bürgerbusch „Im Buchenhain“.
- Orobancha caryophyllacea* SM. — 4907/1 Rheinwiesen Monheim.
- Osmunda regalis* L. — 4907/2 Bruchwald bei Hapelrath; 4908/4 Buschhorner Bruch.
- Parietaria judaica* L. — 4907/4 Mauer nahe der Aldegundiskirche, Rheindorf.
- Potamogeton berchtoldii* FIEBER — 4907/1 Monheimer Kiesgrube.
- Potamogeton lucens* L. — 4907/4 Fühlinger See.
- Potamogeton natans* L. — 4907/1 Monheimer Kiesgrube.
- Potamogeton nodosus* POIRET — 4907/2 Tümpel bei Rheindorf (det. K. H. HARMS, Bonn-Bad Godesberg). (zu p. 15)
- Potamogeton pectinatus* L. — 4908/1 Fischteich im Bürgerbusch.
- Potentilla intermedia* L. — 4908/3 Kiesgrube Eisholz und an anderen Stellen auf trockenen Böden. Sich ausbreitend.
- Potentilla recta* L. — 4907/2 Bonner Str., Opladen.
- Potentilla supina* L. — 4907/4 Alte Wuppermündung.
- Pulicaria dysenterica* (L.) BERNH. — 4907/4 Rheinufer Wiesdorf; 4908/3 Vogelschutzgebiet am Ophovener Weiher.
- Ranunculus circinatus* SIBTH. — 4907/3 Kiesgrube bei Auweiler; 4907/4 Fühlinger See.
- Rapistrum rugosum* (L.) ALL. — 4907/2 Langenfeld, Kalkhecke.
- Reynoutria japonica* HOUTT. — Hat sich stark ausgebreitet. Ufer von Dhünn und Wupper, Bürgerbusch u.s.w. Gräben und Wegränder, in beiden MTB verbreitet.
- Rumex maritimus* L. — 4907/4 Rheinufer Merkenich.
- Sagittaria sagittifolia* L. — 4907/4 Altwasser Wuppermündung.
- Scrophularia umbrosa* DUM. — 4907/4 Rheinufer Merkenich.
- Scutellaria minor* HUDS. — 4908/1 Fischteich im Bürgerbusch.
- Sedum reflexum* L. — 4907/2 Felsen an der Bonner Str., Opladen.
- Sedum spurium* M. BIEB. — 4907/2 Felsen an der Bonner Str., Opladen.

Ulmus laevis PALLAS. — 4908/3 Fixheide, mehrfach, dort durch Industrieanlagen bedroht.

Veronica filiformis SM. — Inzwischen in fast allen Parkrasen. Da die Pflanze steril bleibt, erfolgt die Ausbreitung wohl durch städtische Rasenmäher, die Sproßstücke verschleppen. In privaten Rasen und an Feldrändern (noch?) seltener. (zu p. 141)

Virga pilosa (L.) HILL. — 4908/2 Altenberg

Der erstaunliche Reichtum an bemerkenswerten Pflanzenarten im Raum Leverkusen kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß gerade hier in erschreckendem Maße Standorte vernichtet wurden und werden. Vor allem im Stadtgebiet fallen immer mehr artenreiche Ödland- und Ruderalflächen sowie Restbestände naturnaher Vegetation der gärtnerischen Gestaltung zum Opfer, wodurch artenarme Parks entstehen. Die Rekultivierung der Kiesgruben, in denen viele Ruderal-, aber auch Wasserpflanzen neue Lebensräume fanden, wirkt sich ebenfalls sehr ungünstig aus. (Die Flora des Fühlinger Sees ist dadurch stark verarmt, andere Rekultivierungsmaßnahmen stehen bevor.)

Die „klassischen“ Fundorte am Rheinufer (MTB 4907) sowie im Eifgental und bei Paffrath (MTB 4908) existieren zum großen Teil noch. Auf die Anführung von Arten dieser Gebiete, die von LAVEN & THYSSEN (1959) schon erwähnt worden sind, wurde meist verzichtet. An der Wuppermündung sind die von LAVEN & THYSSEN (1959) gemeldeten Arten zum großen Teil verschwunden.

Literatur

HÖPPNER, H. & PREUSS, (1926): Flora des Westfälisch-Rheinischen Industriegebietes. Nachdruck Duisburg 1971.

LAVEN, L. & THYSSEN, P. (1959): Flora des Köln-Bonner Wandergebietes. — Decheniana **112**, 1—179.

ROCHE, O. & ROTH, H. J. (1975): Flora des Köln-Bonner Wandergebietes (Gefäßkryptogamen und Phanerogamen). Nachträge aus dem Nachlaß von Paul THYSSEN. — Decheniana **128**, 143—167.

ROTHMALER, W. (1972): Exkursionsflora (Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin).

Anschriften der Verfasser:

Klaus Adolphi, Eduard-Spranger-Str. 10, D—5090 Leverkusen 3; Wolf-Bernhard Dickoré, Nicolai-Hartmann-Str. 19, D—5090 Leverkusen 1; Uwe Köller, Schleiermacher-Str. 8, D—5090 Leverkusen 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [131](#)

Autor(en)/Author(s): Adolphi Klaus, Dickore Wolf Bernhard, Köller Uwe

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Pflanzenfunde in Leverkusen und Umgebung \(1974— 1976\) 39-41](#)