

# FID Biodiversitätsforschung

## Decheniana

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und  
Westfalens

Untersuchungen zur Verteilung und zum Vorkommen der Wanzen  
(Heteroptera) und Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) in einem  
typischen Biotopkomplex des Münsterlandes - mit 1 Tabelle und 2  
Abbildungen

**Bernhardt, Karl-Georg**

**1985**

---

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im  
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

---

### **Weitere Informationen**

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

*Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.*

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten  
Identifikator:

[urn:nbn:de:hebis:30:4-190934](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:4-190934)

## Untersuchungen zur Verteilung und zum Vorkommen der Wanzen (Heteroptera) und Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) in einem typischen Biotopkomplex des Münsterlandes

Karl-Georg Bernhardt

Mit 1 Tabelle und 2 Abbildungen

(Eingegangen am 19. 10. 1983)

### Kurzfassung

In einem typischen Biotopkomplex des Kernmünsterlandes, im Werseraum, wird die Wanzen- und Zikadenfauna untersucht. Dargestellt werden die räumlichen, strukturellen und zeitlichen Verteilungsmuster innerhalb des Untersuchungsgebietes, außerdem werden Angaben zur Verbreitung gemacht.

### Abstract

Faunistic studies on the heteroptera and cicadina of a complex of biotops in the Westfalen lowland near the river Werse were carried out. Based on research results, the spatial, structural and chronological distribution is described.

### 1. Einleitung

Im Rahmen einer Diplomarbeit am Lehrstuhl für Landschaftsökologie (Institut für Geographie) in Münster wurden im Landschaftsplangebiet Werse-Ost vergleichende synökologische Studien zu einem Tansekt: Wald-Waldrand-Acker-Hecke betrieben (BERNHARDT & VOIGT 1983). Hierbei zeigte sich, daß die Wanzen sowie Zikaden besonders intensive Bindungen an bestimmte Biotope und deren Strukturelemente zeigten. Deshalb wurden in der folgenden Vegetationsperiode (1983) bestimmte Aspekte auf einem größeren Areal weiter vertieft sowie teilweise auch neu bearbeitet und der vorliegenden Arbeit ergänzend beigelegt. Diese Arbeit ist innerhalb der zoozönotischen Forschungsrichtung als Beitrag zur faunistischen Abgrenzung verschiedenartiger Phytozoozönosen durch typische Organismen gedacht. Ebenfalls soll die Arbeit ein Beitrag zur Erfassung der Wanzen- und Zikadenfauna in der westfälischen Bucht sein.

### 2. Das Untersuchungsgebiet

Das untersuchte Gebiet liegt etwa 4 km östlich des Zentrums der Stadt Münster, nahe der Werse, einem Zuleiter der Ems (Abb. 1). Es ist ca. 1 km<sup>2</sup> groß und durch einen relativ kleinflächigen Nutzungswechsel von Acker-, Weide- und Forstwirtschaft charakterisiert. Das Gebiet enthält noch einige strukturierende Landschaftselemente wie Hecken, Säume u. a. Durch die landwirtschaftliche Beanspruchung sowie Freizeitnutzung ist das Gebiet stark gestört. In der Mehrheit liegen staunasse Lehmböden vor, auf denen als potentielle natürliche Vegetation nach BURRICHTER (1973) das Stellario-Carpinetum zu finden ist.

### 3. Methode

Zur Erfassung der auf dem Boden lebenden Heteroptera wurden BARBER-Fallen (BARBER 1931) mit einer Öffnungsweite der Behälter von 6 cm benutzt und mit mehrfacher Wiederholung in den unterschiedlichen Pflanzenformationen aufgestellt. Der größere Teil der Wanzen und Zikaden mußte mit dem Kächer gefangen werden. Hierbei wurden die einzelnen Vegetationseinheiten durch eine Probe von 10 Schlägen auf 2 m<sup>2</sup>–5 m<sup>2</sup> abgesucht. In Tab. 1 ist die Gesamtzahl der in den zwei Jahren gefangenen Tiere pro Pflanzenformation oder Assoziation angegeben.




Abbildung 1. Lage des Untersuchungsgebietes (+).

Die Nomenklatur der Wanzen basiert auf STICHEL (1955–1962), die der Zikaden auf HAUPT (1960). Die Angaben zur Verbreitung und Lebensweise entstammen ebenfalls diesen Werken sowie aus WAGNER (1952–1967) und sind durch eigene Angaben ergänzt. Das Prinzip der Übersichtstabelle (Tab. 1) richtet sich nach HOFFMANN (1978). Für die pflanzensoziologischen Einheiten wurden die Benennungen von RUNGE (1973) und WITTIG (1976) verwendet, die Pflanzennamen entstammen der Flora von OBERDORFER (1979). Die Bestimmung der *Rubus*-Arten nahm freundlicherweise Herr Prof. Dr. WITTIG vor.

#### 4. Vegetationsverhältnisse

Als Waldgesellschaft findet sich im Gebiet das Stellario-Carpinetum OBERDORFER 1953 in seinen drei Untergesellschaften:

Stellario-Carpinetum periclymenetosum

Stellario-Carpinetum typicum

Stellario-Carpinetum stachyetosum

sowie als Fragment. Einen besonders großen Teil nahmen hier die Eichen (*Quercus robur*) ein.

Die Gebüschgesellschaften der Waldränder und Hecken sind dem Corno-Prunetum WITTIG 1976 und dem *Rubus elegantispinosi*-Prunetum WITTIG 1976 zuzuordnen. Das Corno-Prunetum zeichnet sich durch anspruchsvollere Arten wie *Cornus sanguinea*, *Acer campestre* und *Stachys sylvatica* aus, die zweite Gesellschaft wird durch *Rubus lindleianus* und *Rubus winteri* charakterisiert.

An Weg-, Acker- und Gebüschrändern finden sich Saumgesellschaften, die zu unterschiedlichen Vegetationseinheiten gehören. Es sind dies das *Urtico-Aegopodietum* TÜXEN 1967, die *Urtica dioica*-Galio-Calystegietalia-Fragmentgesellschaften (vgl. WITTIG 1976), das *Alliario-Chaerophylletum temuli* LOHMEYER 1949 und das *Tanaceto-Artemisietum* BRAUN-BLANQUET 1969. Die Getreidefelder, in der Hauptsache aus Hafer und Weizen bestehend, werden vom *Aphano-Matricarietum chamomillae* TÜXEN 1937 und Fragmenten, die einen hohen Anteil an *Apera spica-venti* aufweisen, eingenommen; die Maisfelder wiesen keinerlei andere Pflanzen auf. Auf den kleinflächigen Rübenfeldern gedieh das *Chenopodietum polyspermi* SISSINGH 1942.

Gesamtartenzahl	Vegetationseinheiten														Gesamtzahl	Verteilung in Deutschland	Verteilungstyp	Lebensweise																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467

<b>Mabiidae</b>													
<i>Nabis limbatus</i>	1	3	8	17	.	.	.	.	17	v+h	zp	zo	Kräuter, feuchte Biotope
<i>Himacerus apterus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	12	v+zh	eus	zo	Gehölze
<b>Pentatomidae</b>													
<i>Dolycoris baccarum</i>	.	12	17	3	.	.	.	4	36	wv+sh	eu	zo	Gehölze, Kulturpflanzen
<i>Palomena prasina</i>	.	3	2	.	.	.	.	.	5	v+h	eus	ph	Laubhölzer
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	8	11	.	.	.	.	.	21	v+h	eu	ph	Gebüsch, Kräuter
<b>Saldidae</b>													
<i>Saldula orthochila</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	1	v+ns	eus	zo	feuchte Laubstreu, oft fern von Gewässer
<b>CICADINA</b>													
<b>Delphacidae</b>													
<i>Stenocranus minutus</i>	.	.	.	2	31	.	.	1	34	v+h	eu	ph	Kräuter, Urtica
<b>Cercopidae</b>													
<i>Aphrophora alni</i>	.	17	10	.	41	.	.	.	68	v+h	eus	ph	Gehölze
<i>Cercopis sanguinolenta</i>	.	.	.	.	29	.	.	.	29	v+h	eu	ph	Gramineen, Kräuter
<i>Lepyronia coleoptrata</i>	.	6	1	.	.	.	.	.	7	v+ns	eu	ph	Kräuter
<i>Philaenus spumarius</i>	.	18	6	.	182	1	.	2	209	wv+sh	eu	ph	Gramineen, Kräuter
<b>Jassidae</b>													
<i>Aphrodes flavostriatus</i>	.	9	8	.	.	.	.	.	17	wv+h	eu	ph	Gramineen, feuchte Biotope
<i>Deltacephalus pulicaris</i>	.	25	11	.	.	.	.	.	36	wv+h	eu	ph	Kräuter
<i>D. striatus</i>	.	.	1	.	16	.	.	7	24	v+sh	eu	ph	Gramineen, Getreideschädl.
<i>Eucanthus acuminata</i>	.	21	.	.	.	.	.	.	21	v+ns	eus	ph	Kräuter, feuchte Biotope
<i>Euscelis sordidus</i>	.	27	12	.	.	.	.	.	39	wv+h	eus	ph	Gramineen, Kräuter
<i>Macropsis virescens</i>	.	7	.	.	.	.	.	.	7	v+ns	eus	ph	Salix
<i>Eucanthus acuminata</i>	.	21	.	.	.	.	.	.	21	v+ns	eus	ph	Kräuter, feuchte Biotope
<i>Euscelis sordidus</i>	.	27	12	.	.	.	.	.	39	wv+h	eus	ph	Gramineen, Kräuter

Tabelle 1. Artenliste, Verteilung der Arten auf die untersuchten Vegetationseinheiten und ökologische Angaben. Erläuterung der Abkürzungen:

A	Stellario-Carpinetum	v	verbreitet	ha	holarktisch
B	Corno-Prunetum	wv	weit verbreitet	p	paläarktisch
C	<i>Rubio elegantissimosi-Prunetum</i>	z	zerstreut	wp	westpaläarktisch
D	<i>Urtico-Aegopodietum</i>	h	häufig	eu	europäisch
E	<i>Urtica dioica-Galio-Calystegietalia-Fragmentgesellschaft</i>	nh	nicht häufig	meu	mitteleuropäisch
F	<i>Alliario-Chaerophylletum temuli</i>	sh	sehr häufig	eus	euroibirisch
G	<i>Tanacetum-Artemisietum</i>	zh	ziemlich häufig	zp	zirkumpolar
H	Getreide	s	selten	hm	holomediterran
J	Rübenfeld	ns	selten	a	alpin
		ph	phytophag	pm	pontomediterran
		zo	zoophag		

## 5. Ergebnisse

Insgesamt wurden 1619 Individuen, die sich auf 54 Arten verteilen, gefangen. Die Arten verteilen sich auf die Familien wie folgt:

### HETEROPTERA

Acanthosomatidae	4 Arten	—	7,7%
Anthcoridae	2 Arten	—	3,9%
Cydnidae	1 Art	—	1,5%
Lygaeidae	6 Arten	—	10,6%
Miridae	24 Arten	—	46,0%
Nabidae	2 Arten	—	3,9%
Pentatomidae	3 Arten	—	5,8%
Saldidae	1 Art	—	1,5%

### CICADINA

Delphacidae	1 Art	—	1,5%
Cercopidae	4 Arten	—	7,7%
Jassidae	6 Arten	—	10,6%

Die genauen Individuenzahlen sind Tab. 1 zu entnehmen.

## 6. Diskussion der Ergebnisse

Die artenreichsten Flächen des Gebietes sind die Gebüschformationen des Waldmantels und der Hecken mit den beiden Assoziationen Corno-Prunetum und Rubo elegantispinosi-Prunetum: 33 Zikaden- und 31 Wanzenarten. Allerdings sind die Individuenzahlen relativ gering. Der Grund ist in der hohen strukturellen Vielfalt dieser Gebüschgesellschaften zu




Abbildung 2. Strukturelle Verteilung der Charakterarten.

Erklärung der Ziffern:

1 *Elasmucha grisea*, 2 *Heterocordylus tumidicornis*, 3 *Dolycoris baccarum*, 4 *Palomena prasina*, 5 *Pentatoma rufipes*, 6 *Aphrodes flavostriatus*, 7 *Deltocephalus pulicaris*, 8 *Euacanthus acuminata*, 9 *Euscelis sordidus*, 10 *Anthocoris nemorum*, 11 *Calocoris affinis*, 12 *Amblytylus nasutus*, 13 *Apolygus lucorum*, 14 *Lygus rugulipennis*, 16 *Orthops campestris*, 17 *Nabis limbatus*, 18 *Oncothylus punctipes*.

sehen. Denn auch diese zeichnen sich durch hohe Pflanzenartenzahl sowie ein reichhaltiges Lebensformenspektrum aus. Gräser, Kräuter und Sträucher bieten darüber hinaus mit ihren unterschiedlichen Blühphasen den verschiedensten Tierarten einen Lebensraum. Dagegen zeigen die schmalen Säume der Hecken, Waldmäntel und Gehölzstreifen aufgrund einer relativ gleichförmigen Struktur hohe Individuenzahlen bei den untersuchten Wanzen und Zikaden. Besonders Arten, die an bestimmten Pflanzenarten leben, wie *Anthocoris nemorum*, *Liocoris tripustulatus* oder *Calocoris affinis*, sind sehr häufig. Der Großteil der Arten gehört zur Familie der Weichwanzen, sie leben alle phytophag. Sie weisen immer besondere Häufigkeiten in dichten krautigen Vegetationstypen auf, wie bei der *Urtica dioica*-Galio-Calystegietaalia-Fragmentgesellschaft mit einer Vegetationsbedeckung von 100%. Einen großen Einfluß haben dabei die hohen Anteile von Gramineen und von *Urtica dioica*.

Im Untersuchungsgebiet zeichnen sich generell die kleinflächigen schmalen Säume und Hecken durch Arten- sowie Individuenreichtum aus. Größere Waldflächen oder auch Kulturfelder sind in jeder Hinsicht wesentlich ärmer (Abb. 2). Auch die Untersuchungen von POLLARD 1968, LEWIS 1969, POHLE 1978 sowie ROTTER & KNEITZ 1977/78 stimmen darin überein, daß in einer von Landwirtschaft und Freizeitaktivitäten stark beanspruchten Landschaft diese „Saumbiotope“ die artenreichsten sind. Aber die großen Störungen in dem Untersuchungsgebiet sind auch daran erkennbar, daß keine seltene Art auftritt und daß die Artenzahlen im Vergleich zu anderen Untersuchungen (MADER 1980, 1981) niedriger liegen.

Für einige pflanzensoziologische Einheiten lassen sich stenotope Tiere aufzeigen (vgl. BERNHARDT & VOIGT 1983):

Stellario-Carpinetum:

*Elasmucha grisea*

Corno-Prunetum und Rubo elegantispinosi-Prunetum:

*Heterocordylus tumidicornis*

*Dolycoris baccarum*

*Palomena prasina*

*Pentatoma rufipes*

*Aphrodes flavostriatus*

*Deltocephalus pulicaris*

*Euacanthus acuminata*

*Euscelis sordidus*

*Urtica dioica*-Galio-Calystegietaalia-Fragmentgesellschaft:

*Anthocoris nemorum*

*Calocoris affinis*

*Amblytylus nasutus*

*Apolygus lucorum*

*Liocoris tripustulatus*

*Lygus rugulipennis*

*Orthops campestris*

*Nabis limbatus*

Tanaceto-Artemisietum:

*Oncothylus punctipes*

Bei dieser Zuordnung müssen allerdings einige Einschränkungen gemacht werden, da monophage Tiere auch in anderen Vegetationseinheiten vorkommen können, in denen die Wirtspflanze wächst; ein Beispiel hierfür ist *Anthocoris nemorum*. Die Art kommt überall an *Urtica* vor. Mehrheitlich gehören die Tiere dem mitteleuropäischen bis europäischen Verbreitungstyp an, ebenso ist der paläarktische Typ häufig vertreten.

Danksagung

Herrn Prof. Dr. WITTIG (Düsseldorf) bin ich für die Bestimmung der *Rubus*-Arten dankbar. Für die Durchsicht des Manuskriptes danke ich Herrn Prof. Dr. SCHREIBER (Münster).

## Literatur

- BARBER, H. S. (1931): Traps for care inhabiting insects. — *J. Elisha Mitchell Sci. Soc.* **46**, 259–266.
- BERNHARDT, K. G. & VOIGT, H. (1983): Vergleichende synökologische Untersuchungen zu einem Transekt Wald-Waldrand-Acker-Hecke im Landschaftsplangebiet Werse. — Diplomarbeit aus dem Lehrstuhl für Landschaftsökologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
- BURRICHTER, E. (1973): Die potentielle natürliche Vegetation in der Westfälischen Bucht. — *Landeskundliche Karten u. Hefte d. Geogr. Kommission Westf.*, Reihe Siedlung u. Landschaft in Westfalen **8**. — Münster.
- HAUPT, H. (1960): Homoptera, Zikaden, in: BROHMER, P. et al. *Die Tierwelt Mitteleuropas*, IV. 3. Lief. — Jena.
- HOFFMANN H.-J. (1978): Untersuchungen zur Heteropteren-Fauna des Gelpetales in Wuppertal. — *Jahresber. d. Naturwissenschaftl. Ver. in Wuppertal* **31**, 80–90.
- LEWIS, T. (1969): The diversity of the insect fauna in a hedgerow and neighbouring fields. — *J. appl. Ecology (Oxford)* **6**, 453–458.
- LOHMEYER, W. (1949): Die *Alliaria officinalis*-Chaerophyllum temulum-Assoziation. — *Mitt. flor. soz. AG (Stolzenau)* N. F. **1**, 78–81.
- MADER, H.-J. (1980): Die Verinselung der Landschaft aus tierökologischer Sicht. — *Natur u. Landschaft (Bonn)* **55** (3), 91–96.
- (1981): Untersuchungen zum Einfluß der Flächengröße von Inselbiotopen auf deren Funktion als Trittstein oder Refugium. — *Natur u. Landschaft (Bonn)* **56** (7/8), 235–242.
- OBERDORFER, E. (1953): Der europäische Auenwald. — *Beitr. naturk. Forschung-Südwestdeutschland* **12**, 23.
- (1979): *Pflanzensoziolog. Exkursionsflora*. — Stuttgart (Eugen Ulmer Verlag).
- POHLE, A. (1978): Ökologische Bedeutung von Hecken u. Wallhecken. — *Mitt. d. LÖLF NRW (Recklinghausen)* **3** (10), 249–257.
- POLLARD, E. (1968): Hedges II. — The effect of removal of the bottom flora of a hawthorn hedgerow on the fauna of the hawthorn. — *J. appl. Ecol. (Oxford)* **5**, 109–123.
- ROTER, K. & KNEITZ, G. (1977/78): Die Fauna der Hecken und Feldgehölze und ihre Beziehung zur umgebenden Agrarlandschaft. — *Waldhygiene (Würzburg)* **12** (1 u. 3), 1–82.
- RUNGE, F. (1973): *Die Pflanzengesellschaften Deutschlands*. — Münster.
- STICHEL, W. (1955–1962): *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen Europas*. — II. Cimicomorpha (Miridae, Reduviidae, Saldoidea, Tingioidea). — IV. Pentamorpha. — Berlin.
- TÜXEN, R. (1937): *Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands*. — *Mitt. flor. soz. AG in Niedersachsen* **3**. — Hannover.
- (1967): Ausdauernde nitrophile Saumgesellschaften Mitteleuropas. — *Contribut. Bot. (Cluj)* **1967**, 431–453.
- WAGNER, E. (1952–1967): Blindwanzen oder Miridae. — Pentamorpha. — Cimicomorpha, in: DAHL, F., *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile* **41**, **54** (1), **55** (2). — Jena.
- WITIG, R. (1976): Die Gebüsch- und Saumgesellschaften der Wallhecken in der Westf. Bucht. — *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* **38** (3), 1–78.

Anschrift des Verfassers: Karl-Georg Bernhardt, Biologisches Institut, Spez. Botanik, Barbarastraße 11, D-4500 Osnabrück.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [138](#)

Autor(en)/Author(s): Bernhardt Karl-Georg

Artikel/Article: [Untersuchungen zur Verteilung und zum Vorkommen der Wanzen \(Heteroptera\) und Zikaden \(Homoptera, Auchenorrhyncha\) in einem typischen Biotopkomplex des Münsterlandes 78-84](#)