FID Biodiversitätsforschung

Decheniana

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und
Westfalens

Zur Kenntnis der Foraminiferenfauna der Münsterländer Oberkreide
(Untersanton von Esbeck/Lippstadt) - mit 1 Tabelle und 1 Abbildung

Küppers, Renate

1985

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

[urn:nbn:de:hebis:30:4-191069](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:4-191069)

Zur Kenntnis der Foraminiferenfauna der Münsterländer Oberkreide (Untersanton von Esbeck/Lippstadt)

Renate Küppers

Mit 1 Tabelle und 1 Abbildung

(Eingegangen am 1. 3. 1984)

Kurzfassung

Das untere Santon von Esbeck (südöstliches Münsterland) weist eine artenreiche Foraminiferenfauna (176 Taxa) auf. Die stratigraphisch bedeutsamen Gattungen *Neoflabellina* BARTENSTEIN 1948 und *Stensioeina* BROTZEN 1936 ermöglichen eine genaue Datierung: Grenze Oberes Untersanton/Unteres Mittelsanton.

Die ökologische Interpretation deutet auf einen tieferen Schelfbereich und euhalines, an der Oberfläche warmes Meerwasser mit geringer Hydrodynamik hin.

Abstract

The Lower Santonian of Esbeck (southeastern Münsterland) shows a species-rich foraminiferal fauna (176 taxa). The stratigraphically important genera *Neoflabellina* BARTENSTEIN 1948 and *Stensioeina* BROTZEN 1936 allow to mark exactly the boundary between upper Lower Santonian and lower Middle Santonian.

The ecological interpretation points to a deeper shelf and euhaline, on the surface warm seawater with low hydrodynamic.

Der Fundpunkt „Neue Grube Ziegelei Timmermann“ liegt ungefähr 400 m südöstlich von Esbeck im ENE von Lippstadt (TK 25 4316 Lippstadt 4316, [1978] r 34 58 75, h 57 27 77). An der Westwand wurde ein ca. 4,65 m hohes Profil aufgenommen (25 Proben). Im gesamten Profil sind die Schichten, aus dünnplattigem, hellgrauem grünlich- bis bräunlich-grauem Tonmergel bestehend, gleichmäßig ausgebildet und weisen einen auffallend hohen Kalkanteil (50% und mehr) auf. – Die Aufbereitung der Proben erfolgte nach der Kristallisations- und der Wasserstoffperoxydmethode (POKORNÝ 1958). (Artenliste s. Tab. 1.)

Bei der untersuchten artenreichen Foraminiferenfauna (176 Taxa, davon 46 in offener Nomenklatur) überwiegen die kalkschaligen Rotaliina, die mit sechs Überfamilien und fünfzehn Familien 81,66% der Fauna ausmachen, die agglutinierten Textulariina mit zwei Überfamilien und sechs Familien dagegen nur 18,34%. Auffällig ist der hohe Prozentsatz an planktonischen Foraminiferen (69,7%), die sich auf sieben Arten in drei Familien beschränken, wobei die Globotruncanidae BROTZEN mit *Globotruncana* ex. gr. *paraventricosa* HOFKER/lapparenti BROTZEN die größte Familie darstellt (27,65% der Gesamtf fauna). Unter den benthonischen Foraminiferen nimmt die Familie Ataxophragmiidae SCHWAGER mit 15,45% den breitesten Raum ein (Abb. 1).

Stratigraphisch bedeutsam sind vor allem die Gattungen *Stensioeina* BROTZEN 1936 und *Neoflabellina* BARTENSTEIN 1948. Die Basisgrenze des Santons ist nach HILTERMANN & KOCH (1962) durch das erste Auftreten von *Neoflabellina gibbera* (WEDEKIND 1940) gut festzulegen. Die geschlossenen Mündungskappen bei *N. gibbera* (WEDEKIND 1940) beschreibt KOCH (1977) im oberen Teil des Untersantons und im Mittelsanton. Das gemeinsame Auftreten von *Stensioeina granulata granulata* (OLBERTZ), *St. granulata polonica* WITWICKA und *St. exsculpta exsculpta* (REUSS) kennzeichnet nach KOCH (1977) den unteren Teil des Mittelsantons.

St. granulata granulata (OLBERTZ) kommt in den bearbeiteten Proben sehr selten bis selten vor. *St. granulata polonica* WITWICKA und *St. exsculpta exsculpta* (REUSS) sind dagegen häufiger. Nach KOCH (1977) stirbt *St. granulata granulata* (OLBERTZ) an der Grenze Unter- und Mittelsanton aus.

In den Proben findet man zwischen der typischen *St. granulata granulata* (OLBERTZ), bei der die Suturleisten zu einer Granulierung aufgelöst sind, und der typischen *St. granulata polonica* WITWICKA mit annähernd glatter Spiralseite alle Übergangsformen. Die von KOCH

Abbildung 1. Darstellung der prozentualen Häufigkeitsverteilung der Familien in den untersuchten Proben. Globigerinidae, Globotruncanidae und Heterohelicidae sind planktische Formen.

+ Hier wurden zusammengefaßt:

Hormosinidae (0,014%)	Uvigerinidae (0,007%)
Textulariidae (0,13%)	Cibicididae (0,04%)
Polymorphinidae (0,23%)	Pleurostomellidae (0,09%)
Glandulinidae (0,03%)	Nonionidae (0,1%)
Eouvigerinidae (0,007%)	

(1977) für die Pompeckj'sche Schwelle aufgestellte Stratigraphie scheint sich auch im westfälischen Raum zu bestätigen. Es ist jedoch noch unsicher, ob die Feinstratigraphie vorbehaltlos vom niedersächsischen auf das münsterländische Becken übertragen werden kann. Für die Datierung: Grenze oberes Untersanton/unteres Mittelsanton spricht ebenfalls das Vorkommen von *Cibicides? excavatus*, welcher nach HOFKER (1957, Abb. 102) erst ab Mittelsanton beginnt. In den untersuchten Proben ist diese Art nur vereinzelt vertreten, und die Poren in der Gehäusewand sind sehr klein, was nach HOFKER (1957) als Anzeichen für eine gerade entstandene Art gewertet wird.

Nach diesem Index für den Entwicklungsgrad einer Art, beim Entstehen einer Art kleine Poren, beim Erlöschen große Poren, müßte in meinen Proben *granulata* (OLBERTZ) als aussterbende Unterart sehr große und *polonica* WITWICKA als gerade beginnende Unterart sehr kleine Poren zeigen. Dies ist jedoch nicht der Fall, von *granulata* (OLBERTZ) zu *polonica* WITWICKA ist sogar eine Porenvergrößerung zu beobachten. Diese Möglichkeit wird von HOFKER (1957) bei anderen *Stensioeina*-Unterarten auch erwähnt. Nach HOFKERS Interpretation handelt es sich bei diesen Ausnahmen nicht um eine Mutation, sondern „nur um einen Sprung, der in den Genen der Art gelegen ist und mit dem Altern der Art zusammenhängt, also mit der Porenvergrößerung zu vergleichen ist“. Er bezeichnet diese Änderung als

Variation. Nach HOFKER (1957) wäre *St. granulata polonica* WITWICKA keine Unterart, sondern eine Variation.

HOFKER (1957) äußert die Vermutung, daß eine Ornamentation bei der Gattung *Stensioeina* BROTZEN eine ökologische Bedeutung habe, zum Anheften an Pflanzen oder pelagische Tiere, weil sie nur in solchen Fazies vorkommen, wo es auch pelagische Organismen (*Globigerina*, *Globorotalites*, *Heterohelix*) gibt. Dieser Vermutung widerspricht aber nach der heute weithin akzeptierten von DARWIN ausgehenden Evolutionstheorie die Entwicklung zu Formen mit glatter Spiralseite, z. B. *St. granulata granulata* (OLBERTZ) zu *St. granulata polonica* WITWICKA.

Bei manchen Exemplaren der Gattung *Neoflabellina* BARTENSTEIN sind verschiedene Mündungsfiguren zu beobachten. An der Ontogenie eines Individuums kann man dabei die phylogenetische Tendenz zu immer komplizierteren Mündungsfiguren ablesen.

Die Gattungsbestimmung der Exemplare aus der Unterfamilie Ataxophragmiidae SCHWAGER und die Einteilung in Untergattungen wurde nach der nomenklatorischen Neugliederung der Ataxophragmiidae SCHWAGER 1877 von BARNARD & BANNER (1980), aufgrund der Anzahl der Kammern pro Windung und unter Berücksichtigung des inneren Kammeraufbaues durchgeführt.

In der Literatur werden eine Vielfalt von *Dentalina*-Arten unterschieden. Bei ausreichendem Material könnten bei einer Revision viele „Arten“ in einer Art vereinigt werden, da es sich z. B. um verschiedene Generationsformen einer Art handelt. Eine Möglichkeit, den Verwandtschaftsgrad verschiedener Arten zu dokumentieren, ist die Zusammenfassung von Arten zu Formenkreisen.

Ebenfalls ist eine Revision für die Familie Polymorphinidae D'ORBIGNY 1859 empfehlenswert. Bei einer Konstanz der Morphologie über Formationen hinweg (Oberkreide – Neokom) muß man bezweifeln, ob es sich dabei wirklich um die gleiche Art handelt. Dieses läßt sich bei einer paläontologischen Arbeit nicht entscheiden, weil dieser nur hartteilmorphologische Bestimmungsmerkmale zur Verfügung stehen.

Der überwiegende Anteil der Fauna an planktonischen Foraminiferen (69,7%) weist zusammen mit seltenen Oogonien von Characeen, die als fast ausschließlich Süßwasserbewohner Anzeiger für Landnähe sind, auf einen tieferen Schelfbereich hin. Indessen spricht das häufigere Vorkommen des Ostracoden *Cytherelloides* ALEXANDER 1929 nach Vergleich mit rezenten Verhältnissen für flacheres warmes Wasser. Gegen eine zu große Wassertiefe sind in der beobachteten Fauna auch die adhärent wahrscheinlich meist auf Algen oder angiospermiden Pflanzen lebenden *Stensioeina* und *Gavelinella* zu werten. Algen und Angiospermen sind in der photischen bis in Ausläufern der disphotischen Zone verbreitet.

Nach Abschätzung der Verhältnisse wäre eine Wassertiefe von 100–200 m denkbar.

Die Verwendbarkeit von *Neoflabellina santonica* KOCH zur Faziesanalyse wurde von HILTERMANN & KOCH (1962) erkannt. In meinen Proben kommen Formen mit der extrem *Vaginulina*-ähnlich langgezogenen Spira vor, wie sie Exemplare in ausgesprochener Küstenfazies zeigen, jedoch ist die Gehäuseform nicht so schmal-oval. Bei der geringen Anzahl ist es jedoch fraglich, ob man sie zur Faziesanalyse heranziehen kann.

Der hohe Faunenanteil an planktonischen Foraminiferen weist ebenso wie die Ostracoden der Gattung *Cytherelloidea* ALEXANDER auf wärmeres Wasser hin. Als weiteres Indiz für Warmwasser könnte auch der geringe Prozentsatz an kleinen agglutinierten Formen gewertet werden, da diese im Kaltwasser häufiger vorkommen und größer ausgebildet sind.

Bei der ökologischen Interpretation fossiler Faunen muß jedoch berücksichtigt werden, daß nicht nur Gehäusemutationen, sondern auch physiologische Mutationen möglich sind.

Die Salinität ist neben der Temperatur der wichtigste ökologische Faktor, welcher die Verbreitung der planktonischen Foraminiferen bedingt, dabei wird von den rezenten Arten keine Verringerung des normalen Salzgehaltes (33–36%), dagegen gut eine mäßige Erhöhung toleriert. Die in den Schichten vorkommenden Echiniden weisen ebenfalls auf euhalines Meerwasser hin.

Die Gattung *Heterohelix* EHRENBERG, welche sehr häufig in den Proben zu finden ist, charakterisiert die O₂-Minimumzone der Wassersäule. Sie bevorzugt bzw. toleriert meist einen geringen O₂-Gehalt des Wassers (BOERSMA 1978, 40) und spricht damit für eine geringe Durchlüftung bzw. geringe Hydrodynamik.

ART	HÄUFIG- KEIT	ART	HÄUFIG- KEIT
Rhizammina cf. algaeformis BRADY	ss	N. cf. aspera REUSS	ss
Pelosina sp.	ss - ns	N. cf. fusula REUSS	ss
Thurammina sp.	ss	N. intercostata REUSS	ss
Ammodiscus sp.	ss - s	N. cf. limbata D'ORB.	ss
Glomospira sp.	ss - ns	N. naumanni REUSS	ss
Lituotuba incertus FRANKE	ss - s	N. obscura REUSS	ss
Lituotuba rhumbleri FRANKE	ss - s	N. cf. paupercula REUSS	ss
Lituotuba? sp.	ss	N. raphanistrum f. polygona RSS	ss
Reophax cf. scorpiurus MONTFORT	ss	N. raphanistrum f. inflata RSS	ss
Reophax sp.	ss	Marginulina cf. apiculata REUSS	ss
Haplophragmoides sp.	ss - s	Marginulina bullata REUSS	ss
Ammobaculites fontinensis TERQUEM	ss	Marginulina cf. elongata D'ORB.	ss
Ammobaculoides? sp.	ss	Marginulina cf. hamulus CHAPMAN	ss
Ammoscalaria tenuimargo (BRADY)	ss	Marginulina inaequalis REUSS	ss
Bulbophragmium sp.	ss - h	Lagena aspera REUSS	ss
Lituola cf. irregularis (ROEMER)	ss - h	Lagena filicosta REUSS	ss
Lituola sp.	ss	Lagena hispida REUSS	ss
Textularia sp.	ss	Lagena laevis (MONTAGU)	ss
Textularia foeda REUSS	ss - s	Lagena oxyostoma REUSS	ss - s
Trochammindarum incert. gen.	ss	L. sulcata (WALKER & JAKOB)	
Trochammina böhmi FRANKE	ss - h	var. amphora REUSS	s
Trochammina trifolium FRANKE	ss	Frondicularia angusta NILS.	ss - s
Trochammina sp.	ss	Frondicularia cf. apiculata RSS	ss - s
Verneuilina spinulosa REUSS	ss - ii	Frondicularia archiaciana D'ORB.	ss - s
Verneuilina triquetra V. MSTR	ss - s	F. cordai f. goldfussi REUSS	ss
Verneuilina cf. bronni REUSS	ss - s	Frondicularia linearis FRANKE	ss
Gaudryina bronni (REUSS)	ss	Frondicularia cf. tenuis REUSS	ss
Gaudryina rugosa D'ORBIGNY	ns - ii	Neoflabellina gibbera (WEDEKIND)	ss - s
G. rugosa f. laevigata FRANKE	ss - s	Neoflabellina santonica KOCH	ss
Heterostomella carinata (FRANKE)	ss - s	Neoflabellina suturalis	
Tritaxia tricarinata REUSS	ss	suturalis (CUSHMAN)	ss - s
Dorothia crassa (MARSSON)	ss - s	Neoflabellina suturalis	
D. crassa f. trochoides (MARSSON)	ss	praecursor (WEDEKIND)	ss - s
Dorothia pupa (REUSS)	ss	Neoflabellina suturalis	
Dorothia cf. pupa (REUSS)	ss	praerugosa HILTERMANN	ss
Dorothia trochus (D'ORBIGNY)	ss	Citharina strigellata REUSS	ss
Dorothia turris (D'ORBIGNY)	ss - s	Lenticulina (L.) gibba D'ORB.	ss - s
Dorothia sp.	ss	L. (L.) gibba D'ORB. f. truncata RSS	ss - s
Valvulina sp.	ss	L. (L.) obliqua V. HAG.	ss
Valvulina trochoides (REUSS)	ss	L. (L.) ovalis REUSS	ss - ns
Ataxophragmium (A.) crassum (D'ORB.)	ss - s	L. (L.) subalata REUSS	ss - s
A. (A.) puschi (REUSS)	ss - s	L. (L.) sp. 1-3	ss - s
A. (A.) trilobata (FRANKE)	ss	L. (L.) sp. 4-5	ss
A. (A.) variabilis (D'ORB.)	ss - h	L. (Robulus) münsteri ROEMER	ss
A. (A.) sp.	ss	L. (R.) orbicularis D'ORB.	ss
Arenobulimina (A.) preslii (REUSS)	ss - ns	L. (R.) rotulata (LAMARCK)	ss - h
A. (A.) orbigny (REUSS)	ss	L. (Astacolus) crepidula F. & M.	s
A. (A.) sp.	ss - s	L. (A.) crepidula F. & M.	
Eggerellina murchisonia (D'ORB.)	ss - s	f. tripleura REUSS	ss
Amphicoryna sp.	ss	L. (A.) ensis (REUSS)	ss
Nodosaria (Dentalina) cognata RSS	ss	L. (A.) sp.	ss
N. (D.) cylindroides RSS	ss	L. (Saraceneria) navicula D'ORB.	ss - s
N. (D.) cf. communis D'ORB.	ss	L. (S.) sp. 1-2	ss
N. (D.) deflexa RSS	ss	L. (Planularia) sp.	ss
N. (D.) filiformis RSS	ss	L. (Darbyella) sp. 1-5	ss
N. (D.) cf. filiformis RSS	ss - s	Lingulina pygmaea REUSS	ss
N. (D.) gracilis D'ORB.	ss	Globulina minuta (ROEMER)	ss
N. (D.) cf. gracilis D'ORB.	ss	G. gibba f. aequalis D'ORB.	ss
N. (D.) inornata D'ORB.	ss - s	Pyrulina cylindroides (ROEMER)	ss - s
N. (D.) cf. laevigata NILS.	ss	Pyrulina gutta D'ORB.	ss
N. (D.) legumen REUSS	ss	Pyrulina cf. gutta D'ORB.	ss
N. (S.) cf. lorneiana D'ORB.	ss	Pyrulinoidea sp.	ss
N. (D.) multilineata REUSS	ss	Glandulopleurostomella sp.	ss
N. (D.) cf. majuscula		Ramulina aculeata (D'ORB.)	ss - s
f. clausa MARS.	ss	Ramulina globulifera BRADY	ss - s
N. (D.) nana REUSS	ss	Ramulina laevis JONES	ss
N. (D.) oligostegia REUSS	ss	Ramulina sp.	ss
N. (D.) cf. plebeia REUSS	ss	Oolina apiculata REUSS	ss
N. (D.) praegnans REUSS	ss	Oolina globosa (MONTAGU)	s
N. (D.) raristriata CHAPMAN	ss	Oolina sp. 1	ss - s
N. (D.) cf. siliqua REUSS	ss	Oolina sp. 2	ss
N. (D.) cf. westfalica FRANKE	ss	Praebulimina ovulum (REUSS)	ss - s
N. (D.) westfalica cf. f. calva FRANKE	ss	Praebulimina parva FRANKE	ss
N. aspera REUSS	ss	Praebulimina ventricosa (BROTZEN)	ss - h

ART	HÄUFIG- KEIT	ART	HÄUFIG- KEIT
Stilostomella sp.	ss	Pleurostomella sp.	ss
Orthokarstenia sp.	ss	Ellipsoidella sp.	ss
Epistominella karsteni (REUSS)	ss - m	Ellipsoglandulina sp.	ss
Valvulineria lenticula (REUSS)	ss - ns	Globorotalites subconicus (MORROW)	ss - h
Heterohelix globulosa EHRBG	h - ü	Gyroidina nitida (REUSS)	ss - h
Pseudotextularia sp.	ss - s	Stensioeina exsculpta exsculpta (RSS)	ss - m
Globotruncana ex. gr.		Stensioeina granulata	
paraventricosa HOFK./lapparenti BR.	ns - ü	granulata (OLBERTZ)	ss - s
"Globigerinella" aspera EHRBG		Stensioeina gr. polonica WIT.	ns - m
f. trochoides HOFKER	ü	Gavelinella costata BROTZEN	
"Globigerina" cretacea D'ORB.	ü	f. emscheriana HOFKER	ss - h
"Globigerina" quadrata WHITE	s - m	Gavelinella eriksdalensis (BROTZEN)	ss
Cibicides? excavatus BROTZEN	ss - s	Quadrimorphina allomorphinooides (RSS)	ss - s
Pleurostomella nodosa (D'ORB.)	ss		
Pleurostomella cf. lepida (RSS)	ss - s		

Tabelle 1. Häufigkeitsverteilung der Arten in den untersuchten Proben.

	Exemplare/Probe	
ss : sehr selten	1	
s : selten	2	5
ns : nicht selten	6	10
h : häufig	11	25
sh : sehr häufig	26	50
m : massenhaft	51	100
ü : überwiegend	> 100	

Bei der ökologischen Beurteilung fossiler Vergesellschaftungen können die an rezenten Foraminiferen gewonnenen Erkenntnisse nicht vorbehaltlos übernommen werden, da sich die jetzigen Umweltbedingungen von den ehemaligen in vielen Punkten unterscheiden dürften, wie es POKORNÝ (1958, 1, 135–142) näher erläutert. Es ist deshalb wichtig, die anorganische Umwelt, d. h. die umgebenden Sedimente, bei der Milieuanalyse zu berücksichtigen. Der Tongehalt, das klastische Material, mit Vorbehalt die seltenen Characeen deuten darauf hin, daß das Festland im Abstand von einigen Zehnern Kilometern gelegen haben dürfte. Die fehlende Sandfraktion, die gut sichtbare primäre Schichtung und die – nicht bearbeitete – Megafauna (Echinodermata, Pelecypoda) weisen auf schwache Bodenströmung hin und können als Hinweis dafür gewertet werden, daß die Thanatozönose, soweit es die benthonischen Formen betrifft, wahrscheinlich der Biozönose entspricht. Der hohe Karbonatanteil von 50% und mehr im Tonmergel ist auf Coccolithen zurückzuführen, aber auch auf Mollusken, wobei die Inoceramen nur noch die Prismenschicht zeigen, während die aragonitische Perlmuttertschicht gelöst wurde.

Als weitere mikropaläontologische Arbeit ist YUN (1981) zu nennen, der die Dinoflagellatenzystenflora des Untersantons von Esbeck untersuchte.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. W. LANGER für seine stets freundliche Diskussionsbereitschaft.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [138](#)

Autor(en)/Author(s): Küppers Renate

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Foraminiferenfauna der Münsterländer Oberkreide \(Untersanton von Esbeck/Lippstadt\) 237-242](#)