

VI.

A n n o t a t i o n e s

ad

theoriam atque historiam perturbationum coelestium
pertinentes

auctore

CAROLO GUIEL. ANDR. PFAFF,
Professore Noribergensi.

§. I. 1) Nuper illustrissimus La Grange *), dum demonstratio-
nem analyticam pararet propositionis a Poisson propositae: sci-
licet aequationem saecularem axis majoris planetarum non existere,
si vel ad terminos formae $m'm'$ vel mm' respiciatur, vel ad se-
cundam potentiam massarum (ut ajunt) — aequationes novas per-
turbatrices proposuit, quae et forma et simplicitate sunt memora-
biles.

Nexum

*) Mémoires de l'Institut Tome IX.

Nexum harum aequationum atque istarum, quae hactenus ab astronomis usitatae fuerunt, hoc spho ostendere conabor; opera, ut spero, non inutilis, cum et ad vulgares istas aequationes lux exinde aliqua redundet, simplicitati istarum proficua.

Demonstratio haec ex ipsis clementis perturbationum petita, formam supponet aequationum, quae et legibus quibusdam, quas perturbationes reciprocae sequuntur, favere videtur, casusque qui in mutua corporum coelestium relatione quoad situm planorum atque axium obtinere possent, simplici ratione complectitur.

2) Cum aequationes novae variationibus functionis cuiusdam Ω , pendentibus a variatione elementorum, (scil. axis, eccentricitatis, nodi etc.) innitantur, natura atque mutationes hujus functionis ante omnia sunt explicandae.

Sumatur, (omisso ut in sequentibus factore qui a massa pendit)

$$\Omega = \delta^{-\frac{1}{2}} - \frac{(P)}{\gamma'^3}, \text{ dum } \delta \text{ mutuam planetarum perturbationibus affectorum distantiam, } \gamma' \text{ radium vectorem planetae turbantis designet:}$$

obtinebitur

$$\frac{d\dot{\Omega}}{dp} = - \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \frac{d(P)}{dp} \left\{ \begin{array}{l} (p, \mathfrak{d}, \varphi \text{ distantiam perihelii a nodo;}) \\ \text{nodum; inclinationem ad planum fixum designantibus.} \end{array} \right\}$$

$$\frac{d\Omega}{d\mathfrak{d}} = - \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \frac{d(P)}{d\mathfrak{d}} \quad p', \mathfrak{d}', \varphi, \text{ eadem quantitates relatae ad planetam turbantem.}$$

$$\frac{d\Omega}{d\varphi} = - \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \frac{d(P)}{d\varphi}.$$

3) P quantitas ut ita dicam symmetrica est, a coordinatis (planetarum mutuo agentium) in orbita pendens, coefficientibusque, qui observationibus determinantur. Sint itaque $x, y; x', y'$ coordinatae rectangulares in plano planetae turbati, atque turbantis; erit

$$(P)$$

$$(P) = (A) xx' + (B) yy' + (C) xy' + (D) yx'$$

$$(A) = + Fa + Lb + Mc - Nd \quad a = \cos.(\delta' - \delta)$$

$$(B) = + Fb + La + Md - Nc \quad b = \cos.(\delta' - \delta) \cos.\varphi' \cos.\varphi + \sin.\varphi' \sin.\varphi$$

$$(C) = - Lc + Mb - Na - Fd \quad c = \sin.(\delta' - \delta) \cos.\varphi$$

$$(D) = + Ld - Ma + Nb + Fc \quad d = \sin.(\delta' - \delta) \cos.\varphi'$$

$$F = \cos.p \cos.p'; \quad L = \sin.p \sin.p'; \quad M = \sin.p \cos.p'; \quad N = \cos.p \sin.p'.$$

Quantitas haec (P) oritur reducendo functionem symmetricam

$XX' + YY' + ZZ'$ (in qua X, Y, Z .. designent coordinatas orthogonales ad planum fixum) ad coordinatas x, y ..

Coefficientes (A), (B), (C), (D) variis reductionibus, varias induere formas in aperto est.

4) Ex forma coefficientium 3) proposita confestim obtinetur

$$\frac{d(P)}{dp} = (D) xx' - (C) yy' + (B) xy' - (A) yx'$$

simulque proclivis est observatio: planum fixum, cum arbitrarium sit in dispositione generali, transire posse per punctum intersectionis orbitarum; hinc et $\delta' = \delta$ sumitur, et $c = d = 0$ evanescit. Itaque si ea sit mutua planetarum constitutio, quoad situm axium, ut $p = p' = 0$ sumi possit, aequatio formam hanc simplicem obtinebit

$$\frac{d(P)}{dp} = \cos.(\varphi' - \varphi) xy' - yx'.$$

5) Aequationes, quibus a, b, c, d determinantur, has suppeditant

$$\frac{da}{d\varphi} = 0; \quad \frac{db}{d\varphi} = - \sin.\varphi \cos.(\delta' - \delta) \cos.\varphi' + \sin.\varphi' \cos.\varphi;$$

$$\frac{dc}{d\varphi} = - \sin.(\delta' - \delta) \sin.\varphi; \quad \frac{dd}{d\varphi} = 0.$$

Ex his conflatur aequatio

$$\begin{aligned}\frac{d(P)}{d\varphi} = & xx' \sin.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\} = xx' \left\{ L \frac{db}{d\varphi} + M \frac{dc}{d\varphi} \right\} \\ & yy' \cos.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \quad yy' \left\{ F \frac{db}{d\varphi} - N \frac{dc}{d\varphi} \right\} \\ & xy' \sin.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \quad xy' \left\{ M \frac{db}{d\varphi} - L \frac{dc}{d\varphi} \right\} \\ & yx' \cos.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\} \quad yx' \left\{ N \frac{db}{d\varphi} + F \frac{dc}{d\varphi} \right\}\end{aligned}$$

Observare licet (nro 4), sumi posse in disquisitione generali $\mathfrak{d}' = \mathfrak{d}$; hinc et $\frac{dc}{d\varphi}$ evanescit; $\frac{db}{d\varphi}$ obtinetur = $\sin.(\varphi' - \varphi)$; hinc si ea sit mutua planetarum constitutio ut sumi possit $p = p' = o$; aequatio aderit $\frac{d(P)}{d\varphi} = \sin.(\varphi' - \varphi) yy'$.

6) Denique adsunt aequationes ex 3)

$$\begin{aligned}\frac{da}{d\mathfrak{d}} &= \sin.(\mathfrak{d}' - \mathfrak{d}); \quad \frac{db}{d\mathfrak{d}} = \sin.(\mathfrak{d}' - \mathfrak{d}) \cos.\varphi' \cos.\varphi; \quad \frac{dc}{d\mathfrak{d}} = -\cos.(\mathfrak{d}' - \mathfrak{d}) \cos.\varphi; \\ \frac{dd}{d\mathfrak{d}} &= -\cos.(\mathfrak{d}' - \mathfrak{d}) \cos.\varphi'\end{aligned}$$

Ex quibus sponte fluunt sequentes inter a, b, c, d , atque illarum variationes,

$$\begin{aligned}d \cdot \cos.\varphi - \frac{db}{d\mathfrak{d}} &= o; \quad c \cos.\varphi - \frac{da}{d\mathfrak{d}} = \frac{dc}{d\varphi} \cdot \sin.\varphi \\ a \cdot \cos.\varphi + \frac{dc}{d\mathfrak{d}} &= o \quad b \cos.\varphi + \frac{dd}{d\mathfrak{d}} = \frac{db}{d\varphi} \cdot \sin.\varphi.\end{aligned}$$

Ex his aequationibus, differentiando aequationes 3), quibus natura quantitatis (P) determinatur, eruitur sequens, juncta aequatione nro. 4)

cos.

$$\cos.\varphi \cdot \frac{d(P)}{dp} - \frac{d(P)}{d\delta} = xx' \left\{ + L \left\{ d \cos.\varphi - \frac{db}{d\delta} \right\} + yy' \left\{ - L \left\{ c \cos.\varphi - \frac{da}{d\delta} \right\} \right. \right. \\ \left. \left. - M \left\{ a \cos.\varphi + \frac{dc}{d\delta} \right\} \right\} + M \left\{ b \cos.\varphi + \frac{dd}{d\delta} \right\} \right. \\ \left. \left. - N \left\{ b \cos.\varphi + \frac{dd}{d\delta} \right\} \right\} - N \left\{ a \cos.\varphi + \frac{dc}{d\delta} \right\} \right. \\ \left. \left. + F \left\{ c \cos.\varphi - \frac{da}{d\delta} \right\} \right\} - F \left\{ d \cos.\varphi - \frac{db}{d\delta} \right\} \right. \\ \left. + xy' \left\{ F \left\{ b \cos.\varphi + \frac{dd}{d\delta} \right\} + yx' \left\{ F \left\{ - a \cos.\varphi - \frac{dc}{d\delta} \right\} \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - L \left\{ a \cos.\varphi + \frac{dc}{d\delta} \right\} \right\} - L \left\{ - b \cos.\varphi - \frac{dd}{d\delta} \right\} \right. \right. \\ \left. \left. \left. - M \left\{ d \cos.\varphi - \frac{db}{d\delta} \right\} \right\} - M \left\{ - c \cos.\varphi + \frac{da}{d\delta} \right\} \right. \right. \\ \left. \left. \left. - N \left\{ - c \cos.\varphi + \frac{da}{d\delta} \right\} \right\} - N \left\{ + d \cos.\varphi - \frac{db}{d\delta} \right\} \right. \right. \right.$$

scilicet,

$$\cos.\varphi \cdot \frac{d(P)}{dp} - \frac{d(P)}{d\delta} = +xx' \left\{ N \frac{db}{d\varphi} + F \frac{dc}{d\varphi} \right\} \sin.\varphi = \sin.\varphi xx' \cos.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\} \\ + yy' \left\{ -M \frac{db}{d\varphi} + L \frac{dc}{d\varphi} \right\} \sin.\varphi + \sin.\varphi yy' \sin.p \left\{ - \frac{db}{d\varphi} \cos.p' + \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \\ + xy' \left\{ F \frac{db}{d\varphi} - N \frac{dc}{d\varphi} \right\} \sin.\varphi + \sin.\varphi xy' \cos.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \\ + yx' \left\{ -L \frac{db}{d\varphi} - M \frac{dc}{d\varphi} \right\} \sin.\varphi + \sin.\varphi yx' \sin.p \left\{ - \frac{db}{d\varphi} \sin.p' - \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\}$$

Ex qua aequatione apparent, coefficientes his terminis junctos cosdem plane esse quam eos qui in aequatione $\frac{dP}{d\varphi}$ occurunt; mutatis signis termini

se-

secundi ac quarti; atque loco $\sin.p$ posito $\cos.p$ et vice versa;
additoque factore $\sin.\varphi$.

7) Quibus jam paratis ad aequationes ipsas transeamus.

Aequatio nova pro parametro quam per g designamus, quam affert
La Grange, haec est

$$\frac{dg}{2\sqrt{g}} = \frac{d\Omega}{dp}; \text{ itaque secundum ea quae hactenus tradita sunt}$$

$$\text{I. } \frac{dg}{2\sqrt{g}} = - \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \left\{ (D)xx' - (C)yy' + (B)xy' - (A)yx' \right\}$$

Aequatio hactenus usitata haec erat

$$dg = \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \left\{ (P) \frac{dy^2}{dt} - 2y^2 \cdot \frac{d(P)}{dt} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \left\{ + \left\{ (A)xx' + (B)yy' + (C)xy' + (D)yx' \right\} \left\{ 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \right\} \right.$$

$$\left. - \left\{ (A)x' \frac{dx}{dt} + (B)y' \frac{dy}{dt} + (C)y' \frac{dx}{dt} + (D)x' \frac{dy}{dt} \right\} \left\{ 2x^2 + 2y^2 \right\} \right\}$$

Reductionibus adhibitis, oritur

$$2 \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \left\{ y \frac{dx}{dt} - x \frac{dy}{dt} \right\} \left\{ x(B)y' + x(D)x' - y(A)x' - y(C)y' \right\};$$

scilicet

$$= -2\sqrt{g} \left(\frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right) \left((D)xx' - (C)yy' + (B)xy' - (A)yx' \right); \text{ quae}$$

est aequatio nova, cuius demonstrationem quaesivimus, identica praecedenti novae.

8) Aequatio nova, variationes parametri determinans haec est:

$$\text{II. } \sqrt{g \sin.\varphi} \cdot \frac{d\delta}{dt} = \frac{d\Omega}{d\varphi};$$

$$= - \left(\frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right) \frac{dP}{d\varphi} \text{ ex nro. 2)$$

$$= - xx' \sin.p \left(\frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right) \left(\frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right)$$

$$- yy' \cos.p \left(\frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right) \left\{ \right.$$

$$- xy' \sin.p \left(\frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right) \left. \right\}$$

$$- yx' \cos.p \left(\frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right) \text{ ex nro. 5).}$$

Aequatio vulgaris, variis sub formis proposita, si deducatur ex aequationibus in Mecanica coelesti *) pro tribus quantitatibus dc , dc' , dc'' prolatis, ita se habet

$$-\sqrt{g \sin.\varphi} \cdot \frac{d\delta}{dt} = \left(\frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right) \left(x \sin.p + y \cos.p \right)$$

$$\{ X' \sin.\delta \sin.\varphi - Y' \cos.\delta \sin.\varphi + Z' \cos.\varphi \}$$

Factor hanc aequationem intrans, pendens a coordinatis orthogonabilis (ad planum fixum relatis) planetac turbantis X' , Y' , Z' , reductione ad coordinatas in orbita facta, methodo usitata prodibit

$$+ \sin.\delta \sin.\varphi \left(\{ \cos.\delta' \cos.p' - \sin.\delta' \sin.p' \cos.\varphi' \} x' \right.$$

$$- \{ \cos.\delta' \sin.p' + \sin.\delta' \cos.p' \cos.\varphi' \} y' \left. \right)$$

$$- \cos.$$

*) Libro II. Cap. VIII. §. 64.

$$\begin{aligned}
 & -\cos.\delta \sin.\varphi \left\{ \{\sin.\delta' \cos.p' + \cos.\delta' \sin.p' \cos.\varphi'\} x' \right. \\
 & \quad \left. - \{\sin.\delta' \sin.p' - \cos.\delta' \cos.p' \cos.\varphi'\} y' \right\} \\
 & + \cos.\varphi \left\{ \sin.p' \sin.\varphi' x' + \cos.p' \sin.\varphi' y' \right\}
 \end{aligned}$$

ex quibus formulis factor iste tandem obtinetur

$$\begin{aligned}
 & -x' \cos.p' \sin.(\delta' - \delta) \sin.\varphi \\
 & -x' \sin.p' \{\cos.(\delta' - \delta) \cos.\varphi' \sin.\varphi - \sin.\varphi' \cos.\varphi\} \\
 & + y' \sin.p' \sin.(\delta' - \delta) \sin.\varphi \\
 & -y' \cos.p' \{\cos.(\delta' - \delta) \cos.\varphi' \sin.\varphi - \sin.\varphi' \cos.\varphi\}
 \end{aligned}$$

cujus coefficientes congruunt cum $\frac{dc}{d\varphi}$ et $\frac{db}{d\varphi}$ nro. 5).

Exinde prodit aequatio

$$-\sqrt{g \sin.\varphi} d\delta = \left(\frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^2} \right) \{x \sin.p + y \cos.p\} \left\{ + \left(\sin.p' \frac{db}{d\varphi} + \cos.p' \frac{dc}{d\varphi} \right) x' \right. \\
 \left. + \left(\cos.p' \frac{db}{d\varphi} - \sin.p' \frac{dc}{d\varphi} \right) y' \right\}$$

quae plane congruit cum aequatione nova, cuius demonstrationem paravimus.

9) Aequatio nova variationes Inclinationis determinans, a La Grange proposita, haec est

$$\sqrt{g \cdot \sin.\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \cos.\varphi \cdot \frac{d\Omega}{dp} - \frac{d\Omega}{d\delta}$$

Aequatio haec, adhibitis reductionibus nro. 2) et 6), in hanc abit

$$\text{III. } \sqrt{g} \sin\varphi \frac{d\varphi}{dt} = - \left\{ \frac{I}{y'^3} - \frac{I}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \left[+ xx' \cos.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\} \right] \sin.\varphi \\ + yy' \sin.p \left\{ - \frac{db}{d\varphi} \cos.p' + \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \\ + xy' \cos.p \left\{ + \frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \\ + yx' \sin.p \left\{ - \frac{db}{d\varphi} \sin.p' - \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\} \right]$$

Aequatio usitata prorsus et demonstratione et forma similis aequationi, variationes Nodi determinanti, haec est:

$$-\sqrt{g} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \left\{ \frac{I}{y'^3} - \frac{I}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} (x \cos.p - y \sin.p) (X' \sin\delta \sin.p - Y' \cos\delta \sin.p + Z' \cos.p)$$

quae reductionibus nro. 8) adhibitis in hanc abit

$$-\sqrt{g} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \left\{ \frac{I}{y'^3} - \frac{I}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} (x \cos.p - y \sin.p) \left\{ + \left\{ \sin.p' \frac{db}{d\varphi} + \cos.p' \frac{dc}{d\varphi} \right\} x' \right\} \\ \left\{ + \left\{ \cos.p' \frac{db}{d\varphi} - \sin.p' \frac{dc}{d\varphi} \right\} y' \right\}$$

Quam plane identicam esse cum aequatione nova, sponte apparet.

10) Demonstratum jam est, aequationes novas, quibus variationes parametri g , Nodi δ , Inclinationis φ determinantur I, II, III, facili negotio derivari ab aequationibus vulgo notis. His additur aequatio pro variatione axis magni, quam a variatione functionis Ω pendere olim ab illustrissimo la Grange ostensum fuit: ita ut unica tantum aequatio supersit:

11) Antequam ad hanc probandam transeamus, adnotaciones quasdam, quas forma singularis aequationum propositarum postulare videtur, hic proponemus. Positis $\delta' = \delta$, quae hypothesis semper locum habet, cum situs plani fixi sit arbitrarius, *casu quo* duorum planetarum se turbantium ea erit constitutio ut $p' = p = 0$ poni queat, aderunt aequationes

$$\frac{1}{2\sqrt{g}} \cdot \frac{dg}{dt} = - \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^2} \right\} \{\sin. (\varphi' - \varphi) xy' - yx'\}$$

$$\sqrt{g} \cdot \sin. \varphi \cdot \frac{d\delta}{dt} = - \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^2} \right\} \sin. (\varphi' - \varphi) yy'$$

$$\sqrt{g} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = - \left\{ \frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^2} \right\} \sin. (\varphi' - \varphi) xy'$$

12) Si variationes mutuae duorum planetarum considerentur, forma aequationum hactenus tractatarum symmetricam quandam praese fert speciem, si ad quantitates xx' , yy' , xy' , yx' respicias. Coefficients solummodo, quibus hae quantitates affectae sunt, diversi sunt; factorque $\left(\frac{1}{y'^3} - \frac{1}{\delta^2} \right)$, si de perturbationibus reciprocis quaestio est, abit in $\left(\frac{1}{y^3} - \frac{1}{\delta^2} \right)$; ita ut in his perturbationibus mutuis infinita occurrat terminorum multitudine, qui in ratione constanti sunt, scilicet in ratione horum coefficientium.

13) Simili ratione apparebant perturbationes unius ejusdem planetae quoad parametrum g ; Nodum δ ; inclinationem φ continere multitudinem membrorum, quae coefficientibus tantum differant; ita ut calculi numerici explicatio solummodo sola quantitate δ^2 intricatur

tior fiat; qua explanata reliquae sint satis expeditae calculi partes.
Haec annotatio ipsum calculi praxin adjuvare potest.

14) Hanc disquisitionem exemplis illustrare, commodum erit. Pallas et Juno actione atque attractione mutua se petentes in calculum vocentur. γ designet radium vectorem Palladis; γ' radium vectorem Junonis; m, m' massas (ut ajunt) planetarum; tres aequationes, de quibus hoc sypho sermo erat, ita se habebunt ($x, y; x', y'$ denotant ut supra coordinatas orthogonales in orbita).

Aequationes determinantes variationes parametri etc. actione Palladis et Junonis reciproca oriundae.

Aequationes pro Pallade, turbata
a Junone;

Aequationes pro Junone turbata
a Pallade.

$$\text{I. } \frac{dg}{dt} = -m'^2 \sqrt{g} \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^3} \right\} \begin{cases} -0,88561 xx' \\ -0,90322 yy' \\ +0,39618 xy \\ -0,32847 yx' \end{cases} \quad \frac{d\gamma'}{dt} = -m^2 \sqrt{g'} \left\{ \frac{1}{\gamma^3} - \frac{1}{\delta^3} \right\} \begin{cases} +0,90322 xx' \\ +0,88561 yy' \\ -0,32847 xy' \\ +0,39618 yx' \end{cases}$$

$$\text{II. } \frac{d\delta}{dt} = -\frac{m'}{\sqrt{g} \sin \varphi} \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^3} \right\} \begin{cases} -0,24767 xx' \\ +0,11607 yy' \\ -0,14548 xy' \\ +0,19760 yx' \end{cases} \quad \frac{d\gamma'}{dt} = -\frac{m}{\sqrt{g'} \sin \varphi} \left\{ \frac{1}{\gamma^3} - \frac{1}{\delta^3} \right\} \begin{cases} +0,25794 xx' \\ -0,10420 yy' \\ +0,13571 xy' \\ -0,19804 yx' \end{cases}$$

$$\text{III. } \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{m'}{\sqrt{g}} \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^3} \right\} \begin{cases} +0,19760 xx' \\ +0,14548 yy' \\ +0,11607 xy' \\ +0,24767 yx' \end{cases} \quad \frac{d\gamma'}{dt} = -\frac{m}{\sqrt{g}} \left\{ \frac{1}{\gamma^3} - \frac{1}{\delta^3} \right\} \begin{cases} +0,13571 xx' \\ +0,19804 yy' \\ -0,10420 xy' \\ -0,25794 yx' \end{cases}$$

15) Aequationes differentiales allatae primi gradus, in quibus t denotat tempus, integrationem directam admittunt; quando $\delta = \frac{3}{2}$

explicari potest per terminos cosinus aut sinus motus medii conti-
nentes: quod in systemate planetarum semper locum habere, de-
monstrandum erit in sequentibus. Quantitates $x, y; x', y'$ similiter
ita explicari atque evolvi, notum est.

16) Restat jam aequatio, qua variationes perihelii determi-
nantur.

Jam formulae sequentes ex theoria motus elliptici sine ne-
gotio derivantur

$$\begin{aligned} \gamma \cdot \frac{dy}{de} = -ax; \quad \frac{dx}{de} = -\frac{a^2 \sin u^2}{\gamma} - a &= \frac{\gamma \frac{dx}{dt} - a}{na \sqrt{1-e^2}} \\ \gamma \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{e}{\sqrt{g}} y; \quad \frac{dy}{de} = -\frac{ae \sin u}{\sqrt{1-e^2}} + a^2 \sqrt{1-e^2} \sin u \cos u &= -\frac{e y}{1-e^2} + \frac{y \frac{dy}{dt}}{na \sqrt{1-e^2}} \end{aligned}$$

Ex his, substitutionibus factis, obtinetur

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{de} = -\left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \frac{\gamma}{na \sqrt{1-e^2}} &\left\{ (A)x' \frac{dx}{dt} + (B)y' \frac{dy}{dt} + (C)y' \frac{dx}{dt} + (D)x' \frac{dy}{dt} \right\} \\ &+ \left\{ \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right\} \left\{ a(A)x' + a(C)y' + \frac{e}{1-e^2}(B)yy' + \frac{e}{1-e^2}(D)yx' \right\} \\ &+ \delta^{-\frac{3}{2}} ax \end{aligned}$$

Jam si ex aequationibus hactenus *usitatis*, quas offert Mechan. celest. *)
ex aequationibus pro quantitatibus df, df', df'' deducatur aequatio
variationes perihelii exhibens, obtinetur (introducendo coefficientes
 $\alpha, \beta;$)

d

*) Lib. II. Cap. VIII. §. 64.

$$\frac{dp}{dt} + \cos.\varphi \frac{db}{dt} = *) R \left\{ \frac{(P) \frac{dy}{dt} - 2y \frac{d(P)}{dt}}{e} + \left\{ \frac{\alpha Y' - \beta X'}{\cos.\varphi \cdot e} \right\} \cdot \gamma \frac{dy}{dt} \right\}$$

$$- \frac{\cos.p \sin.\varphi}{\cos.\varphi} \left(\cos.p \sin.\varphi \frac{db}{dt} - \sin.p \frac{d\varphi}{dt} \right)$$

$$- \delta^{-\frac{3}{2}} \cdot \left(\gamma \frac{dy}{dt} y - \gamma^2 \frac{dy}{dt} \right) \frac{1}{e}$$

Ut haec aequatio analoga reddatur praecedenti, notandae sunt formulæ sequentes, quarum demonstratio obvia; scilicet

$$(P) \frac{dy}{dt} - y \frac{d(P)}{dt} = \sqrt{g} \left((A)x' + (C)y' \right); (A) et (C) nro. 3 determinatae;$$

$$\gamma \frac{dy}{dt} \cdot y - \gamma^2 \frac{dy}{dt} = -x \sqrt{g}$$

Similiter ex aequationibus II et III nro. 8 et 9. sequitur

$$\cos.p \sin.\varphi \frac{db}{dt} - \sin.p \frac{d\varphi}{dt} = -m' \left(\frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}} \right) \left\{ yy' \left(\cos.p \left\{ \frac{db}{d\varphi} \cos.p' - \frac{dc}{d\varphi} \sin.p' \right\} \right) \right.$$

$$\left. yx' \left(\sin.p \left\{ \frac{db}{d\varphi} \sin.p' + \frac{dc}{d\varphi} \cos.p' \right\} \right) \right\}$$

Porro cum coefficientes α, β his aequationibus determinentur

$$\alpha = \cos.b \cos.p - \sin.b \sin.p \cos.\varphi$$

$$\beta = \sin.b \cos.p + \cos.b \sin.p \cos.\varphi$$

atque valores Y', X' ope coefficientium, qui quantitatibus α, β analogi sunt ad coordinatas y', x' reduci queant; colligentur aequationis termini productis yy' atque yx' juncti; ope reductionum, quas offerunt aequationes $\alpha \cos.b' - \alpha \sin.b' - \cos.p \sin.\varphi \cdot \frac{dc}{d\varphi}$ atque

$$(\beta \sin.b' + \alpha \cos.b') \cos.\varphi' + \cos.p \sin.\varphi \frac{db}{d\varphi}.$$

Quo

$$*) R = \frac{1}{\gamma'^3} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}}.$$

Quo facto identitas coefficientium, producta $yy' yx'$ comitantium in aequationibus tum nova tum prius usitata sponte apparebit: (cujus evolutionem solummodo brevitatis gratia omittimus).

17) Caeterum simili ratione qua termini e membris $\left\{ \frac{\alpha \cdot Y' - \beta X'}{\cos \varphi e} \right\} \frac{ydy}{dt}$ atque $\frac{\cos p \sin \varphi}{\cos \varphi} \left(\cos p \sin \varphi \frac{d\delta}{dt} - \sin p \frac{d\varphi}{dt} \right)$ reductionibus coalescunt, eadem quantitates $y \frac{d(P)}{dt}$ atque termini reductionibus superioribus oriundi coalescunt, ita ut aquatio evadat simplex satis

$$\text{IV. } e \left(\frac{dp}{dt} + \cos \varphi \frac{d\delta}{dt} \right) = \frac{1}{y'^3 - \delta^3} \left(+ \frac{dx}{dt} \cdot \frac{d(P)}{dp} + \sqrt{g} \left\{ (A)x' + (C)y' \right\} \right) + \delta^{-\frac{3}{2}} x \sqrt{g}$$

quam inter aequationes perturbatrices recipere nec usus practicus vetabit.

18) Haec aquatio differt forma ab aequationibus I. II. III. verum demonstrari potest aequationem, qua $\frac{de}{dt}$ (variationes eccentricitatis) determinantur simili plane forma gaudere: ita ut symmetria quaedam hac ratione restituatur.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Denkschriften der Akademie der Wissenschaften München](#)

Jahr/Year: 1814-1815

Band/Volume: [05](#)

Autor(en)/Author(s): Pfaff Carolo Guiel. Andr.

Artikel/Article: [Annotation es ad theoriam atque historiam perturbationum
coelestium pertinentes 161-174](#)