© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fundorte der von R. Semon in den Jahren 1891—1893 gesammelten Thiere.

1) Burnett-River District. Queensland. 24°—26° S. B., 150°—152° O. L. von Gr.
Es wurde am Mittellauf und Oberlauf des Burnett und an seinen Nebenflüssen Barambah Creek, Aranbanga Creek, Boyne River, Auburn River, St. Johns Creek, Three Moon Creek gesammelt: vorwiegend in der Gegend von Coonambula, Cooranga und bei Gayndah.
(August 1891 bis Januar 1892, Juli bis October 1892.)

2) Hinterland von Cooktown. Queensland. 15° S. B., 145° O. L. von Gr.
Bergland am Endeavour River, Annan River, Oaky Creek.
(Juni 1892.)

3) Torresstrasse bei Thursday Island. 10°—11° S. B., 142°—143° O. L. von Gr.
Seethiere wurden gesammelt in den Meerestheilen um Thursday Island und den Nachbarinseln (Prince of Wales Gruppe), ferner noch bei Double Island und Strait Island und an der Küste des Festlandes (Cap York, Jardine River). Die Landthiere stammen fast ausnahmslos von Thursday Island. Die Süsswasserschnecke Pseudopotamis semoni Martens wurde auf Hammond Island gefunden.
(Februar und März 1892.)

4) Neu-Guinea. Südostküste von Cap Possession bis zum Ostcap. 9°—11° S. B., 146°—151° O. L. von Gr.
Der grösste Theil der Sammlungen stammt von Roro (Jule Island) und dem benachbarten Festland, von Hula, Aroma, South Cape (Suau und dem gegenüberliegenden Festland) und dem nordöstlichen Teil der Milne Bay bis zum Ostcap. Eine Anzahl Paradiesvögel stammt vom Nordwesten von Neu-Guinea, was an der betreffenden Stelle besonders hervorgehoben werden wird.
(April und Mai 1892.)

5) Insel Ambon. 3° 41′ S. B., 128° O. L. von Gr.
Es wurde gesammelt in der Aussen- und Innenbai von Amboina, in der Bai von Baguala und der Bai von Waai sowie an den Küsten dieser drei Baien.
(Januar und Februar 1893.)

6) Westjava. Buitenzorg, 6° 35′ 44″ S. B., 106° 47′ 22″ O. L., von Gr., etwa 275 Meter über dem Meere. *Tjibodas,* 1425 Meter über dem Meere auf halber Höhe des Vulkans Gedeh.
(November, December 1892, März 1893.)

Ausserdem wurden noch vereinzelte Exemplare auf Celebes (Menado, Gorontalo), Ternate und Batjan gesammelt; Plankton auch bei Banda, Makassar, Surabaya, Samarang, Penang und im Ganges bei Benares.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Denkschriften der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena

Jahr/Year: 1894-1903

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Semon Richard Wolfgang

Artikel/Article: Fundorte der von R. Semon in den Jahren 1891—1893 gesammelten Thiere. 1