© Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at

Ring-Wiederfunde auswärtiger Stationen 5.

Von E. Schüz, Rossitten.

Podicipedes. Erster Fernfund des Zwergtauchers, *Podiceps ruficollis*: Ber. Troppau, gef. „im Pesenbach, einem linken Nebenfluß der Donau, im Mühlkreis", Ob. Oest. (10. X.—10. XII.), *30*.

Steganopodes. Kormoran, *Phalacrocorax c. carbo*, von Wigtownshire (SW-Schottland) nach Finistère und Morbihan und nach C. Ortegal (8° W, span. Nordküste, 27. XII. i. 3. W.), von Anglesey (N. Wales) nach Ille-et-Vilaine und Villa do Conde (41° 21′ N, Port., 4. X), *32*.

Ardeae. Fischreiher, *Ardea cinerea*, von Hillared (57° 39′ N 13° O, Südschweden) nach San Martin del Pedroso (unweit Braganza, etwa 42° N 7° W, Port.), etwa 20. I., laut *29*. 21 Wiederfunde von Reihern aus Dep. Pas-de-Calais, die entferntesten in Alacontim (Portugal, wo?, 1680 km SW, 10. XII. d. 2. W.) und bei Aveiro (40° 40′ N, 11. X.), *26*.

Anseres. Alt beringte Stockenten, *Anas platyrhyncha*, aus England: Von SW-Schottland (Wigtownshire) nach Upsala (59° 50′ N 17° 36′ O), III. 30—IX. 31, nach Vetil (finnische Westküste etwa unter 64° N), III.—V., nach Willmanstrand (61° 10′ N 28° 20′ O), III. 30—VIII. 31, und nach Lyck (53° 50′ N 22° 21′ O), III.—IX.; von Norfolk nach Sylt, III. 30—VIII. 31, nach Brücke (62° 44′ N 15° 26′ O, Jämtland), —VIII. 31, zur Nogatmündung, —VIII. 31, und nach Reichenbach (54° N 19° 30′ O, Ostpr.), —IX. 31, laut *32*. Alte Krickente, *Anas crecca*, von Cumberland in Mangskog (59° 45′ N 12° 50′ O, XI—IX), Värmland, *32*; junge Krickente von Varberg (57° 9′ N, Hallandküste) nach Arvert, Girondemündung (15. XII.), *29*.

Accipitres. Wespenbussard, *Pernis apivorus*, von Näs (60° 11′ N 16° 30′ O, Kopparbergs Län) nach Chambéry (45° 53′ N 6° O, Savoien), 10. X., laut *28*.

Galli. Wachtel, *C. coturnix*, ber. Steinschönau (50° 47′ N 14° 27′ O), Böhmen, 24. VII. (wohl jung?), gef. Sestri Ponente (Riviera 8° 51′ O), 4. XI., *30*.

Limicolae. Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula*, von Scone Estate (wohl 56° 25′ N 3° 22′ W, Perthsh.) nach Hinojales (38° N 6° 35′ W, Spanien), II, *32*. — Schwedische Waldschnepfe, *Scolopax*

© Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at

rusticola, von Skara (58° 23′ N 13° 30′ O) nach Mons (50° 27′ N 4° O, Belgien), XI, von Perstorp (nach Lönnberg 57° 7′ N, auf unseren Karten nur zu finden 56° 10′ N 13° 20′ O) nach Hernani (spanische Nordküste unter 2° W), XII, und nach Salamanca (41° N 5° 40′ W, Spanien), II, von Stabbarps Gruva (55° 52′ N 13° 20′ O) nach Villablard (Druckfehler?), Dordogne, XII, laut *28*, *29*.

Lari. Englische Brandseeschwalben, *Sterna sandvicensis*, wieder in 3 Fällen an der Goldküste und viermal an der Küste von Portugiesisch Westafrika, *32*.

Alcae. Tordalk, *Alca torda*, von Handa I. (Sutherland) nach Stavanger, XI. d. 2. J., *32*.

Columbae. Turteltaube, *Streptopelia turtur*, von Malvern (52° 5′ N 2° 20′ W, Worcestersh.) nach Biarritz, 12. IX., nach *32*.

Cuculi. Kuckuck, *Cuculus canorus*, von Kelling (Norfolk) nach Evre, wohl bei Bar le Duc (48° 46′ N 5° 9′ O, Meuse), 21. IX, nach *32*.

Passeres. Französische Durchzugs-Saatkrähen, *Corvus frugilegus*, von Rangs (Dep. Doubs) verblieben einmal im Dep. Seine Inf. (475 km NW, X. 29—VI. 31), ferner in Zeilsheim (am Main, 8° 30′ O, XI. 29—I. 31), bei Augsburg (etwa 48° 22′ N 11° O, XI. 28—III. 31), an der Swica südlich von Lemberg (also etwa 49° N 24° O, X. 28—IV. 31) und bei Enese (47° 39′ N 17° 26′ O, Ungarn, XI. 27—II. 31), *26*. — Star, *Sturnus vulgaris*. Außer den in Atlastafel 127 dargestellten Nordfunden schweizerischer Jungstare (Zwischenzug) ist eine Meldung aus Friedelsheim (Wachenheim, Pfalz, 49° 27′ N 8° 12′ O) 19. X. n. 2 J. bekannt geworden, *31*. — Kohlmeise, *Parus major*, von Aarberg (47° 3′ N 7° 16′ O, Schweiz) nach La Colle sur Loup, Alpes maritimes (Fluß Loup etwa bei 7° O, Mittelmeerküste), 1. XII. d. 2. W., *31*. — Wieder ein englisches Braunkehlchen, *Saxicola rubetra*, von Ingleton (54° 10′ N 2° 23′ W, Yorks) nach Nähe der portugiesischen Südküste unter 8° 11′ W (Paderne in Algarve), 21. IX., nach *32*. — Rotkehlchen, *Erithacus rubecula*. Von Borås (57° 42′ N 13° O, Schweden) nach spanische Ostküste unter 39° 10′ N (26. XI.), *28*, von Troppau (50° N 17° 53′ O) nach „Monte del Badia (Sant Anna, Breschia)“, 16. IX.—10. X., und „Castello (Firenze)“, 14. IX—8. XII (Alter bei Beringung?), von Leitomischl (49° 52′ N 16° 19′ O) nach Lecco (45° 51′ N 9° 23′ O, Comer See), 2. X., *30*.

Lebensalter von Feldsperling, Goldammer und Kohlmeise siehe *31*. Ueberwinterung von Lachmöwen am gleichen Ort ebenda.

© Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at

26. (A. Chappellier), Bagnages et reprises d'Oiseaux bagués 7ème Liste, vervielfältigtes Manuskript, 1932.

27. C. Dupond, Oiseaux bagués. Le Gerfaut 21, 3, 1931, S. 143—147.

28, 29. E. Lönnberg, Återfunna ringmärkta fåglar XXX, Fauna och Flora 1932, S. 24—32; XXXI, S. 72—78.

30. K. Loos, 17. Bericht über die Tätigkeit der Ornithologischen Station „Lotos" in Liboch a. E. für das Jahr 1930. Lotos 79, 2, 1931, S. 157—189.

31. A. Schifferli, 7. Bericht der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Der Ornithol. Beobachter, 29, 5, 1932, S. 66—84.

32. (H. F. Witherby), Recovery of marked Birds. British Birds, 25, 11, 1932, S. 319—331.

Kurze Mitteilungen.

Ausländische Beringungszentralen.[1])

Estland: Alle Verzeichnisse der Beringungsstationen teilen mit, daß die Inschrift der Estländischen Ringe folgende ist: früher: Tartu Estonia Universitas — jetzt: Estonia Tartu Orn.

Dieses ist unrichtig, unsere jetzigen Ringe haben die Inschrift „TARTU ESTONIA UNIVERSITAS", die früheren hatten „ESTONIA TARTU ORN." Alle Rückmeldungen bitte unpersönlich an das Zoologische Museum der Universität Tartu (Dorpat), Esti (Estland) richten zu wollen.

M. Härms.

Litauen (Kaunas = Kowno): Das Zoologische Institut der Universität Vytautas des Großen verwendet zur Erforschung des Vogelzuges zwecks Beringung der Vögel folgende Ringe: Serien B, C, D, E, F und G. Der Text auf den Ringen der Serien B, C, D, E, lautet: UNIVERSITE KAUNAS LITHUANIE, derjenige auf den Ringen F und G: UNIVERSITE LITHUANIE. Außerdem ist auf jedem Ring der Serien-Buchstabe und die laufende Nummer angegeben.

Die Vogelberingung mit diesen Ringen begann das Zoologische Institut im Jahre 1931. (In den Jahren 1929 und 1930 wurden zur Beringung Ringe der Vogelwarte Rossitten Ostpr. benutzt.) Während des angeführten Jahres wurden mit Hilfe von 121 Beringern 2472 Vögel verschiedener Arten beringt. Bis jetzt sind 15 Mitteilungen über dort gefundene von uns beringte Vögel aus einer Anzahl von Ländern eingegangen. Diese Beringungsarbeit wird in jedem Jahre umfangreicher.

T. Ivanauskas.

[1]) s. auch die Mitt. im Jahrgang 1 dieser Zeitschrift, S. 130 und 178.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Der Vogelzug - Berichte über Vogelzugsforschung und Vogelberingung

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: 3_1932

Autor(en)/Author(s): Schüz Ernst

Artikel/Article: Ring-Wiederfunde auswärtiger Stationen 5. 136-138