

Auch im Nordosten, in Ostpreußen — Memelland, sind Standvögel vorhanden, wie der Fund R G 108 804 (31. I. 32 und 29. IV. 32, Windenburg, Post Kintun, von M. POSINGIS gefangen) ergibt.

2. Blaumeise — *Parus c. caeruleus* L.

Von dieser Art liegen nur 5 Fernfunde bei der Vogelwarte Helgoland vor.

- | | |
|--|---|
| 1. 907874, juv. 14. VI. 30, Bauerbach bei Marburg (50° 49' N 8° 46' O). | 27. X. 30 St. Gély du Fete bei Les Matelles (43° 43' N 3° 50' O), Frankreich. ca. 850 km. |
| 2. 881335, juv. 25. VII. 30, Dessau (51° 50' N 12° 15' O). | 30. III. 31 Sonneberg bei Langenau (50° 44' N 14° 27' O), Nordböhmen. ca. 185 km. |
| 3. 819812, ad. 12. III. 29, Aue bei Eschwege (51° 11' N 10° 4' O). | 16. III. 30 Bernburg a. Saale (51° 47' N 11° 45' O). 125 km. |
| 4. 906338, juv. 30. V. 30, Gießen (50° 35' N 8° 42' O). | 26. II. 31 Kamp/Rhein (50° 14' N 7° 37' O). 85 km. |
| 5. 621741, juv. 11. V. 27, Seebach bei Langensalza (51° 7' N 10° 40' O). | 16. XI. 28 Bodes bei Hünfeld (50° 41' N 9° 46' O). ca. 78 km. |

Beringt wurden die Vögel von E. SCHRAMM (1), P. HEINZE (2), E. FRÖHLICH (3), W. SUNKEL (4), K. MANSFELD (5).

Die Entfernungen betragen 78, 85, 125, 185 und 850 km.

Die Richtungen sind auch hier vorwiegend südwestliche bzw. nordöstliche; bei dem Frühjahrsfunde (Nr. 4) besteht die Möglichkeit, daß der Vogel im Herbst zunächst ebenfalls südwestlich gewandert ist.

Vier Blaumeisen führten die Wanderungen in ihrem ersten Lebensjahr aus, die fünfte vielleicht auch (vgl. das für die Kohlmeise Gesagte).

Das Zahlenverhältnis der Fernfunde (Nr. 1—5) zu den Feststellungen am Ort in den Monaten November bis Februar ist 9,6 : 100.

Ring-Wiederfunde auswärtiger Stationen 6.

Von E. Schüz, Rossitten.

Accipitres. Raufußbussard, *Buteo lagopus*, O Jämtland etwa unter 63° 17' N 12° 23' O, + Enzersdorf a. Fische (48° 10' N 16° 36' O bei Wien, XII d. 2. W.), und Merlinfalken, *Falco columbarius aculon*, ebendaher + Kanalinself Jersey (I d. 3. W.), + Iseghem (50° 55' N 33° 1' O, II) und + Straßburg i. E. (XII d. 3. W.), 34.

Limicolae. Rotschenkel, *Tringa totanus*, O Oeland, + Sommebucht (24. VII.), + Bassin d'Arcachon (IV n. 3 J.), + Etang des Salses, Ostpyrenäenküste unter fast 43° N (IV n. 3 J.) und + Lissabon

(I), ferner u. a. südlichster Fund eines Oeländer Brachvogels, *Numenius arquata*, + östlich von Antwerpen (51° 14' N 4° 37' O, 16. IX.), 34.

Lari. Mantelmöwe, *Larus marinus*, o Kungsbackafjord (schwedische Westküste 57° 25' N), + Venraij (51° 32' N 6° O, Holland, I), und zwei Heringsmöwen, *L. fuscus*, o Gotland, + in der Ukraine: Matschucha, Bratzlaw (48° 48' N 29° O, 5. XI.) und Golinitzk, Kaliminsk (Kalimovsk 49° 24' N 28° 36' O, 15. IX.), 34. — Lachmöwe, *L. ridibundus*, o Gotland, + Saint Louis (16° N), Senegal (28. III. n. 3 J.), 34. — Brandseeschwalben, *Sterna sandvicensis*, o Mäkläppem (Südspitze Schwedens) bis Ende VIII. + noch in Dänemark, am 8. X. + in Gandia (span. Ostküste 39° N) und am 25. XI. + in Dakar (Senegalküste, knapp 15° N), ferner Küstenseeschwalbe, *St. paradisaca*, ebendaher + im XII. nahe Kapstadt, 34.

Striges. Sumpfohreule, *Asio flammeus*, o Jämtland (wie oben), + Grevesmühlen (53° 46' N 11° 11' O, Meckl., XI. n. 1 J.), 34.

Passeres. Ein Rotrückenwürger, *Lanius collurio*, o Sopron (Ödenburg, 47° 41' N 16° 35' O), + Kythera (zwischen Peloponnes und Kreta, 23. V. — 15. X.), 36. — Grauer Fliegenschnäpper, *Muscicapa striata*, o Südschonen unter 55° 39' N 13° 42' O, + Süd-Korfu (Argyrades, wohl kurz vor Anfang Mai n. 3 J.), 35, und o Fryksände (60° 9' N 13° O, Värmland), + Itylon (36° 42' N 22° 23' O, Peloponnes, 25. IX.), 34. — Amsel, *Turdus merula*, o Valpovo (45° 39' N 18° 27' O, Jugoslawien), + Ancona (43° 38' N, ital. Ostküste, XI. n. 2 1/2 J.), 37. — Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochrurus gibraltariensis*, o Kom. Ödenburg, + Korfu (Sgonrades, 15. VIII.), 33.

Alter: Aus England werden u. a. eine Turteltaube, *Streptopelia turtur*, von mehr als 6 Jahren, ein Star, *Sturnus vulgaris*, von 5 1/2 Jahren, ein Rotkehlchen, *Erithacus rubecula*, von 4 3/4 Jahren und Heckenbraunellen, *Prunella modularis*, von 2 3/4 und 3 Jahren gemeldet, 35.

Verbesserungen zum Atlas des Vogelzugs (z. T. nach freundlicher Mitteilung von Herrn Forstassessor Daackförde): Im Nachtrag 1 sind folgende Fälle zu streichen, da sie schon in den Karten stehen (die während der Ausarbeitung beim Drucker lagen: S. 141 *C. ciconia* (Tafel 14), S. 143 *Anas platyrhynchos* (Gotland-Marne (T. 26), *Anas penelope* von Tara (T. 33, vgl. auch „Vogelzug“ 2 S. 160), S. 147 *Scelopax rusticola* aus Schweden (T. 71), S. 150 *Asio flammeus* (T. 114), S. 152 *Carduelis cannabina* in Sprimont und Isoghem (T. 133), *Turdus philomelos* drei erstgenannte schlesische Vögel, Rhönefund jedoch im X. (T. 142), S. 153 *T. merula* von Bertinoro und Villetagnan (T. 145). S. 51, *Larus ridibundus*

Nyborg liegt an Ostküste von Fyn. — S. 142, *Anas platyrhynchos*: Plauer See 53° 30' N. — S. 147 *Larus argentatus* 2. Zeile: Dalton-on-Tees 54° 28' N; 4. Zeile: Filey Brigg 0° 17' W. — S. 148 (T. 81 r.), *L. canus*: Gjedser an Südspitze von Falster. — S. 149 über Mitte, *L. ridibundus*: Hotzenplotz 50° 17' N. — S. 150. *Sterna hirundo*: Grimshy 0° 5' W. — S. 152, *Fringilla coelebs*, Grantham 0° 39' W. — Tafel 25, *Anas platyrhynchos*: die im XI. im Pommern gefundene Ente vom Ilmensee ist als Mauservogel im VII. beringt (vielleicht auch die anderen Stücke? vgl. „Vogelzug“ I S. 173). Tafel 101, *Larus ridibundus*: der Beringungsort in Nordrußland ist um mehr als 2 Längengrade westwärts vom Onega- an den Ladogasee (ebenfalls Fluß Swir) zu verlegen (s. „Vogelzug“ 2 S. 30).

Verbesserungen zu früheren „Ring-Wiederfunden auswärtiger Stationen“. „Vogelzug“ 2, 3, S. 129 unter Mitte: Boddin 53° 56' N. S. 129 unten: Motala 58° 33' N. 3, 1, S. 29 unter Mitte: El Golea 30° 35' N. S. 31 über Mitte (*Anas crecca*): Behle schon auf Tafel 31, dort um 1° östlich zu verlegen. S. 32 (*Charadrius alexandrinus*) Terracina 13° 20' O. — 3, 2, S. 88 (*C. ciconia*): Dakwa liegt 4° 40' N, der Maifund im Atlas also richtig. S. 89: *Rissa tridactyla* von Neufundland (24. XII. 30 Twillingate) muß folgenden Zusatz bekommen: (1929, Brit. Birds 24 1932 S. 331), laut 25. — 3, 3, S. 136, *Pernis apivorus*: Von 60° 28' N 14° 25' O nach 45° 33' N 6° O.

Schrifttum.

33. G. BREUER, Ungarischer Hausrotschwanz auf Korfu erbeutet. *Köcsag* 5, 1/2, 1932, S. 64.
34. L. A. JÄGERSKIÖLD, Göteborgs Naturhistoriska museums ringmärkningar av flyttfåglar under 1931. Göteborgs Museums Årstryck 1932 S. 46—54.
35. E. LÖNNBERG, Återfunna ringmärkta fåglar XXXII. *Fauna och Flora* 1932, S. 117—126.
36. DESIDER NAVRATIL VON SZALÓK, Ringvögel. *Köcsag* 5, 1/2, 1932, S. 63.
37. J. PLANČIĆ, Markiranje Ptica, Izveštaj o markiranju ptica selica prstenovima zavoda za primijenjenu zoologiju Savske banovine u Zagrebu za vrijeme od godine 1910—1930. (Bericht über die Beringung der Zugvögel mit Ringen des Institutes für angewandte Zoologie in Zagreb in den Jahren 1910—1930). Zavod za primijenjenu zoologiju Savske banovine u Zagrebu ornitološki odio, Zagreb 1932.
38. (H. F. WITHERBY) Recovery of marked birds. Retrapping records. *British Birds*, 26, 2, 1932, S. 48—54.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Der Vogelzug - Berichte über Vogelzugsforschung und Vogelberingung](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [3_1932](#)

Autor(en)/Author(s): Schüz Ernst

Artikel/Article: [Ring-Wiederfunde auswärtiger Stationen 6. 173-175](#)