

Röhrlings-Bestimmungstabelle.

Von Dr. Hans Heil, Darmstadt.

Zur Einarbeitung empfiehlt es sich, daß der Benutzer, dem vielleicht am Anfang der Aufbau der Tabelle noch nicht geläufig ist, zunächst eine vollständige Diagnose (Beschreibung) des einen oder anderen Pilzes aus sämtlichen Angaben der Tabelle zu erhalten versucht. Z. B.:

Hohlfuß-Röhrling (*Boletus cavipes*). Hut gelb oder rotbraun, trocken (filzig). Röhren weit, ihre Mündungen gelb. Fleisch ohne Verfärbung. Stiel mit Schleier (Ring), hohl. Unter Lärchen, selten.

In der oberen Waagrechten (Ziffern!) der Tabelle sind Farbmerkmale (Farbe der Röhrenmündungen, Verfärbung des aufgebrochenen oder angeschnittenen Fleisches [Fl.]) angeführt, in der seitlichen Senkrechten (Buchstaben!) dagegen Formmerkmale (Stiel mit oder ohne Ring, Netzbildung [N.]). Da sich viele Pilzarten während ihrer Entwicklung in Bezug auf Farbe und Gestalt sehr wandlungsfähig zeigen, mußte von verschiedenen Stellen aus (durch Klammerbemerkungen) auf die betreffenden Arten hingewiesen werden. Wie bei allen Pilzbestimmungen benützt man am besten mehrere Stücke einer Art in verschiedenen Entwicklungszuständen.

Aufgenommen wurden alle (45) Arten, die für Band I (Die Röhrlinge. Von Fr. Kallenbach) des Werkes „Die Pilze Mitteleuropas“ (Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig) vorgesehen sind. Die Autorennamen wurden weggelassen, um die Tabelle nicht zu überlasten. Hierauf sei hingewiesen besonders wegen der nicht einheitlichen wissenschaftlichen Bezeichnungen der Hexenpilzarten. Die Benennungen beziehen sich auf die des genannten Werkes, das nach Abschluß ausführliche Beschreibungen und farbige Abbildungen sämtlicher Arten enthalten wird.

Als einwandfrei giftig ist bis jetzt nur der Satanspilz (*Boletus satanas*) erkannt worden. Abgesehen von diesem, sowie den seltenen (ss) — Naturschutz! — und kleinen Arten (*B. lignicola*, *B. Pierrhuguesii*) und den schlecht schmeckenden (bitter: *B. radicans*, *B. felleus*, *B. pachypus*; brennend scharf: *B. piperatus*; muffig: *Str. strobilaceus*) sind die meisten Röhrlinge wertvolle Speisepilze.

Als vorzüglich sind zu nennen: Steinpilz, Maronenröhrling, Rothäubchen, Flockenstieler Hexenröhrling, Königsröhrling.

In ihrer Güte schließen sich an: Rotfußröhrling, Ziegenlippe, Birkenröhrling, Sandröhrling, Hohlfußröhrling.

Jung zu verwenden sind die schleimigen und druckempfindlichen Arten: Butterröhrling, Goldröhrling, Grauer Lärchenröhrling, Schmerling.

Zu Extrakt taugen: Kuhröhrling, ältere, schleimige Formen, sowie alle eßbaren Pilze, die in Massen gefunden werden.

Farbe der Röhrenmündungen	I. Weiß (± blaß getönt)				
	1. weiß (± grau)		2. im Alter farbig getrübt		
	verschieden		Bläuung (Schwärzung) keine Verf.		
Verfärb. d. Fl.	B. Ohne Schleier (Ring)	b) trocken (filzig)	<p>Schwärzung: ^h Rothhäubchen (<i>B. rufus</i>) r (br) / w (gr) + br (schw) L [vgl. ^s <i>B. pseudoscaber</i> I 2, Bbβ]</p> <p>Keine Verfärbung: ^h Birken-R. (<i>B. scaber</i>) br (gr) / hgr + schw L (Birk.)</p> <p>^s Hasen-R. (<i>B. castaneus</i>) br (r) / hbr (r) L</p>	<p>Bläuung: [vgl. ^h <i>B. badius</i> (jung) II 2, Baβ; ^s <i>B. cyanescens</i> (alt) I 2, Ab]</p> <p>Schwärzung: ^s Falscher Birken-R. (<i>B. pseudoscaber</i>) br (g, gr, schw) / gr + schw L (Hainbuchen)</p> <p>^s Porphyrsporiger R. (<i>B. porphyrosporus</i>) br (gr) / br (gr) N</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. badius</i> (jung) II 2, Baβ; ^s <i>B. castaneus</i> I 1, Bbβ]</p>
		a) mit Netz (+ sehr fein)	<p>[vgl. ^h <i>B. felleus</i> III 2, Bba]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Erklärung der Abkürzungen: ^h häufig, ^s selten, ^{ss} sehr selten, w weiß, r rot, h hell, L Laubwald, gr grau, br braun, d dunkel, N Nadelwald, g gelb, schw schwarz, M Mischwald. Hutfarbe / Stielfarbe, z. B.: w (g, h r) / g + r. Hut: gelbliches oder hell rötliches Weiß. Stiel: gelb mit Rot, d. h. roten Zeichnung.</p> </div>	<p>^h Steinpilz (<i>B. edulis</i>) f. <i>typica</i> br / hbr L</p> <p>f. <i>pinicola</i> br (r) / br (r) N</p>	
a) schmierig	β) ohne Netz	a) mit Netz	<p>[vgl. ^h <i>B. scaber</i> I 1, Bbβ]</p>	<p>^h Kuh-R. (<i>B. bovinus</i>) br (r) / br (g) weite Röhren N (Kiefern)</p> <p>[vgl. ^h <i>B. badius</i> (alt) II 2, Baβ]</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. badius</i> II 2, Baβ; ^{ss} <i>B. placidus</i> II 1, Baβ]</p>
		b) trocken (filzig)	<p>über ziegelrötl. schwärzend: ^s Schuppen-R. (<i>Strobilomyces strobilaceus</i>) gr (schw) / gr (schw) L, M</p>	<p>^s Kornblumen-Röhrling (<i>B. cyanescens</i>) hg (br) / hg (br, gr) L</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. edulis</i> I 2, Bba]</p>
Hut: a) schmierig	Stieloberfläche: a) mit N. β) ohne N.	b) trocken (filzig)	<p>bläul.-grünl. Verfärb.: ^s Grauer Lärchen-R. (<i>viscidus</i>) gr (g, r) / g (gr) Lärchen</p> <p>^{ss} Gelbbeschleierter L. (<i>visc. v. Bresadolae</i>) br (r, gr) / r (gr) Lärchen</p>	<p>^s Erlen-Grübling (<i>Gyrodontia livida</i>) hg (br) / hg (br), Röhren sehr kurz, Erlen</p> <p>[vgl. ^{ss} <i>pseudosulph.</i> II 1, Bbβ; ^s <i>pulverulentus</i> II 1, Bbβ]</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. edulis</i> I 2, Bba]</p>
				<p>Schwach trübend: ^h Gold-R. (<i>elegans</i> = <i>flavus</i>) g, g (br) / g, g (br) Lärchen</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. elegans</i> II 1, Aaβ]</p>

II. Gelb		
1. rein (schwefel-, zitron-, gold-) gelb		2. grünlich- oder olivgelb
± Bläuung (Schwärzung)	Keine Verfärbung	verschieden
<p>Bläuung: ^s Schwarzblauer R. (<i>pulverulentus</i>) br / g + br M (Rotb.)</p> <p>^{ss} Falscher Schwefel-R. (<i>B. pseudosulphureus</i>) g / g L (Rotbuche)</p> <p>^{ss} Nadelholz-R. (<i>lignicola</i>) br (r, g) / b (r, g) N-Holz</p> <p>[vgl. ^{ss} <i>sulphureus</i> II 2, Bbβ; ^s <i>radicans</i> II 1, Bba]</p> <p>Schwärzung: ^s Gelber Birken-R. (<i>B. rimosus</i>) hbr (g) / hg L</p>	<p>Stiel schlank: ^h Ziegenlippe (<i>B. subtomentosus</i>) br (gr) / br (g, r) N, L</p> <p>^{ss} Schmarotzer-R. (<i>parasiticus</i>) g (br) / g (br) auf Kartoffelbovist</p> <p>Stiel tonnenförmig: ^{ss} Fahler R. (<i>impolitus</i>) w (br) / w (g) L (Eichen)</p>	<p>schwache Bl.: ^h Rotfuß-R. (<i>B. chryseron</i>) br (gr) / r, Hut rissig gefeldert N, L</p> <p>^{ss} Schwefel-R. (<i>sulphureus</i>) g / g N-Holz [vgl. ^h <i>badius</i> (jung) II 2, Baβ]</p> <p>starke Bl.: ^h Sand-R. (<i>variegatus</i>) g (br) / hg, enge Röhren, N</p> <p>^{ss} Blutroter R. (<i>sanguineus</i>) r / g + r (punkt.) L [vgl. ^s <i>rimosus</i> II 1, Bbβ; ^s <i>pulverulentus</i> II 1, Bbβ]</p>
<p>Schwache Bläuung: ^s Bronze-R. (<i>aereus</i>) dbr / g (br) + L (Eichen)</p> <p>Starke Bläuung: ^s Anhängsel-R. (<i>appendiculatus</i>) br (g, r) / g + L</p> <p>^s Wurzelnder R. (<i>B. radicans</i>) gr (hbr) / g +, bitter L [vgl. ^s <i>B. pachypus</i> II 2, Bba]</p> <p>^{ss} Sommer-R. (<i>aestivalis</i>) w (gr) / g + L</p> <p>Schwärzung: [vgl. ^s <i>rimosus</i> II 1, Bbβ]</p> <p>^s Erlen-Grübling (<i>Gyrodontia livida</i>) hg (br) / hg (br), Röhren sehr kurz, Erlen</p> <p>[vgl. ^{ss} <i>pseudosulph.</i> II 1, Bbβ; ^s <i>pulverulentus</i> II 1, Bbβ]</p>	<p>[vgl. ^s <i>B. aereus</i> II 1, Bba]</p> <p>^h Schmerling (<i>granulatus</i>) hg (br) / hg N</p> <p>^s Goldporiger R. (<i>auriporus</i> = <i>gentilis</i>) hr (gr, br) / g (br) L</p> <p>^{ss} Elfenbein-R. (<i>placidus</i>) w (g, br) / w (g) Weimutkiefer</p>	<p>Bläuung: ^h Maronen-R. (<i>badius</i>) dbr / br (g) N (L) [vgl. ^h <i>bovinus</i> I 2, Baβ; ^{ss} <i>sanguineus</i> II 2, Bbβ]</p> <p>Keine Verfärbung: [vgl. ^h <i>edulis</i> (alt) I 2, Bba]</p>
	<p>^s Hohlfuß-R. (<i>B. cavipes</i>) g, br (r) / g, br (r) weite Röhren, Stiel hohl, Lärchen</p>	<p>[vgl. ^s <i>B. cavipes</i> II 1, Ab]</p>
	<p>^h Butter-R. (<i>B. luteus</i>) dbr / w (g) N (Kiefern)</p> <p>^{ss} Schleimig beringter R. (<i>flavidus</i>) g (gr) / hg (gr) weite Röhren N (Torfmoore)</p>	

III. Rot			Farbe der Röhrenmündungen
1. orange- oder blutrot		2. rosa oder rostrot	
Bläuung (außer <i>B. tridentinus</i>)	keine Verfärbung		Verfärb. d. Fl.
<p>^h Flockenstieler Hexen-Röhrling (<i>Boletus miniatoporus</i>) dbr / g + r (punktiert), Fleisch gelb, L, N</p> <p>^s Glattstieler Hexen-Röhrling (<i>Boletus erythropus</i> Pers.) g, br, r / g + r, Fleisch weinrot durchzogen, L</p>	<p>^{ss} Rosasporiger Röhrling (<i>Boletus Pierrhuguesii</i>) hg / hg, Röhren rosa, N</p> <p>[vgl. ^s <i>B. piperatus</i>, N, scharf, III 2, Baβ]</p>		<p>Stieloberfläche: β) ohne Netz</p> <p>Hut: b) trocken (filzig)</p> <p>Stiel: B. Ohne Schleier (Ring)</p>
	<p>Hut blaß: ^s Purpur-Röhrling (<i>rhodoxanthus</i>) w (g, hr) / g + r (Netz), Fleisch tiefgelb, Stiel schlank, L</p> <p>^s Satans-Röhrling (<i>B. satanas</i>) hgr (grünl.) / g + r (Netz), Fleisch blaß, Stiel tonnenförmig, L, giftig!</p> <p>Hut dunkel: ^s Netzstieler Hexen-Röhrling (<i>B. luridus</i>) g (br), r / g, r L</p>	<p>^h Gallen-Röhrling (<i>Boletus felleus</i>) br / hbr (Röhren hellrosa), bitter, N</p>	
<p>[vgl. ^s <i>B. erythropus</i> Pers. III 1, Bbβ]</p>	<p>^s Pfefferröhrling (<i>Boletus piperatus</i>) h (br) / g (Röhren rostrot), scharf, N [vgl. ^{ss} <i>B. Pierrhuguesii</i>, mild, III 2, Bbβ]</p>		<p>β) ohne Netz</p> <p>a) mit Netz</p>
<p>[vgl. ^s <i>B. satanas</i> III 1, Bba; ^s <i>B. luridus</i> III 1, Bba]</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. felleus</i> III 2, Bba]</p>		<p>b) trocken (filzig)</p> <p>a) schmierig</p>
<p>Goldgelbrötliche Verfärbung: ^s Orangeporiger Röhrling (<i>B. tridentinus</i>) g + br / g (br) Lärchen</p>	<p>[vgl. ^s <i>B. tridentinus</i> (alt) III 1, Aaβ]</p>		<p>a) schmierig</p> <p>A. Mit Schleier (Ring)</p>

Mitgliedsbeitrag der Deutschen Mykologischen Gesellschaft: RM 1.10.

Postscheckkonto: Deutsche Mykologische Gesellschaft, 22-8-71, Wien.

Bezugspreis der Zeitschrift

für Mitglieder: RM 2.50,

Postscheckkonto: Deutsche Blätter für Pilzkunde, 81-605, in Wien,
für freie Bezieher: RM 3.30 jährlich durch die Firma Dr. Werner
Klinkhardt, Leipzig.

Bitte beachten!

1. Neubestellungen und Anschriftenänderungen sind nur zu richten an:
Therese Bertl, Wien, III./40, Mohsgasse 2.
2. Alle die Schriftleitung betreffenden Angelegenheiten erledigt:
Hans Fenzl, Wien-Purkersdorf, Herrngasse 6.
3. Anfragen wegen des Mitgliedsbeitrages u. dgl.:
Stephanie Tiller, Wien, III./40, Landstraßer-Gürtel 21.



**Vollkornbrot
ist besser und gesunder!**

Deutsche Blätter für Pilzkunde

Herausgegeben von der Deutschen Mykologischen Gesellschaft

Sitz: Wien 40, Rennweg 14

(Botanisches Institut)

Jährlich 6 Hefte

Bezugspreis der Zeitschrift RM 3,30, für Mitglieder RM 2,50. — Eigentümer, Herausgeber und Verlag: Deutsche Mykologische Gesellschaft, Wien 40, Rennweg 14. — Vertrieb für freie Bezieher: Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig, Liebigstraße 6.

Röhrlings- Bestimmungstabelle.

Von Dr. Hans Heil, Darmstadt.

Zur Einarbeitung empfiehlt es sich, daß der Benutzer, dem vielleicht am Anfang der Aufbau der Tabelle noch nicht geläufig ist, zunächst eine vollständige Diagnose (Beschreibung) des einen oder anderen Pilzes aus sämtlichen Angaben der Tabelle zu erhalten versucht. Z. B.:

Hohlfuß-Röhrling (*Boletus cavipes*). Hut gelb oder rotbraun, trocken (filzig). Röhren weit, ihre Mündungen gelb. Fleisch ohne Verfärbung. Stiel mit Schleier (Ring), hohl. Unter Lärchen, selten.

In der oberen Waagrechten (Ziffern!) der Tabelle sind Farbmerkmale (Farbe der Röhrenmündungen, Verfärbung des aufgebrochenen oder angeschnittenen Fleisches [Fl.]) angeführt, in der seitlichen Senkrechten (Buchstaben!) dagegen Formmerkmale (Stiel mit oder ohne Ring, Netzbildung [N.]). Da sich viele Pilzarten während ihrer Entwicklung in Bezug auf Farbe und Gestalt sehr wandlungsfähig zeigen, mußte von verschiedenen Stellen aus (durch Klammerbemerkungen) auf die betreffenden Arten hingewiesen werden. Wie bei allen Pilzbestimmungen benützt man am besten mehrere Stücke einer Art in verschiedenen Entwicklungszuständen.

Aufgenommen wurden alle (45) Arten, die für Band I (Die Röhrlinge. Von Fr. Kallenbach) des Werkes „Die Pilze Mitteleuropas“ (Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig) vorgesehen sind. Die Autorennamen wurden weggelassen, um die Tabelle nicht zu überlasten. Hierauf sei hingewiesen besonders wegen der nicht einheitlichen wissenschaftlichen Bezeichnungen der Hexenpilzarten. Die Benennungen beziehen sich auf die des genannten Werkes, das nach Abschluß ausführliche Beschreibungen und farbige Abbildungen sämtlicher Arten enthalten wird.

Als einwandfrei giftig ist bis jetzt nur der Satanspilz (*Boletus satanas*) erkannt worden. Abgesehen von diesem, sowie den seltenen (^{ss}) — Naturschutz! — und kleinen Arten (*B. lignicola*, *B. Pierrhuguesii*) und den schlecht schmeckenden (bitter: *B. radicans*, *B. felleus*, *B. pachypus*; brennend scharf: *B. piperatus*; muffig: *Str. strobilaceus*) sind die meisten Röhrlinge wertvolle Speisepilze.

Als vorzüglich sind zu nennen: Steinpilz, Maronenröhrling, Rothäubchen, Flockenstieleriger Hexenröhrling, Königsröhrling.

In ihrer Güte schließen sich an: Rotfußröhrling, Ziegenlippe, Birkenröhrling, Sandröhrling, Hohlfußröhrling.

Jung zu verwenden sind die schleimigen und druckempfindlichen Arten: Butterröhrling, Goldröhrling, Grauer Lärchenröhrling, Schmerling.

Zu Extrakt taugen: Kuhröhrling, ältere, schleimige Formen, sowie alle eßbaren Pilze, die in Massen gefunden werden.

Farbe der Röhrenmündungen		I. Weiß (± blaß getönt)				
		1. weiß (± grau)		2. im Alter farbig getrübt		
Verfärb. d. Fl.		verschieden	Bläuung (Schwärzung)	keine Verf.		
B. Ohne Schleier (Ring)	b) trocken (filzig)	β ohne Netz	Schwärzung: ^h Rothäubchen (<i>B. rufus</i>) r (br) / w (gr) + br (schw) L [vgl. ^s <i>B. pseudoscaber</i> I 2, Bbβ] Keine Verfärbung ^h Birken-R. (<i>B. scaber</i>) br (gr) / hgr + schw L (Birk.) ^s Hasen-R. (<i>B. castaneus</i>) br (r) / hbr (r) L	Bläuung: [vgl. ^h <i>B. badius</i> (jung) II 2, Baβ; ^s <i>B. cyanescens</i> (alt) I 2, Ab] Schwärzung: ^s Falscher Birken-R. (<i>B. pseudoscaber</i>) br (g, gr, schw) / gr + schw L (Hainbuchen) ^s Porphyrsporiger R. (<i>B. porphyrosporus</i>) br (gr) / br (gr) N	[vgl. ^h <i>B. badius</i> (jung) II 2, Baβ; ^s <i>B. castaneus</i> I 1, Bbβ]	
			a) mit Netz (* sehr fein)	[vgl. ^h <i>B. felleus</i> III 2, Bba]	[vgl. ^s <i>B. pseudoscaber</i> I 2, Bbβ]	^h Steinpilz (<i>B. edulis</i>) f. <i>typica</i> br / hbr L f. <i>pinicola</i> br (r) / br (r) N
	a) schmierig		β ohne Netz	[vgl. ^h <i>B. scaber</i> I 1, Bbβ]	^h Kuh-R. (<i>B. bovinus</i>) br (r) / br (g) weite Röhren N (Kiefern) [vgl. ^h <i>B. badius</i> (alt) II 2, Baβ]	[vgl. ^h <i>B. badius</i> II 2, Baβ; ^{ss} <i>B. placidus</i> II 1, Baβ]
			a) mit Netz			[vgl. ^h <i>edulis</i> I 2, Bba]
Stiel A. Mit Schleier (Ring)	b) trocken (filzig)		über ziegelrötl. schwärzend: ^s Schuppen-R. (<i>Strobilomyces strobilaceus</i>) gr (schw) / gr (schw) L, M	^s Kornblumen-Röhrling (<i>B. cyanescens</i>) hg (br) / hg (br, gr) L		
	Hut: a) schmierig	Stieloberfläche: a) mit N. / β ohne N.		bläul.-grünl. Verfärb.: Grauer Lärchen-R. (<i>viscidus</i>) gr (g, r) / g (gr) Lärchen ^{ss} Gelbbeschleierter L. (<i>visc. v. Bresadolae</i>) br (r, gr) / r (gr) Lärchen		

Erklärung der Abkürzungen:
^h häufig, ^s selten, ^{ss} sehr selten,
 w weiß, r rot, h hell, L Laubwald,
 gr grau, br braun, d dunkel, N Nadelwald,
 g gelb, schw schwarz, M Mischwald.
 Hutfarbe / Stielfarbe, z. B.: w (g, h r) / g + r.
 Hut: gelbliches oder hell rötliches Weiß.
 Stiel: gelb mit Rot, d. h. roter Zeichnung.

II. Gelb

1. rein (schwefel-, zitron-, gold-) gelb		2. grünlich- oder olivgelb
± Bläuung (Schwärzung)	Keine Verfärbung	verschieden
<p>Bläuung: ^s Schwarzblauer R. (<i>pulverulentus</i>) br / g + br M (Rotb.) ^{ss} Falscher Schwefel-R. (<i>B. pseudosulphureus</i>) g / g L (Rotbuche) ^{ss} Nadelholz-R. (<i>lignicola</i>) br (r, g) / b (r, g) N-Holz [vgl. ^{ss} <i>sulphureus</i> II 2, Bbβ; ^s <i>radicans</i> II 1, Bba] Schwärzung: ^s Gelber Birken-R. (<i>B. rimosus</i>) hbr (g) / hg L</p>	<p>Stiel schlank: ^h Ziegenlippe (<i>B. subtomentosus</i>) br (gr) / br (g, r) N, L ^{ss} Schmarotzer-R. (<i>parasiticus</i>) g (br) / g (br) auf Kartoffelbovist Stiel tonnenförmig: ^{ss} Fahler R. (<i>impolitus</i>) w (br) / w (g) L (Eichen)</p>	<p>schwache Bl.: ^h Rotfuß-R. (<i>B. chrysenteron</i>) br (gr) / r, Hut rissig gefeldert N, L ^{ss} Schwefel-R. (<i>sulphureus</i>) g / g N-Holz [vgl. ^h <i>badius</i> (jung) II 2, Baß] starke Bl.: ^h Sand-R. (<i>variegatus</i>) g (br) / hg, enge Röhren, N ^{ss} Blutroter R. (<i>sanguineus</i>) r / g + r (punkt.) L [vgl. ^s <i>rimosus</i> II 1, Bbβ; ^s <i>pulverulentus</i> II 1, Bbβ]</p>
<p>Schwache Bläuung: ^s Bronze-R. (<i>aereus</i>) dbr / g (br) + L (Eichen) Starke Bläuung: ^s Anhängsel-R. (<i>appendiculatus</i>) br (g, r) / g + L ^s Wurzelnder R. (<i>B. radicans</i>) gr (hbr) / g +, bitter L [vgl. ^s <i>B. pachypus</i> II 2, Bba] ^{ss} Sommer-R. (<i>aestivalis</i>) w (gr) / g + L Schwärzung: [vgl. ^s <i>rimosus</i> II 1, Bbβ]</p>	<p>^s Königs-Röhrling (<i>B. regius</i>) r (g + r) / g + L (Rotbuche) [vgl. ^s <i>B. aereus</i> II 1, Bba]</p>	<p>Bläuung: ^s Dickfuß-R. (<i>pachypus</i>) hg (gr, br) / r, bitter, L [vgl. <i>sanguineus</i> (alt) II 2, Bbβ] Keine Verfärbung: [vgl. <i>B. edulis</i> (alt) I 2, Bba; <i>regius</i> (alt) II 1, Bba].</p>
<p>^s Erlen-Grübling (<i>Gyrodon lividus</i>) hg (br) / hg (br), Röhren sehr kurz, Erlen [vgl. ^{ss} <i>pseudosulph.</i> II 1, Bbβ; ^s <i>pulverulentus</i> II 1, Bbβ]</p>	<p>[vgl. ^s <i>B. aereus</i> II 1, Bba] ^h Schmerling (<i>granulatus</i>) hg (br) / hg N ^s Goldporiger R. (<i>auriporus = gentilis</i>) hr (gr, br) / g (br) L ^{ss} Elfenbein-R. (<i>placidus</i>) w (g, br) / w (g) Weimutkiefer</p>	<p>Bläuung: ^h Maronen-R. (<i>badius</i>) dbr / br (g) N (L) [vgl. ^h <i>bovinus</i> I 2, Baß; ^{ss} <i>sanguineus</i> II 2, Bbβ] Keine Verfärbung: [vgl. ^h <i>edulis</i> (alt) I 2, Bba]</p>
	<p>^s Hohlfuß-R. (<i>B. cavipes</i>) g, br (r) / g, br (r) weite Röhren, Stiel hohl, Lärchen</p>	[vgl. ^s <i>B. cavipes</i> II 1, Ab]
<p>Schwach trübend: ^h Gold-R. (<i>elegans = flavus</i>) g, g (br) / g, g (br) Lärchen</p>	<p>^h Butter-R. (<i>B. luteus</i>) dbr / w (g) N (Kiefern) ^{ss} Schleimig beringter R. (<i>flavidus</i>) g (gr) / hg (gr) weite Röhren N (Torfmoore)</p>	
[vgl. ^h <i>B. elegans</i> II 1, Aaβ]		

III. Rot		Farbe der Röhrenmündungen		
1. orange- oder blutrot	2. rosa oder rostrot			
Bläuung (außer <i>B. tridentinus</i>)	keine Verfärbung	Verfärb. d. Fl.		
<p>^h Flockenstielliger Hexen-Röhrling (<i>Boletus miniatoporus</i>) dbr / g+r (punktirt), Fleisch gelb, L, N</p> <p>^s Glattstielliger Hexen-Röhrling (<i>Boletus erythropus Pers.</i>) g, br, r / g+r, Fleisch weinrot durchzogen, L</p>	<p>^{ss} Rosasporiger Röhrling (<i>Boletus Pierrhuguesii</i>) hg / hg, Röhren rosa, N</p> <p>[vgl. ^s <i>B. piperatus</i>, N, scharf, III 2, Baβ]</p>	<p>Stieloberfläche: β) ohne Netz</p>		
<p>Hut blaß: ^s Purpur-Röhrling (<i>rhodoxanthus</i>) w (g, hr) / g+r (Netz), Fleisch tiefgelb, Stiel schlank, L</p> <p>^s Satans-Röhrling (<i>B. satanas</i>) hgr (grünl.) / g+r (Netz), Fleisch blaß, Stiel tonnenförmig, L, giftig! Hut dunkel: ^s Netzstielliger Hexen-Röhrling (<i>B. luridus</i>) g (br), r / g, r L</p>	<p>^h Gallen-Röhrling (<i>Boletus felleus</i>) br / hbr (Röhren hellrosa), bitter, N</p>	<p>a) mit Netz (+ sehr fein)</p>		
<p>[vgl. ^s <i>B. erythropus Pers.</i> III 1, Bbβ]</p>	<p>^s Pfefferröhrling (<i>Boletus piperatus</i>) h (br) / g (Röhren rostrot), scharf, N [vgl. ^{ss} <i>B. Pierrhuguesii</i>, mild, III 2, Bbβ]</p>	<p>β) ohne Netz</p>		
<p>[vgl. ^s <i>B. satanas</i> III 1, Bba; ^s <i>B. luridus</i> III 1, Bba]</p>	<p>[vgl. ^h <i>B. felleus</i> III 2, Bba]</p>	<p>a) mit Netz</p>		
		<p>b) trocken (filzig)</p>		
<p>Goldgelbrötliche Verfärbung: ^s Orangeporiger Röhrling (<i>B. tridentinus</i>) g+br / g (br) Lärchen</p>	<p>[vgl. ^s <i>B. tridentinus</i> (alt) III 1, Aaβ]</p>	<p>β) ohne Netz</p>		
		<p>a) mit Netz</p>		
		<p>B. Ohne Schleier (Ring)</p>		
		<p>A. Mit Schleier (Ring)</p>		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Blätter für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1943

Band/Volume: [5_1943](#)

Autor(en)/Author(s): Heil Hans

Artikel/Article: [Röhrlings - Bestimmungstabelle 21-24](#)