Neue südeuropäische Borkenkäfer

beschrieben von

Oberförster Eichhoff zu Hambach bei Jülich.

Tomicus proximus: Oblongus, cylindricus, thorace subquadrato, antice rotundato, postice minus subtiliter rarius punctulato, elytris transversim subrugulosis profundius striato-punctatis, interstitiis distincte seriatim punctatis; declivitate postica circulari, subimpressa, ambitu infimo vix prominulo, externo et superiore crenulato, denticulis utrinque 4 (longitudine) subaequalibus acutioribus, secundo basi dilatato, quarto duplicato ab ambitu subremoto, scutello impresso; antennarum clava sinuatim subannulata. — Long. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$ lin. — Europ. mer.

Hylesinus Putonii: Oblongo - ovalis, niger, antennis pedibusque ferrugineis, supra obscure dense varioloso-squamosus, thorace subtransverso, antice attenuato, elytris punctato - striatis, interstitio primo apice subelevato, secundo ante apicem abbreviato punctorum striis inde primo et secundo ante apicem conjunctis. — Long. 3 lin.

Mit H. Kraatzii besonders durch den vor der Spitze der Flügeldecken abgekürzten zweiten Zwischenraum der Punktstreifen leicht zu verwechseln, aber merklich gedrungener; das Halsschild an der Basis fast breiter als lang, nach vorn ähnlich wie bei H. vittatus verschmälert, die Farbe der Oberseite merklich dunkler.

Sechs übereinstimmende Stücke aus Madrid von Hrn. Dr. Puton aus Remiremont gütigst eingesendet.

Crypturgus cedri: Elongatus, subnitidus, thorace subelongato, parallelo, minus confertim subtilissime punctulato, linea media angusta subelevata laevi; elytris punctato-striatis, punctis (striarum) subdilatatis, interstitiis laeviusculis. — Long. vix $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ lin.

Zwei ganz übereinstimmende Stücke aus Corsica von demselben fleissigen Forscher wie vorh. eingesendet. Fast kleiner als die

Eichhoff: über nene südeuropäische Borkenkäfer.

kleinsten Stücke des Cryp. pusillus, also um mehr als die Hälfte kleiner als Cr. cinereus, dem er äußerst ähnlich ist. Doch ist das Halsschild deutlich länger, mit weniger nach Außen gebogenen, auf der hinteren Hälfte fast geraden Seiten. Die Oberfläche ist weniger stark gewölbt und die Punktirung weitlänfiger, und der Glanz durch größern Raum zwischen den Punkten lebhafter. Die glatte Mittellinie ist sehr schmal, und länger, dabei merklich etwas erhaben. Die Punkte in den Streifen der Flügeldecken sind etwas feiner und nicht ganz so stark in die Breite gezogen, daher die Zwischenräume glatter, glänzender.

Zum Unterschied mit den beiden bisher bekannten Arten mag auch deren Diagnose hier folgen:

Cryphalus cinereus Herbst 1), Ratzb.: Oblongus, subopacus, thorace latitudine vix longiore, lateribus leviter rotundato, dorso convexo, confertissime subtiliter punctato, linea media postica laevi; elytris profunde punctato-striatis, punctis (striarum) valde dilatatis, interstitiis inde subrugulosis. — Long. $\frac{2}{3}$ lin.

Ich halte den mir vorliegenden Käfer für den ächten Cr. cinereus Hbst., Ratzb., obgleich letzterer (Forstins. I. Taf. XIII. 15.) seinen Bostr. cinereus mit einem nach hinten nicht verengten, also beiderseits nicht bogig erweiterten Halsschild abbildet.

C. pusillus Gyll.: Elongatus, nitidus, thorace oblongo-ovato, laxe punctato, linea media laevi; elytris punctato-striatis, punctis (striarum) rotundatis, interstitiis subtiliter parce seriatim punctulatis. — Long. ½ lin.

¹⁾ Graf Ferrari in seiner jüngst erschienenen Schrift über "Borkenkäfer" beschreibt p. 6. einen Cryphalus numidicus sibi. Es ist dies, wie der Autor selbst (p. 79) nach Stücken, die er von mir erhielt, die in dieser Zeitschrift (VIII. 33. Note 2.) erwähnte kürzere Form des cinereus Hbst., und ich muß bekennen, daß ich auch jetzt durch die vom Autor l. c. gegebene Diagnose von den Artrechten des Cr. numidicus nicht überzeugt worden bin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Eichhoff Wilhelm Josef

Artikel/Article: Neue südeuropäische Borkenkäfer 403-404